





L. Steiner 1878

ZOOLOGISCHES
MUSEUM
BERLIN

FÜR
KUNST UND WISSENSCHAFT
BERLIN

NATURHISTORISCHES
MUSEUM

JOHANN ALBRECHT DÖRNER

VERLAG
VON G. E. S. C. H. E. I. C. H.

LEIPZIG

VERLAG VON G. E. S. C. H. E. I. C. H.

LEIPZIG

ZOOLOGISCHE
BEYTRÄGE

ZUR

XII. AUSGABE

DES LINNEISCHEN

NATURSYSTEMS

VON

JOHANN AUGUST DONNDORFF.

ZWEYTER BAND

DIE VÖGEL.

ERSTER THEIL

RAUBVÖGEL, SPECHTARTIGE VÖGEL,
SCHWIMMVÖGEL UND SUMPFVÖGEL.

Leipzig,

in der Weidmannschen Buchhandlung.

1794.

ORNITHOLOGISCHE
BEYTRÄGE

ZUR

XIII. AUSGABE

DES LINNEISCHEN

NATURSYSTEMS

VON

JOHANN AUGUST DONNDORFF.

A. U. H.



ERSTER BAND

RAUBVÖGEL, SPECHTARTIGE VÖGEL,
SCHWIMMVÖGEL UND SUMPFVÖGEL.

KGL. CHIR. ACAD.

Leipzig,

in der Weidmannschen Buchhandlung.

1794.



COMMUNICATIONS

BY THE

NATIONAL

FOR THE

FOR THE

FOR THE

verkannt habe. Billige Kunstrichter haben dies auch eingesehen, und mir Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Die mir gegebenen Winke sollen von mir nicht unbenutzt bleiben, und ich werde das fehlende, so viel als möglich, in einem Supplementbände zu seiner Zeit nachzuholen und zu ergänzen suchen.

Da die Klasse der Vögel viel weitläufiger, als die der Säugthiere ist, so war es nicht möglich, alles dahin gehörige in Einen Band zu fassen. Die Ornithologie erscheint daher in zwey Theilen, und unter einem gedoppelten Titel, zum Besten derer, die sich etwa diese allein anzuschaffen Willens sind. Das Verzeichniß ausländischer Synonymen und das Register über das Ganze werden beym zweyten Theile erfolgen.

In Ansehung der Einrichtung habe ich natürlich den vorigen Plan beybehalten. *Lathams* Index ornithologicus, s. Systema ornithologiae etc. London 1790. Vol. I. II. gr. 4. enthält noch viele neuere Gattungen und Spielarten, die seit der Herausgabe des Gmelin - Linneischen Systems bekannt geworden sind. *Erstere* habe ich, wie vorhin bey den Säugthieren geschehen, allemal am Schluss eines jeden Geschlechts mit bemerkt, *letztere* aber den Gattungen, wohin sie gehörten, beygefügt, und mit einem * bezeichnet. Ich hätte gewünscht, daß ich auch von *Bechsteins* Uebersetzung der *Lathamschen* Synops. mehr Gebrauch hätte machen können. Aber es ist bis hieher nur der erste und zweyte Theil davon heraus; ich muß also das Uebrige im Supplementbände

nachholen. Von *Briffon* wird man die französischen Synonymen nach der Octavausgabe der Ornithologie, Lond. 1763. angeführt finden. Es ist ein Fehler, daß nicht eben dies bey den Säugthieren im ersten Bande beobachtet ist.

Uebrigens wünsche ich nichts mehr, als daß durch meine mühsame Arbeit, der einzige Zweck derselben — die Erleichterung des Studiums der Zoologie — erreicht werden möge. Quedlinburg vor der Ostermesse 1794.

Donndorff.



ZWEYTE KLASSE.

A V E S. (*Vögel*.)

ERSTE ORDNUNG.

ACCIPITRES. (*Raubvögel*.)

41. GESCHLECHT. VULTUR. *Der Geyer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 48. Gen. XLI.

Leske, Naturgesch. I. p. 229. Gen. X.

Borowsky, Thierreich, II. p. 60 Gen. I.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 156.
Gen. A.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 305. Gen. I.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 196. Gen. I.

Halle, Vögel, p. 184. Gen. II.

Pennant, arct. Zool. II. p. 184.

Onomat. hist. natur. VII. p. 845.

Klein, hist. av. prodr. p. 42.

Briffon, ornithol. I. p. 130. Gen. X.

Batsch, Thiere, I. p. 285. Gen. L.

Latham, allgem. Uebersicht der Vögel, I. p. 3.
Gen. I.

Latham, Index ornithol. f. Syst. ornithol. I.
p. 1. Gen. I.

Hermann, tab. affin. animal. p. 170.

Donndorf, Handb. der Thiergeschichte, p. 195.
Gen. I.

I. GRYPHUS. *Der Condor.* (1)

Müller, Naturfyft. I. p. 49. n. 1. *der Cuntur.*

Leske, Naturgesch. p. 229. n. 1. *der Kuntur.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 62. n. 2. *Greifgeyer, Cuntur, Condor.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 156. n. 1. Vultur (Gryphus), caruncula verticali longitudine capitis; *der Condor, Cuntur, Greifgeyer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 307. *der Cuntur, oder so genannte Vogel Greif.*

Funke, Naturgesch. I. p. 312. *der Condor.*

Ebert, Naturlehre, II. p. 15. *der Cuntur.*

Halle, Vögel, p. 194. n. 131. *der Greif; mit einem Helmgewächse.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 2. n. 2. *der Cuntur.*

Neuer Schaupl. der Natur, III. p. 512. *Greifgeyer.*

Onomat. hist. nat. III. p. 259. *der grosse peruvianische Raubvogel, Condor genannt.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 137. *der Cuntur.*

Klein, Vorbereitung zur Vögelhist. p. 86. n. 8. *Greifgeyer.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 45. n. 8. *Greifgeyer.*

Brisson, ornithol. I. p. 137. n. 10. *le Condor.*

Büsson, Vögel, I. p. 245. *der Greifgeyer.*

Batsch, Thiere, I. p. 286. n. 2. *der Cuntur.*

Latham, Vögel, I. p. 5. n. 1. *der Kondur, Greiffgeyer.*

Latham,

(1) Der grösste von allen fliegenden Vögeln. Hauptsächlich im westlichen Südamerika. Grösse und Stärke werden aber von einigen ganz übertrieben angegeben. Lebt meist vom Raube unter den Viehheerden und von todtten Fischen, die die See auswirft.

Latham, Syst. ornith. I. p. 1. n. 1. Vultur (Gryphus) maximus, caruncula verticali longitudine capitis, gula nuda.

Eberhard, Thiergeschichte, p. 69. *der weifs und schwarze Geyer, oder der Greif.*

Vidaure, Beschr. von Chile. p. 69. *Condoro.*

Schlözer, Erdbeschr. von Amerika, p. 8+6. *der Condor.*

Condamine, Reisen, Erf. 1763. p. 261. *Condor.*

*Tesdorpf*s, Beschreibung des Kolibrits u. s. w. p. 20. n. 22. *Condor.*

Berlin. Samml. IV. p. 292. *der Contor.*

Goeze, Allerley, I. p. 143. II. p. 137. n. 1. III. p. 123. n. 7. *Condor.*

Dresdner g. Anz. 1761. St. 27 *Contur.*

Krünitz, Encyklop. XIX. Art. *Greif.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 255. *Cuntur.*

Meidinger, Vorles. über das Thierreich, p. III. n. 1. *der Kunthur.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 86. n. 1. Vultur (Gryphus) maximus, caruncula verticali longitudine capitis.

Ludolf, Aethiop. II. p. 165. *Contur.*

Acosta, hist. des Indes p. 197.

Hermann, Tab. affin. anim. p. 172. *Gryphus.*

Fonston, av. p. 179. *Cuntur.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 195. n. 1. *der Condor.*

2. BENGALENSIS. *Der bengalische Geyer.*(²)

Latham, Vögel, I. p. 17. n. 16. *der Geyer aus Bengalen.* Tab. I.

A 2

Latham,

(2) Soll, nach *Latham* a. a. O. das Weibchen von *Hasselquist's Vultur Percnopterus* seyn. In dem *Syst. ornith.* ist er als eine

Latham, Syst. ornith. I. p. 3. n. 4. β . Vultur nigricans, capite colloque denudatis; corpore subtus scapis pennarum albis.

3. PAPA. *Der Geyerkönig.*

Müller, Naturfyft. II. p. 54. n. 3. *der Kahlhals*, Tab. I. fig. I.

Leske, Naturgeschichte, p. 230. n. 2. *der Geyerkönig.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 61. n. 1. *Geyerkönig; indian. Geyer; Kurtengeyer; Tab. I.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 157. n. 2. Vultur (Papa) naribus carunculatis, vertice colloque denudato; *der Geyerkönig, Kuttengeyer, Sonnengeyer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 307. *der Geyerkönig.*

Funke, Naturgesch. I. p. 312. *der Geyerkönig.*

Ebert, Naturl. II. p. 16. *Geyerkönig*, Tab. 23. fig. 1.

Halle, Vögel, p. 184. n. 123. *der Geyerkönig, mit dem Ritterbande.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 4. n. 3. *Mönchsgeier, Geierkönig, Kuttengeier, Sonnengeier.*

Neuer Schaupl. der Natur, III. p. 400. n. 3. *Geyerkönig. Vultur monachus.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 855. *der Geyerkönig.*

Klein, av. p. 46. n. 9. *Vultur Monachus. Rex Warwouwarum.*

Klein, Vorbereit. p. 88. n. 9. *Kuttengeyer, Mönch, König der Geyer.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 46. n. 9. *Kuttengeyer, Mönch, Geyerkönig.*

Briffon,

eine Varietät von *Falco Leucocephalos* aufgeführt, und auch *Hasselquists Percnopterus* dahin gerechnet.

Briffon, ornitholog. I. p. 135. n. 1. le Roi des Vautours.

Büffon, Vögel, I. p. 226. *der Geyerkönig*; mit 1 Figur.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 3. *der Geyerkönig*.

Batsch, Thiere, I. p. 287. *der Kuttengeyer*.

Latham, Vögel, I. p. 7. n. 3. *der Geyerkönig*; Titelpupf.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 4. n. 7. Vultur (Papa) rufescente-albus, naribus carunculatis, vertice colloque denudatis.

Berlin. Samml. IV. p. 173. *der Geyerkönig*; mit einer Figur.

Meidinger, Vorles. p. III. n. 2. *der Geyerkönig*.

Krünitz, Encyklop. XVIII. p. 376. *der Geyerkönig*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 86. n. 3. Vultur (Papa) naribus carunculatis, vertice colloque denudato.

Laet, nov. orb. p. 232. *Cosquauthli*.

Nieremb. hist. nat. p. 224. Regina aurarum.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 195. n. 2. *der Geyerkönig*.

4. MONACHUS. *Der arabische Geyer.*

Müller, Natursystem, II. p. 56. n. 4. *der Kahlkopf*.

Onomat. histor. natur. VII. p. 854. *der arabische Mönchsgeyer*.

Briffon, Syst. ornith. I. p. 138. n. 14. le Vautour d'Arabie.

Latham, Vögel, I. p. 8. n. 4. *der Mönch, der arabische Geyer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 5. n. 9. Vultur (Monachus) vertice gibboso, corpore nigro.

Lapeirouse, neue schwed. Abhandl. III. p. 100.
Vultur monacus, vertice gibboso, corpore nigro, pedibus et cera rubicundis.

5. AURA. *Der Urubu.* (3)

Müller, Naturfyst. II. p. 56. n. 5. *der Menschenfresser*,

Borowsky, Thierreich, II. p. 63. n. 3. *der Menschenfresser*, *Urubu*, *brasilianische Geyer*.

Halle, Vögel, p. 192. n. 130. *der brasilianische Geyer*.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 4. n. 5. *Menschenfresser*, *Kahlkopf*, *brasilianische Geyer*.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 183. n. 1. *der Aasgeyer*.

Neuer Schauplatz der Natur, III. p. 400. n. 4. *brasilianischer Geyer*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 849. *der brasilianische Geyer*, *Dreckvogel*, *Luderrabe*.

Handbuch der Naturgesch. II. p. 246. *Urubu*.

Klein, av. p. 44. n. 7. *Vultur brasiliensis Urubu dictus*.

Klein, Vorbereit. p. 85. n. 7. *Kahlkopf*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 44. n. 7. *Kahlkopf*.

Briffon, ornithol. I. p. 135. n. 10. *le Vautour du Bresil*.

Büffon, Vögel, I. p. 234. *der brasilianische Geyer*, *Urubu*; m. 1 Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 287. *der Urubu*.

Latham,

- (3) Gewichte, nach *Catesby* und *Pennant*, vier und ein halbes Pfund. Hat einen sehr scharfen Geruch, und wittert das Aas in einer großen Entfernung aus. Ist auch im wilden Zustande nicht scheu, und läßt sich bey dem Fressen ganz nahe kommen.

Latham, Vögel, I. p. 8. n. 5. *Urubu, der brasilianische Geyer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 4. n. 8. Vultur (Aura) fusco-griseus, remigibus nigris, rostro albo.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 12. *der indianische Bussaar, oder Busshart.*

Schöpf, Reise durch Nordamerika, II. p. 161. *der Buzard.*

Schlözer, Erdbeschr. von Amerika, p. 748. *Gallinazo.*

Murr, Reisen der Missionar. p. 223. *Gallinazo.*

Murr, Reif. d. Miss. p. 547. *Urubu.*

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 91. *der dunkelgraue Geyer mit schwarzen Flügeln, und einem weissen Schnäbel?*

Krünitz, Encyklop. XVIII. p. 377. *der brasilianische Geyer, Urubu.*

Linne, Syst. N. Ed. X. I. p. 86. n. 4. Vultur (Aura) fusco-griseus, remigibus nigris, rostro albo.

Jonston, av. p. 202. *Urubu.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 196. n. 3. *der brasilianische Geyer.*

β. JOTA. *Der Jote.*

Latham, Vögel, I. p. 10. not. *

Latham, Syst. ornith. I. p. 5. n. 8. β niger, remigibus fuscis, rostro cineraceo.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 196. *der Jote.*

6. CINEREUS. *Der gemeine Geyer.*(4)

Bechstein, Naturgesch. I. p. 306. n. 1. *der gemeine Geyer.*

A 4

Bechstein,

(4) Nährt sich zwar hauptsächlich von Aas; stößt aber auch auf Rehe, Ziegen, Schafe, Hasen u. dgl. und ist so gefräßig und

- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 197. n. 1. *der gemeine Geyer*. p. 199. *der Geyer, grosse Geyer, braune Geyer, graue Geyer*; Tab. 8.
- Ebert*, Naturl. II. p. 18. *der schlechtweg sogenannte Geyer*.
- Handbuch der Naturgesch. II. p. 155. *der gemeine Geyer*.
- Klein*, av. p. 44. n. 4. *Vultur cinereus*.
- Klein*, Vorbereit. p. 84. n. 4. *grauer Geyer, graue Weihe*.
- Klein*, verbesserte Vögelhist. p. 44. n. 4. *grauer Geyer*.
- Briffon*, ornithol. I. p. 130. n. 1. *le Vautour*.
- Büffon*, Vögel, I. p. 202. *der grosse, gemeine Geyer*; m. 1 Fig.
- Latham*, Vögel, I. p. 13. n. 8. *der grosse Geyer*.
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 1. n. 2. *Vultur (cinereus) fusco-nigricans, remigibus rectricibusque cinerascens, pedibus pennatis*.
- Bechstein*, Musterung schädli. Thiere p. 55. n. 1. *der gemeine Geyer*.
- Jonston*, av. p. 17. *Vultur cinereus*.

8. FUSCUS. *Der braune Geyer.* (5)

Neuer Schaupl. d. Nat. III. p. 400. n. 1. *der braune Malthesergeyer*.

Büffon,

und auf seinen Raub so sehr erpicht, daß er sich leicht dabey fangen und schießen läßt.

- (5) Bey dieser und den beyden folgenden Gattungen herrscht in Ansehung der Synonymen grosse Verwirrung, da es von ihnen, so wie von der *vorbergehenden*, noch nicht völlig ausgemacht ist, ob sie wirklich besondere Gattungen, oder nur Spielarten von *V. Percnopterus* sind. Ist dieß nicht, so sind auch die Synonymen, die der Uebersetzer von *Cetti* in den Noten angeführt hat, unrichtig.

Bliffon, Vögel, I. p. 214. *der braune oder Malthefergeyer*; m. I Fig.

Krünitz, Encyklop. XVIII. p. 376. *der braune oder Malthefer Geyer*.

Briffon, av. I. p. 130. n. 2. le Vautour brun.

Latham, Vögel, I. p. 14. n. 9. *der Malthefergeyer*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 5. n. 10. Vultur (Fuscus) fuscus, remigibus nigricantibus, primoribus apice albis, fusco maculatis, pedibus nudis.

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 3. *der Greif*.

Jonston, av. p. 15. Heteropos?

9. NIGER. *Der schwarze Geyer*.

Bliffon, Vögel, I. p. 197. *schwarzer Geyer*.

Briffon, ornith. I. p. 131. n. 4. le Vautour noir.

Latham, Vögel, I. p. 14. n. 10. *der schwarze Geyer*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 6. n. 11. Vultur (Niger) niger, remigibus rectricibusque fuscis, pedibus pennatis.

Cetti, Naturgesch. von Sardin. II. p. 9. *der schwarze Geyer*.

Boswell, Besch. von Corsica, p. 45. *der Geyer*.

10. LEUCOCEPHALUS. *Der weifsköpfige Geyer*.⁽⁶⁾

Klein, av. p. 44. n. 5. Vultur albicans?

Klein, Vorbereit. p. 84. n. 5. *weifser Geyer*, *Hünerweihe*, *weifser Hünerahr*?

A 5

Klein,

(6) Hält sich haufenweise mit andern Gattungen seines Geschlechts bey Aefern auf, soll aber besonders sein Vergnügen an Menschenkotie finden.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 44. n. 5. *weißer Geyer?*

Büffon, Vögel, I. p. 210. *der kleine Geyer.*

Batsch, Thiere, I. p. 290. *der norwegische Bergadler.*

Briffon, ornith. I. p. 134. Vautour à tête blanche.

Latham, Vögel, I. p. 12. n. 7. Var. A. *der aschgraue Aasgeyer; der Geyer aus Norwegen.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 2. n. 4. Falco (Leucocephalus) corpore fuliginoso maculis rufis; capite, collo basique caudae albis.

Lapeirouse, neue schwed. Abh. III. p. 100. *Vultur leucocephalus.* Rostrum elongatum, corneum, Irides caeruleae. Caput nudum, croceum, uti et cera et guttur, villis raris albis adpersum. Corpus albo-fuscum. Ventriculus nudus, prominens, croceus. Remiges nigrae. Pedes elongati, nudi, cinerascens.

II. FULVUS. *Der braunrothe Geyer.* (7)

Ebert, Naturl. II. p. 18. *der braunrothe Geyer.*

Halle, Vögel, p. 190. n. 128. *der graurothe Geyer.*
Fig. 10.

Neuer Schauplatz der Natur, III. p. 398. n. 3. *der braunrothe Geyer.*

Büffon, Vögel, I. p. 193. *der braunrothe Geyer;*
n. 1 Fig.

Briffon, ornithol. I. p. 133. le Vautour fauve.

Latham, Vögel, I. p. 15. n. 11. *der rothgelbe Geyer, der Greif.*

Latham,

(7) Länge, nach *Briffon*, 3 Fufs, 6 Zoll; Flügelweite 8 Fufs. Nährt sich auf den samamisschen Alpen von allerley Sorten Aas, und wird von den dasigen Einwohnern *Dal* genennet, welche sich seines Fetts statt einer Salbe bedienen, wenn sie mit Gliederreissen behaftet sind.

Latham, Syst. ornith. I. p. 6. n. 13. Vultur (Fulvus) griseo - fuscescens, capite, collo et tor- que albis, remigibus rectricibusque nigris.

7. PERCNOPTERUS. *Der Aasgeyer.* (8)

Müller, Naturfyst. II. p. 59. n. 7. *der Erdgeyer.*

Leske, Naturgesch. p. 230. n. 4. *der Erdgeyer.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 65. *der egyptische Erdgeyer, heilige Geyer.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 257. n. 4.

Vultur (Percnopterus) remigibus nigris, mar- gine exteriore, praeter extimas, canis; *der Aasgeyer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 308. n. 5. *der Aas- geyer.*

Funke, Naturgesch. I. p. 313. *der Aasgeyer.*

Ebert, Naturl. II. p. 20. *der Erdgeyer.*

Halle, Vögel, p. 192. n. 129. *der Geieradler.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 6. n. 7. *der Aasgeier, Erdgeier.*

Beckmann, Naturhist. p. 37. *der ägyptische Erd- geyer.*

Neuer Schaupl. der Nat. III. p. 400. n. 2. *der ägy- ptische Geyer.*

Onomat.

(8) Die Verwechslung der Synonymen bey dieser Gattung so wohl an sich, als auch zwischen ihr und dem *Falco Barbatus* (Syst. p. 252. n. 38) ist groß, und die Beschreibungen in Ansehung der Größe, des Ansehens, des Vaterlandes, u. s. f. sehr verschieden. *Lathams* Beschreibung, den ich im System nicht angeführt finde, paßt offenbar zu dem *Percnopterus*, aber er zieht *Brissons Vultur alpinus* mit hieher, der im Sy- stem a. a. O. zu *Falco Barbatus* gerechnet wird, obgleich *Linne* ihn in der XII. Edition noch zu seinem *Percnopterus* rechnete; wohin er auch sammt *Ray's* und *Willughby's* *Percnopterus* wohl zu gehören scheint. Nach *Lapeirouse* ist weder das Männchen ganz weiß, noch das Weibchen ganz braun, die Jungen aber weißlich u. s. w.

- Onomat. histor. nat. VII. p. 858. *der Geyeradler, der ägyptische Erdgeyer.*
- Klein*, av. p. 44. n. 6. *Vulturina Aquila.*
- Klein*, Vorbereit. p. 85. n. 6. *Geyeradler, Bastardadler.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 44. n. 6. *Adlergeyer, Bastartadler.*
- Büsson*, Vögel, I. p. 190. *der Geyeradler.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 287. *der Erdgeyer.*
- Latham*, Vögel, I. p. II. n. 7. *der Aasgeyer, Geyeradler, Alpengeyer.*
- Latham*, Syst. ornith. I. p. 2. n. 3. Vultur (*Pernopterus*) remigibus nigris, margine exteriori, praeter extimas, albis.
- Eberhard*, Thiergesch. p. 68. *der ägypt. Geyer.*
- Schwed. Abhandl. XIV. p. 203. *ägyptische Bergfalke.*
- Lapeirouse*, neue schwed. Abhandl. III. p. 99. Vultur (*Pernopterus*), auribus denudatis, claviculis prominentibus, remigibus nigris, secunda brevior?
- Bruce*, Reise nach d. Quellen des Nils, V. p. 167. Tab. 33. *Rachamah.*
- Hasselquist*, Reise nach Palästina, *Edit. german.* p. 286. n. 14.
- Goeze*, All. II. p. 139. n. 3. *der Aasgeyer.*
- Krünitz*, Encyklop. XVIII. p. 372. *der Geyeradler, oder Bastardadler.*
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI, p. 17. n. 1. Falco capite nudo albicans.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 87. n. 6. Vultur (*Pernopterus*) remigibus nigris, margine exteriori (praeter extimas) canis.
- Hermann*, tab. affin. animal. p. 172. V. *Pernopterus.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 196. n. 4.
der Aasgeyer.

β. *Büffon*, Vögel, I. p. 216. *der ägyptische Erdgeyer.*

Briffon, ornitholog. I. p. 131. n. 3. le Vautour d'Egypte.

Latham, Vögel, I. p. 13. n. 7. Var. B. *der ägyptische Aasgeyer.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 2. n. 2. β. V. rufo-cinereus, fusco maculatus, pedibus nudis.

Krünitz, Encyklop. XVIII. p. 376. *der heilige ägyptische Geyer, ägyptischer Erdgeyer.*

Halle, Vögel, p. 186. n. 125. *der ägyptische Erdgeier.*

Merrem, verm. Abh. p. 92. n. 3. V. *ägyptischer Geyerkalke.*

Jonston, av. p. 24. *Sacer Aegyptius.* Tab. 9. *Abbild. schlecht.*

12. CRISTATUS. *Der Hasengeyer.* (9)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 202. n. 3. *der Hasengeyer.* p. 204. *Aasgeyer, Kibgeyer, Rossgeyer, Gänseaar.*

Ebert, Naturl. II. p. 19. *der Hasengeyer.*

Halle, Vögel, p. 189. n. 126. *der Hasengeier.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 7. n. 8. *der Hasengeyer.*

Neuer

(9) In Deutschland giebt man Schlesiern zu seinem Vaterlande an; eigentlich aber bewohnt er die südlichen bewachsenen Gebürge von Europa. Im Jahr 1513. fing man im Januar im Elßas zwey solcher Vögel, und im folgenden Jahre traf man wieder einige in einem Neste auf einem sehr hohen dicken Eichbaum nicht weit von der Stadt Misen an. Seiner Gefräßigkeit ohnerachtet kann das Thier doch ohne Lebensgefahr an vierzehn Tage hungern.

Neuer Schauplatz der Natur, III. p. 398. n. 4. *der Hasengeyer.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 135. *der Hasengeier.*

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 91. *Hasengeyer.*

Klein, av. p. 44. n. 2. Vultur Leporarius.

Klein, Vorbereit. p. 83. n. 2. *Hasengeyer*, *Gänsefahr.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 44. n. 2. *Hasengeyer*, *Gänsefahr.*

Briffon, ornith. I. p. 132. n. 6. *le Vautour hupé.*

Büffon, Vögel, I. p. 204. *der Hasengeyer.*

Latham, Vögel, I. p. 15. n. 12. *der Haasengeyer*, *Gänseadler.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 6. n. 13. Vultur (Cristatus) rutilo-nigricans, cristatus, pectore rufescente, pedibus nudis.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 259. n. 2. *Hasengeyer*, *Vogelgeyer.*

Naturforsch. VIII. p. 42. n. 2. *Hasengeyer.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 76. c. 116. *der Hasengeyer.*

Martini, Naturlex. I. p. 51. *Aasgeyer*, *oder Hasengeyer.*

Bechstein, Musterung schädli. Thiere. p. 97. n. 3. *der Hasengeyer.*

Krünitz, Encyklop. XVIII. p. 373. *der Hasengeyer* *oder Hasenstößer.*

Kraft, Ausrott. grauf. Thiere, II. p. 527. n. 14. *Gans - Ahr.*

Jablonsky, allg. Lex. p. 395. *der Hasen - Geyer.*

Merklein, Thierreich, p. 270. *Hasengeyer.*

Jonston, av. p. 18. V. Leporarius.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 197. n. 5. *der Hasengeyer.*

13. BARBARUS. *Der Geyer aus der Barbarey.* (10)
Briffon, ornith. I. p. 137. n. 13. le Vautour barbu?
Latham, Vögel, I. p. 10. n. 6. *der Bartgeyer*,
Goldgeyer?
Latham, Syst. ornith. I. p. 3. n. 5. Vultur (Barba-
 rus) ex atro fuscus, subtus albo-fufcescens, pe-
 dibus lanatis, digitis plumbeis, unguibus fuscis.
Seligmann, Vögel, V. Tab. 1. *der Bartgeyer?*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 202.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Ver-
 mehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

Edit. XIII.

- p. 120. n. 2. Vultur Harpya. p. 251. n. 34. Falco Harpya.
 p. 123. n. 6. Vultur Barbatus. p. 252. n. 38. Falco Barbatus.
 p. 123. n. 8. Vultur Albicilla. p. 253. n. 39. Falco Albicilla.

In der XIIten Edition enthielt dies Geschlecht acht Gattungen; von welchen nunmehr nach diesem Verzeichniß 3 unter das folgende Geschlecht gebracht sind. Da aber die XIIIte Edition demohnerachtet 13 Gattungen hat, so sind 8 neue, als n. 2. 6. 8. 9. 10. 11. 12. und 13. hinzugekommen; überdem aber bey der 5. und 7. zwey Varietäten aus einander gesetzt; wovon die bey ersterer ganz neu, bey der letztern aber nur die Synonymen getrennt sind.

B. *Un-*

(10) Ich habe das französische Synonym aus *Briffon*, und die deutschen aus *Lathams* Uebersetzung hier angeführt, weil ich sie im System selbst bemerkt finde. Aber sollten nicht beyde, und auch *Edward's bearded Vulture* zu *Falco Barbatus* p. 252. n. 38. gehören? da zumal bey der Var β das *Lathams Golden Vulture* n. 13. angeführt ist, der ohnstreitig mit seinem *Bearded Vulture* n. 6. einerley ist. Was übrigens von *Edward* gilt, muß auch von *Seligmann* gelten.

B. Unbestimmtere Thiere.

1. *Vultur (Arrian)* fuscus, collo dimidio pedibusque nudis caerulescentibus. *Auf den Pyrenäen.*
Lapeirouse, neue schwed. Abhandl. III. p. 100.
2. *Vultur (Stercorarius)* albidus, capite, cera et g' bbo nudis croceis; remigibus nigris; pedibus nudis cinerascens. *Auf den Pyrenäen, wo er Alimoch heißt.*
Lapeirouse, a. a. O.

C. Neuere Gattungen.

1. *Der Geyer aus Pondischery.*
Latham, Vögel, I. p. 21. n. 21.
Latham, Syst. ornith. I. p. 7. n. 14. *Vultur (Ponticerianus)* niger, capite colloque subdenudatis, incarnatis; lateribus colli caruncula carnosa rubra.
Sommerat, voy. Ind. II. p. 182. le Vautour royal de Pondicheri. Tab. 104.
2. *Der indianische Geyer.*
Latham, Vögel, p. 22. n. 22.
Latham, Syst. ornith. I. p. 7. n. 15. *Vultur (Indicus)* fuscus, corpore supra fasciis pallidis, capite colloque denudatis, rufis, remigibus rectricibusque nigris.
Sommerat, l. c. p. 183. le grand Vautour des Indes, Tab. 105.
3. *Der Geyer aus Gingi.*
Latham, Vögel, I. p. 22. n. 23.
Latham, Syst. ornith. I. p. 7. n. 7. *Vultur (Gingianus)* albus, remigibus nigris; rostro pedibusque griseis.
Sommerat, l. c. p. 184. le Vautour de Gingi.

42. GESCHLECHT. FALCO. *Der Falk.*

- Müller*, Naturfyst. II. p. 62. Gen. XLII.
Lesske, Naturgesch. p. 231. Gen. XI.
Borowsky, Thierreich, II. p. 66. Gen. II.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 158.
 Gen. II.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 204. Gen. II.
Funke, Naturgesch. I. p. 277. 281. und 312.
Ebert, Naturl. II. p. 22 ff.
Haile, Vögel, p. 174. Gen. I. p. 195. Gen. III.
Pennant, arct. Zool. II. p. 185.
 Neuer Schaupl. der Natur, I. p. 96. II. p. 750.
 Onomat. hist. nat. I. p. 42. u. 616.
Klein, av. Prodrum. p. 47. Gen. I. Trib. 3.
Briffon, ornithol. I. p. 89. Gen. VIII. p. 121.
 Gen. IX.
Batsch, Thiere, I. p. 285. Gen. LI.
Latham, allg. Ueberf. der Vögel, I. p. 23. Gen. II.
Latham, Syst. Ornith. I. p. 9. Gen. II.
Merrim, verm. Abhandl. p. 76.
Hermann, tab. affin. anim. p. 172.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 198
 Gen. II.

* *Mit sehr langen Füßen.*

33. SERPENTARIUS. *Der Sekretairvogel.*

- Blumenbach*, Handb. der Naturgesch. p. 158. n. 1.
 Falco (Serpentarius) cera alba, cruribus longif-
 fimis, crista cervicali pendula, rectricibus in-
 termidiis elongatis; *der Secretair.*
Latham, Vögel, I. p. 17. n. 17. *der Secretair*;
 Tab. 2. (unter den Geyern.)
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 8. n. 21 Vultur
 (Serpentarius) plumbeus, occipite cristato, pe-
 II. Band I. Th. B dibus

dibus elongatis, remigibus, crisso, femoribus-
que nigris, rectricibus intermediis longissimis.

Sparrmann, Reise n. d. Vorgeb. der g. Hoffn.
p. 148. *der Secretairvogel*. p. 149. *Schlange-
fresser*.

Boddaert, dierkundig Mengelwerk. Utrecht 1740.
4. p. 17. *Sagittarius*.

Beckmann, physikal. ökonom. Bibl. III. p. 76.
Sagittarius.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 198. n. 1.
der Sekretairvogel.

** *Geyeradler*; mit einem nur an der Spitze
gebogenen Schnabel, und langen Bartborsten
an der Wurzel.

34. *HARPYJA. Der Heiduckenadler.*

Müller, Naturfyst. II. p. 53. n. 2. *der Räuber*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 68. n. 2. *der brasili-
anische Heiduckenadler*.

Ebert, Naturl. II. p. 27. *Haubenadler, gehäubte
Adler*.

Halle, Vögel, p. 183. n. 121. *der brasilianische
Heiduckenadler*.

Halle, Vögel, p. 183. n. 122. *der große amerika-
nische Stofsadler*.

Merrem, verm. Abhandl. p. 83. n. 1. *Kronadler*.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 3. n. 3. *der Heiduckenadler*.

Onomat. hist. nat. I. p. 641. *Buschadler, Kamm-
adler, Kronenadler*.

Klein, av. p. 42. n. 8. *Urutaurana, Urutavi Cu-
quichu Carririri*.

Klein, Vorbereit. p. 81. n. 8. *Gehaupteter Adler*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 42. n. 8. *gehaubter Adler*.

Briffon,

Briffon, ornithol. I. p. 128. n. 13. l'Aigle hupé de Brésil.

Büffon, Vögel, I. p. 173. *der brasilianische Heidenuckenadler*; m. 1 Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 291. *der Heyduckenadler*.

Latham, Vögel, I. p. 7. n. 2. *die Harpye, der Geyer mit dem Federbusch*. (unter d. Geyern.)

Latham, Syst. ornith. I. p. 9. n. 1. Falco (Harpyia) capite pennis elongatis cristato, corpore vario, subtus albo.

Martini, Naturlex. I. p. 303. *der gekrönte afrikanische Adler*.

Molina, Naturgesch. von Chili, p. 208. *der grofse Adler*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 86. n. 2. Vultur (Harpyia) capite subcristato.

Jonston, av. p. 198. Urutaurana.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 198. n. 2. *der Heidenuckenadler*.

35. JACQUINI. *Der Kronenfalk.*

Latham, Vögel, I. p. 21. n. 20. *der Kronengeyer*, (unter den Geyern.)

Latham, Syst. ornith. I. p. 9. n. 1. β . Falco cristatus niger, ventre albo, femoribus albo maculatis, cauda elongata, albo nigroque varia. (*als Variet. des vorigen.*)

36. AMBUSTUS. *Der lohgelbe Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 16. n. 15. *der lohgelbe Geyer*. (unter den Geyern.)

Latham, Syst. ornith. I. p. 8. n. 1. Vultur (Ambustus) luteo-fuscus, orbitis antice nudis, gula pennis elongatis, cera ampla, pedibus caerulefcentibus.

37. *ANGOLENSIS.* *Der Falk aus Angola.*

Latham, Vögel, I. p. 16. n. 14. *der Geyer aus Angola.* (unter den Geyern.)

Latham, Syst. ornith. I. p. 7. n. 17. *Vultur* (*Angolensis*) *albus, orbitis nudis incarnatis, remigibus basique caudae nigris.*

38. *BARBATUS.* *Der Bartfalk.* (1)

Müller, Natursystem, I. p. 57. n. 6. *Bartgeyer*; Tab. I. fig. 2.

Leske, Naturgeschichte, p. 230. n. 3. *der Bartgeier, Goldgeier, Lämmergeier.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 64. n. 4. *Lämmergeyer, Goldgeyer, Bartgeyer.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 157. n. 3. *Vultur* (*Barbatus*) *rostri dorso versus apicem gibboso, mento barbato.* *Lämmergeyer, Bartgeyer, Goldgeyer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 306. *der Bartgeyer.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 199. n. 2. *der Bartgeyer.* p. 202. *Goldgeyer, Lämmergeyer, weißköpf. Geyer, Weißkopf, Grimmer.*

Funke, Naturgesch. I. p. 313. *der Bartgeyer.*

Ebert, Naturl. II. p. 19. *der Bartgeyer.*

Halle, Vögel, p. 186. n. 124. *der goldbrüstige Geier.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 5. n. 6. *Goldgeyer, Lämmergeyer, Bartgeyer.*

Neuer

(1) Das Weibchen legt 3 bis 4 Eyer, größer als Gänseeyer, weiß, von rauher Schale, und auf beyden Seiten scharf zugrundet. Man muß diesen Vogel der deutschen Benennung halber nicht mit dem *Goldadler* verwechseln. *Büffon*, und andere haben ihn mit dem *Condor* vermengt. Ueber die Verwechselung der Synonymen bey dieser Gattung, sehe man bey dem vorigen Geschlechte die Noten 8. und 10.

Neuer Schauplatz der Natur, III. p. 400. *Bärtiger Geyer.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 852. *der Bartgeyer.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 131. *der Lämmergeyer.*

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 91. n. 1. *Lämmergeyer, Bartgeyer, Goldgeyer, Greifgeyer.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 46. n. 10. *bärtiger Geyer.*

Briffon, ornitholog. I. p. 133. n. 8. *le Vautour des Alpes?*

Büffon, Vögel, I. p. 196. *Goldgeyer.* p. 259. *der Lämmergeyer der Alpen.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 3. n. 6. Vultur (Barbatus) albido-rutilus, dorso fusco, taenia nigra supra et infra oculos.

Batsch, Thiere, I. p. 288. *der Bartgeyer.*

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 17. *der Bartgeyer; Tab. 1.*

Bruce, Reise nach d. Quellen des Nils, V. p. 159. *Nisserwerk, oder der Goldadler, Abou Douchn.* Abbild. Tab. 31. schlecht. — Eine Abbild. des Kopfs aus dem Götting. Mus. ebendaf. zu Seite 249.

Pallas, Reif. Ausz. III. p. 185. *Bartgeyer.*

Beckmann, physik. ökon. Bibl. VII. p. 353. *Lämmergeyer.*

Goeze, All. II. p. 138. *der schweitzerische Lämmergeyer.*

Krünitz, Encykl. I. p. 417. *der Lämmer-Geier.* XVIII. p. 378. *Bartgeyer.*

Bechstein, Musterung schäd. Thiere p. 56. n. 2. *der Bartgeyer.*

Lapeirouse, neue schwed. Abhandl. III. p. 99.

Vultur (Barbatus), albo-rufescens, dorso

plumbeo, costis plumarum albis; pedibus lanatis; gula barbata; capite linea nigra cincto.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 87. n. 5. Vultur (Barbatus) albidus, dorso fusco, iugulo barbato, rostro incarnato, capite linea nigra cincto.

Hermann, tab. affin. animal. p. 172. n. 1. Vultur barbatus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 199. *der Lämmergeyer.*

β. *Müller*, Naturfyst. II. p. 58. *Goldgeyer.*

Klein, av. p. 43. n. 1. Vultur aureus.

Klein, Vorbereit. p. 83. n. 1. *Goldgeyer.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 44. n. 1. *Goldgeyer.*

Pallas, nord. Beyträge a. a. O. p. 64. *Goldgeyer.*
p. 66. *Sach.*

Briffon, ornith. I p. 132. n. 5. le Vautour doré.

Latham, Syst. ornith. I. p. 3. n. 6. β. Vultur rufus, dorso nigro, capite et collo supremo rufo-albis, remigibus reatricibusque fuscis.

Bresl. Natur- und Kunstgesch. 35. Verf. 85.

Krünitz, Encyklop. XVIII. p. 373. *der Goldgeyer.*

γ. FALCO (MAGNUS). *Der große Bartfalk.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 4. n. 6. β.

Merrem, vermischte Abhandl. p. 89. n. 12. *Bart-Adler.*

39. ALBICILLA. *Der Fischadler.*(²)

Müller, Natursystem, II. p. 61. n. 8. *der Fischgeyer.*

Bechstein,

- (2) Bewohnt Europa bis Island und die Lapmark hinaus, und ist in Grönland sehr gemein. Er sitzt auf den Felsen mit hangenden Flügeln, und fliegt langsam. Sein Nest macht er auf

- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 222. n. 4. *der Fischadler*. p. 226. *der große Fischadler*, *Gemsenadler*, *weißgeschwänzter Adler*, *Steingeyer*, *Weißkopf*, *Gelbschnabel*, *aschgraue Adler*, *Fischgeyer*, (*Schwalbengeyer*.)
- Ebert*, Naturl. II. p. 26. *der Fischadler?*
- Halle*, Vögel, p. 177. n. 115. *der weißköpfige Adler*; Fig. 8.
- Merrem*, verm. Abh. p. 87. n. 8. *Fischadler*.
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 8. n. 9. *der Fischgeyer*, *Schwalbengeyer*.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 204. n. B. *der aschgraue Adler*.
- Neuer Schaupl. d. Nat.* I. p. 98. *der Fischadler*.
- Onomat. hist. nat.* I. p. 648. *der weißgeschwänzter Adler*.
- Onomat. hist. nat.* VII. p. 847. *der Fischgeyer*.
- Klein*, av. p. 40. n. 2. *Aquila Pyganguis*; *Albicilla*, quibusdam *Hinnularia?*
- Klein*, Vorbereit. p. 77. n. 2. *Weißkopf*, *Gelbschnabel*.
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 41. n. 2. *Weißkopf*, *Gelbschnabel*, *Weißschwanz?*
- Brisson*, ornithol. I. p. 123. n. 5. *l' Aigle à queue blanche*.
- Büffon*, Vögel, I. p. 125. *der Fischadler*.
- Latham*, Vögel, I. p. 32. n. 8. *der aschgraue Adler*.
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 9. n. 2. *Falco* (*Albicilla*) *cera pedibusque flavis, rectricibus albis, intermediis apice nigris*.

B 4

Fischer,

auf hohen Klippen aus Zweigen, und futtert es in der Mitte mit Moos und Federn aus. Das Weibchen legt zwey Eyer, und brütet zu Ende des Mayes oder Anfang des Junius. Die Grönländer bekleiden sich mit der Haut dieses Vogels, essen das Fleisch, und tragen Füße und Schnabel als Amulete.

- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 64. n. 32.
glattköpfiger Geyer.
- Pontoppidan*, Naturhistorie von Norwegen, II.
p. 170. Fiske-Oernen.
- Pontoppidan*, Naturhist. von Dännemark, p. 165.
n. 2. Fischadler, weißköpfigter Adler.
- Leem*, Nachricht von den Lappen, p. 126. Falco
Albicilla.
- Pallas*, Reise, Ausz. I. p. 96. der weißliche Ad-
ler, oder Weißschwanz.
- Linné*, auserles. Abhandl. II. p. 287. n. 52. der
Adlergeyer.
- Tengmalm*, neue schwed. Abhandl. IV. p. 43.
Falco Albicilla.
- Bechstein*, Musterung schädlicher Thiere. p. 62.
der Fischadler.
- Otto*, neue Mannichfaltigk. IV. p. 443. Gänse-
adler.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. VI. p. 17. n. 6. Pyganguus.
- Linné*, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 89. n. 8. Falco
(Albicilla) cera flava, rectricibus albis, inter-
mediis apice nigris.
- Linné*, Fn. Suec. II. p. 19. n. 55. Falco (Albicilla)
cera flava, rectricibus albis, intermediis nigris.
- Müller*, zool. dan. prodr. p. 9. n. 58. Vultur (Al-
bicilla) cera pedibusque flavis, rectricibus albis,
intermediis apice nigris.
- Kramer*, Austr. p. 326. n. 3. Falco cera flava, re-
ctricibus albis, versus apicem nigris. Gamsen-
Geyer.
- Fabric*. Fn. Grönl. p. 53. n. 33. Vultur (Albicilla)
cera pedibusque flavis, rectricibus albis, inter-
mediis apice nigris.
- Hermann*, tab. affin. animal. p. 172. not. h. Vul-
tur Albicilla.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 199. n. 4.
der aschgraue Adler.

*** Adler; von vorzüglicher Größe, meistens mit
befiederten Füßen.

I. CORONATUS. *Der Haubenadler.*⁽³⁾

Müller, Natursystem, II. p. 62. n. I. *der Hauben-*
adler.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 164. n. IV. *ge-*
krönter Adler.

Briffon, ornithol. I. p. 128. n. 14. *l'Aigle hupé*
d'Afrique.

Büffon, Vögel, I. p. 175. *der Vogel der westli-*
chen Küste von Afrika, den Edwards unter
dem Namen des gekrönten Adlers geliefert
hat.

Martini, Naturlex. I. p. 305. *gekrönter Adler.*
Handbuch der Naturgesch. II. p. 135. *der Hauben-*
geier.

Merrem, vermischte Abhandl. p. 84. n. I. *β. Hau-*
benadler.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. I. *der gekrönte*
Adler.

Latham, Vögel, I. p. 24. n. I. *der Kronenadler.*

Bruce, Reise nach den Quellen des Nils, V.
p. 163. Tab. 82. *Nisser-Tokoon? der schwarze*
Adler?

Latham, Syst. ornithol. I. p. 11. n. 6. Falco (Co-
ronatus) *cera ferruginea, pedibus lanatis, albis,*
nigro-punctatis, pectore rufo, lateribus nigro-
fasciatis.

(3) Wird von Büffon und Merrem mit *Falco Harpyia* für einer-
ley gehalten.

40. *CHERIWAY. Der Cheriway.*(4)

Latham, Vögel, I. p. 21. n. 19. *der Cheriway.*
(unter den Geyern.)

Latham, Syft. ornith. I. p. 8. n. 20. Vultur (*Cheriway*) *cera rosea, pedibus flavis, corpore ferrugineo, capite albido, vertice cristato ferrugineo.*

41. *THARUS. Der Tharu.*

Latham, Vögel, I. p. 24. not. *** *der Tharu.*

Latham, Syft. ornith. I. p. 16. n. 24. Falco (*Tharus*) *cera pedibusque luteis, corpore albo, nigrescente, vertice cristato.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 199. n. 5.
der Tharu.

2. *MELANAETOS. Der schwarzbraune Adler.*(5)

Müller, Naturfyft. II. p. 63. n. 2. *der schwarze Adler.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 69. *Hasenadler, schwarzbrauner Adler.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 158. n. 2.
Falco (*Melanaëtos*) *cera lutea, pedibusque femila-*

(4) Länge des Vogels, nach *Latham* anderthalb Fuß, auch wohl drüber.

(5) Es ist bey weitem noch nicht ausgemacht, ob diese Gattung von *Falco Fulvus* p. 256. n. 6. des Systems wirklich verschieden, oder mit derselben einerley sey. Viele Ornithologen trennen sie; Büffon aber und mehrere, auch von denen, die ich angeführt habe, nehmen beyde theils als Spielarten, theils nur als dem Geschlecht nach von einander verschieden, diese hier für das Männchen, jene für das Weibchen an. Wäre dies, so könnte man ihn mit Bechstein *Falco Aquila* nennen, um hinführo Verwirrungen, wegen der zwey verschiedenen lateinischen Benennungen zu vermeiden.

milanatis, corpore ferrugineo-nigricante, striis flavis; *der schwarzbraune Adler.*

Bechstein, Naturg. I. p. 310. n. 2. *der gemeine Adler.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 212. n. 2.

der gemeine Adler. (mit Falco Fulvus verbunden.) p. 219. *Hasenadler, schwarzbrauner Adler; gemeiner brauner Adler; kurzschwänziger Steinadler; Kurzschwanz mit weißem Ringe, weißgeschwänzter Adler, Stock- od. Steinadler.*

Funke, Naturgesch. I. p. 279. *gemeiner Adler.*

Ebert, Naturl. II. p. 23. *der gemeine Adler.*

Halle, Vögel, p. 180. n. 118. *der schwarze Adler.*

Merrem, verm. Abh. p. 86. n. 6. *schwarzer Adler.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 10. n. 11. *der schwarze Adler, Hasenadler.*

Onomat. hist. nat. I. p. 644. *der schwarze Adler, Haasenadler.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 133. *der schwarze Adler.*

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 92. *der gemeine Adler.*

Klein, av. p. 41. n. 4. Aquila Valeria f. Melanaetus.

Klein, Vorbereit. p. 78. n. 4. *Hasenadler, schwarzer Adler.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 41. n. 4. *schwarzer Adler, Hasenadler.*

Briffon, ornithol. I. p. 125. n. 3. l'Aigle noir.

Büffon, Vögel, I. p. 108. *der gemeine Adler.*

Tab. 3. *der gemeine schwarze Adler.*

Batsch, Thiere, I. p. 289. *der gemeine Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 25. n. 2. *der gemeine Adler, der schwarze Adler.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 10. n. 3. Falco (Melanaetos) cera lutea, pedibus semilanicatis, corpore ferrugineo-nigricante, striis flavis.

Beseke,

Beske, Beyträge zur Naturgesch. der Vögel Kur-lands, p. 2. n. 1. *der schwarze Adler.*

Fischer, Naturgesch. von Livl. p. 64. n. 33. *Hasenadler, schwarzer Adler.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 260. n. 4. *schwarzer Adler.*

Naturforsch. VIII. p. 43. n. 4. *der schwarze Adler.*

Martini, Naturlex. I. p. 306. *schwarzer Adler.*

Lapeirouse, neue schwed. Abhandl. III. p. 101. Falco Melanaetos.

Bechstein, Musterung schädli. Th. p. 59. n. 5. *der gemeine Adler.*

Eberhard, Thiergesch. p. 68. *der schwarze Adler.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 21. *der Stockadler.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 460. *Hasenadler.*

Kraft, Ausrott. grauf. Th. II. p. 520. *Melanaetos oder Valeria.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 88. n. 1. Falco (Melanaetos) cera lutea, pedibus femilanatis, corpore ferrugineo-nigricante, striis flavis.

Plin. hist. nat. Lib. I. c. 3. Melanaetes.

42. GLAUCOPIS. *Der blaufchnäblichte Adler.* (6)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 234. *der weisköpfige Adler.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 16. n. 25. Falco (Glaucopis) cera et pedibus femilanatis citrinis, dorso et pectore fusco, capite et cervice ex flavicante albis, striis fuscis, remigibus nigris.

3. LEU-

(6) Die Beschreibung ist nur noch von einem einzigen und zwar von einem einjährigen Exemplare, das auf dem Dransberge bey Göttingen aus dem Neste genommen und aufgezogen wurde, gemacht worden. Da aber fast alle Raubvögel bis ins dritte Jahr ihre Farbe ändern, so ist noch nicht gewis, ob es wirklich eine eigne Gattung, oder nur ein junger Vogel von einer andern, vielleicht vom Fischaar sey.

3. LEUCOCEPHALUS. *Der weißköpfige Adler.* (7)

Müller, Naturfyst. II. p. 64. n. 3. *der Weißkopf.*

Halle, Vögel, p. 178. n. 116. *der weißköpfige Adler mit glattem Kopfe.*

Merrem, verm. Abh. p. 88. β. *der weißköpfige Fisch-Adler.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 187. n. 5. *der Adler mit dem weißen Kopfe.*

Onomat. histor. nat. I. p. 632. *der weißköpfige Adler, der kahle Adler.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 11. n. 12. *der weißköpfige Adler.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 132. *der Weißkopf.*

Klein, av. p. 40. ad n. 2. *Aquila capite albo virginienfis.*

Klein, Vorbereit. p. 78. ad n. 3. *ein glattköpfiger Adler.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 41. ad n. 2. *ein Adler aus Virginien und Carolina, dessen Kopf, halber Hals und Schwanz weiß sind.*

Briffon,

- (7) Pennant sagt: Dieser Vogel begleitet gewöhnlich den Jäger und raubt ihm das erlegte Wildpret, ehe er es erreichen kann. Sie nisten in den größten verdorrten Cypressen oder in Fichten, welche über die See oder große Flüsse herabhängen, in Gesellschaft des Balbusard, Reigers und anderer Vögel. Ihre Nester sind so zahlreich, daß sie einem Dohlenest ähnlich sehen, sind sehr groß, und stinken von den Ueberbleibseln der Beute dieser Vögel. — Sie sollen sehr oft brüten, und unter ihre kahlen Jungen schon wieder Eyer legen, welche die Wärme der Jungen ausbringt. — An der Hudsonsbay kommt der Vogel im May an, und bauet auf die höchsten Bäume. Den weißen Kopf und Hals soll er nicht vor dem zweyten Jahre bekommen. *Bechstein* nimmt ihn als eine Varietät von *Falco Albicilla* an.

Briffon, ornithol. I. p. 122. n. 2. l' Aigle à tête blanche.

Biiffon, Vögel, I. p. 126. *der weißköpfige Adler.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 2. *der Adler mit dem weißen Kopf.*

Latham, Vögel, I. p. 25. n. 3. *der weißköpfige Adler.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 11. Falco (Leucocephalus) cera lutea, pedibusque semilunatis, corpore fusco, capite caudaque albis.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 265. n. 8. *der Weißkopf, Gelbschnabel, Fischadler.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 65. n. 35. *Weißkopf.*

Cetti, Naturgesch. von Sardin. II. p. 31. *der weißgeschwänzte Adler.*

Boswell, Besch. von Corfica, p. 45. *Adler?*

Martini, Naturlexicon, I. p. 298. *der weißköpfige Adler.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 89. n. 8. β . Aquila capite albo.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 200. n. 6. *der weißköpfige Adler.*

4. OSSIFRAGUS. *Der Seeadler.* (8)

Müller, Natursystem, II. p. 64. n. 4. *der Beinbrecher.*

Borowsky,

(8) Länge 3 Fufs, 6 bis 10 Zoll. Flügelweite 8 Fufs. Hält sich am liebsten nahe an den Ufern des Meers auf, verachtet aber auch das platte Land nicht, wenn fischreiche Flüsse, Seen und Teiche in der Nähe sind. Nährt sich besonders von großen Fischen, auf die er mit Ungestüm losstürzt; nimmt aber auch Lämmer, Hasen, junge Ziegen und Gänse mit sich fort. Horstet auf den höchsten Bäumen, besonders auf Eichen, macht ein außerordentlich breites Nest; legt alle
Jahr

- Borowsky*, Thierreich, II. p. 69. n. 4. *Beinbrecher*, *Meeradler*.
- Blumenbach*, Handb. der Naturgesch. p. 159. n. 4. Falco (*Ossifragus*) *cera lutea*, pedibusque *se-milananis*, corpore ferrugineo, rectricibus laterè interiore albis; *der Fischadler*, *Beinbrecher*.
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 311. n. 3. *der See-adler*.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 219. n. 3. *der Seeadler*. p. 222. *Meeradler*, *Beinbrecher*, *großer Meeradler*, *großer Hasenadler*, oder *Hasenaar*, *Gänseadler*, *bartiger Adler*, *Fischadler*, *Skast*. (in Thüringen *Steinadler*.)
- Funke*, Naturgesch. I. p. 278. *der Fischadler*.
- Ebert*, Naturl. II. p. 25. *der große Meeradler*.
- Halle*, Vögel, p. 181. n. 119. *der Meeradler*.
- Merrem*, vermischte Abhandl. p. 86. n. 7. *Beinbrecher*.
- Gatterer*, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 11. n. 13. *der Beinbrecher*, *Fischadler*.
- Pennant*, arct. Zoolog. II. p. 185. n. 2. *der See-adler*.
- Neuer Schaupl. der Natur, I. p. 98. n. 3. *der große Meeradler oder Beinbrecher*.
- Onomat. hist. nat. I. p. 645. *der Beinbrecheradler*.
- Handbuch der Naturgesch. II. p. 133. *Beinbrecher*. Tab. IV. *Meeradler*.
- Handb. der deutschen Thiergesch. p. 93. *Fischadler*, *Beinbrecher*.
- Klein*, av. p. 41. n. 5. *Aquila ossifraga*.

Klein,

Jahr zwey große, abgerundete, schwere, schmutzigweißse und rothgefleckte Eyer, bringt aber oft nur Ein Junges aus, daher seine schwache Vermehrung. Das Fleisch der Jungen soll schmackhaft seyn.

- Klein*, Vorbereit. I. p. 79. n. 5. *Meeradler*, *Beinbrecher*.
- Klein*, verbesserte Vögelhist. p. 41. n. 5. *Beinbrecher*, *Meeradler*.
- Briffon*, ornithol. I. p. 125. n. 9. le grand Aigle de mer.
- Büffon*, Vögel, I. p. 143. *der Beinbrecher*.
- Batsch*, Thiere, I. p. 291. *der Beinbrecher*.
- Latham*, Vögel, I. p. 26. n. 4. *der Seeadler*.
- Latham*, Syst. ornith. I. p. 12. n. 7. Falco (Offi-fragus) cera lutea, pedibusque femilanatis, corpore ferrugineo, rectricibus latere interiore albis.
- Beseke*, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 4. n. 2. *der Beinbrecher*.
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 267. n. 5. *Beinbrecher*, *Gänsefahr*.
- Cetti*, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 34. *der Beinbrecher*.
- Pallas*, Reise, Ausz. I. p. 316. *der große schwarze Adler*.
- Schlözer*, Erdbeschreib. von Amerika, p. 357. *Meeradler*.
- Pontoppidan*, Naturgesch. von Dännem. p. 166. n. 16. *Gänseadler*.
- Leem*, von den Lappen in Finnmarken, p. 125. *der Landörn*, *Gaaseörn*.
- Pallas*, nord. Beytr. IV. p. 10. *der weissschwänzige Adler*.
- Martini*, Naturlex. I. p. 292. *der Beinbrecher*.
- Bechstein*, Musterung schäd. Thiere. p. 60. n. 6. *der Seeadler*.
- Jablonsky*, allg. Lex. p. 21. *der Beinbrecher*.
- Kraft*, Ausrott. graufl. Thiere, II. p. 521. *Steinoder Beinbrecher*.

Hermann, Tab. affin. anim. p. 172. not. i. *Falco ossifragus*.

Müller, zool. dan. prodr. p. 9. n. 58. Falco (*Ossifragus*) cera lutea, pedibus semilunatis, corpore ferrugineo, rectricibus latere inferiore albis.

Jonston, av. p. 14 *Ossifraga*.

Plin. hist. nat. Lib. II. c. 3. *Ossifraga*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 200. n. 7. *der Fischadler*.

5. CHRYSÆTOS. *Der Goldadler*. (9)

Müller, Naturyst. II. p. 65. n. 5. *der Goldadler*; Tab. 28. fig. 2.

Leske, Naturgesch. p. 232 n. 1. *der Goldadler*; *grofse Adler*; *Steinadler*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 66. n. 1. *der Goldadler*, *Steinadler*, *grofse Adler*.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 158. n. 3. Falco (*Chrysaëtos*) cera lutea, pedibusque lanatis,

(9) Dieser Adler fliegt unter allen Vögeln am höchsten, daher ihn auch die Alten *Vogel des Himmels*, und bey ihren Wahrsagungen *Gesandten des Jupiters* nannten. Er nährt sich vom Raube kleiner Säugthiere, Hasen, Lämmer, junger Ziegen, Füchse, Gemsen und Vögel, als Gänse, wilder Hünen, Trappen, Kraniche, Störche. Liebt hohe gebirgigte Waldungen; und wird selten in Thälern angetroffen. Horstet auf den höchsten Felsen, auf hohen Tannen und Fichtenbäumen, an unzugänglichen Orten. Macht ein flaches, 5 bis 6 Fuß breites Nest, von trocknen Stäben, Reisern und Ruthen, mit vielem Schilf, Heidekraut und Rasen bedeckt. Das Weibchen legt im März zwey grofse längliche, doch an beyden Enden stumpf zugerundete weisse, ungeflechte Eyer, und brüret 30 Tage. — Man hat Beyspiele, daß ein solcher Adler 21 Tage gehungert hat. — Soll über 100 Jahre alt werden können.

- natis, luteo - ferrugineis, corpore fusco, ferrugineo-vario, cauda nigra, basi cinereo-undulata; *der Goldadler, Steinadler.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 309. n. 1. *der Goldadler.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 205. n. 1. *der Goldadler.* p. 212. *Steinadler, grosser Adler, Landadler, Sternadler.*
- Funke*, Naturgesch. I. p. 279. *der Goldadler.*
- Ebert*, Naturl. II. p. 23. *der Goldadler.*
- Halle*, Vögel, p. 174. n. 114. *der Steinadler.*
- Merrem*, zool. Abh. p. 84. n. 2. *Goldadler.*
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 12. *der Goldadler, Steinadler.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 204. n. A. *der goldfarbige Adler.*
- Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 98. *der grosse Adler.*
- Onomat. hist. nat. I. p. 635. *der Goldadler.*
- Handb. d. Naturgesch. II. p. 133. *der Goldadler.*
- Handb. der deutschen Thiergeschichte. p. 92. *der Goldadler.*
- Klein*, av. p. 40. n. 1. *Aquila Chrysaetos.*
- Klein*, Vorbereit. p. 76. n. 1. *Gold-Steinadler.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 40. n. 1. *Goldadler, Steinadler.*
- Briffon*, ornithol. I. p. 124. n. 7. *l' Aigle doré.*
- Büffon*, Vögel, I. p. 94. *der grosse Adler, der Steinadler.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 289. *der Stein- oder Goldadler.*
- Latham*, Vögel, I. p. 27. n. 5. *der Goldadler.*
- Latham*, Syst. ornith. I. p. 12. n. 8. *Falco (Chrysaetos) cera lutea, pedibusque lanatis, luteo-ferrugineis, corpore fusco, ferrugineo-vario, cauda nigra, basi cinereo-undulata.*
- Bock,*

- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 267. n. 7. a.
der Goldadler.
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 65. n. 36.
Goldadler.
- Lepeschin*, Tageb. der russischen Reise, I. p. 308.
Goldadler.
- Taube*, Slavon. und Syrm. I. p. 24. *Goldadler.*
- Olassen*, Isl. I. p. 32. *der Adler.*
- Pontoppidan*, Naturhist. von Dänemark, p. 165.
n. 1. *Landadler, Steinadler.*
- Pallas*, Reise, I. p. 235. — Ausz. I. p. 168.
Goldadler?
- Naturforsch. VIII. p. 44. n. 7. *Goldadler.*
- Eberhard*, Thiergesch. p. 68. *der Steinadler.*
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 2. n. 1.
Gold. Steinadler.
- Martini*, Naturlex. I. p. 309. *Goldadler.*
- Bechstein*, Musterung schädlicher Thiere. p. 57.
n. 4. *der Goldadler.*
- Goeze*, Allerley, II. p. 140. n. 4. *der Goldadler,*
Steinadler.
- Geoffroy*, mat. med. VII. p. 321. *Adler, Steinadler,*
oder Gold-Königsadler.
- Beckmann*, phys. ökon. Bibl. I. p. 187. III. p. 182.
Goldadler.
- Jablonsky*, allgem. Lexicon, p. 20. *der Gold-*
adler.
- Mellin*, von Anleg. der Wildbahn. p. 345. *Adler,*
Steinadler.
- Meidinger*, Vorles. I. p. 112. n. 1. *der Gold-Stein-*
oder grosse Adler.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 76. n. 114. *Steinadler.*
- Merklein*, Thierreich, p. 270. *der Steingeyer.*
- Linné*, Syst. Natur. Edit. VI. p. 17. n. 4. Falco
Chrysaëtos.

Linne', Syst. Natur. Edit. X. I. p. 88. n. 2. Falco (Chrysaëtos) cera lutea, pedibus lanatis, corpore fusco ferrugineo vario, cauda nigra, basi cinereo-undulata.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 9. n. 60. Falco (Chrysaëtos) cera lutea, pedibus lanatis, luteo-ferrugineis, corpore fusco ferrugineo vario, cauda nigra, basi cinereo-undulata.

Kramer, Austr. p. 325. n. 1. Falco cera lutea, pedibus lanatis, corpore rufo.

Hermann, tab. affin. anim. p. 172. *F. Chrysaëtos.*
Jonston, av. p. II. Chrysaëtos.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 201. n. 8. *der Goldadler.*

β. Der weiße Goldadler?

Taube, Slavon. und Syrm. p. 25?

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 212?

6. FULVUS. *Der gemeine Adler.* ⁽¹⁰⁾

Müller, Natursystem, II. p. 66. n. 6. *der gemeine Adler.*

Funke,

(10) Ich habe schon vorher, not. 5. bemerkt, daß diese Gattung von sehr vielen Ornithologen mit *Falco Melanætos* für einerley gehalten wird. Die lateinische Benennung *Chrysaëtos*, und die deutschen *Goldadler* und *Steinadler*, die diesem zuweilen beygelegt werden, haben so wie die Anführung des *weißen Schwanzes*, bey Bestimmung des Charakters, auch zu manchen Verwechslungen Anlaß gegeben. Doch ist die Verbreitung des gemeinen Adlers beträchtlicher, als die des *Goldadlers*, seine Größe aber merklich geringer. *Beseke* rechnet auch *Frischens braunfahlen Adler* Tab. 70 mit hieher, der im System p. 253. zu *F. Albicilla* n. 39. gezählt wird. *Pallas Goldadler* scheint freylich zur vorhergehenden Gattung zu gehören, da das Linneische *Chrysaëtos* dabey steht. Aber

Pallas

Funke, Naturgesch. I. p. 279. *der braune Adler.*
Halle, Vögel, p. 179. n. 117. *der kurzschwänzige Adler.*

Merrem, vermischte Abhandl. p. 85. n. 3. *brauner Adler.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 13. n. 15. *der gemvine braune Adler.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 186. n. 3. *der schwarze Adler.*

Neuer Schaupl. der Natur, I. p. 98. n. 2. *der braune Adler.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 132. *der gemeine Adler.*

Klein, av. p. 41. n. 3. *Aquila simpliciter.*

Klein, Vorbereit. p. 78. n. 3. *Kurzschwanz mit weißem Ringe.*

C 3

Klein,

Pallas hat auch die tatarische Benennung *Bjurkut* hinzugefügt, und wenn man nach dieser die Synonymen aus *Rytschkow*, *Strahlenberg* und *Lepechin* vergleicht, scheinen sie doch auf den *gemeinen Adler* zu gehen. Die Ornithologen mögen hier entscheiden. Der gemeine Adler bewohnt die gebirgigten Waldungen, und liebt, wie der Goldadler, die Einsamkeit. Hasen sind seine liebste Speise. Fängt aber auch andere vierfüßige Thiere, Vögel und Amphibien. In der Gefangenschaft kann er sehr lange hungern, und man hat Beyspiele, daß sie fünf Wochen ohne Nahrung zugebracht haben. Nistet auf Felsen und Bäumen. Das Nest hat zwey Ellen ins Gevierte, und ist flach, aus Stöcken Heidekraut, Binsen und Reisern zusammen gesetzt. Das Weibchen legt zwey Eyer. Die Jungen sind anfänglich wollig und weißgrau, werden hernach braun, und am Unterleibe weiß und braunbunt. Erst bey der dritten Fiederung erscheint der röthlich weiße Kopf, und der weiße Schwanz, mit der schwarzen oder dunkelbraunen Schwanzspitze. Die unabhängigen Tataren gewöhnen diesen Adler zur Jagd auf Hasen, Füchse, Antilopen, ja selbst auf Wölfe, wie schon der große Reisende *Marco Polo* 1269. bemerkt hat.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 41. n. 3. *Weißschwänzel*.

Briffon, ornith. I. p. 121. n. 1. Aigle.

Büsson, Vögel, I. p. 108. Tab. II. *der gemeine braune Adler*. (Edw. Fig.)

Latham, Vögel, I. p. 28. n. 6. *der Ringelschwanz-Adler*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 10. n. 4. Falco (Fulvus) *cera flava, pedibus lanatis, fusco-ferrugineis, dorso fusco, cauda fascia alba.*

Bisike, Vögel Kurl. p. 5. n. 4. *der gemeine Adler*.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 261. n. 6. *gemeiner Adler, Weißschwänzel*.

Fischer, Zusätze zur Naturgesch. von Livl. p. 43. n. 487. *Weißschwanz*.

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 30. *der gemeine Adler*. *

Lepechin, Tagebuch der russ. Reise, I. p. 308. *braungelbe Falken*.

Lepechin, Tageb. der russ. R. II. p. 25. *Goldadler*.

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 168. *Goldadler*.

Rytschkow, orenb. Topogr. I. p. 242. *Berkuty*.

Rytschkow, orenb. Topogr. in *Büschings* Magaz. VII. p. 49.

Strahlenberg, Asien, p. 309. *Burkut*.

Carver, Reise durch Nordamerika, p. 384. *der Adler*.

Lapeirouse, neue schwed. Abhandl. III. p. 101. Falco (Fulvus) *cera flava, pedibusque lanatis, fusco-ferrugineis; dorso fusco, cauda fascia alba.*

Perrault, *Charras* u. *Dodart*, Abh. zur Naturgesch. II. p. 29. anatomische Beschreib. dreyer Adler, Tab. 50. *der Adler*; Tab. 51. die Zergliederung.

Martini,

Martini, Naturlex. I. p. 306. *der braune Adler.*

Otto, neue Mannichfalt. IV. p. 442. n. 2. *brauner, mit ganz rauhen Füßen.*

Oekonom. Zoologie, p. 62. n. 1. *der gemeine Adler.*

Eberhard, Thiergesch. p. 68. *der gemeine Adler.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 41. n. 3. Falco (Fulvus) cera flava, pedibus lanatis, dorso fusco, cauda fascia alba.

Mus. Worm. p. 292. Aquila.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 201. n. 6. *der gemeine Adler.*

β. CANADENSIS. Der canadische Adler.

Müller, Naturfyst. II. p. 77. *eine Nebenart des gemeinen Adlers.*

Merrem, vermischte Abhandl. p. 85. γ. *der canadische Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 29. n. 6. A. *der weißgeschwänzte Adler.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 11. n. 4. β. Falco cera flava pedibusque lanatis, corpore fusco, cauda alba, apice fusco.

Seligmann, Vögel, I. Tab. *der weißgeschwänzte Adler.*

Ellis, Reise nach Hudsons Meerbusen, p. 38. *der Adler mit dem weißen Schwanz.*

Gerin, ornith. I. p. 40. Tab. 7.

43. LEUCOGASTER. Der weißbäuchige Adler. (1)

Latham, Vögel, I. p. 30. n. 7. a. *der Weißbauch-Adler.*

C 4

Latham,

(1) Diese und die folgende Gattung, ingleichen die 67. u. 68. p. 264. werden von *Latham* als Spielarten von *Falco ferax*, p. 260. n. 59. angesehen.

Latham, Syst. ornith. I. p. 13. n. 9. Falco (Leucogaster) albus, dorso, alis caudaque obscure fuscis, caudae apice albo, rostro pedibusque flavis.

44. JAPONENSIS. *Der japanische Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 30. n. 7. b. *der japanische Habicht.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 13. n. 10. Falco (Japonicus) cera obscura, corpore fusco, ferrugineo vario, remigibus caudaque obscuris, ferrugineo maculatis.

45. PLANCUS. *Der schwarzgraue Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 30. n. 18. *der schwarzgraue Geyer.* (unter den Geyern.)

46. AMERICANUS. *Der amerikanische Adler.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 187. n. 4. *der Adler mit schwarzen Wangen.*

Latham, Vögel, I. p. 33. n. 10. *der amerikanische Adler.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 13. n. 12. Falco (Americanus) cera pedibusque lanatis, luteis, corpore nigro, capite, collo pectoreque cinereis, fascia genarum transversa nigra.

47. ALBUS. *Der weiße Adler.*(²)

Handbuch der Naturgesch. II. p. 132. *der weiße Adler.*

Onomat. hist. nat. I. p. 631. *der weiße Adler.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 212. *der weiße Adler.*

Klein,

(²) Nach *Bechstein* u. a. eine Varietät von *Falco Chrysaetos*.

- Klein*, Vorbereit. p. 80. n. 7. *weißer polnischer Adler*.
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 42. n. 7. *weißer Adler, polnischer Adler*.
- Briffon*, ornithol. I. p. 122. n. 3. *Aigle blanc*.
- Latham*, Vögel, I. p. 34. n. 12. *der weiße Adler*.
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 14. n. 16. *Falco (Cygneus) totus albus*.
- Jonston*, av. p. 15. *Aquila alba seu Cygnea*.

48. CANDIDUS. *Der louisianische Adler.* (3)

- Pennant*, arch. Zool. II. p. 188. n. 6. *der weiße Adler*.
- Latham*, Vögel, I. p. 34. n. 13. *der louisianische Adler*.
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 14. n. 17. *Falco (Candidus) albus, remigibus apice nigris*.

C 5

Donn-

(3) Das *Friedenszeichen* (Calumet of Peace), welches die Einwohner von Louisiana aus den Schwungfedern dieses Vogels machen, besteht aus einer anderthalb Fuß langen oder etwas längern Röhre oder Pfeife, die mit der Haut vom Halfe einer prächtig gefärbten Ente bedeckt wird: an dem einen Ende ist eine Art von Fächer angebracht, der aus den Schwungfedern dieses weißen Adlers besteht, und beynahe die Form des vierten Theils eines Zirkels hat; an der Spitze jeder Feder ist ein kleiner Busch von rothgefärbten Haaren befindlich. Das andere Ende ist unbedeckt, das man daraus rauchen kann. Der Kopf dieser Pfeife ist insgemein von weichem rothen Marmor gemacht. Ohne dies *Calumet* wird kein wichtiges Geschäft vollbracht. Man sieht es beständig beym Handel oder Tausch, bey Zusammenkünften, um Frieden oder Krieg zu beschliessen, und selbst in dem hitzigsten Gefechte. Wenn das *Calumet* angenommen wird, so ist es ein Zeichen, das man in die vorgelegten Artikel einwilligt, schlägt man es aus, so ist es wieder ein sicheres Merkmal, das man sie verwirft, u. s. w.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 202. n. 10.
der weiße Adler.

49. NAEVIUS. *Der kleine Adler.* (4)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 226. n. 5.
der Schreyer. (Planga und Clanga.) p. 228.
kleiner Adler, Steinadler, Entenadler, klingender Schellentenadler, Gänseadler, gefleckter oder geschäckter Adler, röthlicher Mäuseaar.

Ebert, Naturl. II. p. 24. der kleine Adler.

Halle, Vögel, p. 182. n. 120. der Entenadler.

Murrem, verm. Abh. p. 86. n. 4. Steinadler.

Pennant, arct. Zool. II. p. 205 n. C. der Schreyer.

Onomat. histor. nat. I. p. 639. der Entenadler,
Fischadler.

Handbuch der Naturgesch. II. p. 133. Schell- oder
Entenadler.

Klein, av. p. 41. n. 6. Aquila Clanga.

Klein, Vorbereit. p. 79. n. 6. klingender Schellenten-
Adler.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 42. n. 6. Schell-
adler, klingender Adler, Entenadler.

Briffon, ornithol. I. p. 122. n. 4. Aigle tacheté.

Buffon, Vögel, I. p. 115. Tab. 4. der kleine
Adler.

Latham, Vögel, I. p. 35. n. 14. der Steinadler,
der Rauchfußadler.

Latham,

- (4) Man muß die, zu dieser und der folgenden Gattung (wenn beyde wirklich von einander verschieden sind, gehörige Synonymen, sorgfältig prüfen, um sie nicht zu verwechseln; es ist aber sehr schwer, sie vollkommen richtig aus einander zu setzen. Briffon, Buffon u. m. der ältern und neuern Ornithologen vereinigen sie mit einander. Andere vermengen sie sogar mit *Falco Haliaetos*, p. 263. n. 26. Ueberhaupt ist die Hierskologie, oder die Naturgeschichte der Falkenarten, noch mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden.

Latham, Syft. ornith. I. p. 14. n. 18. Falco (Naevius) cera, iridibus pedibusque lanatis, luteis, corpore ferrugineo, rectricibus basi apiceque albis.

Batsch, Thiere, I. p. 289. *der kleine Adler.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 262. n. 7. *kleiner Adler, Steinadler, Entenadler.*

Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 28. *der kleine Adler.*

Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffn. Edit. in 4. p. 385. *der Enten-Adler.*

Steller, Kamtschatka, p. 193. Naevia?

Martini, Naturlex. I. p. 313. *der kleine Steinadler.*

Bechstein, Musterung schäd. Th. p. 62. n. 8. *der Schreyer, Entenstößer.*

Plin. hist. nat. L. X. c. 3. *Morphnos?*

50. MACULATUS. *Der gefleckte Adler.* (5)

Handb. d. Naturgesch. II. p. 133. *der fleckigte Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 35. n. 15. *der gefleckte Adler.*

Latham, Syft. ornith. I. p. 15. n. 19. Falco (Maculatus) cera pedibusque lanatis, luteis, corpore ferrugineo, subtus fusco, pennis axillaribus tetricibusque alarum apice macula ovata albida.

Jonston, av. p. 14. *Morphno* congener.

51. ALBICAUDUS. *Der weißschwänzige Adler.* (6)

Borowsky, Thierreich, II. p. 70. n. 5. *der große Fischadler, Steingeyer?* (mit Falco Pygargus verwechselt.)

Ebert,

(5) S. die vorhergehende Anmerkung. *Latham* rechnet *Kleine Aquila Clanga*, *Pennants Crying Eagle*, und *Rajs Morphno* congener hieher.

(6) Auch diese Gattung wird häufig mit andern verwechselt und dadurch die genaue Berichtigung der Synonymen unendlich

- Ebert*, Naturl. II. p. 26. *der Fischadler.*
Klein, av. p. 40. n. 2. Aquila Pygargus, Albicilla quibusdam Hinnularia?
Klein, Vorbereit. p. 77. n. 2. *Weißkopf, Gelbschnabel?*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 41. n. 2. *Weißkopf, Gelbschnabel, Weißschwanz?*
Briffon, ornithol. I. p. 124. n. 6. le petit Aigle à queue blanche.
Briffon, Vögel, I. p. 125. *der kleine Fischadler.*
 Naturforsch. VIII. p. 46. n. 9. *der Weißkopf, Gelbschnabel, Weißschwanz, Fischadler?*
Latham, Vögel, I. p. 36. n. 16. *der braunfahle Adler.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 15. n. 20. Falco (Hinnularius) cera pedibusque nudis luteis, corpore ferrugineo, subtus nebuloso, capite et collo castaneo cinerascens, cauda alba.
Jonston, av. p. 13. Pygargus?

52. GALLICUS. *Der französische Adler* (7)

Müller, Natursystem, II. p. 70. *Moosweiher*; *Jean le blanc*; Tab. 27. fig. 2.

Borowsky,

lich erschwert. Besonders wird sie mit *Falco Albicilla* und *Leucocephalus* vermengt, welche auch *Büffon* sämmtlich als Spielarten von einer Gattung annimmt. Die Farbe des Schnabels, die nach dem Alter so sehr veränderlich ist, der weiße Schwanz, der mehreren Gattungen gemein ist, u. dgl. haben wohl oft Gelegenheit zu Verwechslungen — auch wohl zu Bestimmung neuer Gattungen gegeben, und auf die kahlen oder befiederten Füße hat man vielleicht nicht immer Rücksicht genommen. Nach *Latham* soll sogar *Frisch braunfahler Adler* hierher gehören. S. vorher Note 10.

(7) Soll auch, nach *Latham*, sich häufig in den südlichen Gegenden Russlands, besonders am Düna- und Wolgattrom, nicht aber

Borowsky, Thierreich, II. p. 71. *St. Martin der Große, der weiße Hans.*

Handbuch d. Naturgesch. II. p. 137. *der Lerchengeyer.*

Briffon, ornith. I. p. 127. n. II. *Jean-le-blanc.*

Buffon, Vögel, I. p. 157. *der Lerchengeyer.*
II. p. 13. *Lerchengeyer.*

Latham, Vögel, I. p. 36. n. 17. *der französische Adler.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 15. n. 21. Falco (Gallicus) rostro cinereo, pedibus nudis flavicantibus, corpore griseo-fusco, subtus (Mori) albidus, maculis rufescente-fuscis.

Martini, Naturlex. I. p. 318. *der Lerchengeyer, der weißschwänzige Ritter.*

Beckmann, physik. ökon. Bibl. VI. p. 45. *Jean-le-blanc.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 22. n. II. *der Lerchengeyer.*

53. AUSTRALIS. *Der Statländische Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 37. n. 19. *der Statländische Adler.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 16. n. 23. Falco (Australis) fuscus, cera flava, cauda nigra, apice lutescente.

54. NIGER. *Der Adler mit schwarzem Rücken.*

Latham, Vögel, I. p. 39. n. 22. *der Adler mit schwarzem Rücken.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 16. n. 26. Falco (Melanotus) cera pedibusque lanatis, luteis, capite, cervice, ventre et tectricibus alarum ferrugineis,

aber in Sibirien, finden, und die Kalmukken sich seiner zur Falkenjagd bedienen.

rugineis, gula, pectore, dorso remigibus-
que nigris.

55. LEUCORYPHOS. *Der russische Adler.* (8)

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 65. n. 33. *der russi-
sche Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 39. n. 23. *der Adler mit
dem weißen Wirbel.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 17. n. 27. Falco (Leu-
coryphos) cera cinerea, pedibus femilanatis, al-
bidis, corpore nebuloso-fusco, macula verticis
trigona, gulaque tota alba.

Mervem, vermischte Abhandl. p. 89. n. 11. *Weiß-
fußs Adler.*

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 316. *eine noch unbe-
schriebene kleine Art, mit weißgeflecktem Kopf.*

Pallas, Reise, Ausz. I. Anh. p. 2. n. 5. *Aquila
leucorypha.*

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 13. n. 19.

56. MOGILNIK. *Der Mogilnik.*

Merrem, verm. Abhandl. p. 86. n. 5. *hochbeinig-
ter Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 40. n. 24. *der Mogilnik.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 17. n. 18. Falco (Mo-
gilnik) cera lutea, pedibus lanatis, et reliquo
corpore obscure ferrugineis, dorso albo ad-
mixto.

57. CRISTATUS. *Der Karakka.*

Latham, Vögel, I. p. 74. n. 64. *der Karakka.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 17. n. 29. Falco
(Cristatus) capite cristato, dorso, alis gula-
que

(8) Gewicht, nach *Pallas*, etwa sechs Pfund. Ist nach *Beseke*
mit *Falco Haliaetos* einerley.

que nigris, abdomine albo, rectricibus fasciis quatuor cinereis.

58. LAGOPUS. *Der rauhbeinige Adler.* (9)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 228. n. 6. *der rauhbeinige Falk.* p. 229. *Scheerengeyer*, *Rauchfuß*, *Moosgeyer*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 191. n. 8. *der Falk mit rauchen Beinen.*

Latham, Vögel, I. p. 67. n. 54. *der europäische Rauchfußfalke.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 19. n. 33. Falco (Lagopus) cera pedibusque pennatis luteis, corpore fusco et albido vario, rectricibus fuscis, basi dimidia apiceque albis.

Bechstein, Musterung schäd. Thiere, p. 64. n. 10. *der rauhbeinige Falke.*

59. FEROX. *Der astrakanische Adler.* (10)

Latham, Vögel, I. p. 29. n. 7. *der Adler aus Astrakan.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 13. n. 11. Falco (Ferox) cera viridi, corpore supra fusco, dorso, abdomine et uropygio niveo, maculis castaneis vario, rectricibus aequalibus, fuscis, fasciis 4. obsoletis.

60. MA-

(9) So lange er in den Waldungen sich aufhält, nährt er sich von Mäusen und kleinen Vögeln; im Herbst aber begiebt er sich oft in großer Menge in die Ebenen, und stellt den Hasen, Rebhühnern, Tauben, Lerchen u. s. w. nach.

(10) Im System heißt es: *nec ipsa cadavera respiciens.* In der Lathamschen Uebersetzung aber, die ich vor mir habe, steht: *er soll kein todes Thier berühren.*

60. MARITIMUS. *Der Hühnergeyer von Java.*

Lichtenberg, Magaz. a. a. O. *Hühnergeyer*, oder *Hühnerdieb von Java*. Bey den Inländern: *Oolong-Oolong*, oder *Alap*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 20. n. 35. Falco (Maritimus) cera pedibusque flavis, corpore caudaeque apice albo, cruribus colore ex rubicundo et albido misto.

61. AEGYPTIUS. *Der ägyptische Adler.*(¹)

Latham, Vögel, I. p. 105. n. 108. *der arabische Hühnergeyer*.

Forskäl, fn. arab. p. VI. n. 1. — Descript. anim. p. 1. n. 1. Falco cinereo-ferrugineus; arabisch *Haddáj*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 20. n. 36. Falco (Forskalii) cera pedibusque semilanatis flavis, supra cinereus, subtus ferrugineus, alis supra fuscis, cauda forficata, fusco fasciata, longitudine corporis.

12. MILVUS. *Der Weihe.*(²)

Müller, Naturfyft. II. p. 71. n. 12. *der Weihe*.

Müller,

(1) Wahrscheinlich ist diese Gattung wohl mit *F. Forskäl.* p. 263. n. 121. einerley, und dieser Vogel aus Versehen zweymal, mit den nämlichen Worten beschrieben.

(2) Gewicht nach Pennant, u. s. w. 44 Unzen. Verläßt Deutschland im Septbr. und October. Ueberwintert in Astrakan, besonders aber in Aegypten, und kömmt im April zurück. Nährt sich von jungem Geflügel, ausserdem aber von Feldmäusen, Fröschen, Schlangen, Eidexen, Regenwürmern, Schnecken und Aas. Nistet in gebirgigen Waldern, und großen Feldhölzern auf den höchsten alten Eichen, Buchen, Fichten und Tannen, und nie in die Klüfte unzugänglicher Klippen.

Müller, Naturfyst. II. p. 72. *der Königs - Weihe.*

Leske, Naturgesch. p. 232. n. 2. *der Weihe.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 72. n. 8. *der Hünnergeyer, Stoßvogel.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 159. n. 6. Falco (Milvus) cera flava, cauda forficatā, corpore ferrugineo, capite albidiore; *die Weihe, der Gabelgeyer, Milan, Scherschwänzel, Schwalbenschwanz, Taubenfalke.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 319. n. II. *die Gabelweihe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 243 n. 2. *die Gabelweyhe. p. 250. der Weyhe, Weyh-falk, Milan, Scheerschwänzel, Hünner-Dub, Stößer, Stoßvogel, röthliche Weyhe, rother Milan, Gabelgeyer, Schwalbenschwanz, Hünnergeyer, Steingeyer, Stoßgeyer, Hünneraar, Hauahr, Weichmilane, Grimmer, Schwimmer.*

Funke, Naturgesch. I. p. 281. *der Weihe.*

Ebert, Naturl. II. p. 31. *der Weihe.*

Halle, Vögel, p. 211. n. 146. *der Weihe, mit gabligem Schwanz und Fischerhosen.*

Gatterer,

Klippen. Das Nest hat eine Unterlage von großen Holzreibern, und ist inwendig mit Gras, Moos und Wolle nachlässig ausgefüttert. Das Weibchen legt zu Anfang des Maies, und brüet drey Wochen. Von den Jungen kommen gewöhnlich nur zwey auf. In Frankreich heist dieser Vogel *Königsweihe*, weil er sonst zum Vergnügen der Prinzen diente, welche abgerichtete Falken und Sperber auf ihn losgeschickten. Seine Rückkunft sieht man im Frühjahr als ein sicheres Zeichen des geendigten Winters und der starken Fröste an. — Der allgemeine Name *Weihe* wird von den Jägern auch der II. 29. u. a. Gattungen beygelegt.

- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 15. n. 18. *die Weyhe, der Milan, Scheerschwänzel, Gabelgeyer, Hühnerdieb.*
- Pennant*, arch. Zoolog. II. p. 212. H. *der Weyhe, der Hühnergeyer.*
- Beckmann*, Naturhist. p. 37. n. b. *der Weihe.*
Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 644. *Weihe.*
Onomat. hist. nat. V. p. 201. *der Weihe.*
- Handb. der Naturgesch. II. p. 123. *der Hühnergeier.*
- Handb. der deutschen Thiergesch. p. 94. *Milane.*
- Klein*, av. p. 51. n. 13 *Falco cauda forcipata.*
- Klein*, Vorbereit. p. 96. n. 13. *Scheerschwänzel.*
- Klein*, verbesserte Vögelhist. p. 50. n. 13. *Scheerschwänzel.*
- Klein*, Vögeleyer. p. 19. Tab. I. fig. 6.
- Merrem*, verm. Abhandl. p. 93. n. 50. *der gemeine Weihe.*
- Briffon*, ornithol. I. p. 118. n. 35. *Milane royal.*
- Biffon*, Vögel, I. p. 267. *der Hühnergeyer;*
Tab. 21.
- Batsch*, Thiere, I. p. 295. *der Hühnergeyer.*
- Latham*, Vögel, I. p. 57. n. 43. *der Milan, Gabelgeyer, Scheerschwänzel, Hühnergeyer.*
- Latham*, Syst. ornith. I. p. 20. n. 37. *Falco (Milvus) cera flava, cauda forcipata, corpore ferrugineo, capite albidiore.*
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 9. n. 8. *der Königsweihe.*
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 10. n. 9. *der Weyhe.*
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 266. n. 10. *der Weihe.*
- Bock*, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 267. n. 11. *Königsweihe, röthliche Weihe.*
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 64. n. 34. *Hühnerweihe.*

- Pontoppidan*, Naturg. von Dännemark, p. 165.
n. 4. *Stößer*, *Weyhe*.
- Pontoppidan*, Naturhist. von Norwegen, p. 142.
Glente.
- Cetti*, Naturgesch. von Sardin. II. p. 54. *der Hün-
nergeyer*.
- Naturforsch. VIII. p. 47. n. 10. *der Weyhe*.
- Naturforsch. VIII. p. 47. n. 11. *Königsweyhe*.
- Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Freunde,
VII. p. 447. n. 2. *der Weihe*.
- Eberhard*, Thiergesch. p. 67. *der Weiher*.
- Pallas*, nord. Beyträge, III. p. 15. *der gemeine
und der bunte Weihe*.
- Adanson*, Senegall, p. 97. *der Hünnergeyer*.
- Mellin*, von Anleg. der Wildbahnen, p. 347. n. 6.
der Milan, Schwalbenschwanz.
- Frisch*, Vögel, Tab. 72.
- Linné*, auserles. Abhandl. II. p. 286. n. 53. *der
Weihe*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 243. *der Milan, Gabler,
oder Hünnerdieb*.
- Bechstein*, Musterung schädl. Thiere, p. 65. n. 12.
die Gabelweyhe.
- Goeze*, Allerley, II. p. 142. n. 5. *die Gabelweihe,
oder Milane*.
- Merklein*, Thierreich, p. 297. *Hünnerdieb, Wey,
Weye, Wy, Weihe, Weiher, Wuwe, Rut-
tel-Weyh, Rötel-Weyh, Hünner-Arh*.
- Kraft*, Ausrott. grauf. Th. II. p. 74. *Weyhen*.
- Maidinger*, Vorles. über d. Thierr. p. 112. n. 2.
der Weyhe.
- Krinitz*, Encyklop. XVIII. p. 374. *der Hühner-
geyer, Hünnerdieb*.
- Jablonsky*, allg. Lex. p. 395. *Hünner-geyer*.
- Naumann*, Vogelsteller, p. 169. *Gabelgeyer*.

- Loniceri*, Kräuterbuch, p. 655. *Weyhe*.
Döbel, Jägerpraktik, I. p. 78. *Milane*, *Curwey*,
Schwalbenschwanz.
Beckmann, Bibl. VI. p. 48. VII. p. 222.
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 52. *Milvus*.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 7. *Milvus*
vulgaris.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 89. n. 10. *Falco*
(Milvus) *cera flava*, *cauda forcicata*, *corpore*
ferrugineo, *capite albidiore*.
Müller, zool. dan. prodr. p. 9. n. 61. *Falco (Mil-*
vus) *cera flava*, *cauda forcicata*, *corpore fer-*
rugineo, *capite albidiore*.
Kramer, Austr. p. 326. n. 4. *Falco cera flava*,
cauda forcipata, *corpore ferrugineo*, *capite*
albidiore. *Rother Milan*.
Brünnich, ornith. bor. p. 1. n. 2. *Milvus*.
Jonston, av. p. 25. *Milvus*.
Hermann, tab. affin. animal. p. 172. *Milvus*.
Plin. hist. nat. L. X. c. 10. *Milvi*.
Aristot. hist. animal. L. 6. c. 6. n. 72. *Ἰκτινός*.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 302. n. 12.
der Weihe.

β. *Eine Abart mit kastanienbraunem Scheitel und Kehle.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 21. β.

γ. *Der Korschun.*

Latham, Vögel, I. p. 57. n. 46. *der Korschun*,
der russische Milan.

Latham, Syst. ornith. I. p. 21. γ.

Merrem, vermischte Abhandl. p. 93. n. 4. β. *der*
russische Weihe.

δ. *Der*

δ. *Der jaikische Weihe.* Lepech. l. c.

Latham, Syst. ornith. I. p. 21. δ.

ε. *Der weiße Weihe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 250.

62. ATER. *Der schwarze Weihe.*(³)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 259. n. 6.
die schwarze Hünnerweyhe.

Briffon, ornith. I. p. 117. n. 34. Milan noir.

Buffon, Vögel, I. p. 273. 274. *der schwarze Hünnergeyer.*

Latham, Vögel, I. p. 57. n. 44. *der schwarze Milan.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 21. n. 38. Falco (Ater) cera pedibusque flavis, corpore supra fusconigro, capite subtus albido, cauda forficata.

Bechstein, Musterung schädlicher Thiere, p. 68. n. 15. *die schwarze Hühnerweihe, Mäuseaar.*

Merrem, verm. Abh. p. 93. n. 6. *Mäuse-Falke.*

Kramer, Austr. p. 326. n. 5. Falco cera flava, cauda subfurcata, fasciata, corpore castaneo-ferugineo, capite albidiore; *Brauner Wald-Geyer.*

63. AUSTRIACUS. *Der braune Weihe.*(⁴)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 260. n. 7.
die braune Hühnerweihe.

D 3

Latham,

(3) *Der ätolische schwarze Hünnergeyer; der Mäuseadler oder Arn.* Soll sich, besonders im Winter, in großen gebirgigen Waldungen aufhalten, auf Heuschrecken, Feldmäuse, und junge Vögel stoßen; und die Größe einer Henne haben. *Buffon* hält ihn für verwandt mit dem gemeinen *Weihe*; und *Bechstein* ist geneigt, ihn für einen jungen *Bussard* zu halten.

(4) *Bechstein* will ihn für ein junges Männchen von der gemeinen *Weihe* halten, auf welches er die systematische Beschreibung sehr passend gefunden hat.

Latham, Vögel, I. p. 57. n. 45. *der österreichische Milan.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 21. n. 39. Falco (Austriacus) cera pedibusque semilanatis flavis, capite corporeque supra castaneo, pennarum scapis nigris, rectricibus fuscis, fasciis nigris, apicibus albis.

Kramer, Austr. p. 327. n. 6. Falco cera flava, corporeque castaneo, pennarum rachi nigra, rectricibus fuscis, fasciis nigris, apice albis.
Brauner Milan; brauner Geyer.

64. BRASILIENSIS. *Der Karakara.*

Buffon, ornitholog. I. p. 116. n. 31. Bufard du Brésil.

Buffon, Vögel, II. p. 30. *der brasilian. Sperber, Karakara.*

Latham, Vögel, I. p. 58. n. 47. *der brasilianische Milan.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 21. n. 40. Falco (Brasilienensis) pedibus flavis, corpore rufo, albo flavoque punctato, rectricibus fusco alboque variegatis.

Marcgr. Brasil. p. 211. *Caracara.*

Jonston, av. p. 205. *Caracara.*

35. FURCATUS. *Die Sperberschwalbe. (5)*

Müller, Natursystem, II. p. 86. n. 25. *der Langschwanz.*

Halle, Vögel, p. 212. n. 147. *die purpurfarbene Sperberschwalbe.*

Merrem, verm. Abhandl. p. 94. n. 9. *Schwalbenschwanz.*

Gatte.

(5) *Buffon* hält ihn für eine mit dem *Weibe* verwandte Gattung.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 21. n. 26. *der Sperberfalk, Schlangenhabicht.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 200. n. 24. *der Falk mit dem Schwalbenschwanz.* Tab. X.

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 754. n. 9. *Schwerschwänzel.*

Klein, Vorbereit. p. 97. n. 14. *Schwalbenfalke.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 50. *Schwalbenfalk.*

Briffon, ornitholog. I. p. 118. n. 36. *Milan de la Caroline.*

Büffon, Vögel, I. p. 272. *der Habicht mit dem Schwalbenschwanz.* p. 273. *der carolinische Geyer.*

Büffon, Vögel, II. p. 26. *die Sperberschwalbe.*

Batsch, Thiere, I. p. 295. *die Sperberschwalbe, Schwalbenfalk.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 8. *der Habicht mit dem Schwalbenschwanz.*

Latham, Vögel, I. p. 55. n. 42. *der Schwalbenschwanz.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 22. n. 41. *Falco Furcatus.*

Linné, auserlesene Abhandl. II. p. 278. n. 1. *der Scheeren-Falk.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 89. n. 11. *Falco (Forficatus) cera flava, cauda forficata longissima, corpore supra fusco, subtus albido.*

Hermann, tab. affin. animal. p. 173. *F. Furcatus.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 203. n. 13. *die Sperberschwalbe.*

121. FORSKÄHLII. Siche vorher die Anmerk. 1. bey *F. Aegyptius.*

26. HALIAETOS. *Der Balbusard.* (6)

Müller, Natursystem, II. p. 86. n. 26. *der Fischadler.* Tab. II. fig. 4.

Leske, Naturgeschichte, p. 233. n. 5. *der Fischhabicht.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 71. n. 6. *der Flußadler, Balbusard.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 159. n. 5.
Falco (Haliaëtus) cera pedibusque caeruleis,
corpore

- (6) Ein Zugvogel, der uns im November, so bald die Teiche und Flüsse gefrieren, verläßt, und zu Anfang des März, wenn sie sich wieder öffnen, zurückkömmt. Besucht die Gegenden des festen Landes, wo Flüsse, Teiche und Seen sind, und wird seltener an den Meeresufern gefunden. Er schwebt ohne Geräusch, wie angeheftet, über dem Wasser, und wartet so, bey hellem Wetter, wenn die Fische an der Oberfläche des Wassers spielen, da er denn mit einem Male wie ein Pfeil aufs Wasser, und selbst bis in die Tiefe hinabfährt, und den Fisch hervorholt, auf welchen er gezielt hatte. Bey trübem Wetter, wo ihm sein Schweben nichts hilft, läßt er seinen Unrath ins Wasser fallen, nach welchem die Fische wie nach einem Köder kommen, und ihm so zur Beute werden. Nistet auf den höchsten Gipfeln alter Eichen und Tannen. An dem Bau des Nestes nehmen Männchen und Weibchen Antheil. Das Nest hat drey Fufs im Durchmesser, besteht aus lauter starken Reisern, ist ganz flach, und inwendig mit Moos und Rasen ausgefuttert. Es dauert auch mehrere Jahre, bloß mit einem kleinen Zusatz von neuem Moos. Das Weibchen legt drey, seltener 4 weiße rothgestreifte und gewölkte abgerundete Eyer, und brütet etwa dreyßig Tage, binnen welcher Zeit ihm das Männchen Nahrung zuträgt. Nach *Büffon* u. a. nährt sich der Vogel bloß von Fischen, da man nie etwas anders in seinem Magen gefunden haben will. Seine Beute verzehrt er niemals auf der Stelle, sondern trägt sie zuweilen Stunden weit auf einen Baum, und löst das Fleisch sehr sorgfältig von den Gräten ab. — Ist oft mit *Falco ossifragus* verwechselt.

- corpore supra fusco, subtus albo, capite al-
bido; *der Entenstößer, Moosweih.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 312. n. 5. *der Fischaar.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 229. n. 7.
der Fischaar. p. 234. *der Balbusard, Fisch-*
adler, Meeradler, kleiner Meeradler, Flußad-
ler, Rohrfalke, Fischähr, weißköpf. Blaufuß.
- Halle*, Vögel, p. 208. n. 143. *der Rohrfalk.*
- Merrem*, verm. Abhandl. p. 88. n. 10. *der euro-*
päische Meer. Adler.
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 21. n. 27. *der Balbusard, Entenstößer,*
Fischadler, Meeradler, Flußadler, Rohrfalk,
Moosweyhe, Fischähr.
- Pennant*, arct. Zoolog. II. p. 190. n. 7. *der Bal-*
busard.
- Neuer Schaupl. der Nat.* I. p. 98. n. 2. *der kleine*
Meeradler.
- Onomat. histor. nat.* I. p. 641. *der Meeradler,*
Fischadler.
- Handbuch der deutschen Thiergeschichte*, p. 92.
Entenadler, kleiner Adler, scheckiger Adler,
Schelladler, Moosweihe, Entenstößer.
- Brisson*, ornith. I. p. 126. n. 10. *Aigle de Mer.*
- Büffon*, Vögel, I. p. 131. *der kleine Fluß- oder*
Meeradler, Balbusard. Tab. 8.
- Batsch*, Thiere, I. p. 290. *der kleinere Balbusard.*
- Latham*, Vögel, I. p. 41. n. 26. *der Entenstößer,*
Moosweyh, Fischaar.
- Latham*, Syst. ornith. I. p. 17. n. 30. Falco (Ha-
liaëtus) cera pedibusque caeruleis, corpore
supra fusco, subtus albo, capite albido.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 13. n. 19. *der Fischadler.*
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 65. n. 37.
Fischadler.

Leem, von den Lappen in Finnmarken, p. 126.
n. 1. *Fiske-Gjoe*.

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 165.
n. 8. *Meeradler*.

Carver, Reise durch Nordamerika, p. 384. *der
Fischhabicht?*

Steller, Beschreibung von Kauntschatka, p. 193.
Haliaëtus.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 274. n. 19.
der Fischadler, Seeadler.

Pallas, Reise, Auszug, I. p. 316. *der gemeine
Fischaar?*

Naturforsch. VII. p. 40. *Fischadler*.

Naturforsch. VIII. p. 53. n. 19. *der Fischadler.
Seeadler*.

Bechstein, Musterung schädlicher Thiere. p. 63.
n. 9. *der Fischaar*.

Naumann, Vogelsteller, p. 168. *Fischaar*.

Martini, Naturlexicon, I. p. 289. *der Balbu-
zard*.

Meidinger, Vorles. I. p. 112. n. 4. *der Fisch-
habicht*.

Oedmann, neue schwed. Abhandl. V. *Geschichte
des Fischhabichts*.

Tengmalm, neue schwed. Abh. IV. p. 43. *Falco
Haliaëtus*.

Lichtenberg u. *Voigt*, Magazin für das Neueste
u. s. w. IV. 1. p. 104. *Fischhabicht*.

Jablonsky, allgem. Lexicon, p. 20. *Meeradler,
Fischaar*.

Kraft, Ausrott. grauf. Thiere, II. p. 590. *Meer-
Adler oder Fisch-Ar*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 78. *Fisch-Geyer*.

Nau, Entdeck. a. d. Naturgesch. I. p. 247. *Falco
Haliaëtus*.

Beckmann,

Beckmann, phys. ökon. Bibl. I. p. 187. *Fischaar*.
VI. p. 44. *Balbusard*.

Linné, auserl. Abh. II. p. 286. n. 53. F. *Haliaëtus*.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 17. n. 5. Falco
Haliaëtus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 91. n. 21. Falco
(*Haliaëtus*) cera pedibusque caeruleis, corpore
supra fusco, subtus albo, capite albido.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 10. n. 66. Falco
(*Haliaëtus*) cera pedibusque caeruleis, cor-
pore supra fusco, subtus albo, capite albido.

Kramer, Austr. p. 325. n. 2. Falco pedibus cera-
que caeruleis; corpore supra fusco, capite al-
bo, *Blaufuß*.

Brünnich, ornith. bor. p. 5. *Haliaëtus*.

Herniann, tab. affin. anim. p. 170. F. *Haliaëtus*.

Jonston, av. p. 12. *Haliaëtus*; *Meeradler*.

Plin. hist. nat. L. X. c. 3. *Haliaëtus*.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 203. n. 14.
der Balbusard.

β. ARUNDINACEUS. *Der Rohrfalk*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 18. β. Falco cera ci-
nerea, pedibus pallidis, corpore supra griseo,
infra albido, cauda aequali.

γ. CAROLINENSIS. *Der carolinische Fischer-
falk*.

Halle, Vögel, p. 215. n. 151. *der Seefalk mit Fi-
scherhosen*.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 127. *der Geier aus
Carolina*.

Merrem, vermischte Abhandl. p. 89. β. *der ame-
rikanische Meeradler*.

Klein, av. p. 52. n. 19. Falco piscator cyanopus.

Klein,

Klein, Vorbereit. p. 99. n. 19. *Weißkopf, weißköpfiger Blaufuß.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 51. n. 19. *weißköpfiger Blaufuß.*

Briffon, ornitholog. I. p. 105. n. 14. Faucon pecheur des Antilles.

Briffon, ornitholog. I. p. 105. n. 15. Faucon pecheur de la Caroline.

Büffon, Vögel, I. p. 182. *der Fischweih.* Tab. 14.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 4. *der Fischeaar.*

Latham, Vögel, I. p. 42. n. 26. A. *der Fischeaar aus Carolina.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 16. γ. Falco cauda fusca, concolore, vertice nigro, aut fusco, albo variegato, ventre albo.

Du Tertre, hist. gen. des Antilles, II. p. 253.

δ. CAYENNENSIS. *Der cayennische Fischerfalk.*

Latham, Vögel, I. p. 43. n. 26. B. *der Fischeaar aus Cayenne.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 18. δ. Falco corpore ferrugineo fusco, linea alba a mandibula superiore per utrumque oculum ad occiput similiter album ducta.

65. ANTILLARUM. *Der Mansfeni.*

Briffon, ornithol. I. p. 114. n. 13. Faucon des Antilles.

Büffon, Vögel, I. p. 183. *der Mansfeni des du Tertre.*

Latham, Vögel, I. p. 43. n. 27. *der Mansfeni.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 19. n. 32. Falco (Antillarum) toto corpore fusco.

Martini, Naturlex. I. p. 326. *der Mansfeni des du Tertre.*

66. SINENSIS. *Der chinesische Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 33. n. 11. *der chinesische Adler*; Tab. 3.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 13. n. 13. Falco (Sinensis) cera pedibusque luteis, corpore supra rubro-fusco, subtus flavescente, rectricibus alarum, rectricibusque fascia obscura.

**** Falken; von minderer Größe, mit unbefiederten Füßen.

67. ORIENTALIS. *Der orientalische Falk.* (7)

Latham, Vögel, I. p. 31. n. 7. c. *der orientalische Habicht.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 22. n. 44. Falco (Orientalis) pedibus plumbeis, corpore fusco, superciliis ferrugineis, remigibus rectricibusque albo maculatis.

68. INDICUS. *Der javanische Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 31. n. 7. d. *der javanische Habicht.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 23. n. 45. Falco (Indicus) cera pedibusque luteis, corpore fusco rubro, remigibus rectricibusque nigro fasciatis, fronte, uropygio, crisso fasciisque abdominis albis.

69. NOVAE HOLLANDIAE. *Der neuholländische Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 37. n. 18. *der neuholländische Adler.*

Latham,

(7) Nach *Latham*, nebst der folgenden Gattung, eine Varietät von *Falco Ferox*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 16. n. 22. Falco (Nova Hollandiae) albus, cera, orbitis pedibusque luteis, ungue postico anterioribus duplo longiore.

70. URUBITINGA. *Der brasilianische Falk.*

Ebert, Naturl. II. p. 28. *Urubitinga.*

Halle, Vögel, p. 179. n. 117. *der kurzschwänzige Steinadler?*

Briffon, ornith. I. p. 128. n. 12. *Aigle du Brésil.*

Büffon, Vögel, I. p. 180. *der brasilian. Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 38. n. 20. *der brasilianische Adler.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 22. n. 43. Falco (Urubitinga) cera pedibusque flavis, corpore fusco nigricante vario, alis cinereo admixto, rectricibus albis, apice nigricantibus, albo terminatis.

Martini, Naturlex. I. p. 297. *der brasilianische Adler, Urubitinga.*

Jonston, av. p. 208. *Urubitinga.*

71. PONDICERIANUS. *Der Adler von Pondichery.*

Ebert, Naturl. II. p. 27. *der Adler von Pondichery.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 133. *der Adler aus Pondichery.*

Merrem, verm. Abh. p. 89. n. 13. *heiliger Adler.*

Briffon, ornithol. I. p. 129. n. 15. *Aigle de Pondichery.*

Büffon, Vögel, I. p. 170. *der Adler von Pondichery.*

Latham, Vögel, I. p. 38. n. 21. *der Adler aus Pondichery.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 23. n. 46. Falco (Ponticerianus) cera caerulefcente, corpore caftaneo, capite, collo pectoreque albis lineolis fufcis variis, remigibus fex primoribus ultima medietate nigris.

Batfeh, Thiere, I. p. 291. *der Adler von Pondichery.*

Martini, Naturlex. I. p. 327. *der Adler von Pondichery, der malabarifche Adler.*

Eff. philofoph. p. 35. Aigle Malabare.

72. AEQUINOCTIALIS. *Der cayennifche Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 40. n. 25. *der cayennifche Adler.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 22. n. 42. Falco (Aequinoctialis) pedibus luteis, corpore nigricante ferrugineo vario, remigibus medio ferrugineis, reëtrixibus V. albo notatis.

15. BUTEO. *Der Buffard.* (8)

Miller, Naturfyft. II. p. 78. n. 15. *Buffhard.* Tab. 27. fig. 1.

Leske,

(8) In Deutfchland faft überall unter dem Namen des *Mäufefalken* bekannt Variirt vor allen andern vorzüglich in der Farbe. Ein träger ungeschickter Vogel, der Stundenlang auf einem Baume zufammengedrückt fitzt, und nicht eher auf den Raub ausfliegt, bis ihn der größte Hunger treibt. Fliegt langsam und hoch. Ist fehr fcheu und furchtsam. Ist in Deutfchland Strichvogel; wandert bey strengem Winter füdlicher, und kömmt bey dem Eintritt gelinderer Witterung bald wieder. Liebt die Vorhölzer in grofsen Waldungen. Nähret sich befonders von Amphibien, und lauert den Maulwürfen und kleinen Feldmäufen auf; geht aber auch auf junge Hasen, Kaninchen, Reblühner und Wachteln. Nistet auf den höchften Eäunen, befonders auf alten hohen Fichten. Das Weibchen legt drey bis vier weißliche, ins Grüne spielende,

mit

- Leske*, Naturgesch. p. 233. n. 4. *der Buffard*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 313. n. 6. *der Bu fard*.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 238. n. 1.
der Buffard. p. 242. *Bushart*, *Bushart falk*,
Weyhe, *Waldgryer*, *Rüttelweyhe*, *Sumpfweyhe*,
Wasservogel; (*Mäusefalk*, *Unkenfresser*, in Thüringen.)
Halle, Vögel, p. 207. n. 142. *der Bushart*.
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
 II. p. 17. *der Bushart*, *Mausfalk*, *Waldgryer*,
 die *Rüttelweyhe*, *Sumpfweyhe*.
Pennant, arch. Zoolog. II. p. 197. n. 19. *der Buffard*.
 Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 753. n. 9. *Bushart*.
 Onomat. hist. nat. II. p. 359. *Büzard*, *Busart*.
 Handbuch der Naturgesch. II. p. 122. *der Bushart*,
Mausfalk.
Klein, av. p. 50. n. 12. Falco Buten, vulgaris, autorum.
Klein, Vorbereit. p. 96. n. 12. *Bushart*, *Mausfalk*.
Klein, verbess. Vögelhist. p. 90 n. 12. *Bushart*.
Klein, Stemm. av. p. 8. Tab. 8. fig. 2. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 19. Tab. 6. fig. 2.
Brisson, ornith. I. p. 116. n. 32. la Buse.
Büsson, Vögel, II. p. 3. *der Weyhe*. Tab. 21.
Batsch, Thiere, I. p. 292. *der Wryhe*.
Latham, Vögel, I. p. 44. n. 28. *der gemeine Busart*,
 die *Weyhe*.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 23. n. 47. Falco
 (Buteo) cera pedibusque luteis, corpore fusco,
 abdo-

mit gelbbraunen Flecken unordentlich bestreucte Eyer. Im nördlichen Amerika bewohnt er die Hudsonsbay bis Neu-land. Um Lyon soll er den Winter sehr häufig und ausnehmend fett seyn, auch daselbst gegessen werden.

abdomine pallido, maculis fuscis, cauda fusco
fasciata.

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 13. n. 17.
der Buffard.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 272. n. 17.
Buffard, Mausfalk.

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 65. n. 38.
Mausfalk, Steinadler.

Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 56. *der*
Weihe.

Pennant, britt. Thiergeschichte, (von Murr.) II.
Tab. 5. *Bushart.*

Linné, auserlesene Abhandl. II. p. 287. *der Bush-*
hart.

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 165.
n. 6. *Weyhe.*

Naturforsch. VIII. p. 52. n. 17. *Bushart.*

Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Fr. VII.
p. 448. n. 5. *der Buffard.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. p. 4. n. 4. *der*
Mausfalk, Waldgeyer.

Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 65. n. 11. *der*
Buffard.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 78. *Mausgeyer.*

Beckmann, physikal. ökonom. Bibl. VI. p. 48.
der Bushard.

Krünitz, Encyklop. I. p. 134. n. 13. *Mäusfalk,*
Mäuseaar, Mäusegeyer, Mäusehabicht, Mäu-
sewächter, Mausjer, Buffaar, Bushard.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 52. Buteo.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 12. Buteo
triorchis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 90. n. 14. Falco
(Buteo), cera pedibusque luteis, corpore fusco,
abdomine pallido, maculis fuscis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 9. n. 64. Falco (Buteo), cera pedibusque luteis, corpore fusco, abdomine pallido, maculis fuscis.

Kramer, Austr. p. 329. n. 11. Falco cera pedibusque luteis, dorso fusco, pectore pallido, maculis longitudinalibus fuscis; *Wald-Geyer*.

Brünnich, ornith. bor. p. 5. Buteo.

Hermann, tab. affin. anim. p. 172. 174. F. Buteo.

Jonston, av. p. 23. Buteo.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 204. *der Buffard*.

73. GALLINARIUS. *Der Hühnerfalk.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 263. n. 9. *der Hühnerfalke*. — *Hühnerhabicht*, *Hühnergeyer*.

Briffon, ornithol. I. p. 114. n. 28. le gros Busard.

Latham, Vögel, I. p. 45. n. 29. *die Hühner-Weihe*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 24. γ. (als Spielart vom vorigen betrachtet.)

Bechstein, Musterung schäd. Thiere, p. 70. n. 17. *der Hühnerfalke*.

β. NAEVIUS. *Der gefleckte Hühnerfalk.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 263. *der gefleckte Hühnerfalke*.

Briffon, ornith. I. p. 114. n. 28. A. le Busard varié.

Latham, Vögel, I. p. 45. n. 29. A. *die gefleckte Hühner-Weihe*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 24. δ. (als Varietät von *Falco Buteo* aufgeführt.)

74. JAMAICENSIS. *Der Buffard aus Jamaika.*

Latham, Vögel, I. p. 48. n. 30. *der Buffard aus Jamaika*.

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 24. n. 49. Falco (Jamaicensis) cera pedibusque luteis, corpore supra luteo fuscescente, fusco vario, rectricibus fasciis fuscis obsoletis.

75. BOREALIS. *Der amerikanische Buffard.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 196. n. 16. *der Falk mit dem rothen Schwanze.*

Latham, Vögel, I. p. 40. n. 31. *der amerikanische Busard.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 25. n. 50. Falco (Borealis) cera pedibusque luteis, corpore fusco, abdomine albo, maculis hastato-nigris, cauda ferruginea, fascia ad apicem nigra.

76. LEVERIANUS. *Der leverianische Falk.* (9)

Pennant, arct. Zool. II. p. 196. n. 17. *Lever's Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 103. n. 103. *der leverianische Falke.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 18. n. 31. Falco (Leverianus) fuscus, pedibus flavis, capite, collo corporeque subtus albis, pone aures taenia fusca, rectricibus lateralibus fusco alboque, intermediis fusco nigroque fasciatis, omnibus apice albis.

77. RUFUS. *Der Brandfalk.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 261. n. 8. *der Brandfalke.* p. 262. *Brandgeyer, Fischgeyer.*

Briffon, ornithol. I. p. 115. n. 30. *Busard roux.*

Büffon, Vögel, II. p. 20. *der Fischgeyer.* Tab. 26.

E 2

Latham,

(9) Von *Ashton Lever* also genannt, dem dieser Vogel aus Carolina geschickt wurde.

Latham, Vögel, I. p. 46. n. 32. *der Fischgöyer, Brandgeyer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 25. n. 51. Falco (Rufus) pedibus flavis, corpore rufo maculis longitudinalibus vario, dorso fusco, rectricibus cinereis.

Bechstein, Musterung schädli. Th. p. 96. n. 16. *der Brandfalke.*

78. **VARIEGATUS.** *Der bunte Buffard.*

Latham, Vögel, I. p. 88. n. 33. *der bunte Buffard.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 24. n. 48. Falco (Variegatus) pedibus flavis, corpore fusco, subtus albo, fusco maculato, capite colloque albidis, striis ferrugineo fuscis, tectricibus alarum albo maculatis, rectricibus albo fasciatis.

79. **ALBIDUS.** *Der Bastardbuffard.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 201. n. 25. *der Bastardbuffard.*

28. **APIVORUS.** *Der Wespenfalk.* (10)

Müller, Naturfyft. II. p. 87. n. 28. *der Bienenfresser.*

Bechstein,

(10) Länge 2 Fufs. Flügelweite 4 Fufs 8 Zoll. Gewicht etwa 2 Pfund. Flug langsam und niedrig. Gang hurtig. Stimme zischend. Gehört unter die Zugvögel, die spät wegziehen und früh wieder kommen. Zieht die ebenen Gegenden den gebirgigen vor, und liebt besonders die Feldhölzer, auch die Vorhölzer an großen Waldungen, wo er auf hohen Bäumen nistet. Das Nest besteht aus Spänen und Reifern, mit Wolle und Federn ausgefütert. Das Weibchen legt 3 bis 4, — nach *Latham* dunkelrothbraune, rostigroth oder kastanienbraun gefleckte, nach *White*, an jedem Ende mit

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 314. *der Wespenfalke.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 264. n. 10.
der Wespenfalke. p. 268. *Mäusehabicht, Mäus-*
sewächter, Läuferfalk, Honigbusshard, Frosch-
geyer, Mäusefalk, Bienenfalk, Vögelgeyeria.
Halle, Vögel, p. 209. n. 144. *der Läuferfalk,*
Wespenfalk.
Merrim, verm. Abh. p. 94. n. 8. *Wespenfalke.*
Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere,
 II. p. 22. n. 29. *Wespenfalk, Läuferfalk.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 214. I. *der Bienen-*
fresser.
Onomat. hist. nat. II. p. 361. *Buteo apivorus.*
Handb. d. Naturgesch. II. p. 123. *Buteo apivorus.*
Klein, av. p. 50. ad n. 12. *Buteo api — vel ve-*
spivorus.
Klein, Vorbereit. p. 96. ad n. 12. *der Bienen-*
oder Wespenfresser.
Klein, verbess. Vögelhist. p. 50. ad n. 12. *Hon-*
ney Buzzard (zu *F. Buteo* gerechnet).
Briffon, ornith. I. p. 117. n. 38. *la Bondrée.*
Buffon, Vögel, II. p. 7. *der Wespenfalk.*
Batsch, Thiere, I. p. 292. *der Wespenfalk.*
Latham, Vögel, I. p. 47. n. 33. *der Wespenfal-*
ke, Honigfalke.
Latham, Syst. ornith. I. p. 25. n. 52. *Falco* (*Api-*
vorus) *cera nigra, pedibus feminudis, flavis,*
capite cinereo, caudae fascia cinerea, apice
albo.

E 3

Bock,

mit schmalen rothen Flecken gezeichnete, in der Mitte mit einem rund herumgehenden blutrothen Querstreifen umgebene — nach *Bechstein* aschgraue mit kleinen braunen Flecken bezeichnete — Eyer, und brüetet etwa 3 Wochen. *White* sagt: das Ey sey kleiner und nicht so rund als das vom *Buffard*.

- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 276. n. 21.
der Bienenfresser.
- White*, Naturg. v. England, p. 57. *Honigadler.*
- Pennant*, britt. Thiergesch. (v. Murr.) Tab. 6. 7.
der Froschgeyer.
- Pontoppidan*, Naturgesch. von Dänemark, p. 165.
n. 9. *Mäusehabicht, Mäufewächter.*
- Naturforsch. VIII. p. 54. n. 21. *der Bienenfresser.*
- Nau*, Entdeck. a. d. Naturgesch. I. p. 247. *Falco apivorus.*
- Krinitz*, Encyklop. XII. p. 135. *Bienenfresser, Honigbusshard.*
- Bechstein*, Musterung schädli. Thiere, p. 70. n. 18.
der Wespenfalke.
- Beckmann*, physik. ökonom. Bibl. VI. p. 48. *der Bienenfalk.*
- Frisch*, Vögel, I. Tab. 88.
- Linne'*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 13. *Buteo apivorus.*
- Linne'*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 91. n. 23. Falco (Apivorus), cera nigra, pedibus seminudis, flavis, capite cinereo, caudae fascia cinerea, apice albo.
- Müller*, zool. dan. prodr. p. 10. n. 68. Falco (Apivorus) cera nigra, pedibus seminudis flavis, capite cinereo, caudae fascia cinerea, apice albo.
- Kramer*, Austr. p. 331. n. 14. Falco pedibus seminudis, cera nigra, capite cinereo, cauda fascia cinerea, apice albo; *Frosch-Geyerl, Maus-Geyerl, Vögel-Geyerl.*
- Brünnich*, ornith. bor. p. 5. Apivorus.
- Hermann*, tab. affiq. anim. p. 173. F. Apivorus.
- Jonston*, av. p. 23. Goyran, f. Bondrée.
- Donndorff*, Handb. der Thiergesch. p. 204. n. 16.
der Bienenfresser.

29. AERUGINOSUS. *Der Rostweyhe.* (1)

Müller, Naturfyst. II. p. 88. *die Hühnerweyhe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 320. n. 12. *die Rostweyhe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 250. n. 3. *die Rostweyhe.* p. 253. *Sumpfbuffard, Brandgeyer, Entengeyer, Hühnerweih, Hühnergeyer, brauner Geyer, Wasserfalke, brauner Rohrgeyer, rostige Weihe, buntrostiger Falke* (die Jungen), *rostiger Falke*; bey den Jägern: *Moosweyhe.*

Halle, Vögel, p. 213. n. 148. *der rostige Weihe.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 22. n. 30. *Brandgeier, Entengeier.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 215. L. *der Sumpfbuffard.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 754. *buntrostiger Falk.*

Onomat. hist. nat. III. p. 203. *Milvus aeruginosus, der rostige Weihe.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 122. *Circus, der buntrostige Falk.*

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 94. *Rohrvogel, Rohrfalke, rostige Weihe, Rohrgeyer, Brandgeyer, Entengeyer.*

E 4

Klein,

(1) Länge 23 Zoll. Flügelweire 4 Fuß. Gewicht etwa 20 Unzen. Fliegt schön, sanft schwimmend, und fast immer in horizontaler Lage. Hält sich in Vorhölzern, Gebüsch, Hecken, nahe bey Teichen, Flüssen und Sümpfen auf. Wandert nicht. Nistet in sumpfigen Gegenden, in niedrigen Gesträuche, oder gar nur auf kleinen mit hohem Gras bewachsenen Hügeln. Das Nest besteht aus durren Reisern, trockenem Riedgras und welchem Laub. Legt 3 bis 4 bläuliche Eyer. Brütet 3 Wochen. In seinem Kropfe hat man mehrere Spitzmäuse gefunden. In Frischens Zeichnung sind die Endspitzen der Federn zu helle.

- Klein*, av. p. 51. n. 15. Falco f. Milvus aeruginosus.
- Klein*, Vorbereit. p. 97. n. 15. *bun:rostiger Falke*.
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 50. n. 15. *buntrostiger Falk*.
- Briffon*, ornitholog. I. p. 115. n. 29. Busard de marais.
- Büffon*, Vögel, II. p. 22. *der rostige Weyhe*.
- Batsch*, Thiere, I. p. 293. *der rostige Weyhe*.
- Latham*, Vögel, I. p. 48. n. 34. *die rostige Weyhe*.
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 25. n. 53. Falco (Aeruginosus) cera virescente, corpore griseo, vertice, gula, axillis pedibusque luteis.
- B. Seke*, Vögel Kurl. p. 16. n. 23. *der Hühnerweihe*.
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 278. n. 23. *Hühnerweihe, brauner Geyer, Fischahr, Fischgeyer*.
- Cetti*, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 45. *der Sumpfweihe*.
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 66. n. 40. *brauner Fischgeyer*.
- Pallas*, Reise, Ausz. I. p. 370. Falco aeruginosus.
- Pontoppidan*, Dännemark, p. 165. n. 10. *Hühnergeyer*.
- Pennant*, britt. Thiergesch. (von Murr.) Tab. 8. *brauner Rohrgeyer*.
- Frisch*, Vögel, Tab. 77.
- Bechstein*, Musterung schädlicher Thiere, p. 66. n. 13. *die Rostweihe*.
- Linné*, auserles. Abh. II. p. 286. *der rostige Falk*.
- Beikmann*, Bibl. VI. p. 49. *der Busard*.
- Naumann*, Vogelsteller, p. 169. *die Moosweyhe*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 8. Milvus aeruginosus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 91. n. 24. Falco (Aeruginosus) cera fusca, corpore griseo, vertice, gula, axillis pedibusque luteis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 10. n. 69. Falco (Aeruginosus) cera virescente, corpore griseo, vertice, gula, axillis pedibusque luteis.

Kramer, Austriac. p. 328. n. 7. Falco cera flava, corpore subtus ferrugineo, superne fusco, capite concolore, reatricibus testaceis; *brauner Rohr-Geyer*.

Brünnich, ornith. bor. p. 5. Aeruginosus.

Jonston, av. p. 22. Circus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 204. n. 17. *der Sumpfbuffard*.

80. JAVANICUS. *Der Habicht von der Insel Java; der Lang.*(²)

Latham, Syst. ornith. I. p. 27. n. 58. Falco (Javanicus) cera nigra, medio luteo; pedibus luteis, capite, collo et pectore castaneis, dorso fusco.

81. CINEREUS. *Der aschfarbige Falk.*

Klein, av. p. 50. ad n. 12. the ashcoloured Buzzard, pedibus e caeruleo cinereis, unguibus nigris.

Klein, Vorbereit. p. 96. ad n. 12. the ashcoloured Buzzard.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 50. ad n. 12. (zu Falco Buteo gerechnet.)

Marrum, verm. Abhandl. p. 98. n. 14. *Blaufuß*.

Briffon, ornithol. I. p. 103. n. 10. Faucon de la Baye de Hudson.

Büsson, Vögel, II. p. 32. *der aschfarbige Weyhe*.

E 5

Selig.

(1) Länge 19 Zoll. Flügelweite 48 Zoll; engl. M.

Seligmann, Vögel, III. Tab. i. *der aschfarbne Busfaar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 24. β. Falco cera pedibusque caerulescentibus, supra cinereo fuscus, albo fuscoque varius, superciliis albis, fusco maculatis. (*zu Falco Buteo gerechnet.*)

82. LINEATUS. *Der gestreifte Falk.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 197. n. 18. *der Falk mit rothen Schultern.*

Latham, Vögel, I. p. 51. n. 36. *der gestreifte Busfard.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 27. n. 59. Falco (Lineatus) cera pedibusque flavis, corpore fusco ferrugineo alboque vario, pectore rufo albo fasciato, rectricibus fasciis duabus albis.

83. OBSOLETUS. *Der einfarbige Falk.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 198. n. 20. *der einfarbige Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 101. n. 99. *der einfarbige Falke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 30. Plain Falcon.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 28. n. 61. Falco (Obsoletus) pedibus flavis, corpore fusco, subtus remigibus, rectricibusque, laterè interiore albo maculatis.

7. RUSTICOLUS. *Der Falk mit dem Halsbande.*⁽³⁾

Müller, Natursystem, II. p. 67. n. 7. *der Weißkragen.*

Bechstein,

(3) Wenn *Fabrizzi Falco Rusticolus* wirklich hieher gehört, wie mir sehr wahrscheinlich ist, auch von *Pennant* und *Latham* angenommen wird, so ist doch in Ansehung der dahin geze-

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 839. *der Falke mit dem Halsbande.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 212. G. *der Falk mit dem Halsbande.*

Latham, Vögel, I. p. 52. n. 37. *der Falke mit dem Halsbande.*

Latham, Syn. Suppl. p. 15. Collared Falcon.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 28. n. 60. Falco (Rusticolus) cera, palpebris pedibusque luteis, corpore cinereo, alboque undulato, collari albo.

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 87. Falco rusticolus.

Neue Mannichfalt. IV. p. 422. n. 3. *Weißkragen.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 88. n. 5. Falco (Rusticolus) cera, palpebris pedibusque luteis, corpore cinereo alboque undulato, collari albo.

Fabric. fn. groenl. p. 55. n. 34. Falco (Rusticolus) cera, palpebris pedibusque luteis, corpore cinereo, alboque undulato, collari albo?

84. NOVAE SEELANDIAE. *Der neuseeländische Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 52. n. 38. *der Neu-Seeländische Falke.* Tab. 4.

Latham, Syst. ornith. I. p. 28. n. 62. Falco (novae Zelandiae) cera pedibusque flavis, corpore ferrugineo-

gezogenen Synonymen manche Schwierigkeit. *Fabricius* rechnet nämlich *Brünnichs Falco Islandus* (ornith. bor. p. 2. n. 9.) und *Müllers Falco Islandus* (zool. dan. prodr. p. 10. n. 73.) hieher, welcher im System p. 271. n. 87. als eine eigne Gattung aufgeführt ist. *Latham* folgt (Syst. ornithol. I. p. 32. n. 69.) in Ansehung *Brünnichs* n. 7. und 8. der *Gmelinschen* Eintheilung, rechnet aber n. 9. und *Müllers* n. 73. zu *Falco Gyrfalco* (l. c. p. 32. n. 68.) *Müller* a. a. O. nimmt *Brünnichs* 7. 8. 9. als Spielarten an, und *Brünnich* selbst läßt nur 7. u. 9. als Varietäten gelten.

rugineo-fusco, subtus rufo striato, cauda lutescente fasciata, femoribus ferrugineis.

30. PALUMBARIUS. *Der Stockfalk.* (Habicht.)⁽⁴⁾

Müller, Natursystem, II, p. 88. n. 10. *der Taubenhabicht.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 460. n. 8.

Falco (Palumbarius) cera nigra, margine, pedibusque flavis, corpore fusco, rectricibus fasciis pallidis, superciliis albis; *der Habicht, Taubenfalke.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 318. n. 10. *der Stockfalk.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 268. n. II. *der Stockfalk.* p. 273. *Tauben-Hühner-oder Gänsehabsicht, Habicht, großer Habicht, Taubenfalk, Taubengeyer, brauner Taubengeyer, Sternfalk, Stockaar, schwärzlicher Falke mit pfeilförmigen Flecken, größter gepfeilter Falke.*

Funke, Naturgesch. I. p. 281. *der Habicht.*

Ebert,

- (4) Einer der schönsten Falken. Das Männchen ist um ein Drittheil kleiner als das Weibchen, beyde aber haben einerley Farbe. Beyde lassen sich nicht leicht zähmen, zanken mit einander, und tödten sich sogar, wenn man sie einsperrt. — Dieser Vogel gehört zu den gefährlichsten Feinden des Wald-Feld- und Hausgeflügels; stößt aber auch auf allerhand Feldmäuse und auf Spitzmäuse, und geht im Winter auch aufs Aas. Vögel rupft er, und zerreißt sie erst in Stücken, ehe er sie frisst. Mäuse aber verschluckt er ganz, und speyet die zusammengerollten Häute derselben mit den Knochen wieder von sich. Gekochtes Fleisch frisst er nur bey großem Hunger. Nistet auf hohen Waldbäumen, besonders Tannen und Fichten. Legt 3 bis 4 rothgelbe Eyer mit schwarzen Flecken und Strichen, unter welchen hie und da die weißse Farbe hervorschimmert. Die jungen sehen bis zur sechsten Woche weißgrau aus, und alsdenn erst wird der Oberleib allmählich braun.

Ebert, Naturl. II. p. 33. *der Habicht.*

Halle, Vögel, p. 216. n. 153. *der schwärzliche Falk, mit Flecken wie Pfeile.*

Gattorer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 44. n. 31. *der Habicht, Habich, Taubenfalk, Taubengeier, Sternfalk, Stockahr.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 194. n. 15. *der Stockfalk.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 753. *Taubenfalk.*
VIII. p. 810. *Tauberfalk.*

Onomat. hist. nat. II. p. 39. *Astur.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 107. *der große Habicht.*

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 94. *der Habicht, Hacht, Taubefalke, Ahr, Eichvogel, Taubengeyer, Gänsegeyer, Hünnerfalke.*

Klein, av. p. 50. n. II. Falco Palumbarius.

Klein, Vorbereitung, p. 95. n. II. *Taubenfalke, Stockahr.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 49. n. II. *Taubenfalk.*

Briffon, ornitholog. I. p. 91. n. 3. *Autour.*

Büffon, Vögel, II. p. 46. *der Taubengeyer.*
Tab. 22.

Batsch, Thiere, I. p. 293 *der Taubengeyer.*

Latham, Vögel, I. p. 53. n. 39. *der Habicht, Taubenfalke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 16. *Goshawk.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 29. n. 65. Falco (Palumbarius) cera nigra, margine pedibusque flavis, corpore fusco, rectricibus fasciis pallidis, superciliis albis.

Gerini ornith. I. p. 54. Tab. 21. 22.

Beseke, Vögel Kurl. p. 12. n. 15. *der große gepfeilte Falk.*

- Fischer*, Naturgesch. von Livl. p. 67. n. 45. *Taubenhabicht*, *Taubengeyer*.
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 277. n. 22. *Taubenhabicht*, *Tauberfalke*, *Stockahr*.
- Cetti*, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 48. *der Habicht*.
- Pontoppidan*, Naturgesch. v. Dännemark, p. 165. n. 11. *Taubenfalk*.
- Steller*, Beschreibung von Kamtschatka, p. 194. *weiße Habichte?* (vergl. mit Latham a. a. O. p. 53. u. Bechstein a. a. O. p. 273.)
- Eberhard*, Thiergesch. p. 67. *der eigentlich sogenannte Habicht*.
- Döbel*, Jägerpraktik, I. p. 77. n. 118. *Habicht*, *Eich-Vogel*.
- Mellin*, Anleg. der Wildbahn. p. 346. n. 2. *der Habicht*.
- Tengmalm*, neue Schwed. Abhandl. IV. p. 44. *der Taubenhabicht*.
- Bechstein*, Musterung schädli. Th. p. 72. n. 19. *der Stockfalke*.
- Anweis. Vögel zu fangen u. s. w. Nürnberg. 1768. p. 269. *der Habicht*.
- Neues Hamb. Magaz. St. 37. *Taubengeyer*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 238. *der eigentlich sogenannte Habicht*.
- Beckmann*, Bibl. VI. p. 49. *der Habicht*.
- Merklein*, Thierreich, p. 278. *Habicht*.
- Kraft*, Ausrottung grausamer Thiere, I, p. 529. *Habicht*.
- Jablonsky*, allg. Lex. p. 422. *Habicht*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 91. n. 25. Falco (Palumbarius) *cera nigra, margine pedibusque flavis, corpore fusco, rectricibus fasciis pallidis, superciliis albis.*

Müller, zool. dan. prodr. p. 10. n. 70. Falco (Palumbarius) cera nigra, margine, pedibusque flavis, corpore fusco, rectricibus fasciis pallidis, superciliis albis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 173. F. Palumbarius.

Jonston, av. p. 21. Accipiter Palumbarius. Tab. XI. Accipiter maior.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 204. n. 18. der Habicht.

85. CAYENNENSIS. *Der cayennische Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 54. n. 40. der Falk aus Cayenne.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 28. n. 69. Falco (Cayanensis) pedibus caeruleis, corpore cinereo-nigricante, subtus albo, capite et collo caerulescente-albis, rectricibus albo nigroque quater fasciatis.

86. MACROURUS. *Der Lun.*

Latham, Vögel, I. p. 54. n. 41. der langgeschwänzte Falke.

Latham, Syst. ornith. I. p. 29. n. 64. Falco (Macrourus) cera pedibusque luteis, rostro nigricante, corpore supra cinereo, subtus albo, remigibus interioribus cinereis, apice albis.

Lepchin, l. c. n. b. Falco superne fuscus, inferne rufus, lituris longitudinalibus fuscis, circulo ex pennis decompositis albo, fusco rufoque permixtis, oculorum orbitas ambiente.

13. GENTILIS. *Der Edelfalk. (5)*

Müller, Natur syst. II. p. 73. n. 13. der Edle Falke.

Müller,

(5) Bey keiner Gattung in der Hierakologie sind die Synonymen mehr verwechselt, und die Eintheilungen und Unterabthei-

Miller, Natursystem, II. p. 77. g. *der edle Falke.*

Leske, Naturgesch. p. 232. n. 3. *der edle Falke.*

Borow-

theilungen der Naturhistoriker verschiedener, als bey dieser, und den folgenden, und den dazu im System gerechneten Spielarten. Einige sondern den *Edelfalken* vom *gemeinen* als eine eigene Gattung ab; andere halten beyde für einerley, und nennen den *gemeinen* Falken *edel*, wenn er abgerichtet ist; andere nehmen viele der im System bey n. 86. angeführten Spielarten, als besondere Gattungen an; andere rechnen sie wieder zum Theil zu n. 12. u. dgl. m. So viel ist wohl gewis, daß eine ungewöhnliche Veränderung der Farbe, nach dem Unterschiede des Alters und des Geschlechts, unbeständige Merkmale des Schnabels, die veränderliche Farbe der Füße u. s. w. sehr leicht Gelegenheit geben können aus einer Art zwey zu machen, und die Anzahl der Gattungen wider die Natur zu vermehren. Ueberhaupt muß man sagen, daß die Spielarten bey dem Falkengeschlecht ins Unendliche gehen, so wie die Meynungen der verschiedenen Schriftsteller über diesen Gegenstand. Ich will bey jeder Gattung und Spielart, wo es nöthig ist, die Abweichungen anderer Naturhistoriker bemerken, und die Entscheidung den Ornithologen überlassen. — Das Weibchen der Edelfalken ist 1 Fuß 10 Zoll lang; die Flügelweite beträgt fast 4 Fuß. Das Männchen ist gemeinlich um ein Drittheil kleiner. — Hält sich auf den steilen Klippen der höchsten Berge auf. Findet sich auch in der Schweiz, in Polen, Italien, Spanien, an der Wolga, und auf den Inseln des mittelländischen Meeres. Stößt auf lauter köstliche Bissen, junge Hasen, Kaninchen, Birkhühner, Haselhühner, Fasanengehege u. dgl. m. und hat ein ausnehmend scharfes Gesicht. Nistet in den höchsten Felsenklüften. Das Nest ist groß, besteht aus großen und kleinen Reisern, und ist allemal gegen Mittag in dem Felsen angebracht, damit es vor dem kalten Nordwinde sicher seyn, und von der Sonne erwärmt werden möge. Schon im März findet man 3 bis 4 Eyer in demselben, und die Jungen sind schon im May zum Ausfliegen tüchtig. Nur die jung aus dem Neste genommenen Falken schicken sich zum Abrichten. Haben sie erst ein Alter von 9 bis 10 Monaten erreicht, so hält es weit schwerer sie zahm und folg-sam zu machen.

Borowsky, Thierreich, II. p. 73. n. 9. *der edle Falke.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 160. n. 7.

Falco (Gentilis) cera pedibusque flavis, corpore cinereo, maculis fuscis, cauda fasciis quatuor nigricantibus.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 315. n. 1. *der edle Falke.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 273. n. 12. *der edle Falke.*

Funke, Naturgesch. I. p. 283. *der Edelfalke.*

Ebert, Naturl. II. p. 29. *der edle Falke.*

Halle, Vögel, p. 197. n. 134. *der deutsche Falke.*

Mirrem, verm. Abhandl. p. 95. n. 10. *edler Falke.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 29. n. 36. *der Falk, Esel Falk, J. g. Falk.*

Pennant, act. Zool. II. p. 194. n. 14. *der edle Falk.*

Beckmann, Naturhist. p. 37. n. a. *der edle Falk.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 753. n. 3. *edler Falk, deutscher Falk.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 116. *der edle Falk.*

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 93. *der edle oder deutsche Falke.*

Klein, av. p. 48. n. 3 Falco gentilis, i. e. nobilis. Falco migrator et commeator.

Klein, Vorbereit. p. 92. n. 3. *edler, deutscher Falke, Wanderfalke, Fremdlingsfalke.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 48. n. 3. *edler Falk, deutscher Falk, Wanderfalk, Fremdling.*

Briffon, ornithol. I. p. 98. n. 5. Faucon gentil.

Baffon, Vögel, II. p. 76. Tab. 39. *der Falke.*

Batsch, Thiere, I. p. 293. *der eigentliche Falke.*

Latham, Vögel, I. p. 58. n. 48. *der Edelfalke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 17. Gentil Falcon.

- Latham**, Syst. ornith I. p. 29. n. 6. Falco (Gentilis) cera pedibusque flavis, corpore cinereo, maculis fuscis, cauda fasciis quatuor nigricantibus.
- Beseke**, Vögel Kurl. p. 10. n. 10. *der Edelfalk.*
- Bock**, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 278. n. 13. *edler deutscher Wanderfalk.*
- Cetti**, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 36. *der Falke.*
- Fischer**, Zus. z. Naturgesch. von Livland, p. 43. n. 489. *Jagdfalk, edler Falk.*
- Pontoppidan**, Naturg. von Dänneemark, p. 166. n. 15. *gemeiner Falk.*
- Scopoli**, Bemerk. a. d. Naturgesch. p. 4. n. 3. *der Falk, edler deutscher Falk.*
- Naturforsch. VIII. p. 50. n. 13. *edler Falke.*
- Bechstein**, Musterung schädli. Thiere, p. 73. n. 20. *der edle Falke.*
- Goeze**, Allerley, II. p. 143. n. 6. *der Edelfalk.*
- Krünitz**, Encyklop. XII. p. 130. *der gemeine deutsche Falk.*
- Eberhard**, Thiergesch. p. 67. *der Falk.*
- Oekonom. Zoologie, p. 63. n. 2. *der edle Falke.*
- Ludovici**, Kaufmannslex. II p. 1462.
- Neueste Mannichfalt. I. p. 169.
- Jablonsky**, allg. Lex. p. 317. *Falke.*
- Kraft**, Ausrott. grauf. Th. I. p. 528. *der Falke.*
- Hamburg. Magazin, V. p. 144. *der Falke.*
- Meidinger**, Vorles. über d. Thierr. I. p. 112. n. 3. *der edle Falk.*
- Linné**, Syst. Nat. Ed. II. p. 52. Falco.
- Linné**, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 3. Falco gentilis.
- Linné**, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 89. n. 12. Falco (Gentilis), cera pedibusque flavis, corpore cinereo,

cinereo, maculis fuscis, cauda fasciis quatuor nigricantibus.

Müller, zool. dan. prodr. p. 9. n. 62. Falco (Gentilis), cera pedibusque flavis, corpore cinereo, maculis fuscis, cauda fasciis quatuor nigricantibus.

Kramer, Austr. p. 328. n. 8. Falco pedibus flavis, corpore cinereo, maculis fuscis, cauda fasciis quatuor; *Falk*.

Brünnich, ornith. bor. p. 1. n. 6. Falco Gentilis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 172. Falco Gentilis.

Jonston, av. p. 31. Gentilis.

Böhmer, Handb. der Naturgesch. u. f. w. Leipz. 1786. II. 1. p. 544. 550. (eine Sammlung höchst unregelmäßig geordneter, zum Theil die Falkonikunft betreffender Schriften.)

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 209. n. 19. der Edelfalke.

86. COMMUNIS. *Der gemeine Falk.* (6)

Müller, Natursystem, II. p. 73. a. *der gemeine Falke*.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 114. *der gemeine Falk*.

Briffon, ornith. I. p. 92 n. 4. Faucon.

Büffon, Vögel, II. p. 96. *der gemeine Falke*.

Latham, Vögel, I. p. 59. n. 49. *der gemeine Falke*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 30. n. 67. Falco (Communis) rostro caerulescente, cera, iridibus, pedibusque luteis, corpore fusco, pennarum margine rufo, rectricibus fasciis saturatoribus.

F 2

Bock,

(6) Nach *Büffon* und den allermehresten Naturhistorikern mit dem vorhergehenden einerley; (s. die vorige Anmerkung) daher auch viele der vorstehenden Synonymen auf beyde ohne Unterschied gehen.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 269. n. 12.
der gemeine Falke.

Naturforsch. VIII. p. 49. n. 12. *der gemeine Falke.*
Loniceri, Kräuterb. p. 657. *Falk.*

Krünitz, Encykl. XII. p. 130. n. 3. *der gemeine
deutsche Falk.*

β. HORNOTINUS. Der jährige Falk.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 294. n. 1.
der junge Falk.

Briffon, ornithol. I. p. 93. A. Faucon Sors.

Büffon, Vögel, II. p. 99. *Faucon Sors.* p. 91.
frische Falken.

Latnam, Vögel, I. p. 60. n. 49. A. *der jährige
Falke.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 30. β. Falco Hor-
notinus.

Jonston, av. p. 228. Hornotini.

γ. GIBBOSUS. Der bucklichte (alte) Falk.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 294. n. 2.
der bucklichte oder alte Falke.

Briffon, ornitholog. I. p. 93. B. Faucon hagar,
ou boslu.

Büffon, Vögel, II. p. 77. n. 2. *Hagerfalk.* p. 91.
die Alten. p. 99. *Faucon hagar.*

Latham, Vögel, I. p. 60. B. *der wilde Falke.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 30. γ. Falco gib-
bosus.

Jonston, av. p. 32. Falco gibbosus.

δ. LEUCOCEPHALUS. Der weißköpfige Falk.

Briffon, ornitholog. I. p. 93. C. Faucon à tête
blanche.

Briffon, Vögel, II. p. 78. n. 3. *der Rauchfußgeyer.*
p. 99. *der weißköpf. Falk, mit langen Hosn.*

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 60. C. *der weißköpfige Falke.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 30. ♂. Falco leucocephalus; capite, collo pectoreque albis, maculis minutis fuscis.

Merrem, verm. Abhandl. p. 91. n. 2. ♂. *der deutsche Geyerfalke.*

e. ALBUS. *Der weiße Falk.* (7)

Müller, Naturfyst. II. p. 74. b. *der weiße Falke?*

Borowsky, Thierreich, II. p. 73. *der weiße Falk.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 294. n. 3. *der weiße Falke.*

Halle, Vögel, p. 199. n. 137. *der weiße russische Falke.*

Klein, av. p. 49. n. 6. Falco albus, lactei coloris.

Klein, Vorbereit. p. 93. n. 6. *weißer Falke.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 48. n. 6. *weißer Falk.*

Klein, Vögeleyer, p. 18. Tab. 5. fig. 3.

Briffon, ornitholog. I. p. 94. D. Faucon blanc.

Büffon, Vögel, II. p. 95. *der weiße Falke.*

Batsch, Thiere, I. p. 293. *der weiße Falke.*

Latham, Vögel, I. p. 60. D. *der weiße Falke.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 31. n. 2. Falco albus, corpore toto albo, maculis flavis vix conspicuis.

Jonston, av. p. 32. Falco albus.

ζ. ATER. *Der schwarze Falk.* (8) (*Schwarzbraune Habicht: Kohlfalk.*)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 305. n. 1. *der schwarze Falk.*

F 3

Halle,

(7) Soll nicht mit dem isländischen Falken verwechselt werden. (Syst. p. 271. n. 87.)

(8) Nach *Büffon* mit dem gefleckten Falken einerley. Nach *Bechstein* eine Varietät von *Falco Peregrinus*.

Halle, Vögel, p. 210. n. 145. *der schwarze ameri-*
kanische Falk.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 115. *der schwarze Falk.*

Briffon, ornith. I. p. 94. E. Faucon noir.

Büffon, Vögel. II. p. 126. *der schwarze Falke.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 7. *der schwarze Falk*
oder Habicht.

Latham, Vögel, I. p. 61. C. *der schwarze Falke.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 31. ζ. *Falco niger.*

Jonston, av. p. 22. Aefaló?

η. *NAEVIUS.* *Der gefleckte Falk.* (9)

Müller, Naturfyst, II. p. 74. c. *der gefleckte Falke.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 306. n. 2.
der gefleckte Falke oder Habicht.

Klein, av. p. 50. ad n. II. *Edwardi spotted*
Falcon.

Klein, Vorbereit. p. 96. ad n. II. *Edwards spot-*
ted Falcon.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 50. ad n. II. *der*
gefleckte Falk.

Briffon, ornith. I. p. 95. F. Faucon tacheté.

Büffon, Vögel, II. p. 129. *Edwards gefleckter*
Falk oder Habicht.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 5. *der gefleckte Ha-*
bicht oder Falk.

Latham, Vögel, I. p. 61. F. *der Falke mit ge-*
fleckten Flügeln.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 31. η. *Falco macu-*
latus (p. 33. n. 72. γ. zu *Falco peregrinus* ge-
zogen.)

θ. *FUSCUS.*

(9) Nach *Klein* zu *Falco Palumbarius* gehörig. Nach *Büffon* mit dem vorhergehenden einerley. Nach *Beckstein* eine Spielart von *Falco Peregrinus*.

9. FUSCUS. *Der braune Falke.* ⁽¹⁰⁾ (Braunfahle Geyer.)

- Briffon*, ornithol. I. p. 95. G. Faucon brun.
 Handb. d. Naturgesch. II. p. 115. *der braune Falk.*
Büffon, Vögel, II. p. 100. *der braune Falke.*
Latham, Vögel, I. p. 62. G. *der braune Falke.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 31. ♀. Falco fuscus.

10. RUBER. *Der rothfleckige Falk.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 115. *der rothe Falk.*

- Briffon*, ornith. I. p. 36. H. Faucon rouge.
Büffon, Vögel, p. 100. *der rothe Falk.*
Merrem, verm. Abh. p. 96. n. 10. β. *der rothe Falke.*

Latham, Vögel, I. p. 62. H. *der rothe Falke.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 31. i. Falco rubens.

Krünitz, Encyklop. XII. p. 134. n. 12. *der rothe Falk.*

11. INDICUS. *Der rothe indianische Falk.* ⁽¹⁾

Halle, Vögel, p. 218. n. 155. *der rothbäuchige indianische Falk.*

Briffon, ornithol. I. p. 96. I. Faucon rouge des Indes.

Handb. der Naturgesch. II. p. 116. *der rothe indianische Falk.*

Büffon, Vögel, II. p. 101. n. 9. *der rothe indianische Falk.* p. 132. *der ostind. rothe Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 62. I. *der rothe indianische Falk.*

F 4

Latham,

(10) Nach *Büffon* eine Abänderung der Weyhen. Nach *Latham* vielleicht zu Falco *Borealis* gehörig.

(1) Nach *Büffon* eine eigene Gattung.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 31. α . Falco ruber
indicus.

Jonston, av. p. 33. Falco rubeus

λ . ITALICUS. *Der italienische Falke.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 294. n. 4.
der italiänische Falke.

Briffon, ornithol. I. p. 97 K. Faucon d'Italie.

Büffon, Vögel, I. p. 101. n. 10. *der italienische
Falke.*

Latham, Vögel, I. p. 63 K. *der ital. Falke.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 32. λ . Falco italicus.

Merrem, verm. Abh. p. 96. n. 10. γ . *der italiäni-
sche Falke.*

μ . ARCTICUS. *Der arktische Falke.*

Briffon, ornith. I. p. 97. L. Faucon d'Islande.

Latham, Vögel, I. p. 63. L. *der nordische Falke.*

87. ISLANDUS. *Der isländische Falke.* (2)

Miller, Natursystem, II. p. 75. d. *der isländische
Falke.*

Pennant,

(2) Hier findet sich abermals eine große Verwechslung und Vermischung der Synonymen. *Bechstein* u. a. nehmen zwar mit unserm System den *isländischen Falke*n als eine eigene Gattung an; aber die mehresten betrachten ihn als Spielart vom gemeinen. *Brünnich* selbst ist noch bey weitem nicht überzeugt, ob er eine eigne Gattung sey. *Latham* ordnete in der *Synops.* die Synonymen so, wie wir sie im System finden. In dem *Syst. ornithol.* aber zieht er *Raj. Gyrfalco*, *Pennants Gyrfalcon*, *Briffons* und *Büffons Gersault*, ingleichen seinen eignen *White* und *Iceland Fersfalcon*, u. a. m. die im System p. 275 n. 101. zu *Falco candicans* gerechnet werden, hicher; und lässe nicht nur diesen *Falco candicans* eingehen, sondern rechnet auch wieder zu seinem *Gyrfalco* p. 32. n. 68. den er übrigens wie *Linne* und *Gmelin* charakterisirt, *Brif-
sons*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 206. d. *der isländische Falk.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 115. der isländ. Falk.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 295. *der isländ. Falk.*

Büffon, Vögel, II. p. 101. n. II. p. 125. *der isländ. Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 62. n. 50. *der isländ. Falk.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 32. n. 69. Falco (Islandicus) albis maculis fuscis varius, rectricibus albis, lateralibus extus fusco-maculatis?

Oloffen, Reise d. Island, I. p. 32. *der Falk.*

De Kerguelen Tremarec, Reif. n. der Nordsee, p. 76. *graue Falken.*

Berlin. Samml. VII. p. 156. *graue Falken.*

Uno von Troil, Reise nach Island, p. 118. *graue Falken.*

Cranz, Hist. von Grönl. p. 112. *graue Falken?*

Egede, Beschr. von Grönl. p. 88. *graue Falken?*

Müller, zool. dan. prodr. p. 10. n. 73. Falco Islandus.

β. ALBUS. *Der weiße isländische Falk.*

Müller, Naturfyst. II. p. 74. b. *der weiße Falke.*

F 5

Bechstein,

sons Gyrfalco Islandicus, Brünichs Falco Islandus, n. 9. Kleins Falco Rapax u a. m. so, daß man gar nicht weiß, wie man aus dieser Verwickelung herauskommen soll. Fabricii Falco Islandus ist nach der Beschreibung kein anderer als Brünichs n. 8 oder Var γ. des Systems. Er macht aber aus dieser und n. 7. wieder zwey Spielarten, die bloß auf der Verschiedenheit des Alters beruhen sollen, und rechnet Cranzens und Egedens sprenklichte und fleckige Falken mit hierher. Brünichs isländischen Falken n. 9. aber zieht er zu seinem Falco Rusticolus; s. auch vorher Anmerk. 5. bey Falco Gentilis; imgleichen die folgende Anmerk. 6. bey Falco Gyrfalco.

Bochstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 296. n. 2.
die weißen isländischen Falcken.

Latham, Vögel, I. p. 64. A. der weiße isländische Falck.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 271. n. 14.
der weiße isländ. Falck.

Naturforsch. VIII. p. 50. n. 14. der isländische Falck.

Tremarec, Reise nach der Nordsee, p. 76. weiße Falcken.

Egede, Beschreib. von Grönland, p. 88. weißliche Falcken?

Uno von Troil, Reise durch Island, p. 118. weiße Falcken.

Berlin. Samml. VII. p. 156. weiße Falcken.

Leem, von den Lappen in Finnmarken, p. 127.
weiße Falcken?

Krünitz, Encyklop. XII. p. 134. n. 11. der weiße, weiße isländische, oder russische Falck.

γ. *MACULATUS*. Der gefleckte isländische Falck.

Latham, Vögel, I. p. 64. B. der gefleckte isländische Falck.

Tremarec, Reise n. d. Nordsee, p. 76. weißgraue Falcken.

Uno von Troil, Reise d. Island, p. 118. dunklere Falcken.

Cranz, Hist. von Grönland, p. 112. sprenklichte Falcken?

Egede, Besch. von Grönl. p. 88 fleckige Falcken.

Berlin. Samml. VII. p. 156. weißgraue Falcken.

Fabric. fn. groenl. p. 58. n. 35. Falco (Islandus) albus, maculis cordatis nigricantibus, rectricibus albis, nigro-fasciatis.

8. BARBARUS. *Der Falk aus der Barbarey.* (3)

Müller, Naturfyst. II. p. 68. n. 8. *der Barbarfalke.*
 Halle, Vögel, p. 198. n. 135. *der graublau Falke*
von den barbarischen Küsten.

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 253. n. 4. *der*
Barbarfalke.

Handbuch der Naturgesch. II. p. 116. n. 1. *der Tu-*
neser aus der Barbarey.

Klein, av. p. 48. n. 4. Falco Tunetanus. Falco
 punicus.

Klein, Vorbereitung, p. 92. n. 4. *Alphanet, Bar-*
barfalke.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 48. n. 4. *Barbar-*
falk, Alphanet.

Briffon, ornitholog. I. p. 99. A. Faucon de la
 Barbarie.

Büffon, Vögel, II. p. 102. n. 15. *der barbari-*
sche Falk.

Latham, Vögel, I. p. 65. n. 51. *der Falke aus*
der Barbarey.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 53. n. 71. Falco
 (Barbarus) cera pedibusque luteis, corpore
 caerulefcente, fusco - maculato, pectore im-
 maculato, cauda fasciata.

Krünitz, Encyklop. XII. p. 130. n. 4. *der barbar-*
oder tunesische Falk.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 88. n. 6. Falco
 (Barbarus) cera pedibusque luteis, corpore cae-
 rulefcente fuscoque maculato, pectore imma-
 culato, cauda fasciata.

Jonston, av. p. 31. Falco Tunetanus.

88. PERE.

(3) Nach Briffon eine Varietät von *Falco Peregrinus*. Nach
 Büffon ist Briffons *Pelerin* kein anderer als der *gemeine Falke*,
 und der *barbarische Falk* eine bloße Abänderung des *Wan-*
derfalken.

88. PEREGRINUS. *Der Wanderfalk.* (4)
- Miller*, Naturfyst. II. p. 76. f. *der Pilgrimfalk.*
- Borowsky*, Thierre ch. II. p. 74. *der Wanderfalk.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 317. n. 9. *der Wanderfalk.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 300. n. 15. *der Wanderfalk.* Tab. II.
- Ebert*, Naturl. II. p. 30. *der Wanderfalk.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 193. n. 13. *der Wanderfalk.*
- Briffon*, ornithol. I. p. 98. n. 6. Faucon pelerin.
- Buffon*, Vögel, II. p. 97. 101. Tab. 40. *der Wanderfalk.*
- Latham*, Vögel, I. p. 65. n. 52. *der ausländische Falke.*
- Latham*, Syn. Suppl. p. 18. Peregrine Falcon.
- Lotham*, Syst. ornitholog. I. p. 33. n. 72. Falco (Peregrinus) cera pedibusque luteis, corpore nigricante, transversim striato, supra caerulefcente, subtus albido, rectricibus fasciatis, apicibus albidis.
- White*, Naturgeschichte von England, p. 14. *ein Falke?*
- Pallas*, Reise, Ausz. II. p. 8. *Wanderfalk?*
- Pennant*, britt. Thiergesch. (von Murr.) Tab. 3. *der Wanderfalk.*
- Bechstein*, Musterung schädlicher Thiere, p. 74. n. 22. *der Wanderfalk.*
- Jonston*, av. p. 29. Falco peregrinus.

β. TATA-

- (4) Länge 1 Fufs, 10 Zoll, Flügelweite 4 Fufs. — Nach *Klein* u. a. zu *Falco Gentilis* oder *communis* gehörig. *Latham* ist geneigt, den *Falco communis naevius* System Linn. p. 271. n. als eine Varietät hieher zu rechnen. S. System, ornith. I. c. p. 33. γ.

β. TATARICUS. *Der tatarische Falk.*

Miller, Natursystem; II. p. 76. *der große tartarische Falk mit röthlichen Flügeln.*

Handb. der Naturgeschichte, II. p. 116. n. 2. *der Tartar.*

Briffon, ornith. I. p. 100. B. Faucon de Tartarie.

Büfson, Vögel. II. p. 98. 102. *der tartar. Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 66. A. *der Falke aus der Tartarey.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 33. β. Falco tataricus.

89. VERSICOLOR. *Der gefleckte Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 66. n. 53. *der gefleckte Falke.*

Latham. Syst. ornithol. I. p. 33. n. 73. Falco (Versicolor) cera flava, corpore supra albo et rufescente-fusco vario, uropygio subtus albicante, pectore ferrugineo maculato, remigibus retrixibusque fulcis, saturatiore fasciatis.

90. PENNATUS. *Der gestiefelte Falk.*

Briffon, ornithol. I. p. 120. n. 39. Faucon Patu.

Latham, Vögel, I. p. 68. n. 55. *der gestiefelte Falke.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 19. n. 34. Falco (Pennatus) cera pedibusque pennatis, luteis, corpore nigricante, griseo vario, subtus luteo-fusco, capite pallido, superciliis nigris.

91. SPADICEUS. *Der chocolatsfarbige Falk.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 192. n. 10. *der chocolatsfarbige Falk.* Tab. 9. unt. Fig.

Latham, Vögel, I. p. 49. A. *der Hudsons-Bay-falke.*

Latham,

Latham, Syn. Suppl. p. 19. Placentia Falcon.

Latham, Syst. ornith. I. p. 27. n. 57. Falco (Spadiceus) cera pedibusque pennatis flavis, corpore spadiceo, abdomine lateribus albo, femoribus luteo mixtis, speculo alarum albo, rectricibus 5. exterioribus basi albis.

β. F. UROPYGIO ALBO. *Der weißbürtliche Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 50. B. *der Hudsons Bay-Falk mit weißem Bürzel.* (Im Syst. ornith. hat *Latham* diese beyden Varietäten nicht getrennet; vielmehr seinen *white-rumped Bay-Falcon*, als eine Spielart von *Falco cyaneus* angenommen. S. Syst. ornith. I. p. 40. n. β.)

92. S. JOHANNIS. *Der St. Johns Falk.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 191. n. 9. *St. Johns Falk.* Tab. 9. obere Fig.

Latham, Vögel, I. p. 69. n. 58. *der St. Johannis Falke.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 34. n. 74. Falco (S. Johannis) cera, pedibusque pennatis flavis, corpore fusco, capite colloque ferrugineis, cauda flavescente, fasciis nigris.

93. SACER. *Der Sakerfalk.* (5)

Müller, Naturfyst. II. p. 76. e. *der britannische Falke.*

Beaustein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 298. *der Sakerfalke.* p. 299. *Brittischer Falke, Sakerfalk, heiliger Falk, Sacker, Köppel, Stockerfalk,*

(5) Nach *Briffon* eine Variet. von *F. Communis*. Nach *Merrrens* eine Varietät von *F. Gyrfalco*.

ckerfalk, heiliger Sakerfalke, Stock-oder Stoßfalk, Großfalk.

Halle, Vögel, p. 197. n. 133. der brittische Falke, mit bohnenförmigen Fack n.

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 753. n. 2. der Sakerfalk.

Handb. der Naturgesch II. p. 119. der Sacrefalk.

Klein, av. p. 48. n. 2. Falco Sacer.

Klein, Vorbereit. p. 92 n 2 Saker-, Sockerfalke, Stockerfalke, heiliger Falke.

Klein, verbeß. Vögelhistorie, p. 48. n. 2. Sacrefalk.

Briffon, ornith. I. p. 98. M. Le Sacre.

Biffon, Vögel, II. p. 71. der brittische Falke. Tab. 38.

Batsch, Thiere, I. p. 293. der brittische Falke.

Latham, Vögel, I. p. 69. n. 59. der Saker-Falke.

Latham, Syn. Suppl. p. 20. Sacre.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 34. n. 75. Falco (Sacer) cera pedibusque caeruleis, dorso, pectore, et tectricibus alarum fusco-maculatis, rectricibus maculis reniformibus.

Merrem, vermischte Abhandl. p. 92. n. 3. β. der heilige Geyerfalke.

Krünitz, Encykl. XII. p. 130. n. 2. der Sakerfalk, Großfalk.

Bechstein, Musterung schäd. Th. p. 74. n. 21. der Sakerfalk.

Berkmann, Bibl. VI. p. 50. der Sakre-Falk.

Jonston, av. p. 29. Sacer.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 205. n. 20. der heilige Falke.

β. Pennant, arct. Zool. II. p. 192. n. 12. der heilige Falk.

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 70. A. *der amerikanische Sak r. Falke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 20. American Sacre.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 34. n. 75. β . Falco
cera pedibusque caeruleis, corpore, remigibus
rectricibusque fulcis, fasciis pallidis, capite,
pectore et abdomine albis maculis longitudina-
libus fulcis.

94. NOVAE TERRAE. *Der neuländische Falk.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 192. n. II. *der Falk von Neuland.*

Latham, Vögel, I. p. 70. n. 60. *der Neu-Foundlänische Falk.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 34. n. 76. Falco (no-
vae Terrae) cera pedibusque semipennatis, fla-
vis, corpore supra fusco, occipite subtusque
ferrugineo, abdomine nebuloso, cauda fusca,
fasciis quatuor saturatoribus.

95. STELLARIS. *Der Sternfalk.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 307. n. 16.
der Blaufuß.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 117. n. 6. *der Stern-
falk.*

Halle, Vögel, p. 214. n. 150. *der aschfarbne Berg-
falk.*

Klein, av. p. 52. n. 18. Falco Cyanopus.

Klein, Vorbereit. p. 98. n. 18. *Blaufuß, Sprinz,
aschfarbener Bergfalk.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 51. n. 18. *Blaufuß.*

Brisson, ornitholog. I. p. 103. n. II. Faucon
etoilé.

Buffon, Vögel, II. p. 103. *der Sternfalk.*

Latham, Vögel, I. p. 70. n. 61. *der Stern-Falke.*

Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 35. n. 77. Falco (Stellaris) pedibus caeruleis, corpore nigricante, maculis stellas referentibus, subtus albo nigroque vario.

Bechstein, Musterung schädli. Th. p. 75. n. 23. der *Blaufuß*.

Jonston, av. p. 33. Falco Cyanopus.

96. HIEMALIS. *Der Winterfalk.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 119. *der Winterfalk.*

β. *Der nördliche Falk.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 120. *Lathams nördlicher Falke.*

Latham, Vögel, I. p. 71. n. 62. *der Winterfalke.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 35. n. 78. Falco (Hyemalis) cera pedibusque flavis, capite corporeque supra atro-fuscis, subtus ferrugineo-fuscis, fasciis albis interruptis, cauda fasciis 4 fuscis, apice albo.

97. CIRRHATUS. *Der indianische geschoppte Falk.*

Halle, Vögel, p. 219. n. 156. *der rauchbeinige indianische Falk, mit dem Federbusche.*

Merrem, verm. Abhandl. p. 90. n. 1. *Haubenfalke.*

Briffon, ornithol. I. p. 104. n. 12. Faucon hupé des Indes.

Büffon, Vögel, II. p. 103. *der indianische geschoppte Falk.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 117. n. 7. *der Haubenfalk aus Ostindien.*

Latham, Vögel, I. p. 71. n. 63. *der indianische Falke mit dem Federbusche.*

Latham, Syn. Suppl. p. 20. Crested indian Falcon.

Latham, Syst. ornith. I. p. 36. n. 83. Falco (Cirrhatius) cera pedibusque pennatis luteis, crista occipitis bifida pendula, corpore supra nigro, subtus albo nigroque striato.

98. MELANOLEUCOS. *Der schwarz und weiße Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 72. n. 65. *der schwarz und weiße Falke, der indianische Ringelfalke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 20.

Latham, Syst. ornith. I. p. 36 n. 85. Falco (Melanoleucos) pedibus luteis, corpore albo, capite, collo, dorso, axillis remigibusque nigris. Naturforsch. I. p. 265. n. 2. *der schwarz und weiße Falke.*

Berlin. Samml. IX. p. 190. n. 2. *der schwarz und weiße Falk.*

Neueste Mannichfalt. I. p. 187. n. 2. *der schwarz und weiße Falk.*

Wolf, Reise n. Zeilan, p. 136. *der Falke?*

99. CEYLANENSIS. *der zeylonische Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 73. n. 66. *der ceylonische Falke mit dem Federbusche.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 36. n. 84. Falco (Ceylanensis) cera flava, corpore lacteo, capite pennis duabus elongatis dependentibus.

100. GRISEUS. *Der graue Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 73. n. 67. *der graue Falke.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 37. n. 86. Falco (Griseus) cera, palpebris pedibusque luteis, corpore supra griseo, abdomine albo, maculis oblongis nigris, cauda cuneiformi, longa, remigibus rectricibusque lateralibus albo maculatis.

27. GYRFALCO. *Der braune Geyerfalk.* (6)

Müller, Natursystem, II. p. 87. n. 27. *Geyerfalk.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 22. *der Geierfalk, Gyrfalk, Mittelfalk, Raubfalk.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 72. n. 7. *der Geyerfalk.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 308. n. 17. *der Geyerfalk.* p 311. *groß Falken, Mittelfalken, Gyrfalken, Geyer, Raubfalken, Gyroder Geyerfalken, Reigerfalken.*

Ebert, Naturl. II. p. 30. *der Geyerfalk, oder Gyrfalk.*

Halle, Vögel, p. 196. n. 132. *der Geierfalk.*

G 2

Neuer

(6) Die Auseinandersetzung der zu dieser und der folgenden Gattung wenn beyde wirklich von einander verschieden sind) gehörigen Synonymen, ist mit grossen und fast unüberwindlichen Schwierigkeiten verbunden. Die Farbe der Wachshaut, der Füße, und des ganzen Gefieders variirt so sehr, und die Beschreibungen der Naturhistoriker sind in Ansehung des Vaterlandes, der Lebensart und der verschiedenen einzelnen Theile des Körpers, zum Theil so schwankend und in einander laufend, daß es oft gar nicht möglich ist, mit Gewisheit zu bestimmen, welche Gattung gemeynt sey. Beseke, dessen Beobachtungen vielen Glauben verdienen, legt sogar seinem Geyerfalken ein *weißes Nasenwachs*, und dem Schwanz *vier weiße Bänder* bey; welche Umstände auf keine von beyden Gattungen unsers Systems passen. Ich habe daher die Synonymen, wo mir das System nicht selbst Anleitung gab, so gut, als es mir hier möglich war, zu ordnen gesucht. Es ist aber unter allen kein einziges, welches sich nicht gewissermassen auf beyde deuten ließe. Ich beziehe mich übrigens auf dasjenige, was ich hierüber schon vorher in der *Anmerk. 2.* angeführt habe, und bemerke nur noch, daß auch *Pennant Brünicks und Fabrixens isländischen Falken* mit hierher zieht.

- Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 752. n. 1. *der Gierfalk, Gyrfalk.*
- Onomat. hist. nat. IV. p. 114. *Geyer-Falke.*
- Handb. der Naturgesch. II. p. 112. *der Gyrfalk.*
- Klein*, av. p. 48. n. 1. Falco rapax, Gyrfalco, Falco vulturinus, Herodias.
- Klein*, Vorbereit. p. 91. n. 1. *Gyr-, Gierfalke.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 47. n. 1. *Gyrfalk, Gierfalk.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 293. *der Geyerfalke.*
- Latham*, Vögel, I. p. 74. n. 68. *der braune Geyer-Falke.*
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 32. n. 68. Falco (Gyrfalco) cera caerulea, pedibus luteis, corpore fusco, subtus fasciis cinereis, caudae lateribus albis.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 15. n. 22 *der Geyerfalk.*
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 276. *Geyerfalke, Gyrfalk, Gierfalk.*
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 67. n. 44. *Geyerfalk.*
- Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Freunde, VII. p. 449. n. 7. *der Geyerfalke.*
- Bechstein*, Musterung schäd. Thiere, p. 76. n. 24. *der Geyerfalke.*
- Krünitz*, Encyklop. XII. p. 129. n. 1. *der Ger-, Gier- oder Geyerfalk.*
- Mervem*, verm. Abh. p. 91. n. 3. *Geyer-Falke.*
- Linné*, Syst. Natur. Edit. VI. p. 17. n. 10. Gyrfalco.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 91. n. 22. Falco (Gyrfalco) cera caerulea, pedibus luteis, corpore fusco, subtus fasciis cinereis, caudae lateribus albis.

101. CANDICANS. *Der weiße Geyerfalk.* (7)*Briffon*, ornithol. I. p. 108. n. 19. Gerfault.*Biffon*, Vögel, II. p. 60. Tab. 36. *der Geyerfalke.**Pennant*, arct. Zool. II. p. 211. F. *der Geyerfalk.**Merrem*, vermischte Abhandl. p. 91. n. 2. α . *der nordische Rauchfaßfalke.**Latham*, Vögel, I. p. 74. n. 69. *der weiße Geyer-Falke.**Beckmann*, Bibl. VI. p. 50. *der Geyerfalk.**Jonston*, av. p. 29. Gyrfalco? β . ISLANDICUS. *Der isländische Geyerfalk.**Briffon*, ornith. I. p. 108. A. Gerfault d'Islande.*Büffon*, Vögel, II. p. 63. *der isländ. Geyerfalk.**Latham*, Vögel, I. p. 75. A. *der isländische Geyer-Falke.*17. SUFFLATOR. *Der surinamische Falk.**Müller*, Naturfyst. II. p. 80. n. 17. *der Blaser.**Latham*, Syn. I. p. 85. n. 7. Surinam Falcon.*Latham*, Vögel, I. p. 75. n. 70. *der surinamische Falke.**Latham*, Syst. ornithol. p. 37. n. 87. Falco (Sufflator) cera pedibusque luteis, corpore fusco albido, oculorum operculis offeis.*Bankroft*, Naturgesch. von Guiana, p. 91. *der surinamische Falke.**Beckmann*, Bibl. VI. p. 52. Falco sufflator.*Hermann*, tab. affin. anim. p. 173. Falco sufflator.*Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 90. n. 16. Falco (Sufflator) cera pedibusque luteis, corpore fusco albido, oculorum operculis offeis.

G 3

18. CA.

- (7) S. die vorhergehende Anmerkung. Länge des Körpers nach *Pennant* fast 2 Fuß; Flügelweite 4 Fuß 2 Zoll. Gewicht 45 Unzen Troy.

18. CACHINNANS. *Der Lachfalk.*

Müller, Naturfyst. II. p. 81. n. 18. *der Spötter.*

Latham, Vögel, I. p. 76. n. 71. *der Lach-Falke.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 37. n. 88. Falco (Cachinnans) cera pedibusque luteis, palpebris albis, corpore fusco albidoque vario, annulo nigro verticem album cingente.

Jinné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 90. n. 17. Falco (Cachinnans) cera pedibusque luteis, palpebris albis, corpore fusco albidoque vario, annulo nigro verticem album cingente.

24. LANARIUS. *Die braune Lanette.*

Müller, Naturfyst. II. p. 85. n. 24 *der Mausadler.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 296. n. 14. *die Lanette.* p. 297. *Mausadler, Schwimmer (Swimern, Schweymer,) große Schlachter, Würger mit dem langen Schwanze; wollige Falken.*

Halle, Vögel, p. 199. n. 136. *der französische Würger, mit rundlichen Münzflecken, an der inwendigen Seite der Flügel.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 20. n. 24. *der Mausadler, französische Würger.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 214. K. *die Lanette.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 117. *der große Schlachter.*

Klein, av. p. 48. n. 5. Falco lanarius, crudelis.

Klein, Vorbereit. p. 93. n. 5. *großer Schlachter.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 48. n. 5. *großer Schlachter.*

Briffon, ornitholog. I. p. 105. n. 16. *Lanier.*

Büffon, Vögel, II. p. 67. Tab. 37. *der französische Würger.*

Batsch,

Batsch, Thiere, I. p. 293. *der franz. Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 77. n. 72. *die braune Lanette, der Schweimer, Wachtelgeyer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 21, Lanner.

Latham, Syst. ornith. I. p. 38. n. 92. Falco (Lanarius) cera lutea, pedibus rostroque caeruleis, corpore subtus maculis nigris longitudinalibus.

Lepechin, Tageb. der russischen Reise, I. p. 308. *Neuntödter. Russ. Balaban.*

Pallas, Reise d. Rusl. Ausz. I. p. 255. *Schwemmerfalken oder Balaban.*

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 370. Falco lanarius.

Pallas, Reise, Ausz. III. p. 373. *Steppenfalken.*

Linné, auserles. Abhandl. II. p. 286. n. 53. *der Würger-Falk.*

Eberhard, Thiergesch. p. 67. *der Würger mit langem Schwanz.*

Beckmann, physik. ökonom. Bibl. VI. p. 50. *der Schweymer.*

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 52. Lanio?

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 17. n. 9. Falco Lanarius.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 91. n. 20. Falco (Lanarius) cera lutea, pedibus rostroque caeruleis, corpore subtus maculis nigris longitudinalibus.

Müller, zool. dan. prodr. p. 10. n. 67. Falco (Lanarius) cera lutea, pedibus rostroque caeruleis, corpore subtus maculis nigris longitudinalibus.

Snurle.

Brünnich, ornith. bor. p. I. n. I. 2. Lanarius.

Jonston, av. p. 32. Lanarius?

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 206. n. 21. *die Lanette.*

102. ALBICANS. *Die weiße Lanette.* (8)

Briffon, ornith. I. p. 107. n. 18 Lanier blanc.
Latham, Vögel, I. p. 78. n. 73. *die weiße Lanette.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 38. n. 93. Falco
 (Albicans) cera pedibusque luteis, corpore
 fuscescente, subtus albicante, remigibus re-
 ctricibusque nigricantibus.

β. *Latham*, Vögel, I. p. 78. ad n. 73. * *

10. CYANEUS. *Der blaue Habicht.* (9)

Müller, Natursystem, II. p. 69. n. 10. *der blaue Habicht.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 256. n. 5.
der blaue Habicht. p. 259. *St. Martin*, grau-
 weißer Geyer, weiße Weyhe, blauer Falke,
 Schwarzflügel, kleiner Spitzgeyer, blaues
 Geyerte; in Thüringen: *der Bleyfalke.*

Klein, verbeff. Vögelhist. p. 165. *blauer Falk.*

Briffon, ornith. I. p. 106. n. 17. Lanier cendré.

Büffon,

(8) Nach *Latham* vielleicht eine Spielart von der vorigen. Seine Länge giebt er auf ein Fuß, achthalb Zoll, und die der Var. β. auf 2 Fuß, 1 Zoll an.

(9) Hier findet sich wieder eine große Verwechslung der Synonymen, da diese und die folgende Gattung von mehreren für einerley gehalten werden. *Latham* ordnete vorher die Synonymen so wie sie in unserm System aufgeführt sind. In seinem Syst. ornithol. hat er eine merkliche Abänderung gemacht. Er nimmt *Brünnichs* und *Briffons Falco Torquatus*, *Raj* und *Willoughby Pygargus*, *Kleins Falco plumbeus*, und *Albins Pygargus* als das Männchen, — *Linnés* und *Scopoli's Pygargus*, *Büffons Soubouse*, *Pennants Ring-tail* in der britischen Zoologie, und *Kramers kleinen Rohrgeyer* als das Weibchen, — *Briffons Accipiter freti Hudsonis*, *Edwards Ringtail-Hawk*, als eine, — und seine eigene *Cayeune Ringtail (Falco Buffoni)* als die andere Varietät an.

Büffon, Vögel, II. p. 28. Tab. 24. *der St. Martin, oder der grauweiße Geyer.*

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 2. *der blaue Falk.*

Batsch, Thiere, I. p. 292. *der grauweiße Geyer.*

Latham, Vögel, I. p. 78. n. 74. *der Hühnerhabicht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 39. n. 94. Falco (Cyaneus) cera alba, pedibus fulvis, corpore caeruleo - canescente, arcu superciliari albo, gulari cingente. (Mas.)

Beseke, Vögel Kurl. p. 9. n. 6. *der blaue Habicht.*

Kramer, Austr. p. 329. n. 12. Falco cera luteo-viridi, cinereus, maculis abdominalibus longitudinalibus ferrugineis; *kleiner Spitz-Geyer, blaues Geyer?*

Hermann, tab. affin. anim. p. 174. F. Cyaneus.

Jonston, av. p. 13. Pygargus, genus alterum?

II. PYGARGUS. *Der Ringelfalk.* (10)

Müller, Naturyst. II. p. 70. n. II. *der Bleyfalke.*

Halle, Vögel, p. 217. n. 154. *der aschfarbene Falk, mit weißem schwarzgewürfeltem Schwanz.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 15. n. 17. *der Bleyfalke, Lerchengeier.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 199. n. 22. *der Falk mit einem Ringe um den Schwanz.*

Klein, av. p. 52. n. 22. Falco plumbeus, cauda tessellata.

Klein, Vorbereit. p. 100. n. 22. *Bleyfalke mit gewürfeltem Schwanz.*

G 5

Klein,

(10) Nach *Latham* u. a. das Weibchen vom vorhergehenden. S. die vorige Anmerk. Gewicht des Männchens, nach *Latham* 12 Unzen, Länge 17 Zoll, Breite 3 Fuß, 2 Zoll. — Gewicht des Weibchens 18 Unzen, Länge 20 Zoll, Breite über 3 Fuß.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 51. n. 22. *Bleyfalk*.

Briffon, ornith. I. p. 100. n. 7. Faucon à collier.

Biffon, Vögel, II. p. 17. Tab. 25. *der Ringelfalke, oder Halbweyhe*.

Batsch, Thiere, I. p. 292. *der Ringelfalk*.

Latham, Vögel, I. p. 79. n. 75. *der Ringelfalke*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 39. n. 94. Falco cera pedibusque flavis, corpore cinereo, abdomine pallido, maculis oblongis rufis, oculorum orbita alba. (*Femina*.)

Befke, Vögel Kurl. p. 9. n. 7. *der Bleyfalke*.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 266. n. 9. *der Bleyfalke, Ringelfalke*.

Pennant, britt. Thiergesch. Tab. 9. 10.

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 165. n. 3. F. Pygargus.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 3. n. 2. *der weißgeschwänzte Adler, Steingeyer, Weißkopf, Gelbschnabel*.

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 375. Falco Pygargus.

Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde, VII. p. 447. n. 1. *der Bleyfalke*.

Naturforsch. VII. p. 40. *Bleyfalke, Tauberfalke*.

Naturforsch. VIII. p. 46. n. 8. *der Bleyfalke*.

Bechstein, Musterung schädlicher Thiere, p. 67. n. 14. *die Halbweyhe*.

Beckmann, physikal. ökonom. Bibl. VII. p. 221. Falco Pygargus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 89. n. 9. Falco (Pygargus) cera flava, corpore cinereo, abdomine pallido, maculis oblongis rufis, oculorum orbita alba.

Müller, zool. dan. prodrom. p. 10. n. 72. Falco (Pygargus) cera pedibusque flavis, corpore cinereo,

neroo, abdomine pallido, maculis oblongis rufis, oculorum orbita alba.

Kramer, Austr. p. 330. n. 13. Falco flavo-viridi, testaceo-, ferrugineo - et fusco - varius; abdomine pallido, maculis longitudinalibus ferrugineis, *kleiner Spitzgeyer, kleiner Rohrgeyer?*

Brünnich, ornithol. bor. p. 4. n. 14. Falco Torquatus?

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 206. n. 22. *der Bleyfalk.*

19. HUDSONIUS. *Der Falk von der Hudsons-bay.* (1)

Müller, Naturyst. II. p. 81. n. 19. *der hudsonische Falk.*

Briffon, ornithol. I. p. 119. n. 37. Epervier de la Baye de Hudson.

Latham, Vögel, I. p. 83. n. 76. *der Ringelfalk aus Hudsons-Bay.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 40. β. Falco cera pedibusque flavis, dorso fusco, superciliis albis, speculo alarum caerulescente.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 2. *der Ringelfalk.*

103. BUFFONI. *Der cayennische Ringelfalk.* (2)

Latham, Vögel, I. p. 85. A. *der cayennische Ringelfalke.*

Latham,

(1) Nach *Latham* Synopf. eine eigne Gattung, nach *Latham* Syst. ornith. eine Spielart von *Falco Cyaneus*, wohin auch daselbst *Pennants Ring-tail Hawk* in der arctischen Zoologie, gerechnet wird.

(2) Nach *Latham* Synopf. eine Varietät von *Falco Hudsonius*. — Nach *Latham* Syst. ornithol. eine Spielart von *Falco Cyaneus*. Die Länge giebt *Latham* in der Synopf. auf zwey, die Flügelweite auf vier Fufs an.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 40. γ. Falco cera caerulea, pedibus luteis, corpore nigricante spadiceo, subtus rufescente, arcu gulari albicante, remigibus rectricibusque fusco-fasciatis.

104. ULIGINOSUS. *Der Sumpffalk.*⁽³⁾

Pennant, arct. Zool. II. p. 198. n. 21. *der Sumpffalk.*

Latham, Vögel, I. p. 84. A. *der Sumpf-Hacht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 40. n. 95. Falco (Uliginosus) cera pedibusque aurantiis, corpore supra fusco, subtus splendide ferrugineo, caudae taeniis quatuor nigris.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 206. n. 23. *der Sumpffalk.*

105. LITHOFALCO. *Der Steinfalk.*⁽⁴⁾

Müller, Natursystem, II. p. 77. h. *der Bergfalke.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 328. *Steinfalke.*

Briffon, ornithol. I. p. 101. n. 8. Faucon de Roche, ou Rochier.

Büsson, Vögel, II. p. 102. *der Steinfalke.*

Büsson, Vögel, II. p. 157. *der Steinfalke.* Tab. 44.

Latham, Vögel, I. p. 84. n. 77. *der Steinfalke.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 47. n. 115. Falco (Lithofalco) cera lutea, corpore fusco-cinereo, supra rufescente, striis fuscis, rectricibus apice

(3) Nach *Latham* Synopf. eine Varietät von *Falco Pygargus*; — nach *Latham* Syst. ornithol. eine Varietät von *Falco Cyaneus*, weil er, wie ich schon vorher Anmerk. 9 angeführt habe, beyde in der Folge für einerley angenommen hat.

(4) Nach *Bechstein* u. a. eine Varietät von *Falco Nisus*.

apice nigricantibus, albo terminatis, laterali-
bus nigro fasciatis.

Frisch, Vögel, Tab. 87. *der Steinfalk.*

Eberhard, Thiergesch. p. 67. *der Steinfalke.*

Krünitz, Encyklop. XII. p. 133. n. 8. *der Stein-
falk.*

Jonston, av. p. 33. Falco Lapidarius.

106. MONTANUS. *Der Bergfalk.* (5)

Halle, Vögel, p. 216. n. 152. *der graue Berg-
falke.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 754. n. II.
Bergfalk.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 117. n. 5. *der Berg-
falk.*

Briffon, ornitholog. I. p. 101. n. 9. Faucon de
Montagne, ou Montagner.

Büffon, Vögel, II. p. 102. n. 19. *der Bergfalke.*

Klein, av. p. 52. n. 20. Falco montanus, monta-
rius. Cybindus. Accipiter nocturnus.

Klein, Vorbereit. p. 99. n. 20. *Birk-Bergfalke.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 51. n. 20. *Birkfalk,
Bergfalk.*

Latham, Vögel, I. p. 84. n. 78. *der Bergfalke.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 48. n. 116. Falco
(Montanus) pedibus luteis, corpore fusco. ci-
nereo, subtus albido, capite nigro, iugulo mac-
culato, caudae basi cinerea, medio nigricante,
apice albo.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 271. n. 15.
Steinfalke, Bergfalke.

Naturforsch. VIII. p. 51. n. 15. *Bergfalk.*

Lapeirouse, neue schwed. Abhandl. III. p. 101.

Falco montanus, cera, digitis palpebrisque ci-
trinis;

(5) Nach *Büffon* eine Spielart vom vorigen.

trinis; corpore atro, pectore macula alba notato, pedibus lanatis.

Eberhard, Thiergesch. p. 67. *der Birkfalke.*

Krönitz, Encykl. XII. p. 133. n. 7. *der Berg- oder Birkfalke.*

Jonston, av. p. 30. Falco Montanus.

β. Der aschgraue Bergfalk. (Zwitterfalk.)

Briffon, ornithol. I. p. 102. A. Faucon de montagne cendré.

Latham, Vögel, I. p. 85. A. *der aschgraue Bergfalke.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 48. β. Falco pedibus luteis, corpore cinereo, subtus niveo, restrictibus duabus utrinque lateralibus albis.

Jonston, av. p. 31. alterum Montani genus.

16. TINNUNCULUS. Der Thurnfalk. (6)

Müller, Naturfyf. II. p. 80. n. 16. *der Thurnfalk.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 74. n. 10. *der Kirchenfalke, Thurnfalke.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 322. *der Thurnfalke.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 311. n. 18. *der Thurnfalke.* p. 314. *Kirchenfalke, Wannenweber,*

- (6) Länge 16 Zoll; Flügelweite 2 Fufs 8 Zoll. Gewicht des Männchens etwa siebenthalb Unzen. Nistet in den Steinritzen hoher Thürme, Bergschlösser, Felsen, auf alten Baumstämmen, in hohlen Bäumen. Legt im May 4 bis 6 rundliche, gelbröthliche, mit rothen und braunen Flecken besetzte Eyer. Die Jungen lassen sich sehr leicht zähmen, und verlassen das Haus nicht, wenn man ihnen die Flügel beschneidet. Die Benennung: *Rüttel-* oder *Rüchelgeyer* kömmt daher, weil der Vogel oft in der Luft lange auf einem Flecke hängt, und die Flügel schnell bewegt, welches die Jäger *rütteln* oder *rütteln* heißen.

*nenweher, Steinschmätzer, Röthelweyhe, Röt-
telweib, Ritthweyer, Windwahl, Graukopf,
Wandwehe, Wandwäher, Lachweyhe, Wieg-
wehen, Steinschmack, Steengall, Sperber, ro-
ther Sperber; in Thüringen: Röthelgeyer,
oder Rittelgeyer.*

Halle, Vögel, p. 200. n. 138. der Thurmfalke.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere,

II. p. 18. n. 21 der Thurmfaik, Kirchenfalk,

Wannenweher, Steinschmätzer, Röthelweyhe.

Pennant, arct. Zool. II. p. 215. M. der Thurm-

falk, Wannenweher.

Onomat. histor. natur. II. p. 784. Cenchrus; der

Thurmfalke, Wannenweher.

*Handb. der Naturgeschichte, II. p. 121. der Wan-
nenweher.*

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 95. Rittel-

*geyer, Wandwäher, Thurmfaik, Spertings-
habicht.*

Klein, av. p. 49. n. 7. Falco Cenchrus.

*Klein, Vorbereitung, p. 94. n. 7. Wannen-
weher.*

*Klein, verbesserte Vögelhist. p. 48. n. 7. Wan-
nenweher, Graukopf, Steinschmätz.*

Klein, Vögeleyer, p. 19. Tab. 6. fig. 4.

Gesner, Vögelbuch, p. 309. Wannenweher.

Briffon, ornith. I. p. 113 n. 27. Cresserelle.

*Büffon, Vögel, II. p. 148. Tab. 43. der Kirchen-
falke.*

Batsch, Thiere, I. p. 294. der Kirchefalke.

*Latham, Vögel, I. p. 85. n. 79. der Röthelgeyer,
Wannenweher, Kirch-Falke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 25. Kestrel.

*Latham, Syst. ornith. I. p. 41. n. 98. Falco (Tin-
nunculus) cera pedibusque flavis, dorso rufo,
punctis*

punctis nigris, pectore striis fuscis, cauda rotundata.

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 13. n. 18. *der Thurmfalk.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 273. n. 18. *Thurm-, Kirchen-, Mauerfalke, Rothelgeyer.*

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 47. *Kirchenfalk.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 65. n. 39. *Thurmfalk, Mauerfalk.*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 165. n. 7. *Kirchenfalk, Sperlingshabicht.*

Pennant, britt. Thiergesch. (v. Murr) Tab. II.

Pallas, nord. Beyträge, III. p. 16. Falco Tinnunculus.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 79. *Rittelgeyer.*

Mellin, von Anleg. der Wildbahnen, p. 347. *der Rittelgeyer.*

Linné, auserlesene Abhandl. II. p. 287. n. 53. *der Kirchenfalk.*

Naturforsch. VIII. p. 52. n. 18. *Thurmfalke.*

Nau, neue Entdeck. a. d. Naturgesch. I. p. 246. Falco tinnunculus.

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII. p. 448. n. 6. *der Thurmfalke.*

Bechstein, Musterung schädli. Thiere, p. 77. n. 25. *der Thurmfalke.*

Beckmann, phys. ök. Bibl. VI. p. II. *der Thurmfalk:* (Weibchen zuweilen fälschlich: *Lerchensperber*.)

Zorn, Petinotheol. II. p. 242. *das Röthel-Geyerlein.*

Krünitz, Encykl. XII. p. 131. n. 5. *der Kirchen- oder Thurmfalk.*

Jablonsky, allgem. Lexicon, p. 395. *der Rittel-Geyer, oder Rötel-Geyer,*

Merklein,

Merklein, Thierreich, p. 279. *Wannenweher*.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. p. 5. *der Wannenweher, Windwahl*.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 52. Falco Tinnunculus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 14. Falco Tinnunculus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 90. n. 15. Falco (Tinnunculus) cetera pedibusque flavis, dorso rufo, punctis nigris, pectore maculis longitudinalibus fuscis, cauda rotundata.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 9. n. 65. Falco (Tinnunculus) cetera pedibusque flavis, dorso rufo, punctis nigris, pectore striis fuscis, cauda rotundata.

Kramer, Austr. p. 331. n. 15. Falco pedibus ceteraque flavis, dorso rufescente, pectore maculis longitudinalibus fuscis, cauda rotundata; *Windwahl, Ritthweyer, Wannenweher*.

Brünicb, ornith. bor. p. 1. n. 45. Falco Tinnunculus.

Jonston, av. p. 22. Tinnunculus.

Columella, de re rust. L. 8. c. 8. n. 7. Tinnunculus.

Aristot. hist. anim. L. VI. c. 8. *Κερχεῖς*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 207. n. 24. *der Thurmfalk*.

β. GRISEUS. *Der graue Thurmfalk.*

Latham, Vögel, I. p. 86. **B.** *der graue Röthelgeyer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 42. **β.** Tinnunculus pennis griseis.

γ. ACCIPITER ALAUDARIUS. *Der Lerchenhabicht.*

Klein, av. p. 49. n. 8. Falco Murorum, Ruderum, Turrium?

Klein, Vorbereit. p. 94. n. 8. *Mauerfalke?*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 49. n. 8. *Mauerfalke?*

Klein, av. p. 49. n. 9. *Falco varius, pictus, alaudarum.*

Klein, Vorbereitung, p. 94. n. 9. *Lerchenfalke.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 49. n. 9. *Lerchenfalke, Schwimmer.*

Klein, Vögeleyer, p. 19. Tab. 6. fig. 6.

Briffon, ornithol. I. p. 110. n. 22. *Epervier des alouettes.*

Latham, Vögel, I. p. 86. A. *der Lerchenhabicht.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 42. γ. *Falco rufus, fusco-striatus, subtus rufescens maculis longitudinalibus fuscis, rectricibus griseo-rufescentibus, fusco transversim striatis, apice nigricantibus, albo terminatis.*

δ. *Der Thurmfalk mit hellblauem Kopfe.**

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 315. n. 2.

e. *Der weiße Thurmfalk.**

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 315. n. 3.

107. BOHEMICUS. *Der böhmische Falk. (?)*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 259. *der böhmische Mäusehabicht.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 43. n. 100. *Falco (Bohemicus) pedibus flavescens, corpore supra cinereo, subtus candido, remigibus 5. exterioribus extus nigris, orbitis albis.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 207. n. 25. *der böhmische Falk.*

108. PISCATOR. *Der Fischerfalk.*

Büffon, Vögel, II. p. 141. Tab. 41. *der Fischerfalke. (Tanas bey den Negern am Senegall.)*

Latham,

(7) Nach *Bechstein* eine Varietät von *Falco Cyanus*.

Latham, Vögel, I. p. 86. n. 80. *der Fischer-Falke.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 43. n. 101. Falco (Piscator) subcristatus, capite ferrugineo, corpore cinereo pennis margine fuscis, subtus lutescente, maculis longitudinalibus fuscis.

109. BADIUS. *Der ceylonische braune Habicht.*

Latham, Vögel, I. p. 87. n. 81. *der ceylonische braune Habicht.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 43. n. 102. Falco (Badius) pedibus flavicantibus, corpore fusco, subtus albo, lunulis flavis; rectricibus alarum albo marginatis, rectricibus lineis 4. nigricantibus.

110. AQUILINUS. *Der Falk mit rother Kehle.*

Buffon, Vögel, I. p. 181. Tab. 13. *der kleine amerikanische Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 87. n. 82. *der Falke mit rother Kehle.*

Latham, Syn. Suppl. p. 26. Red-throated Falcon.

Latham, Syst. ornith. I. p. 38. n. 91. Falco (Formosus) cera, orbitis pedibusque luteis, iugulo purpureo, corpore supra caerulescente-rubro, abdomine incarnato.

Merrem, vermischte Abhandl. p. 90. n. 14. *roth-halsigter Adler.*

111. FUSCUS. *Der braune amerikanische Falk.*

Latham, Vögel, J. p. 88. n. 84. *der braune amerikanische Habicht.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 43. n. 103. Falco (Fuscus) cera cinerea, pedibus flavis, corpore nigro striato, supra cinereo-fusco, subtus albicante, rectricibus fasciis 4. obscurioribus.

31. NISUS. *Der Sperber.* (8)

Müller, Naturfyst. II. p. 88. n. 31. *der Sperber.*

Leske, Naturgesch. p. 233. n. 6. *der Sperber.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 75. n. 11. *der Sperber, Lerchenfalke.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 161. n. 9.

Falco (Nisus) cera viridi, pedibus flavis, abdomine albo griseo-undulato, cauda fasciis nigricantibus; *der Sperber, Vogelfalke.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 324. n. 16. *der Sperber.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 320. n. 21. *der Sperber.* p. 327. *Sperber* (bey den Jägern) das Weibchen; *Sprinz*, *Sprengchen*,

Blaubäckchen, das kleinere Männchen. —

Weißgesperrberter Habicht, Islander, Wach-

telhabicht, Sperberfalke, Lerchenfalke, Ler-

chenstößer, Taubenstößer, Schwalbenfalke,

Schwalbengeyer, Finkenfalke, Finkensperber,

Finkenhabicht, Stößer, kleiner Stockfalke, Gold-

fuß mit schwarzem Schnabel, Schwimmer,

Luftschiffer.

Funke,

- (8) Hält sich vorzüglich gern in gebirgigen und waldigen Gegenden auf, und sucht in Vorhölzern großer Kettenwälder, wo er sich in den tiefen Zweigen der Bäume verbirgt, immer dem freyen Felde nahe zu seyn, und geht besonders vor Sonnen Auf- und Untergang seiner Nahrung nach. Brütet im May und Junius. Nistet auf den höchsten Fichten. Das Nest besteht aus Reisern, mit Moos, dürren Blättern und Haaren ausgefüttert. Legt 3 bis 4 schmutzig weisse, mit rothfarbigen großen und kleinen, eckigen und zackigen Flecken, besonders am stumpfen Ende in Gestalt eines Kranzes bezeichnete Eyer. Brütet fast drey Wochen. Die Jungen sehn im ersten und zweyten Jahre sehr bunt aus, und erhalten erst nach dem zweyten Mausern die reguläre Farbzeichnung. — Gewicht des Männchen, nach *Pennaut* fünf, des Weibchen neun Unzen.

- Funke*, Naturgesch. I. p. 282. *der Sperber.*
Ebert, Naturl. II. p. 33. *der Sperber.*
Halle, Vögel, p. 201. n. 139. *der Lerchenfalke.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 25. n. 32. *der Sperber, Finkenfalke, Finkensperber, Sprinzel.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 216. N. *der Sperber.*
Beckmann, Naturhist. p. 37. c. *der Sperber.*
 Neuer Schaupl. der Natur, VIII. p. 332. *Sperber.*
Onomat. histor. nat. I. p. 47. der grüne Sperber, der kleine Habicht.
Onomat. histor. nat. V. p. 620. Sperber, Finkensperber, Lerchenfalke, kleiner Stoßfalke, Finken-Habicht.
 Handbuch der Naturgesch. II. p. 109. *der kleine Habicht.*
 Handbuch der deutschen Thiergeschichte, p. 95. *Sperber, Finkenhabicht, Vogelfalke.*
Klein, av. p. 53. n. 23. Falco Fringillarius.
Klein, Vorbereit. p. 100. n. 23. *Finkenfalke.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 52. n. 23. *Finkenfalke, Sprinzel.*
Gesner, Vögelb. p. 307. *Sperber.*
Briffon, ornith. I. p. 89. n. 1. *Epervier.*
Büffon, Vögel, II. p. 35. Tab. 31. *der Sperber, Finkensperber.*
Batsch, Thiere, I. p. 293. *der Sperber.*
Latham, Vögel, I. p. 89. n. 85. *der Sperber, Vogelfalke.*
Latham, Syn. Suppl. p. 26. Sparrow-Hawk.
Latham, Syst. ornith. I. p. 44. n. 107. Falco (Nisus) cera viridi, pedibus flavis, abdomine griseo undulato, cauda fasciis nigricantibus.
Beseke, Vögel Kurl. p. 16. n. 25. *der Sperber.*

- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. p. 6. n. 6. *der Sperber, Finkenfalke, Sprinz.*
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 278. n. 24. *der Sperber.*
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 66. n. 42. *Sperber.*
- Cetti*, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 51. *der Sperber.*
- White*, Naturgesch. von England, p. 58. *Sperber.*
- Taube*, Slavon. und Syrm. p. 23. *Sperber.*
- Pontoppidan*, Naturg. von Dännemark, p. 166. n. 12. *Sperber.*
- Pallas* Reise, I. p. 370. Falco Nifus.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 240. *der Sperber.*
- Pennant*, britt. Thiergesch. Tab. 13. 14.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 78. *Sperber.*
- Meidinger*, Vorles. über d. Thierr. I. p. 112. n. 5. *der Sperber.*
- Naumann*, Vogelsteller, p. 125. *der Sperber.*
- Beschstein*, Musterung schädli. Thiere, p. 79. n. 28. *der Sperber.*
- Tengmalm*, neue schwed. Abhandl. IV. p. 44. Nifus.
- Geoffroy*, mat. med. VII. p. 274. *Habicht oder Sperber.*
- Loniceri*, Kräuterb. p. 658. *Sperber.*
- Kraft*, Ausrott. grauf. Th. I. p. 291. *Sperber.*
- Eberhard*, Thiergesch. p. 67. *Sperber.*
- Jablonsky*, allg. Lex. p. 1102. *Sperber.*
- Kolbe*, Vorgeb. d. g. Hoffnung, Edit. in 4. p. 389. *Sperber?*
- Beckmann*, Bibl. VI. p. 49. *der Sperber.*
- Linne*, Syst. Nat. Ed. II. p. 52. Nifus.
- Linne*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 15. Falco Moschetus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 92. n. 26 Falco (Nifus) cera viridi, pedibus flavis, pectore albo, fusco undulato, cauda fasciis nigricantibus.

Müller, zool. dan. prodr. p. 10. n. 71. Falco (Nifus) cera viridi, pedibus flavis, abdomine albo, griseo undulato, cauda fasciis nigricantibus.

Kramer, Austr. p. 332. n. 16. Falco cera viridi, pedibus flavis, pectore albo, undulis transversis fuscis, cauda fusca fasciis nigricantibus;

Sprinzl mas., *Sperber* foemina.

Brünnich, ornith. bor. p. 5. Nifus.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 189. Accipiter fringillarius; ein *Sperber*, *Sperwer*.

Kuorr, delic. nat. II. p. 83. Tab. I. 3.

Jonston, av. p. 21. Accipiter Fringillarius.

Hermann, tab. affin. anim. p. 173. F. Nifus.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 207. n. 26. *der Sperber*.

β. MACULATUS. Der gefleckte Sperber.

Klein, av. p. 53. n. 25. Falco manibus aureis, rostro nigricante.

Klein, Vorbereitung, p. 101. n. 25. *Goldfuß mit schwarzem Schnabel*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 52. n. 24. *Goldfuß mit schwarzem Schnabel*.

Briffon, ornithol. I. p. 90. A. Epervier tacheté.

Büffon, Vögel, II. p. 36. *der gefleckte Sperber*.

Latham, Vögel, I. p. 90. A. *der gefleckte Sperber*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 45. β. Accipiter maculatus.

γ. LACTEUS. Der weiße Sperber.

Gesner, Vögelb. p. 307. *ganz weiße Sperber*.

Latham, Vögel, I. p. 91. B. *der weiße Sperber*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 45. γ. Falco lacteus.

112. DUBIUS. *Der unbestimmte Falk.* (9)

Pennant, arct. Zool. II. p. 203. n. 28. *der unbestimmte Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 107. n. 115. *der unbestimmte? Falke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 37. *dubious Falcon.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 44. n. 104. Falco (Dubius) cera, iridibus pedibusque flavis, corpore fusco, subtus albo, striis fuscis, rectricibus cinereis, fasciis 4 nigris.

113. OBSCURUS. *Der dunkelbraune Falk.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 203. n. 29. *der dunkelbraune Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 107. n. 116. *der americanische Falke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 38. *Dusky Falcon.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 44. n. 105. Falco (obscurus) cera pedibusque flavis, corpore fusco, subtus striis albis, cervice albo maculato, rectricibus fusco alboque fasciatis.

21. COLUMBARIUS. *Der carolinische Taubenfalk.* (10)

Miller, Naturfyst. II. p. 82. n. 21. *der Taubensperber.*

Halle,

(9) Gewicht, nach *Pennant*, 6 Unzen. Soll eine Spielart vom folgenden seyn.

(10) Länge 10 bis 12 Zoll. Gewicht 6 Unzen. Bewohnt Amerika von der Hudsonsbay bis Südcarolina. In der Hudsonsbay erscheint er im May an den Ufern des Severnflusses, brütes daselbst, und geht im Herbst nach Süden zurück. Frisst kleine Vögel. Fliegt, wenn sich ihm jemand nähert, mit grossem Geschrey im Kreise herum. Nistet in Felsen
oder

Halle, Vögel, p. 206. n. 141. *der Tauberfalke mit langen schmalen Fischerhosen.*

Merrem, verm. Abh. p. 93. n. 7. *Taubenfalke.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 20. n. 23. *der Buntschwänzel, Taubensperber.*

Pennant, arch. Zoolog. II. p. 202. n. 27. *der Taubenfalk.*

Neuer Schaupl. der Natur, VIII. p. 810. *Taubenhabicht.*

Briffon, ornithol. I. p. 110. n. 21. *Epervier de la Caroline.*

Büffon, Vögel, II. p. 58. *der Taubenhabicht.*

Klein, av. p. 51. n. 17. *Falco Carolinensis Columbarius.*

Klein, Vorbereitung, p. 98. n. 17. *Buntschwänzel, karolinischer Taubenfalk.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 51. n. 17. *Buntschwänzel.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 6. *der Taubenhabicht.*

Latham, Vögel, I. p. 91. n. 86. *der Taubenhacht aus Carolina.*

Latham, Syn. Suppl. p. 27. *Pigeon Hawk.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 44 n. 106. *Falco (Columbarius) cera, icidibus pedibusque luteis, corpore fusco, subtus albido, striis fuscis, cauda-fasciis linearibus 4 nigris.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 90. n. 19. *Falco (Columbarius), cera lutea, corpore fusco, subtus albido, cauda fusca, fasciis linearibus quatuor albis.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 173. *F. Columbarius.*

H 5

Donn-

oder hohlen Bäumen. Legt 2 bis 4 weisse, rothgefleckte Eyer. Raubt in Carolina Tauben, und junge welsche Hühner. *Pennant.*

- Donndorff*, Handb. der Thiergesch. p. 208. n. 27.
der Taubenfalk.
22. SUPERCILIOSUS. *Der guianische Falk.*
Miller, Naturfyft. II. p. 83. n. 22. *der surinami-*
sche Falk.
Latham, Vögel, I. p. 92. n. 87. *der guianische*
Falk.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 45. n. 108. Falco
(Superciliosus) cera, pedibus palpebrisque lu-
teis, corpore fusco, albido undulato, remigi-
bus ferrugineis, nigro fasciatis.
23. VESPERTINUS. *Der Abendfalk.*
Müller, Naturfyft. II. p. 83. n. 23. *der Kobetz.*
Latham, Vögel, I. p. 92. n. 28. *der Falk aus In-*
grien.
Latham, Syn. Suppl. p. 27. *Ingrian Falcon.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 46. Falco (Vesperti-
nus) cera, pedibus palpebrisque luteis, crisso
femoribusque ferrugineis.
Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 66. n. 43.
Nachtfalk.
Decouv. Russ. II. p. 142. *Kobez.*
Hermann, tab. affin. animal. p. 274. *F. Vesper-*
tinus.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 208. n. 28.
der Kobez.
214. VESPERTINOIDES. *Der Falk aus Per-*
mien.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 46. n. 110. Falco
(Vespertinoides) cera, pedibus palpebrisque
luteis, femoribus nigris, collo, pectore et ven-
tre fuscescentibus, albo maculatis.

115. MAGNIROSTRIS. *Der großschnäblichte Falk.*

Latham, Vögel, I. p. 93. n. 89. *der Großschnäbler-Falke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 27. Greatbilled Falcon.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 46. n. III. Falco (Magnirostris) cera pedibusque flavis, corpore fusco, abdomine albo, striis ferrugineis, rectricibus albo nigroque fasciatis.

14. SUBBUTEO. *Der Baumfalk.*(¹)

Müller, Natursystem, II. p. 78. n. 14. *der Baumfalke.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 323. n. 15. *der gemeine Baumfalke.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 317. *der gemeine Baumfalke.* p. 320. *der kleine Bushart, Lerchenfalke, Stoßfalke.* Bey den thüring. Jägern: *das Weißbäckchen.*

Halle, Vögel, p. 219. n. 157. *der kleine Bushart mit rothen schwarzfleckigen Schenkeln, und rothweißem Halse.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 16. n. 19. *der Baumfalk, kleine Bushart.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 216. O. *der Baumfalk.*

Onomat. histor. natur, III. p. 591. *Dendrofalco; der Baumfalk.*

Hand-

(1) Länge 1 Fuß 4 Zoll. Flügelweite 3 Fuß 4 Zoll. Gewicht des Männchen, nach *Pennant* 7 Unzen. Hält sich beständig in den Wäldern auf, und nistet auf den höchsten Bäumen. Zuweilen baut er kein eignes Nest, sondern bedient sich eines alten der Rabenkrähe. Legt 3 bis 4 weisse, röthlich gefleckte Eyer. Die Jungen sehn im ersten Jahre schwärzer aus, und sind gewöhnlich am Unterleibe aschfarbig und ungefleckt.

Handbuch der Naturgesch. II. p. 120. *der Baumfalk.*

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 93. *Baumfalke, Stoßfalke, Lerchenfalke, kleiner Weißback.*

Gesner, Vögelbuch, p. 331. *Baumfalk.*

Briffon, ornithol. I. p. 109. n. 20. Habereau.

Büffon, Vögel, II. p. 143. Tab. 42. *der Baumfalke.*

Batsch, Thiere, I. p. 294. *der Baumfalk.*

Lotham, Vögel, I. p. 93. n. 90. *der Baum-Falke.*

Latham, Syn. Suppl. p. 28. Hobby.

Latham, Syst. ornith. I. p. 47. n. 114. Falco (Subbuteo) cera pedibusque flavis, dorso fusco, nucha alba, abdomine pallido, maculis oblongis fuscis, crisso femoribusque rufis.

Beske, Vögel Kurl. p. 12. n. 16. *der Baumfalk.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 271. n. 16. *Baumfalke, Lerchenfalke.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 66. n. 41. *Lerchenfalk*

Döbel, Jägerpraktik, I. p. 79. *Baum-Falke.*

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 165. n. 5. *Lerchenfalke, Baumfalke.*

Mellin, von Anleg. der Wildb. p. 347. n. 8. *der Baumfalke, Steinfalke.*

Pennant, britt. Thiergesch. (v. Murr) Tab. 12. *der Lerchenfalk.*

Naturforsch. VIII. p. 51. n. 16. *Baumfalke.*

Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde, VII. p. 448. n. 4. *der Baumfalke.*

Nau, Entdeck. a. d. Naturgesch. I. p. 246. Falco Subbuteo.

Bechstein, Musterung schäd. Th. p. 77. n. 26. *der gemeine Baumfalke.*

Tänzer,

Tänzer, notabil. venat. p. 132. *der Baumfalk.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 241. *der Weißback oder Schmerl.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 11. Dendro. Falco.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 89. n. 13. Falco (Subbuteo) cera pedibusque flavis, dorso fusco, nucha alba, abdomine pallido, maculis oblongis fuscis.

Müller, zoolog. dan. prodrom. p. 9. n. 63. Falco (Subbuteo) cera pedibusque flavis, dorso fusco, nucha alba, abdomine pallido, maculis oblongis fuscis.

Brünch, ornithol. bor. p. 3. n. 10. 11. Falco Subbuteo.

Jonston, av. p. 33. Falco arborarius.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 209. n. 29. *der Baumfalk.*

116. AURANTIUS. *Der Falk mit orangefarbner Brust.*

Latham, Vögel, I. p. 95. n. 91. *der Baum-Falke mit orangefarbner Brust.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 48. n. 117. Falco (Aurantius) rostro pedibusque plumbeis, corpore nigricante, dorso basique caudae fasciis albicantibus interruptis, pectore fulvo, femoribus ferrugineis.

β. *Orange-breasted Hobby.* *

Latham, Syn. Suppl. p. 28.

Latham, Syst. ornith. I. p. 48. n. 117. β.

Latham, Vögel, I. p. 95.

- γ. Falco pedibus fulvis, corpore supra nigro-caerulescente, fasciis caerulescentibus, subtus fasciis albis, abdomine imo, femoribus crissoque rufis. *

Latham, Syn. Suppl. p. 29. descr. 2.

Latham, Syst. ornith. I. p. 48. n. 117. γ.

Latham, Vögel, I. p. 95.

117. PLUMBEUS. *Der Falk mit geflecktem Schwanze.*

Latham, Vögel, I. p. 95. n. 92. *der Baum-Falk mit geflecktem Schwanze.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 49. n. 118. Falco (Plumbeus) cera obscura, pedibus flavis, capite, dorso infimo, abdomineque cinereis, remigibus intus ferrugineis, rectricibus lateralibus intus maculis tribus albis.

118. AESALON. *Das Schmierlein.* (2)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 328. n. 22. *der Merlin.* p. 330. *kleiner Rothfalk, Zwergfalk, Schmierlein, Schmerl, kleiner Sperber.*

Halle, Vögel, p. 205. *der Sperber mit weißgelbem Nackenring.*

Onomat. histor. nat. I. p. 117. Aesalo, Smerillus, Merillus.

Handb.

- (2) Die zu dieser und der nächstfolgenden Gattung gehörigen Synonymen werden häufig verwechselt; auch die Varietäten der erstern sehr unter einander geworfen; die ganze Gattung von einigen mit *Falco Minutus* für einerley gehalten; manche Spielarten wieder zu andern Gattungen gerechnet, u. dgl. m. Das *Schmierlein* legt sein Nest in ebenen und gebirgigen Waldungen auf hohen Bäumen an, und legt 5 bis 6 weißliche, mit braunen Punkten besetzte Eyer. Nährt sich von allerhand kleinen Vögeln; ist aber auch wohl im Stande sich eines Rebhuhns zu bemächtigen. — Flügelweite 26 und einen halben Zoll.

- Handb. der Naturgesch. II. p. 113. *des Sperber.*
Klein, av. p. 50. n. 10. Falco Aesalon.
Klein, Vorbereit. p. 95. n. 10. *Schmierlein.*
Klein, verbesserte Vögelhist. p. 49. n. 10. *Sperber, Schmierlein.*
Ge. ner, Vögelb. p. 303. *Mirlein oder Smirlein.*
B. isson, ornitholog. I. p. 111. n. 23. Emerillon.
B. isson, Vögel, II. p. 164. *der europäische Smerl.*
Latham, Vögel, I. p. 96. n. 93. *das Schmierlein.*
Latham, Syn. Suppl. p. 29. *Merlin.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 49. n. 119. Falco (Aesalon) cera pedibusque flavis, capite ferrugineo, corpore supra caerulefcente - cinereo, maculis striisque ferrugineis, subtus flavicante-albo, maculis oblongis.
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 274. n. 18. *der Hühnerdieb, Schmierlein, Merle?*
Bock, Preussen, IV. p. 279. n. 25. *Zwergfalke;* (mit *Falco Minutus* verwechselt.)
Döbel, Jägerpraktik, I. p. 79. *Sprentzgen oder Schmerl.*
Tänzer, notab. venator. p. 133. *der Schmerl.*
Naturforsch. VIII. p. 55. n. 25 *Zwergfalk;* (mit *Falco Minutus* verwechselt.)
Bechstein, Musterung schädlicher Thiere, p. 80. n. 29. *der Merlin.*
Pennant, britt. Thiergesch. (v. Murr) Tab. 15. *Schmerling.*
Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 348. Smerillus. p. 349. Falco parvus, Merlinus; *ein Smyrle, Smyrlin, Myrle.*
Rzaczyński, auct. histor. nat. Polon. p. 354. Falconellus.
Hermann, tab. affin. anim. p. 172. F. Aesalon.
Plin. hist. nat. Lib. X. c. 8. Aesalon?

β. NOVEBORACENSIS. *Der Merlin von Newyork.* (3)

Pennant, arch. Zoolog. II. p. 202. *der Merlin von Newyork.*

Latham, Vögel, I. p. 97. A. *das Schmierlein aus Newyork.*

γ. CARIBAEORUM. *Das caribäische Schmierlein.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 113. n. 1. *der Grigri.*
Briffon, ornithol. I. p. III. n. 24. *Emerillon des Antilles.*

Büffon, Vögel, II. p. 165. *Gry Gry.*

Latham, Vögel, I. p. 98. B. *das karibäische Schmierlein.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 49. β. *Accipiter supra rufus, maculis nigris variis, inferne albus, maculis longitudinalibus nigris notatus.*

δ. FALCONARIORUM. *Das Falkonirer-Schmierlein.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 19. n. 22. *das Schmierlein, der Schmerl, Myrle.*

Büffon, Vögel, II. p. 159. Tab. 45. *das Schmierlein.*

Latham, Vögel, I. p. 98. C. *das Falkonirer-Schmierlein.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 49. γ. *Aesalon habitu Subbuteonis, ceterum Lithofalconi similiar.*

Beckmann, Bibl. VI. p. 51. *der Emerillon, das Schmierlein.*

20. SPAR-

(3) Ist nach *Pennant* dem *Falco Dominicanensis* so ähnlich, daß er kaum von demselben zu trennen seyn möchte. Im Syst. ornith. hat *Latham* ihn auch selbst als das Weibchen von der folgenden Gattung angenommen; p. 42.

20. SPARVERIUS. *Der Kalotchenfalk.* (4)

Müller, Naturfyſtem, II. p. 81. n. 20. *der Hühnerdieb.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 201. n. 26. *der kleine Falk.*

Klein, av. p. 51. n. 16. Falco vertice vel rubro vel luteo.

Klein, Vorbereit. p. 97. n. 16. *Kalotchenfalke.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 50. n. 16. *Kalotchenfalk.*

Handb. d. Naturgeſch. II. p. 113. n. 2. *der Sperber aus Carolina.*

Briffon, ornithol. I. p. 112. n. 25. Emerillon de la Caroline.

Büſſon, Vögel, II. p. 167. *der kleine Habicht.*

Latham, Vögel, I. p. 99. n. 94. *das amerikaniſche Schmierlein.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 42. n. 99. Falco (Sparverius) cera pedibusque luteis, capite fuſco, vertice abdomineque rubro, alis caeruleſcentibus. (*Maſ.*)

Seligmann, Vögel, I. Tab. 10. *der kleine Falk.*

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. 90. n. 18. Falco (Sparverius) cera lutea, capite fuſco, vertice abdomineque rubro, alis caeruleſcentibus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 173. F. Sparverius.

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 209. n. 30. *der kleine Falk.*

119. DOMINICENSIS. *Der Falk von Domingo.* (5)

Pennant, arct. Zool. II. p. 202. *oben.*

Briffon,

(4) Nach *Latham* Syſt. ornithol. gehören die Synonymen der folgenden Gattung mit hierher.

(5) Nach *Pennant* und *Latham* das Weibchen von *Falco Sparverius*.

Briffon, ornith. I. p. 112. n. 26. Emerillon de S. Domingue.

Latham, Vögel, I. p. 99. n. 95. *der St. Dominik-Falke.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 42. n. 99. Falco cera, pedibusque luteis, capite cinereo, corpore rufo-vinaceo, nigro fasciato, subtus albedo, maculis ferrugineis, rectricibus fasciis undecim nigris: (femina.)

32. MINUTUS. *Der Zwergfalk.*

Müller, Naturfyst. II. p. 90. n. 32. *der Zwergfalke.*

Briffon, ornithol. I. p. 91. n. 2. Petit epervier.

Latham, Vögel, I. p. 100. n. 96. *der Zwergfalke.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 50. n. 121. Falco (Minutus) cera fusca, pedibus luteis, corpore subtus albo, rectricibus fuscis, nigro-fasciatis.

Fischer, Zuf. z. Naturgesch. von Livland, p. 43. n. 488. *Zwergfalk?*

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 87. *der allerkleinste Habicht?*

9. CAERULESCENS. *Der bengalische Falk.*

Müller, Natursystem, II. p. 69. n. 9. *der kleine bengalische Habicht.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 52. n. 25. *indianischer Sperber.*

Briffon, ornithol. I. p. 119. n. 38. Falco Bengalensis; *Faucon de Bengale.*

Merrem, vermischte Abhandl. p. 90. n. 15. *kleiner Adler.*

Latham, Vögel, I. p. 100. n. 97. *der bengalische Falke.*

Latham,

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 50. n. 120. Falco (Caerulescens) cera, palpebris, pedibus subtusque luteus, dorso nigro-caerulescente, temporibus linea alba inclusis.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 3. *der kleine schwarz und oramienfarbne indianische Falk.*

Linne, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 88. n. 7. Falco (Caerulescens) cera, palpebris, pedibus subtusque luteus, dorso nigro-caerulescente, temporibus linea alba inclusis.

Gerin. ornith. I. p. 66. Tab. 44. fig. 1. Falco parvus indicus.

120. REGULUS. *Der sibirische Falk.*

Müller, Naturfyft. Suppl. p. 67. n. 34. *der kleine König.*

Latham, Vögel, I. p. 101. n. 98. *der sibirische Falke.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 50. n. 122. Falco (Regulus) cera virescente, pedibus obscure flavis, torque ferrugineo, corpore supra plumbeo, subtus albedo, maculis ferrugineo-fuscis.

Pallas, Reise, Ausz. II. Anh. p. 7. n. 13. Falco Regulus.

Hermann, tab. affin. animal. p. 172. F. Regulus.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Die XIIte Edition hatte 32 Gattungen; die XIIIte 120, worunter 3, als die 34te, 38te und 39te aus dem vorigen Geschlecht hierher versetzt worden. Da nun die 6te und 12te Gattung, p. 261 und 263. ohnstreitig einerley, so beläuft sich die Anzahl der neu hinzugekommenen auf 84. Ausserdem sind bey der 12ten Gattung 4, bey

der 13ten 14. bey der 16ten 4, bey der 26ten 4, bey der 31ten 3 Varietäten aus einander gesetzt, und bey der 27ten die Synonymen dergestalt getrennt, daß daraus die 101ste als eine neue Gattung entstanden ist.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Ein Adler, der das Mittel hält zwischen Adler und Falken.*
Befehle, Vögel Kurl. p. 7. Tab. 1.
2. *Der getiegerte Falk.*
Befehle, Vögel Kurl. p. 10. n. 11. Falco tigrinus. Tab. 2.
3. *Der Falk mit gelbem Nasenwachs, Augenringen und Füßen; ist röthlich schmutzig weiß; Flügel, Rücken und Schwanz dunkelbraun; Endspitzen der Flügel heller; Schwanz mit vier hellern gezackten Binden; Füße bis über die Knie mit einfarbigen, röthlich braunen Flecken besetzt.*
Befehle, Vögel Kurl. p. 11. n. 12. a. b.
4. *Ein dem vorigen ähnlicher Falk.*
Befehle, Vögel Kurl. p. 12. n. 14.
5. *Ein dem Falco Fulvus ähnlicher Falk.*
Befehle, Vögel Kurl. p. 15. n. 21.
6. *Ein dem Falco Aeruginosus ähnlicher Falk.*
Befehle, Vögel Kurl. p. 16. n. 24.
7. *Ein dem Falco Nifus ähnlicher Falk.*
Befehle, Vögel Kurl. p. 16. n. 26.
8. *Ein unbekannter Falk, von der Größe der Bleyfalken.*
Befehle, Vögel Kurl. p. 17. n. 27.

9. *Ein*

9. Ein ganz schwarzer Falk, mit fahlschwarzem Schwingfedern und Unterleibe; Lenden, After, Deckfedern des Schwanzes schön braunroth; Augen schwarz; Augenlieder kahl und nebst dem Nasenwachs und Füßen ziegelroth; Schnabel gezähnt.
Befcke, Vögel Kurl. p. 19. n. 28.
10. Der weiße Falk, (Falco Leucaëtos) aus Neuhol-land; mit schwarzem Schnabel, gelber Schnabelhaut und gelben Füßen.
White, Reise nach Neufüdwallis; — in dem Magazin merkwr. Reisebeschr. V. p. 127.
Vielleicht Falco Cyaneus?
11. Der große Baumfalke.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 315. n. 19.
12. Ntann, eine Adlerart am Senegall.
Adanson, Reise nach Senegall, p. 154.
13. Kleke, in Norwegen.
Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 126. n. 3.
14. Der gestreifte Falk aus Madagaskar.
Latham, Vögel, I. p. 103. n. 105.
Sonner. Voy. Ind. II. p. 181. l'Autour à ventre rayé de Madagascar. pl. 103.
15. Der amerikanische Rauchfußfalk.
Latham, Vögel, I. p. 68. n. 56.
Forster, Cat. N. A. p. 9. Rough-footed Falcon.
16. Der grönländische Falk.
Latham, Vögel, I. p. 106. n. 103.
Fabric. fn. groenl. p. 56. n. 34. b. Falco (Fuscus) cera pedibusque plumbeis, supra subfuscus, subtus

subtus albidus maculis fuscis longitudinalibus.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 210. E. *der dunkelbraune Falk.*

Craux, Hist. von Grönland, p. 112. —

Egede, Besch. von Grönl. p. 88. *graue Falken?*

C. Neuere Gattungen.

1. *Der Falk mit schwarzem Halse*; (aus Cayenne.)

Latham, Syn. Suppl. p. 30. n. 100. Black-necked Falcon.

Latham, Vögel, I. p. 102. n. 100.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 35. n. 80. Falco (Nigricollis) pedibus flavis, corpore rufo, nigro fasciato, vertice colloque nigro striatis, iugulo nigro, rectricibus ad apicem nigricantibus.

2. *Der Falk mit dem weißen Halse*; (aus Cayenne.)

Latham, Syn. Suppl. p. 30. n. 101. White-necked Falcon.

Latham, Vögel, I. p. 102. n. 101.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 36. n. 81. Falco (Albicollis), pedibus flavis, capite, collo, dorso antice corporeque subtus albis, pennis interscapularibus maculis quadratis nigris, alis nigris albo maculatis.

3. *Der asiatische Falk*; (in China.)

Latham, Syn. Suppl. p. 31. Asiatic Falcon,

Latham, Vögel, I. p. 102. n. 102.

Latham, Syst. ornith. I. p. 14. n. 15. Falco (Asiaticus) pedibus femilanatis flavis, corpore fusco, subtus albo, pectore striato, rectricibus griseo-argenteis, exterioribus fasciis quinque obsoletis,

4. *Der*

4. *Der Falk von der Johanna-Insel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 32. Johanna Falcon.

Latham, Vögel, I. p. 103. n. 104.

Latham, Syst. ornith. I. p. 47. n. 113. Falco (*Johannensis*) pedibus luteis, corpore ferrugineo punctis linearibus nigris, gula lutescente, remigibus fusco nigricantibus, cauda cuneiformi, rectricibus albis.

5. *Der Cheela*, in Indien.

Latham, Syn. Suppl. p. 33. Cheela Falcon.

Latham, Vögel, I. p. 104. n. 106.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 14. n. 14. Falco (*Cheela*) subcristatus fuscus, capistro albo, rectricibus alarum albo maculatis, cauda fascia lata alba.

6. *Der Falk mit rothbraunem Kopfe*; (in Cayenne.)

Latham, Syn. Supplem. p. 33. n. 107. Rufous-headed Falcon.

Latham, Vögel, I. p. 104. n. 107.

Latham, Syst. ornith. I. p. 36. n. 82. Falco (*Meridionalis*) cera gulaque luteis, capite colloque rufis, fusco nigrove striatis, abdomine albido, fasciis cinereis, rectricibus 4. intermediis fascia unica, lateralibus 6 pallidis.

7. *Der gestreifte Falk aus Cayenne.*

Latham, Syn. Supplem. p. 34. n. 109. Streaked Falcon.

Latham, Vögel, I. p. 105. n. 109.

Latham, Syst. ornith. I. p. 37. n. 89. Falco (*Melanops*), cera pedibusque luteis, corpore nigro albo maculato, subtus albo, capite colloque albis, nigro striatis, orbitis nigris, rectricibus nigris, medio fascia alba.

8. *Der Falk mit gekerbtem Schnabel; (in Cayenne.)*
Latham, Syn. Suppl. p. 34. n. 110. Notched Falcon.
Latham, Vögel, I. p. 105. n. 110.
Latham, Syst. ornith. I. p. 38. n. 90. Falco (Bidentatus) rostro bidentato fusco, corpore plumbeo, pectore abdomineque rufis, crisso albo, remigibus fasciis plurimis, rectricibus tribus albis.
9. *Der Falk mit rautenförmigen Flecken; (in Indien, am Ganges.)*
Latham, Syn. Suppl. p. 35. Rhomboidal Falcon.
Latham, Vögel, I. p. 106. n. 111.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 35. n. 79. Falco (Rhombus) pedibus flavicantibus, supra griseus, subtus fuscus, maculis rhombeis, rectricibus fasciis undecim obliquis nigris.
10. *Der Behree, in Indien.*
Latham, Syn. Suppl. p. 35. Behree Falcon.
Latham, Vögel, I. p. 106. n. 112.
Latham, Syst. ornith. I. p. 41. n. 96. Falco (Calidus) pedibus flavis, corpore fusco-nigro, subtus albo, lunulis nigris, rectricibus fasciis obsoletis.
11. *Der Bleufalk; (in Cayenne.)*
Latham, Syn. Suppl. p. 37. Plumbeous Falcon.
Latham, Vögel, I. p. 107. n. 114.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 41. n. 97. Falco (Nitidus) plumbeus, subtus albus, fasciis cinereis, rectricibus nigricantibus, lineis duabus transversis albis.
12. *Der Schreyfalk; (in Indien.)*
Sonner. Voy. Ind. II. p. 184. Petite Buse criarde.
Latham, Syn. Suppl. p. 38. Criard Falcon.
Latham, Vögel, I. p. 108. n. 117.

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 46. n. 112. Falco (Vociferus) pedibus flavis, corpore cinereo-griseo, subtus albo, tectricibus alarum minoribus maioribusque nigris.

13. *Der kleinste Falk; (in Cayenne.)*

Latham, Syn. Suppl. p. 39. Tini Falcon.

Latham, Vögel, I. p. 108. n. 118.

Latham, Syst. ornith. I. p. 50. n. 125. Falco (Tinus) pedibus flavis, corpore cinereo-fusco, subtus albido fasciis nigricantibus, vertice albido.

14. *Der Schneegeyer.*

Kramer, Austr. p. 329. n. 10. Falco cera lutea, pedibus, exceptis digitis, lanatis; corpore testaceo, maculis nigris, capite et collo albidioribus; *Schneegeyer*, *Rauchfuß*, *Moosgeyer*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 26. n. 54. Falco (Sclavonicus) cera lutea, pedibus, exceptis digitis, lanatis, corpore testaceo, maculis nigris, capite et collo albidioribus.

Vielleicht eine Spielart von Falco Aeruginosus?

15. *Der Falk mit schwarzbandirten, zu beyden Seiten weißgerändelten Schwanzfedern; (in Slavon.)*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 26. n. 55. Falco (Marginatus) cera caerulescente, corpore supra fusco ferrugineoque vario, subtus ferrugineo, maculis subovatis fuscis, rectricibus fasciis nigricantibus, albo utrinque marginatis.

16. *Der Falk mit röthlichem Fleck auf der Brust; (in Slavonien.)*

Latham, Syst. ornith. I. p. 27. n. 56. Falco (Ruginosus) fuscus, subtus albescenti-luteus, macula

macula pectorali lutea, rectricibus fasciis 4. testaceis.

17. *Ein unbestimmter Falke.*

Sparrmann, mus. Carlf. Fasc. II. Tab. 26.

Latham, Syst. ornith. I. p. 32. n. 70. Falco (Incertus) cera flava, corpore cinereo-fusco, subtus ferrugineo, rectricibus fasciis tribus fuscis.



Ein Verzeichniß von Schriften über die Falconirkunst findet man in *Böimmers* syst. lit. Handb. der Naturgesch. II. I. p. 544 ff.

43. GESCHLECHT. STRIX. *Die Eule.*

Müller, Naturyst. II. p. 92. Gen. XLIII.

Leske, Naturgesch. p. 233. Gen. XII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 75. Gen. III.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 161. Gen. III.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 325. Gen. III.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 330. Gen. III.

Funke, Naturgesch. I. p. 285.

Ebert, Naturl. II. p. 34.

Halle, Vögel, p. 229.

Pennant, arct. Zool. II. p. 217.

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 713.

Onomat. hist. nat. II. p. 306. VII. p. 312.

Klein, av. p. 54. Gen. I. Trib. IV.

Briffon, ornithol. I. p. 139. Gen. XI. p. 146. Gen. XII.

Büffon, Vögel, III. p. 1.

Batsch, Thiere, I. p. 285. 295. Gen. LII.

Latham, allg. Ueberf. d. Vögel, I. p. 109. Gen. III.

Latham,

Latham, Syst. Ornith. I. p. 51. Gen. III.

Hermann, tab. affin. anim. p. 175.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 209.
Gen. III.

* *Ohreulen. Horneulen.*

I. BUBO. *Der Uhu.* (6)

Müller, Naturfyst. II. p. 33. n. 1. *der Schuhu.*

Leske, Naturgesch. p. 234. n. 1. *der Uhu, Schuhu.*
Tab. VI. fig. 2.

Borowsky, Thierreich, II. p. 76. n. 1. *der Uhu,*
Schuhu, große Ohreule.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 161. n. 1.
Strix (Bubo) auribus pennatis, iridibus cro-
ceis, corpore rufo; *der Uhu, Schubut, die*
Ohreule.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 327. n. 1. *der Uhu.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 333. n. 1.
der Uhu. p. 339. *Schubut, Buhu, Bhu, Uhu-*
eule, Schaffut, Hub, Huo, Puh, Berghu,
Huhuy, Puhuy, Aälereule, Großherzog, Schu-
buteule,

(6) Länge 2 Fufs 4 Zoll. Flügelweite 6 Fufs. Gewicht vierte-
halb Pfund. Nistet in Felsenhöhlen, in Klüften hoher und
alter Mauern, seltener auf hohen Räumen. Das Nest hat
drey Fufs im Durchmesser, besteht aus kleinen biegsamen
Reisern, und ist mit Blättern ausgefüttert. Legt 2 bis 3
runde weisse Eyer, etwas größer als Hühnereyer. Brütet im
April, etwa drey Wochen, und zwar nur einmal des Jahrs.
Die Jungen werden von den Jägern zum Jagdgebrauche auf-
erzogen. Diese Eule kann das Tageslicht mehr als die mei-
sten andern Eulen vertragen, und fliegt oft am hellen Mittag
auf. Am Tage fliegt sie niedrig, des Nachts aber kann sie
sich sehr hoch schwingen. Ihre Stärke ist so groß, daß
selbst Adler ihr zuweilen unterliegen müssen. Mit Weyhen
und Krähen unterhält sie einen ewigen Krieg, Soll über
dreysig Jahre alt werden.

buteule, große gelbbraune Ohreneule, große Horneule.

Funke, Naturgesch. I. p. 286. Uhu od. Schubut.

Ebert, Naturl. II. p. 35. Uhu oder Schuhu.

Halle, Vögel, p. 231. die große gelbbraune Ohreneule. Fig. 12.

Meyer, Thiere, I. Tab. 84.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 43. n. 38. der Schuhut u. f. w.

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 716. die große Ohreneule.

Onomat. histor. nat. II. p. 308. Uhu, röthlicher Uhu, gemeine Ohreneule.

Onomat. histor. nat. VI. p. 317. der Uhu oder Schuhu.

Handb. der Naturgesch. II. p. 142. die Schubuteule, der Uhu.

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 95. Uhu, Buhu.

Klein, av. p. 55. n. 1. Ulula, Chalcis Goropii.

Klein, Vorbereit. p. 105. n. 1. Schubuteule, Puhuy, Uhu, Berghu, Huhay, Eule mit großen Ohren und feuerrothem Körper.

Klein, verb. Vögelhist. p. 54. n. 1. Schubuteule.

Klein, Vögeleyer, p. 20. Tab. 7. fig. 1.

Gesner, Vögelb. p. 338. Huw oder Hüru.

Briffon, ornithol. I. p. 139. n. 1. le grand Duc.

Büffon, Vögel, III. p. 27. die große Ohreneule der Uhu. Tab. 61.

Batsch, Thiere, I. p. 297. der Uhu.

Latham, Vögel, I. p. 109. n. 1. die Horneule, der Schubut, Uhu.

Latham, Syn. Suppl. p. 40. Great-eared Owl.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 51. n. 1. Strix (Bubo) capite auriculato, corpore rufo.

Befcke,

- Beseke*, Vögel Kurl. p. 21. n. 29 *der Schubu.*
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 280. n. 27.
der Schubut.
Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 68. n. 47.
Uhu, Berguhu, Schubuteule.
Strahlenberg, Asien, p. 352. *Eulen.*
White, Naturgesch. von England, p. 43. *der Schubut.*
Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 166.
n. 1. *Steineule, große weiße Ohrrule.*
Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 193.
Berg-oder Steineule.
Zorn, Petinotheol. II. p. 255. *der Schuhu oder Uhu.*
Eberhard, Thiergesch. p. 70. *Uhu.*
Oekonom. Zoologie, p. 64. n. 3. *der Uhu.*
Meidinger, Vorles. I. p. 113. *der Uhu.*
Naturforsch. VIII. p. 56. n. 27. *der Schuhu.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 76. *Schuhu oder Uhu.*
Naumann, Vogelsteller, p. 165. *der Uhu.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. p. 9. n. 7.
Uhu, Buhu, Berghu.
Bechstein, Musterung schädli. Thiere, p. 80. n. 30.
Uhu.
Lichtenberg u. Voigt, Magazin für das Neueste
u. s. w. VII. 2. p. 147. *Schuffut.*
Linné, auserles. Abhandl. II. p. 287. n. 53. *die Schubuteule.*
Goeze, nützl. All. II. p. 158. n. 8. *der Uhu, Schubut.*
Anweis. Vögel zu fangen, p. 187. *der Schuhu.*
Loniceri, Kräuterb. p. 671. *Uhu.*
Krünitz, Encyklop. XI. p. 682. *große Ohreule, Uhu.*
Jablonsky, allg. Lex. p. 311. *Schuhu.*

- Kraft*, Ausrott. grauf. Th. I. p. 290. *Schuhu*.
Mellin, von Anleg. der Wildbahn. p. 353. *Schuhu*,
Buhu, *Schuffut*, *Uhu*. Fig. p. 356.
Heppe, wohlredender Jäger, p. 41.
 Götting. g. Anz. 1769. p. 1111-1773. p. 508.
Lemmerly, Materiallex. p. 187.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 52. *Bubo*.
Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 17. n. 1. *Bubo*
 primus.
Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 92. n. 1. *Strix*
 (*Bubo*) capite auriculato, corpore ruffo.
Müller, zool. dan. prodr. p. 10. n. 75. *Strix* (*Bu-*
bo) capite auriculato, corpore rufo.
Kramer, Austr. p. 323. n. 1. *Strix* capite aurito,
 corpore rufo.
Brünic, ornith. bor. p. 7. *Bubo*.
Gerin. ornith. I. p. 84. Tab. 81.
 Mus. Worm. p. 296. *Noctua*.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 175. *Strix*
Bubo.
Jonston, av. p. 46. *Bubo*.
Plin. hist. nat. L. X. c. 12. 16. *Bubo*.
Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 210. n. 1.
der Schubut.

β. *BUBO ATHENIENSIS.* Die große athenien-
 fische Horneule.

- Müller*, Naturyst. II. p. 34. B. der atheniensische
 C. der italiensische. Tab. 28. fig. 3.
Borowsky, Thierreich, II. p. 77. n. 1. die große
 atheniensische Horneule.
 Handb. d. Naturgesch. II. p. 142. n. 1. der wäl-
 sche *Uhu*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 165. n. 1. große Horn-
 eule von *Athen*.

Brisson,

Briffon, ornith. I. p. 140. A. Grand Duc d'Italie.

Büffon, Vögel, III. p. 35. n. 1. der schwarze geflügelte Uhu.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 6. große Horneule von Athen.

Latham, Vögel, I. p. III. A. die athenienfische Ohr-Eule.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 51. β. Bubo Atheniensis.

γ. BUBO PEDIBUS NUDIS. Der kahlfüßige Uhu.

Müller, Naturfyft. II. p. 35. D. Kahlfuß.

Handb. d. Naturgefch. II. p. 142. n. 2. der barfüßige Uhu.

Briffon, ornitholog. I. p. 141. B. Grand Duc de chauffé.

Büffon, Vögel, III. p. 36. n. 2. der kahlfüßige Uhu.

Latham, Vögel, I. p. III. B. die Ohr-Eule mit glatten Füßen.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 52. γ. Bubo pedibus nudis.

δ. BUBO MAGELLANICUS. Der Jacurutu.

Büffon, Vögel, III. p. 37. der brafilische Jacurutu des Markgrav. Tab. 62.

Latham, Vögel, I. p. III. C. die magellanische Ohr-Eule.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 52. δ. Strix capite auriculato, corpore luteo . nigricante albo vario.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 4. Feliceps flavescens, maculis nigris.

13. VIRGINIANA. *Die virginische Ohreule.* (7)

Pennant, arct. Zool. II. p. 217. n. 30. *die große Horneule, Adlereule, Uhu.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 717. *der virginische Uhu.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 143. oben.

Briffon, ornithol. I. p. 141. n. 2. grand Duc de Virginie.

Büffon, Vögel, III. p. 38. *der virginische Uhu.*

Seligmann, Vögel, III. Tab. 15. *der Uhu.*

Klein, av. p. 55. ad n. 1. Edwardi great-horned owl.

Klein, Vorbereit. p. 105. ad n. 1. Edwardi great-horned owl.

Klein, verb. Vögelhist. p. 54. ad n. 1. Edwards Horneule.

Latham, Vögel, I. p. 112. n. 2. *die virginische Ohreule.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 52. n. 2. Strix (Virginiana) corpore fusco - rufo cinereoque lineato, subtus cinerascete, striis transversis fuscis, remigibus rectricibusque fusco fasciatis.

Ellis, Reise nach Hudsons Meerbusen, p. 38. *die große gehörnte Eule.*

Schlözer, Erdbeschr. von Amerika, p. 112. *die große gehörnte Eule.*

2. SCAN-

(7) Nach *Büffon* eine bloße Spielart von der vorigen, die nur durch die Stellung der ohrähnlichen Federbüschel von ihr abgeht. Sie ist in Nord- und Südamerika sehr gemein, auch nicht selten auf der Hudsonsbay, wo sie, nach *Latham*, sich in Wäldern aufhält, und im März ein Nest baut, das aus einigen wenigen, kreuzweis über einander gelegten Reisern besteht, und mehrentheils auf Fichten angebracht ist. Die Jungen werden im Junius flügge. Der Eyer sind 2 an der Zahl, und von mattweißser Farbe.

2. SCANDIACA. *Die lappländische Ohreule.* ⁽⁸⁾

Müller, Naturfyst. II. p. 97. n. 2. *die lappländische Eule.*

Halle, Vögel, p. 233. n. 170. *die große weiße Ohreule mit schwarzen Flecken.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 226. A. *die lappländische Ohreule.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 323. *der lappländische Schuhu.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 142. n. 3. *der lappländische Uhu.*

Briffon, ornithol. I. p. 242. n. 3. grand Duc de Laponie.

Büffon, Vögel, III. p. 36. *der weiße lappländische Uhu mit schwarzen Flecken.*

Latham, Vögel, I. p. 113. n. 3. *die lappländische Ohreule.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 53. n. 6. Strix (Scandiac) capite aurito, corpore toto albo, nigris maculis adsperso.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 2. Bubo Scandiacus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 92. n. 2. Strix (Scandiac) capite auriculato, corpore albido.

Linné, amoenit. acad. VII. p. 479. §. 16. 2.

14. ZEYLONENSIS. *Die zeylonische Ohreule.*

Latham, Vögel, I. p. 113. n. 4. *die zeylonische Ohr-Eule.*

Latham, Syn. Supplem. p. 41. Ceylonese eared Owl.

Latham,

(8) Nach Büffon eine bloße von der Kälte der nördlichen Länder hervorgebrachte Abänderung vom Uhu.

Latham, Syst. ornith. I. p. 52. n. 3. Strix (Ceylonensis) corpore rufo-fusco, nigro striato, subtus lutescente, remigibus rectricibusque nigro, albo rufescenteque striatis.

Marsden, Sumatr. p. 98?

3. ASIO. Die rothe Ohreule.

Müller, Natursystem, II. p. 97. n. 3. die virginische Ohreule.

Halle, Vögel, p. 234. n. 173. das kleinste gehörnte dunkelbraune Käützchen.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 44. n. 39. die südamerikan. Horneule.

Pennant, arch. Zoolog. II. p. 220. n. 33. die rothe Eule. Tab. II.

Onomat. histor. nat. VII. p. 316. der kleine Schuhu, die carolinische Ohreule.

Handb. d. Naturg. II. p. 143. der kleine Schubut.

Briffon, ornitholog. I. p. 144. n. 6. petit Duc de la Caroline.

Büffon, Vögel, III. p. 48 die vom Katesby beschriebene karolinische Ohreule. Tab. 64.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 14. die kleine Eule.

Latham, Vögel, I. p. 116. n. 8. die rothe Ohreule.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 54. n. 10. Strix (Asio) capite aurito, corpore supra ferrugineo, subtus cinereo, alis punctis quinque albidis.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 92. n. 3. Strix (Asio) capite aurito, corpore supra ferrugineo, subtus cinereo, alis punctis quinque albis.

Fabric. fn. groenl. p. 61. n. 37. Strix (Asio) capite aurito, corpore supra ferrugineo, subtus cinereo, alis punctis quinque albis?

Naturforsch. VII. p. 40. Strix Asio.

Beckmann, Bibl. VI. p. 55. *die carolinische Ohr-Eule.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 177. Strix Afio.

15. MEXICANA. *Die mexicanische Ohreule.*

Briffon, ornith. I. p. 146. n. 9. Hibou du Mexique.

Büffon, Vögel, III. p. 50. n. 12. *der mexicanische oder neuspanische Tocolotl.*

Latham, Vögel, I. p. 116. n. 7. *die mexicanische Ohreule.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 54. n. 9. Strix (Mexicana) capite aurito, corpore nigro, fuscoque fasciato.

16. AMERICANA. *Die amerikanische Ohreule.*

Briffon, ornithol. I. p. 145. n. 7. Hibou d'Amerique.

Büffon, Vögel, III. p. 49. *die Ohreule des mittägigen Amerika.*

Latham, Vögel, I. p. 115. n. 6. *die amerikanische Ohr-Eule.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 54. n. 8. Strix (Americana) capite aurito, corpore cinereo, subtus ferrugineo, uropygio crissoque albis, nigro maculatis, remigibus rectricibusque cinereo griseoque fasciatis.

4. OTUS. *Die mittlere Ohreule.*(9)

Müller, Natursystem, II. p. 98. n. 4. *die kleine Horneule.*

K 2

Leske,

(9) Länge 16 Zoll. Flügelweite 3 Fufs 3 Zoll. Gewicht 10 Unzen. Bewohnt gewöhnlich alte verfallene Gebäude, Felshöhlen, gebirgige Wälder, auch ebene Eichwälder, wenn sie

- Leske*, Naturgesch. p. 234. n. 2. *die mittlere Ohreule.*
- Borowfsky*, Thierreich, II. p. 78. n. 2. *die mittlere Ohreule.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 328. n. 2. *die mittlere Ohreule.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 340. n. 2. *die mittlere Ohreule.* p. 344. *kleiner Schuhu, gemeine Ohreule, Katzeule, Horneule, Fuchseule, Ohrkautz, Ranzcul, rothgelber Schubut, kleine rothgelbe Ohreule, Käutzlein, Hörnereule.*
- Funke*, Naturgesch. I. p. 287. *die mittlere Ohreule.*
- Ebert*, Naturl. II. p. 36. *kleiner Uhu, kleine Horneule.*
- Halle*, Vögel, p. 232. n. 169. *die kleinere rothgelbe Ohreule.*
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 45. n. 40. *die Ohreule; Katzeule u. s. w.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 218. n. 31. *die Eule mit langen Ohren, die mittlere Ohreule.*
- Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 717. *die mittlere Ohreule.*
- Onomat. hist. natur. VII. p. 322. *der gemeine kleinere Schuhu, die gemeine Ohreule.*

Hand-

sie viele alte hohle Eichen enthalten. Nährt sich vorzüglich von Wasserratten, Maulwürfen, kleinen Feldmäusen, auch Mist- und Maykäfern. Nistet in alten verlassenen Rabenkrähen- wilden Tauben- und Eichhörnchensnestern, die in dichten Bäumen, besonders Fichtenbäumen stehen; seltener in hohlen Eichen und Steinklüften. Das Weibchen legt 4 bis 5 rundliche weisse Eyer, und brütet sie allein aus; unterdessen trägt ihm das Männchen Speise zu. Die Jungen sehr anfänglich ganz weifs aus, fangen aber nach 14 Tagen an, sich zu verfärben, und lassen sich leicht zähmen.

Handbuch der deutschen Thiergeschichte, p. 96.
kleiner Schuhu, Fuchseule.

Klein, av. p. 55. n. 2. *Ulula-Asio, Otus, Noctua aurita.*

Klein, Vorbereit. p. 105. n. 2. *rothgelber Schubut, kleiner Schu'ut.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 54. n. 2. *kleiner Schubut.*

Briffon, ornithol. I. p. 142. n. 4. *Moyen Duc, ou Hibou.*

Büffon, Vögel, III. p. 42. *die mittlere Ohreule, der kleine Schubut.*

Batsch, Thiere, I. p. 298. *die mittlere Ohreule.*

Latham, Vögel, I. p. 114. n. 5. *die langhörigte Eule, kleine Horn-Eule.*

Latham, Syn. Supplem. - p. 42. *Long-eared Owl.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 53. n. 7. *Strix (Otus) capite aurito, pennis senis.*

Befke, Vögel Kurl. p. 22. *die kleine Horneule.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 282. n. 28. *kleine Horneule, Ohrkauz.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 68. n. 48. *Hornohreule, kleine Horneule.*

Pontoppidan, Naturg. von Dänemark, p. 166. n. 2. *Horneule.*

Hasselquist, Reise nach Palästina, p. 290. n. 15. *Strix (Otus) capite aurito, pennis 6.*

Pennant, britt. Thiergesch. Tab. 16. fig. 1.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 10. n. 8. *die Ohreule, Horneule.*

Lichtenberg u. Voigt, Magaz. f. d. Neuesten. f. w. V. 2. p. 21. *die kleine Horneule.*

Naturforsch. VIII, p. 57. n. 20. *kleine Horneule, Knappeule.*

Schriften der berlin. Gefellsch. naturf. Fr. VII.
p. 449. *kleine Horn-Eule.*

Döbel, Jägerpraktik, I. p. 80. *Horneule.*

Naumann, Vogelsteller, p. 165. *Ohreule.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 258. *die Ohr- od. Fuchs-Eule.*

Günther, Nester und Eyer, Tab. 40. *Horn- oder Ohreule??*

Eberhard, Thiergesch. p. 70. *die gemeine Ohreule.*

Bechstein, Musterung schädlicher Thiere, p. 82.
n. 31. *die mittlere Ohreule.*

Merklein, Thierreich, p. 314 *Or-Kautz.*

Krünitz, Encyklop. XI. p. 648. *die mittlere Ohreule, der kleine Schuffut, Kautzeule, Käutzlein.*

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 52. Otus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 3. Bubo capite aurito, pennis sex.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 92. n. 4. Strix (Otus) capite auriculato, pennis fenis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 10. n. 76. Strix (Otus) capite auriculato, pennis fenis.

Kramer, Austr. p. 323. n. 2. Strix capite aurito, pennis sex; *Horn-Eule.*

Brünicb, ornithol. bor. p. 6. n. 17. Otus.

Schäfer, Elem. ornith. Tab. 22.

Gerin. ornith. I. p. 86. Tab. 85.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 308. Noctua aurita; *ein Ohr-Kutz, Uhr-Eule, Ranz-Eule.*

Jonston, av. p. 48. Asio seu Otus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 211. n. 2. *der kleine Schubut.*

17. BRACHYOTOS. *Die kurzohrige Eule.*⁽¹⁰⁾

Pennant, arct. Zool. II. p. 218. n. 32. *die Eule mit kurzen Ohren.*

Latham, Vögel, I. p. 117. n. 9. *die kurzohrigte Eule.*

Latham, Syn. Suppl. p. 43. Short-eared Owl.

Latham, Syst. ornith. I. p. 55. n. 11. Strix (Brachyotos) capite aurito, penna solitaria, corpore fusco, subtus flavescente, longitudinaliter striato, rectricibus fuscis, intermediis 4 macula lutea, pupilla fusca.

Büffon, Vögel, III. p. 60. Aum. *die kurzohrichte Eule.*

Pennant, Reise durch Schottl. I. p. 19. *die kurzohrigte Eule.*

Hermann, tab. affin. animal. p. 175. Strix brachyotos.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 211. n. 3. *die kurzohrige Eule.*

18. BRASILIANA. *Die brasilianische Ohreule.*

Miller, Naturfyst. II. p. 99. *Cabure.*

Halle, Vögel, p. 241. n. 141. *die brasilische Eule.*

Klein, av. p. 57. n. 8. *Ulula brasiliensis.*

Klein, Vorbereitung, p. 108. n. 8. *die brasilianische Eule.*

K 4

Klein,

(10) Flügelweite 3 Fufs. Gewicht 14 Unzen. Fliegt nie, wie andere Eulen, um Beute zu suchen, sondern sitzt ruhig auf einem Stamme, oder in langem alten Grase, wie eine Katze, und lauert auf die Mäuse. Sie besucht im May die Hudsons-bay, baut ein Nest auf dem Boden, aus trockenem Gras, und legt weisse Eyer. Im Herbst zieht sie nach Süden. In den nördlichen und waldigen Gegenden Sibiriens kommt dieser Vogel zu den nächtlichen Feuern, und fällt die Leute an, dals man ihn mit Prügeln todtzuschlagen kann.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 56. n. 8. *braslianische Eule*.

Briffon, ornith. I. p. 145. n. 8. Hibou du Bresil.

Büffon, Vögel, III. p. 97. *die braslische Ohreule*.
(*Kabure*.)

Bankroft, Naturgesch. von Gujana, p. 92. *der guianische Uhu; Caburo*.

Jonston, av. p. 207. *Cabure*.

19. *NAEVIA. Die gesprengte Ohreule.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 220. *die gesprengelte Eule*. Tab. II.

Latham, Vögel, I. p. 119. n. 11. *die gesprengte Ohr-Eule*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 55. n. 13. Strix (*Naevia*) capite aurito, corpore griseo ferrugineo, que vario, regione periophthalmica pectorisque pennis apice nigris.

20. *INDICA. Die indianische Ohreule.*

Latham, Vögel, I. p. 119. n. 12. *die indian. Ohreule*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 56. n. 14. Strix (*Bakkamuna*), capite aurito, dorso fusco, pectore luteo, maculis sagittatis nigris, remigibus nigro alboque fasciatis.

Naturforsch. I. p. 266. n. 2. *die kleine Horneule aus Ceylon*.

Neueste Mannichfalt. I. p. 188. n. 3. *die kleine indianische Horneule*.

21. *ZORCA. Die Zorca. (1)*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 56. n. 15. Strix (*Zorca*) auricularum pennis 8-9.

22. CAR-

(1) Im *Cetti* selbst steht wiederholentlich nicht *Zorca* sondern *Zanca*.

22. CARNIOLICA. *Die krainische Horneule.* (2)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 349. * *die krainische Eule.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 10 n. 9. *die Wald-Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 120. n. 13. *die krainische Ohr-Eule.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 56. n. 16. Strix (Giu) capite aurito, corpore cinereo - albicante, maculis striisque transversis nigricantibus variegato.

23. DEMINUTA. *Die Jaik-Ohreule.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 67. *der kleine Schuhu,*

Latham, Vögel, I. p. 120. n. 14. *die Jayk-Ohr-Eule.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 56. n. 17, Strix (Deminuta) capite aurito, corpore rufo variegato.

Pallas, Reise, Ausz. II. Anh. p. 18. n. 14. Strix *deminuta.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 176. Str. *deminuta.*

24. PULCHELLA. *Die sibirische Ohreule.*

Müller, Natursystem Suppl. p. 69. n. 15. *die Mignatureule,*

Latham, Vögel, I. p. 122. n. 16. *die sibirische Ohr-Eule.* Tab. 5. fig. 1.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 57. n. 19. Strix (Pulchella) minima, capite aurito, corpore pulveratim cinereo - undulato, subtus albido, alis fasciato-pulveratis, litura ad nares alba.

(2) Soll nach *Bechstein* u. a. mit Str. *Scops* einerley seyn, wovon jedoch *Latham*, *Scopoli* und *Kramer* das Gegentheil versichern.

Lepchin, Tagebuch der russ. Reise, p. 182. die kleine Horneule; (russ. *malorosloi Filin*.)

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 370. eine Art ganz kleiner Ohreulen.

Pallas, Reise, Ausz. I. Anh. p. 3. n. 8. *Strix pulchella*.

5. SCOPS. Die Stockeule. (3)

Müller, Naturfyll. II. p. 99. n. 5. die Baumeule. Tab. 4. fig. 2.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 329. n. 329. die kleinste Ohreule.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 346. n. 4. die kleinste Ohreule. p. 349. Stockrulen, Wald-eulen, aschfarbige Käützchen, gehörnte Käützchen, Posseneulen.

Funke, Naturgesch. I. p. 287. die kleine Ohreule.

Ebert, Naturl. II. p. 37. die Baumeule, Stockeule, Waldeule.

Halle, Vögel, p. 233. n. 171. das gehörnte aschfarbene Käützchen.

Gotterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 46. n. 41. die kleinste Ohreule u. f. w.

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 717. die kleinste Ohreule.

Onomat. histor. nat. VII. p. 324. die Baumeule.

Handb. der Naturgesch. II. p. 143. der Kauz.

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 97. die Stockeule, Baumeule, Waldreule.

Klein, av. p. 57. n. 7. Ulula.

Klein, Vorber. p. 108. n. 7. gehörntes Käützlein.
Klein,

(3) Länge 8 Zoll. Flügelweite 17 Zoll. Nährt sich außer den Feldmäusen auch von May- und Rosskäfern, Abend- und Nachtschnetterlingen. Legt gemeinlich 4 weißse, abgestumpfte rundliche Eyer in hohle Bäume.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 55. n. 7. *gehörntes Käutzlein.*

Briffon, ornithol. I. p. 144. n. 5. petit Duc.

Büffon, Vögel, III. p. 58. *die kleinste Ohreule, die Stockeule, das aschfarbige Käutzchen.*

Latham, Vögel, I. p. 120. n. 15. *die Baum-Eule, der Kauz mit Ohren.*

Latham, Synopf. Supplem. p. 43. Scops eared Owl.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 56. n. 18. Strix (Scops) auricularum penna solitaria.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 283. n. 29. *Baumeule, gehörntes Käutzlein.*

Naturforsch. VIII. p. 57. n. 29. *Baumeule.*

Batsch, Thiere, I. p. 298. *die Baumeule.*

Bechstein, Musterung schäd. Th. p. 83. n. 23. *die kleine Ohreule.*

Krünitz, Encyklop. XI. p. 684. *die kleinste Ohreule.*

Beckmann, phys. ök. Bibl. VI. p. 56. *die kleinste Ohr-Eule.*

Linné, System. Natur. Edit. X. I. p. 92. n. 5. Strix (Scops) capite auriculato, penna solitaria.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 348. Scops; *ein klein Keutzlein, Stockeule, kleine Waldeule.*

Charlet, onomatol. histor. natur. p. 70. n. 3. Scops.

Hermann, tab. affin. anim. p. 175. Str. Scops.

Jonston, av. p. 49. Scops.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 212. n. 4. *die Stockeule.*

** *Eulen mit glatten Köpfen. Ungehörte, ungehörte Eulen. Eulen, ohne Federbüsche. Käutze.*

6. NYCTEA. *Die Schneeeule.* (4)

- Müller*, Naturfyst. II. p. 100. n. 6. *die Tageule.*
Leske, Naturgesch. p. 235. n. 3. *die weiße Eule.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 78. n. 3. *die Tageule.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 329. n. 4. *die Schneeeule.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 350. n. 1. *die Schneeeule.* p. 353. *große weiße Eule, weiße Eule, Tageule, isländische weiße Eule, große weiße nordische Eule, weißbunte Eule, weißbunte schlichte Eule, große weiße und einzelne schwarz gedüpfelte Eule.*
Funke, Naturgesch. I. p. 288. *die Tageule.*
Ebert, Naturl. II. p. 39. *Tageulen,*
Halle, Vögel, p. 239. n. 179. *die große weiße nordische Eule.*
Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 47. n. 43. *große weiße Eule.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 222. n. 37. *die Schneeeule, Tageule. Titelpupf.*
Onomat. hist. nat. VII. p. 321. die weißbunte Eule.
Klein, av. p. 57. n. 5. *Ulula alba, maculis terrei coloris.*

Klein,

- (4) Länge 2 Fuß 3 Zoll. Flügelweite 5 Fuß. Gewicht über 3 Pfund. Die Einwohner an der Hudsonsbay kochen diese Eule, essen zuerst das Fleisch, und trinken dann die Brühe, die sie für etwas gesünder halten. Ihr gräßliches Heulen ist dem Klagegeschrey eines Menschen im größten Unglück ähnlich; in Lappland wird sie deshalb für ein Gespenst gehalten.

- Klein*, Vorbereit. p. 107. n. 5. *weißbunte schlichte Eule.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 55. n. 5. *weißbunte schlichte Eule.*
- Briffon*, ornithol. I. p. 152. n. 8. Chat. huant blanc de la Baye de Hudson.
- Büffon*, Vögel, III. p. 103. *die große weiße Eule.* Tab. 73.
- Batsch*, Thiere, I. p. 298. *die Tageule oder große weiße Eule.*
- Seligmann*, Vögel, III. Tab. 17. *große weiße Eule.*
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 22. n. 31 *die Tageule.*
- Ellis*, Reise nach Hudsons Meerbusen, p. 39. *die große weiße Eule.*
- Fischer*, Zus. z. Naturgesch. von Livland, p. 43. n. 490. *weißbunte Eule, Tageule.*
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 283. n. 30. *die Tageule.*
- Leem*, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 127. *weiße Eulen.*
- Latham*, Vögel, I. p. 124. n. 17. *die große weiße Eule, die Tag-Eule.*
- Latham*, Syn. Suppl. p. 45. Snowy Owl.
- Latham*, Syst. ornith. I. p. 57. n. 20. Strix (Nyctea) capite laevi, corpore albido, maculis lunatis distantibus fuscis.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 11. n. 10. *die weißbunte Eule.*
- Naturforsch. VIII. p. 58. n. 30. *die Tageule.*
- Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Freunde, VII. p. 449. *die Tageule.*
- Bechstein*, Musterung schädli. Thiere, p. 384. n. 35. *die Schneeeule.*
- Dresdn. Magaz. II, p. 394 - 401. m. e. Fig.
- Cranz,*

Cranz, Grönl. p. 112. *Eulen welche weiß sind.*

Egede, Besch. von Grönl. p. 88. *fleckige Nacht-eulen.*

Horrebøw, Nachr. von Isl. p. 181.

Anderson, Besch. von Isl. p. 46. m. 1 Fig.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 17. n. 9. Noctua Scandiaca.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 93. n. 8. Strix (Nyctea) capite laevi, corpore albido, maculis lunatis distantibus fuscis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 11. n. 77. Strix (Nyctea) capite laevi, corpore albido, maculis lunatis distantibus fuscis.

Brünnich, ornith. bor. p. 7. Nyctea.

Fabric. fn. groenl. p. 60. n. 36. Strix (Nyctea) capite laevi, corpore albido, maculis lunatis distantibus fuscis.

Domdorff, Handb. der Thiergesch. p. 212. n. 5. *die Schnee-Eule.*

44. **TENGMALMI.** *Die Eule mit erbsförmigen Flecken.* (5)

Beseke, Vögel Kurl. p. 27. ad n. 37.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 64. n. 42. Strix (Tengmalmi) capite laevi, corpore griseo, maculis pisiformibus albis, iridibus flavis.

25. **NEBULOSA.** *Die gestreifte Eule.* (6)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 223. n. 38. *die gestreifte Eule.* Tab. II.

Latham, Vögel, I. p. 125. n. 18. *die gestreifte Eule.*

Latham,

(5) Nach *Beseke* vielleicht das Weibchen von *Strix Passerina*.

(6) Flügelweite 4 Fuls. Gewicht 3 Pfund, nach *Latham*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 58. n. 23. Strix (Nebulosa) capite laevi, corpore fusco, albido undulatum striato, remige sexto longiore, apice nigricante.

26. CINEREA. *Die aschgraue Eule.*(?)

Pennant, arct. Zool. II. p. 221. n. 36. *die rußschwarze Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 125. n. 19. *die aschgraue Eule.*

Latham, Syn. Suppl. p. 45. Cinereous Owl.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 58. n. 22. Strix (Cinerea) cinereo-fuliginosa, nigro transversim lineata, subtus albido cinereoque nebulosa, regione periophthalmica circulis concentricis nigris.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 212. n. 6. *die rußschwarze Eule.*

27. WAPACUTHU. *Der Wapacuthu.*(?)

Pennant, arct. Zool. II. p. 220. n. 35. *der Wapacuthu.*

Latham, Vögel, I. p. 140. n. 41. *der Wapakuthu.*

Latham, Syn. Suppl. p. 49. *Wapacuthu Owl.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 58. n. 21. Strix (Wapacuthu) capite laevi, corpore albo, pallide rubro nigroque maculato, subtus albido, lineis numerosis rufescentibus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 213. n. 7. *der Wapacuthu.*

28. Cu-

(?) Flügelweite und Gewicht wie bey der vorigen.

(8) Flügelweite 4 Fufs. Gewichte 5 Pfund. Brütet im May und soll, nach *Hutchins*, 5 bis 10 weisse Eyer legen, worin sie, wenn die Bemerkung richtig ist, sehr von andern Gattungen abweicht.

28. CUNICULARIA. *Die Kanincheneule.* (9)

Müller, Naturfyft. II. p. 107. c. *die Kanincheneule.*

Halle, Vögel, p. 241. n. 182. *die Kanincheneule.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 219. *Ulula cunicularia.*

Klein, av. p. 57. n. 9. *Ulula cunicularia.*

Klein, Vorbereitung, p. 108. n. 9. *Erdeule.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 56. n. 9. *Erdeule.*

Briffon, ornith. I. p. 153. n. 11. *Chouette de Coquimbo.*

Büffon, Vögel, III. p. 84. *Kanincheneule.*

Latham, Vögel, I. p. 134. n. 33. *die Minirer-Eule, der Pequen.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 63. n. 38. *Strix* (Cunicularia) capite laevi, corpore fusco, subtus albo, pedibus tuberculatis, pilosis.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 213. n. 8. *der Pequen.*

7. ALUCO. *Dieachteule.* (10)

Müller, Naturfyft. II. p. 102. n. 7. *dieachteule.*

Borowsky, Thierr. II. p. 79. n. 4. *dieachteule.*

Bechstein,

(9) Nach *Büffon* eine bloße Abänderung der europäischen *Steineule.*

(10) Flügelweite 3 Fuß 4 Zoll. Diese Eulen sind so wild daß sie eher verhungern als sich gefangen füttern lassen; und kaum lassen sich die noch ganz kleinen Jungen einigermaßen zähmen. Es sind grimmige und gefährliche Thiere, besonders wenn sie Junge haben, da man sich ihren Nestern mit Vorsicht nähern muß. Nach *Beseke* l. c. p. 27. n. 38. gehört *Frisch* *Schläferneule* Tab. 97. mit hieher, die *Gmelin* zur *Flammea* rechnet. Nach *Latham* ist noch nicht ausgemacht, ob sie von der *Brandeule* wirklich verschieden sey.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 330. n. 5. *die* *Nachteule*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 353. n. 2. *die* *Nachteule*. p. 356. *große Baumeule*, *gemeine Eule*, *Mauseule*, *graue Buscheule*, *Knaupp-eule*, *Grabeule*, *braune Eule*, *rothe Eule*, *Huhu*, *Waldläuffl*.

Funk, Naturgesch. I. p. 287. *die* *Nachteule*.

Ebert, Naturl. II. p. 27. *die* *Nachteule*.

Halle, Vögel, p. 234. n. 174. *die* *gemeine graue Buscheule*, *mit weiß und braunem Schley*.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 46. n. 42. *die* *gemeine Eule*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 315. *die* *gemeine Eule*, *Buscheule*, *Nachteule*.

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 97. *die* *Nachteule* u. f. w.

Klein, av. p. 57. n. 10. *Ulula vulturina?*

Klein, Vorbereit. p. 108. n. 10. *Geyereule?*

Klein, verb. Vögelhist. p. 56. n. 10. *Geyereule?*

Gesner, Vögelb. p. 535. *Ul* oder *Nachteul*, Fig. p. 536. gut.

Briffon, ornitholog. I. p. 148. n. 3. *Hulote*.

Büffon, Vögel, III. p. 64. *die* *Nachteule*, *große Baumeule*. Tab. 66.

Batsch, Thiere, I. p. 298. *die* *Nachteule*.

Latham, Vögel, I. p. 126. n. 20. *die* *Nacht-Eule*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 59. n. 26. *Strix* (*Aluco*) *capite laevi, corpore ferrugineo, iridibus atris*.

Beseke, Vögel Kurl. p. 25. n. 33. *die* *Nachteule*.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 284. n. 31. *die* *Nachteule*.

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 68. n. 49. *gemeine Eule*, *Nachteule*, *Schleyereule*.

- Pontoppidan*, Naturgesch. von Dännem. p. 166.
n. 3. *Nachteule*.
- Krünitz*, Encyklop. XI. p. 684. *die Nach.eule*.
- Naumann*, Vogelsteller, p. 165. *Knapppeule*.
- Naturforsch. VIII. p. 58. n. 31. *Nachteule*.
- Beckmann*, Bibl. VI. p. 56. 57. *die große Baum-
eule*.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 12. n. 11.
die Maus-Eule.
- Eberhard*, Thiergeschichte, p. 70. *die gemeine
Buscheule*.
- Bechstein*, Musterung schädli. Thiere, p. 84. n. 35.
dieachteule.
- Loniceri*, Kräuterbuch, p. 671. *Eul*, *Nachtrapp*,
Nacht-Eul. Fig. p. 672.
- Kraft*, Ausrott. grauf. Thiere, I. p. 141. *Ul oder
Nacht-Eul*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. II. p. 52. *Ulula*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI p. 17. n. 5. *Ulula*.
- Linné*, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 93. n. 6. *Strix*
(*Aluco*) *capite laevi, corpore ferrugineo, iri-
dibus atris, remigibus primoribus ferratis*.
- Schwenkfeld*, aviar. Siles. p. 367. *Ulula*; *eine Eule*,
Ule, *Punsch-Eule*, *Graw-Eule*.
- Hermann*, tab. affin. animal. p. 176. *Strix Aluco*.
- Jonston*, av. p. 50. *Ulula*.
- Donndorff*, Handb. der Thiergesch. p. 213. n. 9.
dieachteule.

29. SYLVESTRIS. *Die Holzeule.*⁽¹⁾

- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 374. n. 8.
die Holzeule.

Scopoli,

(1) Nach *Bechstein* ist es noch nicht ausgemacht, ob diese und die folgende Eule, wirklich verschiedene Gattungen, oder bloß Varietäten sind.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 13. n. 13.
die Holz-Eule, oder wilde Eule.

Latham, Vögel, I. p. 127. n. 21. die österreichische Eule.

Latham, Syst. ornith. I. p. 61. n. 29. Strix (Sylvetris) capite laevi, corpore albo fuscoque variegato, regione periophthalmica albida.

Kramer, Austr. p. 324. n. 7. Strix capite laevi, corpore griseo? Wald-Auffe.

30. ALBA. Die weißbauchige Eule.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 374. n. 9.
die weißbauchige Eule.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 13. n. 14.
die weiße Eule.

Latham, Vögel, I. p. 127. n. 22. die weiße österreichische Eule.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 61. n. 30. Strix (Alba) capite laevi, corpore rufo, griscoque vario, subtus albo, regione periophthalmica margine rufo, rectricibus apice albis.

31. NOCTUA. Die braunrothe Eule.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 15. n. 15.
die Nacht-Eule.

Latham, Vögel, I. p. 128. n. 23. die braunrothe österreichische Eule.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 61. n. 31. Strix (Noctua) capite laevi, iridibus flavis, corpore pallide rufo, maculis longitudinalibus fuscis.

32. RUF A. Die fuchsrothe Eule. (2)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 356. die fuchsrothe Eule.

L 2

Scopoli,

(2) Nach *Bechstein* das Weibchen von *Strix Aluco*.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 14. n. 16.
die fuchsrothe Eule.

Latham, Vögel, I. p. 128. n. 24. *die rostigrothe
österreichische Eule.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 62. n. 32. Strix (Ru-
fa) capite laevi, iridibus caeruleiscentibus, cor-
pore ferrugineo, fusco maculato.

33. SOLONIENSIS. *Die Sologneser Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 128. n. 25. *die sologneser
Eule.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 62. n. 33. Strix
(Sologniensis) capite laevi, corpore supra atro-
fusco, fulvo admixto, subtus albo, cauda alba,
versus apicem lineis nigricantibus decussan-
tibus.

8. FLAMMEA. *Die Schleyereule. (3)*

Müller, Naturyst. II. p. 102. n. 8. *die feurige
Nachteule.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 79. n. 5. *die Perl-
eule, Kirchcule, Schleiereule.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 331. n. 6. *die Schleyer-
eule.*

Bechstein,

(3) Länge 16 Zoll. Flügelweite 3 Fuß 3 Zoll. Gewicht 11 Un-
zen. Hält sich am Tage auf Kirchen, Thürmen, alten Schlöf-
fern u. s. w. auf, und kommt erst in der Dämmerung her-
vor. Nährt sich von Ratten, Mäusen, Fledermäusen, jungen
Vögeln, grossen Käfern u. s. w. ist aber auch den Tauben-
schlägen nachtheilig. Im Herbst besucht sie auch den Schnep-
fen- und Drosselfang. Macht kein Nest, sondern legt ihre
3 bis 5 weissen Eyer, die länglicher als bey andern Eulen
sind, zu Ende des Märztes oder Anfang des Aprils, in die
Klüfte der Mauern, und die Kirchen- und Thurmdächer,
ins Genist, Kehrig, oder verwitterten Mörtel. Das Fleisch
der Jungen soll nach den ersten drey Wochen, wenn sie gut
gefüttert sind, essbar seyn.

- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 359. n. 4. die *Schleyereule*. p. 364. *weiße Eule*, *Kircheule*, *Thurmeule*, *Buscheule*, *Kautzeule*, *Todteneule*, *gestammte Eule*, *Waldkautz*, *Kohleule*, *Schleyer - Auffe*.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 288. die *Steineule*.
- Ebert*, Naturl. II. p. 38. die *Kircheule*, *Thurmeule*.
- Halle*, Vögel, p. 238. n. 178. die *Kircheule*.
- Gatterer*, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 48. n. 44. die *Kircheule*, *Perleule*, *Todtenvogel*, u. f. w.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 224. n. 40. die *weiße Eule*, *Kircheule*.
- Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 718. die *Schleyer - Eule*.
- Onomat. histor. nat. VII. p. 319. *Kircheule*, *Todteneule*.
- Handbuch der Naturgesch. II. p. 145. die *Schleiereule*, *Kircheule*.
- Handb. der deutschen Thiergesch. p. 98. die *Perleule*, *Thürmeule*, u. f. w.
- Klein*, av. p. 56. n. 4. *Ulula Aluco*.
- Klein*, Vorbereit. p. 107. n. 4. *Schleyereule*, *Kircheule*, *Kautzeule*.
- Klein*, verb. Vögelh. p. 55. n. 4. *Schleyereule*,
- Klein*, Stemm. av. p. 9. Tab. 10. fig. 1. a. b. 2. a. b. 3. a. b.
- Gesner*, Vögelbuch, p. 537. *Schleyereul* od. *Kircheul*. Abbild. ziemlich gut.
- Briffon*, ornithol. I. p. 147. n. 2. petit Chathuant.
- Büffon*, Vögel, III. p. 74. die *Kircheule*. Tab. 68.
- Batsch*, Thiere, I. p. 299. die *Perleule*.
- Latham*, Vögel, I. p. 129. n. 26. die *Schleyer - Eule*, *Perl - Eule*.

- Latham*, Syn. Suppl. p. 46. White-Owl.
Latham, Syst. ornith. I. p. 60. n. 28. Strix (Flammea) capite laevi, corpore luteo, punctis albis, subtus albido, punctis nigricantibus.
Beske, Vögel Kurlands, p. 27. n. 38. die rothe Schleyer- oder Perleule.
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 285. n. 32. die feurige Nachteule, Kircheule, gelbe Schleyereule.
White, Naturgeschichte von England, p. 50. Perleulen.
Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 62. die Schleyereule.
Carver, Reise durch Nordamerika, p. 386. die Eule?
Pontoppidan, Naturgesch. von Dännemark, p. 166. n. 8. Krakugle. Tab. 12.
Zorn, Petinotheol. II. p. 256. die Schleyer-Eule.
Eberhard, Thiergesch. p. 70. die Kircheule.
Meidinger, Vorles. I. p. 113. die Kirch- oder Todteneule.
Schneider, zool. Abhandl. p. 144. die Nachteule.
Geoffroy, mat. med. VII. p. 556. die Kircheule.
Valentin, Amph. zootom. II. p. 76.
 Naturforsch. VIII. p. 59. n. 33. das Käutzlein.
 (Mit *Strix Ulula* verwechselt.)
 Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Freunde, VII. p. 449. n. 11. die rothe Schleyer- oder Perleule.
Pennant, britt. Thiergesch. Tab. 18.
Mellin, von Anleg. der Wildbahn. p. 349. d. die Perleule.
 Anweis. Vögel zu fangen, p. 187. Schleyereule.
Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 85. n. 37. die Schleyereule.

Beckmann, ph. ökon. Bibl. IV. p. 57. VI. p. 56.
die Schleyereule.

Merklein, Thierreich, p. 314. *Kircheule.*

Kriinitz, Encyklop. XI. p. 685. *Schleyereule,*
Waldkautz.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 17. n. 7. Strix
Flammea.

Schoenckfeld, aviar. Silef. p. 368. *Ulula flammeata,*
eine Schleier-Eule, Kircheule, Ranz-Eule.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. II. n. 79. Strix
(Flammea) capite laevi, corpore luteo, punctis
albis, subtus albido, punctis nigrican-
tibus.

Kramer, Austr. p. 324. n. 5. Strix capite laevi,
facie alba, pone aures circuli segmento och-
reo e pennis singularis structurae, dorso cae-
rulescente; *Schleuer-Eule, Schleuer-Auffe.*

Schäfer, Elem. ornith. Tab. 64.

Gerin. ornith. I. p. 88. Tab. 91.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 214. n. 10.
die Kircheneule.

9. STRIDULA. Die Brandeule. (4)

Müller, Naturfyst. II. p. 103. n. 9. *die Brandeule.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 338. n. 6. *die Brand-
eule.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 356. n. 3.
die Brandeule. p. 359. *die hellbraune Eule,*
L 4 *gelbe*

(4) Länge über 16 Zoll. Flügelweite 3 Fufs. Hält sich beson-
ders gern in Schwarzwäldern auf, und kommt höchst selten
zu den Wohnungen der Menschen. Nährt sich von Feld-
mäusen, Maulwürfen, Heuschrecken und Käfern. Legt 3
bis 5 weisse rundliche Eyer in ein Saat- oder Rabenkrähen-
Eichhörnchens- oder verlassenes Vogelnest. Lässt sich jung
und alt leicht zähmen.

gelbe Eule, Knarreule, Zischeule, braunschwarze Nachteule, Kirreule, Kieder, Milchsauger, Melker, Stöckeule.

Ebert, Naturl. II. p. 38. die Brandeule, Knarreule.

Halle, Vögel, p. 236. n. 175. die braunschwarze Eule.

Gat. erer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 49. n. 45. die graue Eule u. s. w.

Pennant, arct. Zool. II. p. 226. B. die hellbraune Eule, der Milchsauger.

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 718. die graue Eule.

Onomat. hist. natur. VII. p. 325. die Brandeule.

Handbuch der deutschen Thiergeschichte, p. 97. die graue Eule, Brandeule.

Klein, av. p. 56, n. 3. Ulula Strix.

Klein, Vorbereit. p. 106. n. 3. braune, graue, gemeine Eule.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 55. n. 3. gemeine Eule.

Briffon, ornithol. I. p. 146. n. 1. Chathuant.

Büffon, Vögel, III. p. 69. die graue Eule. Tab. 67.

Batsch, Thiere, I. p. 298. die graue Eule.

Latham, Vögel, I. p. 129. n. 27. die lohgelbe Eule, Brandeule.

Latham, Syst. ornith. I. p. 58. n. 25. Strix (Stridula) capite laevi, corpore ferrugineo, remige tertio longiore.

Beseke, Vögel Kurl. p. 26. n. 34. die Brandeule.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 285. n. 33. die graue Nachteule, Brandeule.

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 68. n. 50. Brandeule, Knarreule.

Hassel-

Hasselquist, Reise nach Palästina, p. 290. n. 16.
Strix (Orientalis) facie pilosa, futura crispato-
plumosa in dorso rostri?

Pennant, britt. Thiergesch. Tab. 19.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 12. n. 12.
die Knarr - oder zischende Eule.

Naturforsch. VIII. p. 59. n. 32. *die Brandeule.*

Bechstein, Musterung schädli. Thiere, p. 85. n. 36.
die Brandeule.

Tengmalm, neue schwed. Abhandl. IV. p. 45.
Strix Stridula.

Krünitz, Encyklop. XI. p. 685. *die graue Eule.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 17. n. 6. Strix
minor.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 93. n. 9. Strix
(Stridula) capite laevi, corpore ferrugineo,
remige tertio longiore.

Müller, zool. dan. prodr. p. 11. n. 82. Strix (Stri-
dula) capite laevi, corpore ferrugineo, remige
tertio longiore.

Brünnich, ornith. bor. p. 7. n. 18. Strix Stridula.

Kramer, Austr. p. 223. n. 4. Strix capite laevi,
pone aures circuli segmento nigro e pennis
singularis structuræ, dorso ferrugineo? *Nacht-
eule, gemeine oder kleine Eule?*

Forstön, av. p. 52. Strix.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 214. n. 11.
die graue Eule.

10. ULULA. Die Steineule. (5)

Müller, Naturyst. II. p. 104. n. 10. *das Käuzstein.*

L 5

Bo.

(5) Flügelweite 2 Fufs 9 Zoll. Gewichte 19 Unzen. Liebt
vorzüglich bergige Gegenden, und wohnt in Steinbrüchen,
Felsenritzen, verfallenen Gebäuden, auch in Kirch- und
Thurm-

Borowsky, Thierreich, II. p. 80 n. 6. *der Steinkautz.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 161. n. 2. Strix (Ulula) capite laevi, iridibus croceis, corpore ferrugineo, remige tertio longiore; *Steinkautz*, *Steineule.*⁽⁶⁾

Bechstein, Naturg. I. p. 332. n. 8. *der große Kautz.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 364. n. 5. *der große Kautz.* p. 367. *Steineule*, *Buscheule*, *Steinauffe*, *heulende Eule*, *große braune Eule*, *Kircheule*, *Tschiaiville*, *Steinkautz*, *Kautz.*

Ebert, Naturl. II. p. 93. *die Steineule.*

Halle, Vögel, p. 237. n. 176. *die große braune Eule.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 49. n. 46. *die Steineule* u. f. w.

Pennant, arct. Zool. II. p. 225. n. 41. *die braune Eule*, *der Kautz.*

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 99. *die Steineule*, *Buscheule.*

Gesner, Vögelb. p. 356. *Kautz oder Steinkautz.* Fig. p. 357.

Briffon, ornith. I. p. 149. n. 4. *grande Chouette.*

Büffon,

Thurmmauern. In Wäldern findet man sie gar nicht. Fängt sehr geschwind Mäuse und Wasserratten, frisst aber auch Grillen. Käfer und Nachtschmetterlinge. Legt, ohne Nest in den Klüften und Ritzen 2 bis 4 rundliche weiße Eyer zu Anfang des März, und wenn das Weibchen über der Brut getödtet wird, so brütet das Männchen die Eyer aus, und futtert die Jungen auf. — Oft wird diese Gattung in den Synonymen mit *Strix passerina* verwechselt. —

(6) Der ganze hier angegebene Charakter weicht von dem bey andern Systematikern ab, und doch kann nach den franz. und engl. Synonymen keine andere als diese Gattung gemeint seyn; auch ist *Frisch* Tab. 98. angeführt.

- Büffon*, Vögel, III. p. 81. *die Steineule, Busch-
eule.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 297. *die Steineule.*
- Latham*, Vögel, I. p. 130. n. 28. *das Käützgen,
die Stein-Eule.*
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 60. n. 27 *Strix*
(*Ulula*) *capite laevi, supra rufescens, maculis
longitudinalibus fuscis, subtus albida, lineolis
fuscis, cauda fasciis fuscis.*
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 26. n. 36. *die Steineule.*
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 69. n. 51.
Käützlein?
- Pontoppidan*, Naturg. von Dännemark, p. 166.
n. 6. *gemeine Eule.*
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 286. n. 34.
Käützlein, Steinkautz, Steineule.
- White*, Naturgesch. von England, p. 16. *Stein-
eule.*
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 80. *Steinkautz.*
- Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde,
VII. p. 450. *die Steineule.*
- Naturforsch. VIII. p. 59. n. 33. *das Käüzlein.*
(Mit *Str. Aluco* verwechselt.)
- Naturf. XVII. p. 224. *Steineule.*
- Bechstein*, Musterung schäd. Th. p. 86. n. 38.
der große Kautz.
- Eberhard*, Thiergeschichte, p. 70. *der Stein-
kautz.*
- Krinitz*, Encyklop. XI. p. 685. *die Steineule.*
- Merklein*, Thierreich, p. 314. *Steineule.*
- Jablonsky*, allgem. Lexicon, p. 522. *Kautz,
Steinkautz.*
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 93. n. 10. *Strix*
(*Ulula*) *capite laevi, corpore supra fusco, al-
bo maculato, rectricibus fasciis albis.*

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 308. Noctua; eine Nacht Eule, Stein-Eule, Mittel Eule, Kautz.

Charleton, onomat. hist. nat. p. 70. n. 6. Noctua.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. II. n. 80. Strix (Ulula) capite laevi, corpore supra fusco, albo maculato, rectricibus fasciis linearibus albis.

Hermann, tab. affin. animal. p. 175. Ulula.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 215. n. 12. die Steineule.

β. Noctua minor aucuparia.

γ. Strix capite inaurito, corpore ferrugineo, supra nigro maculato, subtus lineolis fuscis striato, orbitis, rostro fasciaque subalari nigris. *Latham*, System. ornitholog. I. p. 60. n. 27. β. *

Mus. Carls. Fasc. III. Tab. 51. Strix arctica.

II. FUNEREA. Die kanadische Eule.

Müller, Naturfyst. II. p. 105. n. II. die Steineule.

Pennant, arct. Zool. II. p. 223. n. 39. die Habichtseule.

Onomat. hist. nat. VII. p. 320. die Traurreule.

Briffon, ornithol. I. p. 151. n. 6. Chathuant de Canada.

Büffon, Vögel, III. p. 113. der große kanadische Kautz.

Latham, Vögel, I. p. 132. n. 29. die kanadische Eule.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 62. n. 35. Strix (Funerea) capite laevi, corpore fusco, albo maculato, subtus albo fuscoque fasciato, remigibus maculis albis variegatis, rectricibus albo fasciatis.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 286. n. 35.
die *Steineule*.

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 69. n. 52.
Kircheule, *Steineule*.

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dänemark. p. 166.
n. 4. *Krakugl.*, *Klagsfrau*, *Klage*. Tab. 12.
Naturforsch. VIII. p. 60. n. 34. *Steineule*.

Eberhard, Thiergesch. p. 70. die *kanadische Eule*.

Linneé, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 93. n. 7. Strix
(*Funerea*) capite laevi, corpore fusco, iridi-
bus flavis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 11. n. 81. Strix (*Fune-
rea*) capite laevi, corpore fusco, iridibus flavis.

Gerin. ornith. I. p. 88. Tab. 90.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 215. n. 13.
die *Habichtseule*.

34. HUDSONIA. Die kleine Falkeneule. (7)

Müller, Natursyst. II. p. 101. die *Sperbereule*.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 69. n. 16. Strix Ca.
paroch; der *Weißbacken*.

Halle, Vögel, p. 242. n. 183. die *Geiereule?*

Briffon, ornithol. I. p. 151. n. 7. Chathuant de
la Baye de Hudson.

Büffon, Vögel, III. p. 100. die *kleine Falkeneu-
le*. Tab. 72.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 19. die *kleine Fal-
keneule*.

Latham, Vögel, I. p. 133. n. 30. die *Habicht-
Eule*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 65. n. 35. β. Strix,
corporis pennis supra fuscis, margine albis,
subtus

(7) Nach *Pennant* und *Latham* eine Varietät von *Strix Funerea*.

subtus albis, lineis transversis nigris, rostro
 iridibusque aurantiis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 23. n. 32. Caparoch.

Gerin. ornith. I. p. 91. Tab. 98.

35. URALENSIS. *Die Uraleule.* (8)

Müller, Naturfyft. Suppl. p. 68. n. 14. *die urali-
 sche Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 136. n. 37. *die Ural-Eule.*

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 63. γ. Strix cor-
 pore albido, maculis in singularum pennarum
 medio longitudinalibus fuscis.

Lepechin, Tageb. der russischen Reise, II. p. 181.
uralische Eule.

Pallas, Reise, Ausz. I. Anh. p. 3. n. 7. Strix
uralensis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 174. Str. uralensis

36. ACCIPITRINA. *Die Habichtseule.* (9)

Müller, Naturfyft. Suppl. p. 67. n. 13. *die Ha-
 bichteule.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 372. n. 7.
die Habichtseule. p. 373. *kleine Falkeneule,
 Geyereule, Sperbereule.* Tab. 12.

Latham, Vögel, I. p. 136. n. 36. *die kaspische
 Eule.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 60. n. 27. γ. Strix
 capite laevi, corpore supra lutescente, subtus
 luteo-

(8) Länge, nach *Lepechin*, 1 Fuß 9 Zoll 10 Linien; Flügel-
 weite 2 Fuß 5 Zoll. — Nach *Pennant* und *Latham* eine
 Varietät von *Strix Funevea*.

(9) Länge, nach *Bechstein*, 19 Zoll; Flügelweite 2 Fuß 4 Z.
 Gewicht 12 Unzen. Aus den beygefügtten Synonymen er-
 hellert, dafs *Bechstein* diese Gattung mit n. 34. und 35. für
 einerley hält. *Latham* führt sie als eine Varietät von *Strix
 Uula* auf. Nach *Beseke* nistet sie auch in Kurland.

luteo albo, maculis longitudinalibus nigricantibus.

Beseke, Vögel Kurl. p. 26. n. 35. die Habichtseule.

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 376. eine besondere Eule.

Pallas, Reise, Ausz. I. Anh. p. 3. n. 6. Strix accipitrina.

Bechstein, Musterung schäd. Th. p. 88. n. 44. die Habichtseule.

Hermann, tab. affin. anim. p. 175. Str. accipitrina.

37. JAVANICA. Der Kukepluck. (10)

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 64. n. 39. Strix (Javanica) corpore cinereo, hinc inde rufescente, maculis albis et nigris, subtus sordide albo, hinc inde rufescente, maculis nigris.

38. NOVAE SEELANDIAE. Die neuseeländische Eule. (1)

Latham, Syst. ornith. I. p. 65. n. 45. Strix (Fulva) capite laevi, corpore fusco, marginibus pennarum fulvis, regione periophthalmica fulva, rectricibus fasciis pallidis.

Latham, Syn. Supplem. p. 48. 39. New-Zealand Owl.

β. Strix iridibus flavis, corpore supra fusco-albo maculato, subtus fulvo. *Latham*, Syst. ornithol. I. p. 65. n. 45. β.

Latham, Syn. p. 149. n. 39. New-Zealand Owl.

Gmelin, Syst. Linn. p. 297. n. 38.

39. CA-

(10) Länge 17 Zoll. Flügelweite 40 Zoll; engl. M.

(1) Auf diese Art hat *Latham* die Synonymen in dem Syst. ornithol. geordnet.

39. CAYENNENSIS. *Die cayennische Eule.*

Müller, Naturfyftem Suppl. p. 70. n. 17. *die cayennische Eule.*

Büffon, Vögel, III. p. 112. *die kayennische Eule.*
Tab. 74.

Latham, Vögel, I. p. 135. n. 35. *die kayennische Eule.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 64. n. 41. Strix (Cayanensis) capite laevi, iridibus fulvis, corpore rufo, lineis undulatis transversis tufcis.

40. DOMINICENSIS. *Die Eule von St. Domingo.*

Müller, Naturfyft. Suppl. p. 70. n. 18. *die domingische Eule.*

Büffon, Vögel, III. p. 115. *der große Kautz, von St. Domingo.*

Latham, Vögel, I. p. 125. n. 34. *die St. Dominik-Eule.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 64. n. 40. Strix (Dominicensis) capite laevi, abdomine rufo, pectore maculis sparfis longitudinalibus.

41. TOLCHIQUATLI. *Die schwarzbunte mexikanische Eule.*

Müller, Naturfyft. I. p. 106. b. *Tolchiquatli.*

Briffon, ornithol. I. p. 153. n. 10. *Noctua Mexicana; Chonette du Mexique.*

Büffon, Vögel, III. p. 116. n. 2. *die schwarzbunte mexikanische Eule.*

Latham, Vögel, I. p. 134. n. 32. *die Eule aus Neu-Spanien.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 63. n. 37. Strix (Tolchiquatli) capite laevi, iridibus flavescens, corpore nigro-flavescente, albo fulvoque vario, subtus albo.

42. CHICHICTLI. Die rothbunte mexikanische Eule.

Müller, Natursystem, II. p. 106. a. Chichictli.
 Brisson, ornith. I. p. 152. Strix Mexicana; Chat-
 huant du Mexique.

Büffon, Vögel, III. p. 116. n. 1. die mexikanische
 rothbunte Eule.

Latham, Vögel, I. p. 134. n. 1. die mexikanische
 Eule.

Latham, Syst. ornith. I. p. 63. n. 36. Strix (Chi-
 chictli) capite laevi, oculis nigris, corpore
 fulvo, albo, fusco nigroque vario, palpebris
 caeruleis.

43. ACADICA. Die acadische Eule.

Latham, Vögel, I. p. 137. n. 38. die akadische
 Eule. Tab. 5. fig. 2.

Latham, Syst. ornith. I. p. 65. n. 44. Strix (Aca-
 diensis) capite laevi, regione periophthalmi-
 ca cinerea, corpore supra rubro-fusco maculis
 albis, subtus fordide albo maculis longitudina-
 libus ferrugineis.

12. PASSERINA. Der kleine Kautz. (2)

Müller, Natursyst. II. p. 106. n. 12. die Zwerg-
 eule.

Borowsky;

(2) Flügelweite 1 Fuß 11 Zoll; Gewicht 7 Unzen. Lebt in
 alten verfallenen Gebäuden, oft mitten in Städten, in Kir-
 chen, Steinbrüchen, Gewölben u. s. w. Nistet in Mauerlö-
 chern, auf dem Gebälke und unter den Dächern alter Ge-
 bäude, in Felsen und Steinklüften. Legt 2 weiße rundliche
 Eyer, die das Weibchen abwechselnd mit dem Männchen in
 15 Tagen ausbrüet. Läßt sich sowohl jung als alt zähmen,
 und zum Vogelsange gebrauchen. Von dem Aberglauben,

- Borowsky*, Thierreich, II. p. 81. n. 7. *das Käützchen, der Todtenvogel.*
- Blumenbach*, Handb. der Naturgesch. p. 161. n. 3. Strix (Passerina) capite laevi, remigibus maculis albis, quinque ordinum.
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 333. n. 9. *der kleine Kautz.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 367. n. 6. *der kleine Kautz.* p. 371. *Todtenvogel, Leicheneule, Leichvogel, Leichenhühnchen, Todteneule, Zwerg-eule, kleine Eule, kleine Haus-Wald- und Scheuneule, Steinauffe, Lerchenkäützchen, Spatzeneule, Käützchen.*
- Funke*, Naturgesch. I. p. 288. *das Käützchen.*
- Ebert*, Naturl. II. p. 39. *das Käützlein.*
- Halle*, Vögel, p. 240. n. 180. *die kleine Hauseule.*
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 50. n. 47. *das kleine Käützchen.*
- Pennant*, arct. Zoolog. II. p. 225. n. 42. *die kleine Eule, Zwerg-eule.*
- Neuer Schauplatz der Natur*, II. p. 719. *das Käützchen.*
- Onomat. histor. nat.* VII. p. 323. *das Käützlein, die Stockeule.*
- Handbuch d. deutschen Thiergesch.* p. 99. *das Käützchen.*
- (Klein*, av. p. 56. n. 6. *Noctua parva aucuparia.*
- Klein*, Vorbereit. p. 107. n. 6. *Käützlein, schlechthin also genannt, klein Käützlein, Stockeule, kleine Wald-, Scheuer-, Hauseule.*

Klein,

dafs diese Eule denjenigen Häusern, auf welchen sie sich hören läßt, einen nahen Todesfall verkündige, hat sie den Namen des *Leichvogels* erhalten. Sie hat einen hellen zischenden Laut, und wird auf eine Viertelmeile gelockt, wenn man denselben nachmacht.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 55. n. 6. *Käuzlein*.)

Mit *Strix Ulula*, und *Stridula* verwechselt.

Klein, verb. Vögelhist. p. 165. n. 2. *kleine Eule*.

Briffon, ornithol. I. p. 150. n. 5. *petite Chouette*,
ou la *Cheveche*.

Büffon, Vögel, III. p. 88. *das Käützchen*, *der*
Todtenvogel. Tab. 71.

Batsch, Thiere, I. p. 299. *der Kautz*.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 9. *die kleine Eule*.

Latham, Vögel, I. p. 138. n. 40. *das Käützgen*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 65. n. 46. *Strix* (*Passerina*) *capite laevi*, *remigibus maculis quinque ordinum*.

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 27. n. 37.
die Zwergeule.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 287. n. 36.
Zwergeule, *Käützlein*, *Stockeule*.

Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 64. *die*
Steineule.

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 166.
n. 7. *Käützlein*.

Pennant, britt. Thiergesch. Tab. 21.

Zorn, Petinotheol. II. p. 258. *das Käützlein*.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 14. n. 17.
das Käützlein, *Haus-Eule*, *Stork-Eule*.

Krünitz, Encyklop. XI. p. 686. *die kleine Haus-*
eule.

Tengmalm, neue schwed. Abhandl. IV. p. 45.
Strix passerina.

Goeze, nützl. All. II. p. 158. n. 9. *das Käützlein*.

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII.
p. 449. *Zwergeule*.

Naturforsch. VIII. p. 60. n. 35. *Zwergeule*.

Bechstein, Musterung schädli. Th. p. 87. n. 39. *der*
kleine Kautz.

Eberhard, Thiergesch. p. 70. die kleine Haus-
eule.

Mellin, von Anleg. der Wildbahn. p. 349. e. das
Käützchen.

Beckmann, phys. ök. Bibl. VI. p. 57. der klein-
ste Kauz.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 93. n. II. Strix (Pas-
serina) capite laevi, remigibus albis, maculis
quinque ordinum.

Müller, zool. dan. prodr. p. II. n. 83. Strix (Pas-
serina) capite laevi, remigibus maculis albis
quinque ordinum.

Kramer, Austr. p. 324. n. 6. Strix capite laevi,
corpore fusco, remigibus albis maculis quin-
que ordinum; *Tschiavitl*, Käützlein.

Briinich, ornitholog. bor. p. 7. n. 20. Strix Passer-
rina.

Hermann, tab. affin. anim. p. 175. Strix Passerina.

Jonston, av. p. 51. Noctua minor.

Danndorff, Handb. der Thiergesch. p. 215. n. 14.
das Käuzlein.

β. *Noctua minor*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 66. β.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Ver-
mehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Die Anzahl der Ohreulen ist um 12, der unge-
hörnten um 20, also das ganze Geschlecht mit 32
Gattungen vermehrt; überdem sind bey der ersten
Gattung 33 bey der zehnten 2, und bey der zwölf-
ten gleichfalls 2 Varietäten aus einander gesetzt.

B. Unbestimmtere Thiere.

1. *Der rauhfüßige kleine Kautz.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 371. *Strix*
Passerina dasypus.

C. Neuere Gattungen.

1. *Die Sumpfeule.* *Strix palustris*; (in Hessen und Pommern.)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 344. n. 3.

2. *Die chinesische Ohreule.*

Latham, Syn. Suppl. p. 44. Chinese eared Owl.

Latham, Vögel, I. p. 121. n. 15.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 53. n. 4. *Strix*
(*Sinenfis*) fronte albo, corpore fusco-rufo
lineis nigris undulatis, subtus rufo-nigricante
striato, fasciis albis, remigibus secundariis fa-
sciis 4 nigricantibus.

3. *Die Ohreule von Koromandel:*

Latham, Syn. Supplem. p. 44. Coromandel ear-
ed Owl.

Latham, Vögel, I. p. 122. n. 15. β .

Latham, Syst. ornithol. I. p. 53. n. 5. *Strix* (*Co-
romanda*) corpore rufo-griseo rufescente-al-
bo maculato, subtus pallide rubro, lunulis ni-
gris, remigibus rectricibusque fasciis rufo-albis.

Sonnerat, voy. Ind. II. p. 186. Hibou de Coro-
mandel.

4. *Die Brilleneule; (in Cayenne.)*

Latham, Syn. Suppl. p. 50. Tab. 107. Spectacle
Owl.

Latham, Vögel, I. p. 141. n. 42. Tab. 6.

Latham, Syst. ornith. I. p. 58. n. 24. *Strix* (*Per-
spicillata*) capite laevi, tomentoso albo, re-

gione periophthalmica, gula, corpore supra, fasciaque pectoris rubro-fuscis, abdomine rufo-albo.

5. *Die Bergeule; (in Sibirien.)*

Latham, Syn. Suppl. p. 50. Mountain Owl.

Latham, Vögel, I. p. 141. n. 43.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 62. n. 34. Strix (Barbata) capite laevi, rostro iridibusque flavis, corpore cinereo, gula regioneque periophthalmica atris, remige fessualtera ferrata.

44. GESCHLECHT. LANIUS. *Der Würger.*

Müller, Naturfyft. II. p. 108. Gen. XLIV.

Leske, Naturgesch. p. 135. Gen. XIII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 81. Gen. IV.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 162. Gen. IV.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 334. Gen. IV.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 375. Gen. IV.

Funke, Naturgesch. II. p. 289.

Ebert, Naturl. II. p. 40.

Pennant, arct. Zool. II. p. 227.

Neuer Schaupl. der Natur, VI. p. 132.

Onomat. hist. nat. IV, p. 652.

Halle, Vögel, p. 220.

Klein, av. p. 53. n. 26.

Briffon, ornithol. I. p. 197. Gen. XXI.

Büffon, Vögel, II. p. 169.

Batsch, Thiere, I. p. 317. Gen. LXXI.

Latham, allg. Ueberf. d. Vögel, I. p. 142. Gen. IV.

Latham, Syst. ornith. I. p. 66. Gen. IV.

Hermann, tab. affin. anim. p. 177.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 216.
Gen. IV.

I. FORFICATUS. *Der Drongo.*

Müller, Naturfyftem, II. p. 109. n. 1. *der afrikanische Scheerschwanz.*

Müller, Naturfyft. II. p. 578. ad n. 24. *Drongo.*
Tab. 20. fig. 5.

Onomat. histor. natur IV. p. 658. *der schwarze Würger aus Madagaskar, mit dem getheilten Schwanz.*

Briffon, ornith. I. p. 266. n. 16. grand gobe-mouche noir hupé de Madagascar.

Büffon, Vögel, II. p. 239. *der schwalbenschwänzige Würger von Madagaskar.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 146. *der Drongo; m. 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. p. 144. n. 1. *der afrikanische Scheerschwanz, der Drongo.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 66. n. 1. Lanius (Forficatus) cauda forficata, crista frontali erecta, corpore nigro viridante.

Samml. zur Phys. und Naturgesch. III. p. 119.
der Drongo.

2. CAERULESCENS. *Der Fingah.*

Müller, Naturfyft. Suppl. p. 72. n. 33. *der blaue Neuntödter.*

Müller, Naturfyft. II. p. 109. n. 2. *der bengalische Scheerschwanz.*

Halle, Vögel, p. 224. n. 164. *der bengalische blaue Würger.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 654. *der bengalische blaue Würger.*

Klein, av. p. 54. n. 9. Lanius Bengalensis, Fingah dictus.

Klein, Vorber, p. 103. n. 9. *Fingah aus Bengala.*
 Klein, verbess. Vögelhistorie, p. 53. n. 34. *blauer*
Wrangengel.

Briffon, ornithol. I. p. 210. n. 22. *Pie-grieche à*
queue fourchue de Bengale.

Büffon, Vögel, II. p. 204. *der blaue bengalische*
Würger. Tab. 50.

Batsch, Thiere, I. p. 236. *der bengalische blaue*
Würger.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 7. *der indianische*
Neuntödter, mit dem gabelförmigen Schwanz.

Latham, Vögel, I. p. 145. n. 2. *der bengalische*
Scheerschwanz, Fingah.

Latham, Syst. ornith. I. p. 67. n. 2. Lanius (Caerulescens) cauda forficata, corpore nigro-caerulescente, abdomine albo.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 95. n. 8. Lanius (Caerulescens) cauda forficata, corpore nigro caerulescente, abdomine albo.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 178. Lanius caerulescens.

5. CASTANEUS. *Der kastanienbraune Würger,*

Latham, Vögel, I. p. 145. n. 3. *der kastanien-*
braune Würger.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 67. n. 4. Lanius (Castaneus) cauda cuneiformi, corpore supra castaneo subtus albo, vertice, nucha cervicisque cinereis.

3. CRISTATUS. *Der Charah.*

Müller, Natursyst. II. p. 110. n. 3. *der gehaubte*
Neuntödter.

Onomat. hist. nat. IV. p. 655. *der bengalische ro-*
the Würger, Charah.

Briffon,

Briffon, ornithol. I. p. 205. n. 13. Pie-grieche rousse de Bengale.

Büffon, Vögel, II. p. 195. *der philippinische Würger*.

Halle, Vögel, p. 224. n. 163. *der bengalische rothe Würger*.

Kein, av. p. 54. n. 8. Lanius Bengalensis, Charah dictus.

Klein, Vorber. p. 103. n. 8. *Charah aus Bengala*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 53. n. 33. *gekrönter Wrangengel*.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 3. *der gehäubte röthlich braune Neuntödter*.

Latham, Vögel, I. p. 154. n. 18. *der Charah*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 72. n. 17. Lanius (Cristatus) cauda cuneiformi, capite cristato, corpore rufescente, subtus fulvo fuscoque undulato.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 93. n. 1. Lanius (Cristatus) cauda cuneiformi, capite cristato, corpore rufescente, subtus fulvo fuscoque undulato.

Gerin. ornith. I. p. 74. Tab. 57. fig. 2.

4. CANADENSIS. *Der canadische gehäubte Würger*.

Müller, Naturst. II. p. 110. n. 4. *der Canadische*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 652. *der canadensfische Neuntödter*.

Briffon, ornithol. I. p. 205. n. 12. Pie-grieche de Canada.

Büffon, Vögel, II. p. 236. *der kanadensfische gehäubte Würger*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 228. n. 45. *der Würger mit dem Federbusche, der canadische Würger*.

Latham, Vögel, I. p. 163. n. 35. *der kanadische Würger mit dem Federbusche.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 72. n. 18. *Lanius* (Canadensis) cauda cuneiformi, capite cristato, corpore rufescente, subtus albido.

Gerin, ornith. I. p. 75. Tab. 62. fig. 2.

6. **LUDOVICIANUS.** *Der louisianische Würger.*

Müller, Naturfyft. II. p. III. n. 6. *der Louisianische.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 228. n. 44. *der Schwarzkopf?*

Onomat. hist. nat. IV. p. 659. *der Würger aus Ludovicien.*

Briffon, ornithol. I. p. 202. n. 8. *Pie-grieche de la Louisiane.*

Büffon, Vögel, II. p. 178. *der graue Würger von Louisiana.*

Latham, Vögel, I. p. 147. n. 5. *der Würger aus Louisiana.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 67. n. 8. *Lanius* (Ludovicianus) cauda cuneiformi, cinereus, remigibus nigris, basi rectricibusque apice albis.

7. **NENGETA.** *Der Nengeta.* (3)

Müller, Naturfyft. II. p. III. n. 7. *Brasilianische.*

Pennant,

- (3) Halten sich, besonders im Innern von Guiana, häufig auf den untersten Aesten von gewissen Bäumen auf, wo sie Körner und Insekten suchen. Von Zeit zu Zeit schreyen sie alle auf einmal nach gewissen Zwischenzeiten. Ihr übrigens unangenehmes Geschrey dient verirrtten Reisenden zu einem Zeichen, das sie, wenn sie der Stimme dieser Vögel nachgehen, zu einem Flusse kommen. In Sibirien fängt und zähmt man diese Vögel. Sie fressen auch andere kleine Vögel.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 230. A. der graue Würger.

Onomat. hist. nat. IV. p. 662. der graue brasilianische Würger.

Briffon, ornith. I. p. 256. n. 8. *Cotinga gris*.

Büffon, Vögel, II. p. 242. der brasilianische Würger.

Büffon, Vögel, XIII. p. 158. der *Guiarou*; mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p. 163. n. 36. der *Nengeta*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 68. n. 7. *Lanius* (*Nengeta*) *cauda cuneiformi, apice alba, corpore cinereo, subtus albido.*

Samml. zur Phys. u. Naturgesch. II. p. 752. der *Guiarou*.

Jonston, av. p. 203. *Guiaru Nheenceta*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 216. n. 1. der graue Würger.

β. *Büffon*, Vögel, XIII. p. 161. eine Abart des *Guiarou*.

Latham, Vögel, I. p. 164. n. 36. Var. A.

8. CURVIROSTRIS. Der *Vanga*.

Müller, Naturfyst. II. p. 112. n. 8. *Krummschnabel*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 656. der Würger von *Madagaskar* mit dem krummen Schnabel.

Briffon, ornithol. I. p. 211. n. 23. *Ecorcheur de Madagascar*.

Büffon, Vögel, II. p. 220. der weißbäuchige Würger von *Madagaskar*. Tab. 55.

Latham, Vögel, I. p. 154. n. 19. der krummschnäblige Würger.

Latham, Syst. ornith. I. p. 72. n. 15. *Lanius* (*Curvirostris*) *cauda cuneiformi, corpore albo, dorso nigro, remigibus primoribus 5. macula alba.*

Her-

Hermann, tab. affin. animal. p. 179. Lanius curvirostris.

9. **COLLARIS.** *Der Würger mit dem Halsbände.*

Müller, Naturfyst. II. p. 112. n. 9. *der caapsche Neuntödter.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 654. *der Würger vom Vorgebürge der guten Hoffnung.*

Briffon, ornithol. I. p. 208. n. 18. Pie-grieche du Cap de bonne esperance.

Büffon, Vögel, II. p. 179. *der Würger des Vorgebirges der guten Hoffnung.*

Latham, Vögel, I. p. 148. n. 7. *der Würger mit dem Halsbände.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 69. n. 10. Lanius (Collaris) cauda cuneiformi, corpore nigro, subtus albo, remigibus primoribus basi albis.

10. **LUCIONENSIS.** *Der Würger aus Luçon.*

Müller, Naturfyst. II. p. 112. n. 10. *der lucionische Neuntödter.*

Onomat. hist. natur. IV. p. 659. *der Neuntödter von der Insel Luçon.*

Briffon, ornitholog. I. p. 204. n. 11. Pie-grieche de Luçon.

Büffon, Vögel, II. p. 244. *der lucionische Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 155. n. 21. *der Würger aus Luçon.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 67. n. 5. Lanius (Lucionensis) cauda cuneiformi, corpore griseo-rufescente, rectricibus apice fusco fasciatis, macula aurium nigra.

β. *Latham*, Vögel, I. p. 156. Var. A. *

11. EXCUBITOR. *Der große graue Würger.*(4)

Müller, Naturfyst. II. p. 113. n. II. *der Wächter.*

Leske, Naturgesch. p. 236. n. 1. *der graue Würger, die Bergelster.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 83. n. 2. *der große europäische Neuntödter.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 162. n. 1. Lanius (Excubitor) cauda cuneiformi, lateribus alba, dorso cano, alis nigris, macula alba; *der Würger, Bergälster.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 335. n. 1. *der große graue Würger.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 376. n. 1. *der große graue Würger.* p. 382. *aschfarbiger Würger, großer blauer Würger, gemeiner Neuntödter, großer europäischer Neuntödter, Würgengel, Gebüschfalke, wilder Elster, Sperälster, Griegelster, wachender Würgvogel, grauer großer Aferfalke, Buschelster, Thornkrätzer, Thornkräfer, Walthée, Neunmörder, Wildwold, Krück-, Kruck- oder Krauselster, blauer Neuntödter, Krickelster.* Tab. 13.

Funke, Naturgesch. I. p. 290. *der graue Würger.*

Ebert,

- (4) Länge 10 u. $3\frac{1}{4}$ Zoll. Flügelweite 1 Fuß 3 Zoll. Gewicht 4 Loth. Nährt sich von Feldmäusen, Goldammern, Stieglitzen, Feldsperlingen, Finken, Zeisigen, Lerchen, Insekten, besonders Hirschkäfern, Rosskäfern, Heuschrecken, Maulwurfsgrillen u. dgl. Geht auch im Sommer auf Eidechsen, Blindschleichen u. s. w. Nistet in Wäldern und gebirgigen Gegenden auf hohen Bäumen, auf einzelnen Obstbäumen, die im Felde diesen Gegenden nahe liegen, und zwar auf den untersten Zweigen derselben, auch im Feldgesträuche. Brütet jährlich zweymal. Die Jungen kommen nach 15 Tagen aus.

- Ebert*, Naturl. II. p. 40. *der aschfarbige Neuntödter.*
- Halle*, Vögel, p. 220. n. 158. *der aschfarbne Würger von der ersten Größe.*
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 51. n. 49. *die Bergelster u. f. w.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 227. n. 43. *der große Würger, die Bergelster.*
- Neuer Schaupl. der Natur*, VI. p. 132. *der große aschfarbige Neuntödter.*
- Onomat. hist. nat.* I. p. 382. *Ampelis caerulefscens; der blaulichte Ottervogel, der Warvogel.*
- Handb. d. Naturgesch.* II. p. 198. n. 2. *der große graue Neuntödter.*
- Handbuch der deutschen Thiergesch.* p. 100. *der Würger.*
- Klein*, av. p. 53. n. 1. *Lanius cinereus maior.*
- Klein*, Vorbereitung, p. 101. n. 1. *der größte Aschgraue.*
- Klein*, verbeff. Vögelhist. p. 52. n. 26. *größester Neuntödter.*
- Klein*, Stemm. av. p. 9. Tab. 9. fig. 1. a. b. c.
- Klein*, Vögeleyer, p. 20. Tab. 5. fig. 9.
- Gesner*, Vögelb. p. 501. *der aschenfarbne Thornträer.*
- Briffon*, ornith. I. p. 197. n. 1. *Pie-grieche grife.*
- Büffon*, Vögel, II. p. 173. *der aschfarbige Würger.* Tab. 46.
- Büffon*, Vögel, XIII. p. 162.
- Batsch*, Thiere, I. p. 334 *der aschfarbige Würger.*
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 27. n. 39. *der Wächter.*
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 287. n. 37. *der Wächter, größte Neuntödter, Würgengel.*
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 69. n. 53. *großer Neuntödter.*

- Cetti*, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 52.
Neuntödter.
- Pontoppidan*, Naturgesch. von Dännemark, p. 166.
n. 1. *Hapax*.
- Pallas*, nord. Beyträge, III. p. 15. *der graue*
Neuntödter. IV. p. 25. Lanius Excubitor.
- Lapeirouse*, neue schwed. Abhandl. III. p. 102.
Lanius excubitor.
- Naturforsch. VIII. p. 60. n. 36. *der Wächter*.
- Naturforsch. XVIII. p. 232. Lanius Excubitor.
- Naturf. XXV. p. 16. *Neuntödter*.
- Meidinger*, Vorles. I. p. 114. n. 1. *der graue*
Würger, oder die Bergelster.
- Eberhard*, Thiergesch. p. 75. *der Neuntödter?*
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 16. n. 18.
der große Neuntödter, großer Dorndrähler.
- Linné*, auserles. Abhandl. II. p. 287. n. 54. *der*
Wächter.
- Naumann*, Vogelsteller, p. 126. *Krückelster*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 248. *der große Neun-*
tödter.
- Bechstein*, Musterung schädl. Th. p. 90. n. 41.
der große graue Würger.
- Beckmann*, Biblioth. VI. p. 52. *der graue Neun-*
tödter.
- Kraft*, Ausrott. graus. Thiere, I. p. 294. *Neun-*
Tödter, Wild- oder Krück-Elster.
- Jablonsky*, allg. Lex. p. 731. *Neuntödter*.
- Anweil. Vögel zu fangen, u. s. w. p. 417. *der*
Neuntödter.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 81. *Krück-Elster*.
- Tänzer*, notabil. venator. p. 137.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. II. p. 52. Lanius.
- Linné*, Syst. Natur. Edit. VI. p. 30. n. 3. Col-
lurio.

Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 94. n. 2. *Lanius* (Excubitor) cauda cuneiformi, lateribus alba, dorso cano, alis nigris, macula alba.

Kramer, Austr. p. 364. n. 4. *Ampelis caerulefcens*, alis caudaque nigricantibus; *Speralster*, *Griegelalster*, *Neuntödter*.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 11. n. 84. *Lanius* (Excubitor) cauda cuneiformi, lateribus alba, dorso cano, alis nigris, macula alba.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 291. *Lanius maior*; *ein Wan-Krengel*, *War-Krengel*, *Wurg-Engel*, *Neun-Mörder*, *Waldt-Herr*, *Waldt-Höher*.

Jonston, av. p. 24. *Collurio maior*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 216. n. 2. *der große Würger*.

β. ALBUS. *Eine weiße Spielart.*

Briffon, ornitholog. I. p. 198. A. *Lanius albus*.
Pie-grieche blanche.

Büffon, Vögel, II. p. 177. *ganz weiße Würger*.

Latham, Vögel, I. p. 147. n. 4. Var. B.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 68. γ. L. corpore toto albo.

Aldrov. av. I. p. 387. *Lanius albus*.

Jonston, av. p. 24. *Collurio totus albus*.

γ. MAIOR. *Eine größere Spielart.*

Briffon, ornithol. I. p. 198. n. 2. *grande Pie-grieche grise*.

Büffon, Vögel, II. p. 177. n. 61.

Latham, Vögel, I. p. 147. n. 4. Var. A.

Latham, Syft. ornithol. I. p. 68. β. *Lanius cinereus maior*.

12. COLLEURIO. Der Dorndreher. (5)

Müller, Naturfyft. II. p. 113. n. 12. der Finkenbeißer.

Leske, Naturgesch. p. 236. n. 2. der rothköpfige Würger; Finkenbeißer.

Borowsky, Thierreich, II. p. 84. der Dorndreher.
Blumen-

(5) Unter den zu dieser Gattung gehörigen Synonymen, und den dabey angenommenen Varietäten herrscht groſſe Verwechſelung, wie ich in den folgenden Noten anführen werde. Beſeke bemerkt ſehr richtig, daß die *Lanii* überhaupt noch viel zu wenig beobachtet ſind, und daß die Urfachen dieſes Mangels darin liegen, daß ſie nur einzeln leben, ſich daher ſelten zeigen, und als kleine unbedeutende Vögel den Jäger nicht aufmerkſam machen, wozu noch kommt, daß ſie ſich ſehr ſtill verhalten, und ſelten einmal ein Geſchrey machen, daher man ſie um ſo weniger gewahr wird. Die Größe des Dorndrehers iſt 8 Zoll, die Flügelweite 13 Zoll. Er gehört zu den angenehmſten Singvögeln, und ahmt andrer Vögel Stimme ſehr geſchickt nach. Zänkiſch iſt er wie alle ſeine Geſchlechtsverwandten, und beißt ſich immer mit Graſmücken, Goldammern u. dgl. Vögeln, die ſich ſeinem Revier nähern, herum, iſt aber zu ohnmächtig ſie zu tödten. Im May richtet er unter den Maykäfern, und im Sommer unter den Miſtkäfern, Feldgrillen, und Heuſchrecken groſſe Niederlagen an, ſpißt ſie häufig an die Dornen der Schwarz- und Weißdornſtaude, und hält davon ordentliche Mahlzeiten. Brütet jährlich zweymal, und baut ſich zu jeder Brut ein neues Neſt. Das Neſt iſt ziemlich groſſ, beſteht auswendig aus Wurzeln und groben Graſſtengeln, worauf eine Lage von Moos und Wolle, und dann die innere Ausfüterung aus lauter kleinen Wurzelfaſern folgt. Legt 5, ſeltener 6 weiſe, mit ſchmutzig gelben und aſchgrauen Pünktgen beſtreuete ſtumpfe Eyer, die in 14 Tagen von dem Weibchen ausgebrütet werden. Das Weibchen hat ſelt gar nichts von der Farbe des Männchens gemein, und dies iſt die Haupturſache der Verwirrung, die unter den Schriftſtellern bey dieſer Gattung angetroffen wird. *Bechſtein.*

- Blumenbach*, Handb. der Naturgesch. p. 162. n. 2; Lanius (Collurio) cauda subcuneiformi, dorso griseo, rectricibus quatuor intermediis unicoloribus, rostro plumbeo; *der Neuntödter*.
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 338. n. 4. *der Dorn-dreher*.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 392. n. 4. Lanius Spinitorquus; *der Dorndreher*. p. 399. *Dorntreter*, *kleiner bunter Würger*, *mandelbrauner Millwürger*, *blauköpfiger Würger*, *kleiner bunter Warkengel* oder *Würgengel*, *Dorndrechsler*, *rothgrauer kleinster Würger*, *schückiger Würger*, *singender Rohrwangel*, *singender Rohrwürger*, *großer Dornreich*, *Dornheher*, *Dorngreuel*, *kleiner Neuntödter*.
Tab. 16. fig. 1. 2.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 291. *der Neuntödter*, *Dorndreher*.
- Ebert*, Naturl. II. p. 42. *der Dorntreter*, *Dorndrechsler*.
- Halle*, Vögel, p. 224. n. 166. *der rothgraue kleinste Würger*.
- Gatterer*, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 53. n. 51. Lanius Spinitorquus; *der Dorntreter*, *Dorntraber*; u. s. w.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 229. n. 47. *der Würger mit dem rothen Rücken*, *der Finkenbeißer*.
- Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 372. *Dorntreter*.
- Onomat. hist. nat. II. p. 136. *Warkengel*, *oschfarbner Neuntödter*.
- Handb. der Naturgesch. II. p. 198. *der Wan-kengel*.
- Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 100. L. Collurio; *der Dorndreher*.

Klein, av. p. 53. n. 2. Lanius minor primo capite et collo cinereis, gutture et pectore incarnatis; alis et dorso ex aerugine et nigredine variegatis, rostro et pedibus nigris.

Klein, Vorbereitung, p. 102. n. 2. *kleiner bunter Wankrengel, Dorntraher.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 52. n. 27. *kleiner bunter Wankrengel.*

Klein, Vögeleyer, p. 20. Tab 5. fig. 8.

Klein, stemm. av. p. 9. Tab. 9. fig. 2. a. b.

Briffon, ornithol. I. p. 200. n. 4. Ecorcheur.

Büffon, Vögel, II. p. 192. *der kleinste bunte Würger.* Tab. 49.

Batsch, Thiere, I. p. 535. *der kleine bunte Würger oder Dorntraher.*

Latham, Vögel, I. p. 151. n. 15. *der Finkenbeißer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 52. Red-backed Shrike.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 69. n. ii. Lanius (Collurio) cauda subcuneiformi, dorso griseo, rectricibus 4. intermediis unicoloribus, rostro plumbeo.

Beseke, Vögel Kurl. p. 29. n. 41. *der Finkenbeißer.*

Fischer, Zus. z. Naturgesch. von Livland, p. 44. n. 491. *kleiner Neuntödter.*

White, Naturgeschichte von England, p. 37. *Neuntödter.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 289. n. 39. *der Finkenbeißer, größter rother Neuntödter, Rothkopf.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 25. Lanius Collurio.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 17. n. 19. *der kleine Neuntödter, Dorndreher.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 252. *der kleine Neuntödter, Dorntreter.*

Nau, Entdeck. a. d. Naturgesch. I. p. 248. Lanius Collurio.

Bechstein, Musterung schäd. Thiere, p. 93. n. 44. *der Dornröcher*.

Naturforsch. VIII. p. 61. n. 38. *der Finkenbeißer*.
Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Freunde,
VII. p. 450. n. 13. *der Finkenbeißer*.

Goeze, nützl. All. II. p. 159. n. 10. *der Neuntöchter*.

Lapeirouse, neue schwed. Abhandl. III. p. 102.
Lanius Collurio.

Tengmalm, neue schwed. Abh. II. p. 100.

Linné, Syst. Natur, Edit. VI. p. 30. n. 2. Lanius.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 94. n. 3. Lanius (Collurio) cauda subcuneiformi, dorso griseo, rectricibus quatuor intermediis unicoloribus, rostro plumbeo.

Müller, zool. dan. prodr. p. 11. n. 85. Lanius (Collurio) cauda subcuneiformi, dorso griseo, rectricibus quatuor intermediis unicoloribus, rostro plumbeo.

Kramer, Austr. p. 363. n. 2? *Dorngraul, Dornheher*.

Brünnich, ornith. bor. p. 8. n. 23. 24. Collurio.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 292. Lanius minor varius. Spinitorquus minor; *kleiner bunter Wankrengel, klein Wankrengel, Dornträger*.

Hermann, tab. affin. animal. p. 180. Lanius Collurio.

Johnston, av. p. 107. Merulae congener?

Moehring, av. gen. p. 28. n. 1. Collyrio.

Gerin, ornith. I. p. 73. Tab. 55. fig. 8.

β. VARIUS. *Der bunte Dorndreher.* (6)

Halle, Vögel, p. 224. n. 165. *der singende Rohrwürger.*

Klein, av. p. 54. n. 10. *Lanius arundinum.*

Klein, av. p. 186. *Passer arundinum.* *Lanius arundinum.*

Klein, Vorbereit. p. 103. n. 10. *singender Rohrwürangel.*

Klein, Vorbereit. p. 340. *Rohrsperling.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 53. n. 35. *singender Rohrwürangel.*

Briffon, ornith. I. p. 201. n. 5. *Ecorcheur varié.*

Büffon, Vögel, H. p. 194. *der schäckige Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 152. n. 16. *der bunte Würger.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 70. β. *Lanius griseus, subtus rufescens, striis fuscis, scapularibus albo nigroque dimidiatis, rectricibus exterioribus 3 basi apiceque, extima extus rufo-albis.*

Lapeirouse, neue schwed. Abhandl. III. p. 103.

γ. RUFUS. *Der rothköpfige Würger.* (7)

Müller, Naturyst. Supplem. p. 71. n. 30. *der Schwarzhörige.*

N 3

Borowsky,

(6) Nach Klein, Halle, Briffon u. a. eine eigne Gattung, wofür ihn auch Latham in der Synops. anfänglich annahm, der aber im Syst. ornith. seine Meynung geändert hat, und mit Büffon eine Spielart daraus macht.

(7) In Ansehung dieser Varietät sind die Meynungen der Ornithologen sehr getheilt. Einige nehmen den Dorndreher und diesen rothköpfigen Würger nur als dem Geschlecht (Sexus) nach von einander verschieden an; einige stellen beyde als bloße Spielarten auf; andere als Büffon, Briffon, Zorn, Klein, Latham,

Borowsky, Thierreich, II. p. 83. n. 3. *der rothköpfige Würger.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 337. n. 3. *der rothköpfige Würger.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 387. *der rothköpfige Würger.* p. 392. *der mittlere Neuntödter, Krückelster, Rothkopf, große rothe Neuntödter, Finkenwürguvogel.* p. 390. *Finkenbeißer.* Tab. 15.

Funke, Naturgesch. I. p. 290. *der rothköpfige Würger, Finkenbeißer.*

Ebert, Naturl. II, p. 41. *der Finkenbeißer.*

Halle, Vögel, p. 223. n. 162. *der rothköpfige Würger der zwoten Größe.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 52. *Lanius Collurio; der Finkenbeißer.*

Neuer

Latbam, *Halle*, *Bechstein* u. a. m. betrachten beyde als wesentlich von einander verschiedene Gattungen. Ist dies letztere, so hält es bey denenjenigen, die nur einer Gattung erwähnt, und die andere übergangen haben, sehr schwer zu entscheiden, welche gemeint sey, weil man mehrentheils Synonymen, Charaktere und Beschreibung verwechselt, oder gar vermengt hat. Unter den Neuern hat *Bechstein* die Beschreibung von beyden umständlich geliefert. Ihm nach beträgt die Länge des *rothköpfigen Würgers* 8 Zoll, und die Flügelweite 1 Fuß 3 Zoll. Er beißt sich mit allen Vögeln, die in seiner Nachbarschaft wohnen, besonders aber mit Elstern, und im Herbst und Frühjahr mit Finken herum, lernt auch, wie der Dorndreher, den Gesang der meisten Vögel nachsingen, und hat auch die Nahrung mit denselben gemein. Er nistet in Wäldern, Feldern und Gärten auf hohen Bäumen in dichte Zweige, (*häufig auch in Dornhecken*) baut ein großes Nest von Pflanzenstengeln, Moos, Gras, Schweinsborsten, Wolle und Haaren, und legt gewöhnlich 6 weißliche, ins Grüne schillernde, besonders am stumpfen Ende mit bräunlichen, bläulichen, und blafs-röthlichen Flecken besetzte Eyer, die in 15 Tagen ausgebrütet werden.

Neuer Schaupl. der Natur, VI. p. 133. *der rothköpfige Neuntödter.*

Onomat. histor. nat. I. p. 382. *der graue Ottervogel.*

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 100. Lanius leucopis; *Finkenbeißer.*

Klein, av. p. 53. n. 3. Lanius minor rutilus.

Klein, Vorbereit. p. 102. n. 3. *kleiner rostiger Neuntödter.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 52. n. 28. *kleiner rostiger Neuntödter.*

Klein, Vögeleyer, p. 20. Tab. 5. fig. 7.

Briffon, ornitholog. I. p. 199. n. 3. *Pie-grieche rousse.*

Büffon, Vögel, II. p. 186 *der rothköpfige Würger.* Tab. 48. M. u. W.

Batsch, Thiere, I. p. 335. *der rothköpfige Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 153. n. 17. *die Waldkatze, der Rothkopf.*

Latham, Synopf. Suppl. p. 169. 17 Woodchat,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 70. n. 12. Lanius (Rutilus) supra tricolor, subtus rufescente-albus, scapularibus totis, rectricibus a basi ad medium, lateralibus apice albis, fascia oculari nigra.

White, Naturgesch. von England, p. 41. *eine set-nè Varietät des Neuntödters.*

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 166. n. 2. *Tornskade.*

Naturforsch. VIII. p. 61. n. 39. *kleiner rother Neuntödter.*

Meidinger, Vorles. I. p. 114. n. 2. *der rothköpfige Würger oder Finkenbeißer.*

Zorn, Petinoth. II. p. 251. *der mittlere Neuntödter.*

Bechstein, Musterung schäd. Thiere, p. 92. n. 43.
der rothköpfige Würger.

Tänzer, notabil. venator. p. 137.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 292. *Lanius minor rutilus*; ein kleiner rother Wankrengel, rother Wankrengel.

Gerin. ornith. I. p. 74. Tab. 56.

δ. SENEGALENSIS. Der rothe senegalische Würger. (8)

Biffon, Vögel, II. p. 195. Tab. 49. der rothe senegalische Würger.

Latham, Vögel, I. p. 153. n. 17. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 71. β.

ε. MELANOCEPHALUS. Der schwarzköpfige senegalische Würger.

Biffon, Vögel, II. p. 195. der schwarzköpfige senegalische Würger.

Latham, Vögel, I. p. 154. n. 7. Var. B.

Latham, System. ornithol. I. p. 71. γ.

ζ. ANTIGUANUS. Der Würger aus Antigua.

Latham, Vögel, I. p. 155. n. 20. der Würger aus Antigua.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 72. n. 16. *Lanius* (Antiguanus) cauda cuneiformi, corpore flavo-rufo, iugulo pectoraque albo, capite, remigibus caudaque nigris, rectricibus laterali-bus apice rufis.

η. NIGER. Der schwarze Würger aus Jamaika.

Latham, Vögel, I. p. 166. n. 38. der schwarze Würger aus Jamaika.

Latham,

8) Nach *Latham*, nebst dem folgenden, Spielarten von seinem *Lanius Rutilus*, oder *Lan. Collur. Rufus* unsers Systems.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 73. n. 21. Lanius (Niger) cauda subcuneiformi, corpore nigricante, remigibus secundariis extus margine fuscis.

31. LEVERIANUS. *Der leverianische Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 170. n. 49. *der leverianische Würger.*

Latham, Syn. Suppl. p. 54. Magpie-Shrike.

Latham, Syft. ornith. I. p. 73. n. 10. Lanius (Piscatus) cauda cuneiformi, corpore albo nigroque vario, rectricibus omnibus apice albis.

32. ATRICAPILLUS. *Der surinamische Würger mit schwarzem Scheitel.*

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 73. n. 19. Lanius (Atricapillus) cauda cuneiformi, et vertice, cervice, humeris aliisque nigris, corpore supra murino, subtus caerulefcente - cinereo.

33. POMERANUS. *Der pommerische Würger.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 70. ad n. 12. (als Spielart von *Lanius rutilus*, oder *Lan. Colurio Rufus* unfers Systems.)

13. TYRANNUS. *Der Titiri oder Pipiri. (9)*

Müller, Naturfyft. II. p. 114. n. 13. *der Würger.*

N 5

Borowsky,

(9) Ich habe das Citatum aus *Pennant* arct. zool. zur folgenden Varietät γ . gezogen, wohin es, mir wenigstens, nach allen Umständen, und selbst nach den, vom *Pennant*, aus *Latham*, *Catesby* und *Büffon* angeführten Synonymen zu gehören scheint, ob gleich *Pennant* auch das Synonym aus *Briffon* mit dazu rechnet. Aber der *rote Strich*, der den Scheitel des Vogels der Länge nach theilt, scheint mir das entscheidende Merkmal zu seyn, und die von *Pennant* aus

Catesby

Borowsky, Thierreich, II. p. 82. n. 1. *der tyrannische Würger*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 340. n. 5. *der tyrannische Würger*.

Onomat. histor. nat. IV. p. 665. *der kleine amerikanische Neuntödter, die rothköpfige Drossel*.

Briffon, ornithol. I. p. 267. n. 18. Tyrann.

Büffon, Vögel, II. p. 245. *der tyrannische Würger*.

Büffon, Vögel, XIV. p. 124. *Titiri oder Pipiri* m. 1 Fig. *der schwarzköpfige Pipiri*.

Batsch, Thiere, I. p. 335. *der tyrann. Würger*.

Latham, Vögel, I. p. 164. n. 37. *der Tyrann*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 84. n. 53. *Lanius* (Tyrannus) cinereus, subrus albus, vertice nigro, stria longitudinali fulva.

Linné, auserlesene Abhandl. II. p. 281. n. 19. *der Wütrich Neuntödter*.

Samml. zur Phys. und Naturgesch. III. p. 116. *der Titiri oder Pipiri*.

Meidinger, Vorles. I. p. 114. n. 2. *der tyrannische Würger*,

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 94. n. 4. *Lanius* (Tyrannus) vertice nigro, stria longitudinali fulva.

Hermann, tab. affin. anim. p. 180. L. Tyrannus.

Donn-

Catesby unständig mitgetheilte Beschreibung bestätigt solches noch mehr. Auch *Latham* führt den Pennant bey dieser Varietät γ an; ich kann daher nicht begreifen, warum er *Kleins Turdus corona rubra* zum *Titiri* rechnet, da doch *Klein* selbst *Catesby Tyrann of Carolina* angeführt hat. *Latham* gedenkt auch der *rothen Kopfplatte* nicht, und in der *Seligmannschen* Zeichnung vormisse ich die weißen Schwanzfeder-spitzen. Die Stellen aus *Catesby* und *Klein* führt *Briffon* bey dem *Titiri* an, und gedenkt also der Spielart aus *Carolina* gar nicht.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 218. n. 4.
der Tyrann.

β. *DOMINICENSIS.* *Der Tyrann von Domingo.* (9)

Briffon, ornith. I. p. 267. n. 19. *Tyrann de St. Domingue.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 126. *der Tyrann von St. Domingo.*

Latham, Vögel, I. p. 165. A. *der Tyrann von St. Dominick.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 84. n. 53. β. *Lanius griseo-fuscus*, subtus albus, pectore cinerasciente, rectricibus extus et apice rufescentibus.
Samml. zur Phys. u. Naturgesch. III. p. 117.

γ. *CAROLINENSIS.* *Der Tyrann aus Carolina.* (10)

Pennant, arct. Zool. II. p. 358. n. 180. *der Tyrann.*
Klein, av. p. 69. n. 25. *Turdus corona rubra.*

Klein, Vorbereit. p. 131. n. 25. *rothköpfige Drossel.*

Klein, verbess. Vögelhist, p. 69. n. 25. *rothköpfige Drossel.*

Büffon, Vögel, XIV. p. 131. *der carolinische Tyrann*; m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 10. *der Fliegenstecher mit rother Platte.*

Latham, Vögel, I. p. 165. B. *der Tyrann aus Carolina.*

Latham,

(9) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

(10) Kommt in Neuyork im April an, legt 5 weisse rothfarbig gefleckte Eyer, baut in niedrigen Büschen, (der *Fitiri* in Baumlöcher und dickbelaubte Zweige) macht ein Nest aus Wolle und etwas Moos, mit Federn ausgefütert, verläßt das Land wieder im August, und beobachtet die nämliche Wanderzeit in den südlichen Provinzen, (*Pennant.*)

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 83. γ. *Lanius cinereus*, subtus albus, capite caudaque nigris, rectricibus apice albis.

Samml. zur Phys. u. Naturgesch. III. p. 117. *der carolinische Tyrann*.

δ. *LUDOVICIANUS*. *Der Tyrann aus Louisiana*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 359. n. 181. *der louisianische Tyrann*.

Büffon, Vögel, XIV. p. 133. 141. *der louisianische Tyrann*.

Latham, Vögel, I. p. 166. C. *der Tyrann aus Louisiana*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 82. δ. *Lanius plumbeus*, subtus albus, remigibus albo marginatis, rectrice extima latere exteriori, omnibus apice albis.

Samml. zur Physik u. Naturgesch. III. p. 118. *der louisianische Tyrann*.

14. *SCHACH*. *Der Schach*.

Müller, Naturfyst. II. p. 115. n. 14. *der Schach*.

Onomat. histor. natur. IV. p. 664. *der gelblichte Würger von China*.

Büffon, Vögel, II. p. 248. *der Schach*.

Latham, Vögel, I. p. 156. n. 22. *der Schach*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 75. n. 25. *Lanius* (Schach) *lutescens*, fronte alisque nigris.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 94. n. 6. *Lanius* (Schach) *corpore lutescente*, fronte alisque nigris.

15. *PITANGUA*. *Der Pitangua*.

Müller, Naturfyst. II. p. 15. n. 15. *Pitangua*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 662. *der Pitanga Guecus aus Brasilien*.

Briffon,

Briffon, ornith. I. p. 269. n. 23. *Tyrann du Brésil.*

Büffon, Vögel, II. p. 249. *der brasilische Tyrann,*

Pitangua.

Büffon, Vögel, XIV. p. 134. *der Pitangua Tyrann; m. 1, Fig.*

Latham, Vögel, I. p. 167. n. 39. *der Pitangua.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 78. n. 42. *Lanius (Pitangua) niger; subtus flavus; vertice stria fulva, fascia oculari alba.*

Samml. zur Phys. u. Naturgesch. III. p. 118. der Bentaveo oder Cuiriri.

Jonston, av. p. 210. *Pitangua Guacu Brasiliensibus.*

17. RUFUS. *Der braunrothe madagaskarische Würger.*

Müller, Naturfyftem, II. p. 116. n. 17. *der rothe Neuntödter.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 663. der rothe Würger aus Madagascar.

Briffon, ornithol. I. p. 207. *Pie-grieche rousse de Madagascar.*

Büffon, Vögel, II. p. 224. *der braunrothe Würger von Madagaskar. Tab. 56.*

Latham, Vögel, I. p. 161. n. 31. *der braunrothe Würger.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 77. n. 35. *Lanius (Rufus) rufus, subtus albidus, capite nigrovirescente.*

Gerin, ornith. I. p. 75. Tab. 59. fig. 1.

18. BARBARUS. *Der Gonolak.*

Müller, Naturfyft. II. p. 116. n. 18. *der Schwarze.*

Briffon, ornith. I. p. 209. n. 20. *Pie-grieche rouge de Senegal.*

Büffon,

Büffon, Vögel, II. p. 230. *der rothe senegalische Würger.* Tab. 58.

Latham, Vögel, I. p. 156. n. 23. *der Würger aus der Barbarey.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 79. n. 45. Lanius (Barbarus) niger, subtus ruber, vertice femoribusque fulvis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 179. *Gonolak.*

Gerin. ornith. I. p. 75. Tab. 61. fig. 1.

19. **SULPHURATUS.** *Der schwefelgelbe Würger.*

Müller, Naturfyst. II. p. 116. n. 19. *der Gelbe.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 665. *der gelbe Würger aus Cayenne.*

Briffon, ornitholog. I. p. 206. n. 15. *Pie-grieche jaune de Cayenne.*

Büffon, Vögel, II. p. 216. *der großschnäblichte Würger von Kayenne, mit gelbem Bauche.* Tab. 54.

Latham, Vögel, I. p. 167. n. 40. *der schwefelgelbe Würger.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 79. n. 43. Lanius (Sulphuratus) fuscus, subtus flavus, capite nigricante, fascia ambiente albida.

Gerin, ornith. I. p. 74. Tab. 58. fig. 1.

20. **CAYANUS.** *Der graue cayennische Würger.*

Müller, Naturfyst. II. p. 117. n. 20. *der Cayennische.*

Müller, Naturfyst. Supplem. p. 72. n. 31. *der Schwarzkopf.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 653. *der graue cayennische Würger.*

Briffon, ornithol. I. p. 201. n. 6. *Pie-grieche grise de Cayenne.*

Büffon,

Büffon, Vögel, II. p. 214. *der graue groß-*
schnäblichte Würger von Cayenne. Tab. 53.

Latham, Vögel, I. p. 168. n. 41. *der graue cayen-*
nische Würger.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 80. n. 47. *Lanius*
(Cyanus) cinereus, capite, remigibus re-
ctricibusque primoribus nigris.

β. *NAEVIUS.* *Der geschäckte cayennische Wür-*
ger. (1)

Briffon, ornithol. I. p. 202. n. 7. *Pie-grieche tä-*
chetée de Cayenne.

Büffon, Vögel, II. p. 214. *der gefleckte oder*
schäckige cayennische Würger.

Latham, Vögel, I. p. 168. A. *der gefleckte ca-*
yennische Würger.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 80. n. 47. β. *La-*
nus cyanensis naevius.

γ. *Spotted Cayenne Shrike.* *Latham*, Syn. Suppl.
p. 54. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 80. n. 47. γ. *Variat*
corpore minore, fronte flavescente, abdomine
griseo unicolore, macula aurium rufa.

21. *SENEGALUS.* *Der graue senegalische Wür-*
ger. (2)

Müller, Naturfyst. II. p. 117. n. 21. *der Asch-*
graue.

Onomat. hist. nat. IV. p. 664. *der graue Würger*
aus Senegal.

Briffon, ornitholog. I. p. 203. n. 10. *Pie-grieche*
grise du Sénégal.

Büffon,

(1) Nach *Briffon* eine eigene Gattung.

(2) Nach *Büffon* eine Spielart von *Lanius Excubitor.*

- Büffon*, Vögel, I. p. 179. *der graue Würger von Senegal.*
- Latham*, Vögel, I. p. 148. n. 6. *der senegalsche Würger.*
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 75. n. 24. *Lanius (Senegalus) griseus, subtus albidus, vertice fasciaque oculari nigris, rectricibus nigris, apice albis.*
- Gerin*. ornith. I. p. 75. Tab. 61. fig. 1.
22. **MADAGASCARIENSIS.** *Der Calic-Calic.*
- Müller*, Naturfyft. II. p. 117. n. 22. *der kleine Madagaskarische.*
- Onomat. hist. nat. IV. p. 661. der kleine Würger aus Madagaskar.*
- Briffon*, ornithol. I. p. 203. n. 9. *petite Pie-grieche de Madagascar.*
- Büffon*, Vögel, II. p. 232. *der kleine grüne madagaskarische Würger; m. 1 Fig.*
- Latham*, Vögel, I. p. 157. n. 24. *der Würger aus Madagaskar.*
- Latham*, Syst. ornith. I. p. 79. n. 46. *Lanius (Madagascariensis) cinereus, subtus albidus, superciliis albis, loris nigris, rectricibus rufescentibus.*
3. **EMERIA.** *Der rothgeschwänzte bengalische Würger.*
- Müller*, Naturfyftem, II. p. 118. n. 3. *der Bengalische.*
- Onomat. histor. natur. V. p. 370. der bengalische Fliegenfänger.*
- Briffon*, ornitholog. I. p. 206. n. 14. *Pie-grieche brune de Bengale.*
- Büffon*, Vögel, II. p. 207. *der rothgeschwänzte bengalische Würger.* Tab. 51.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 85. indianisches Rothschwänziem, indianischer Brustwenzel.

Latham, Vögel, I. p. 157. n. 25. der bengalische Würger.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 74. n. 23. Lanius (Emeria) subcristatus griseus, subtus albus, temporibus, abdomine uropygioque albis.

27. BICOLOR. Der blaue madagascarische Würger.

Müller, Natursystem, II. p. 558. n. 42. der madagascarische Kernbeißer.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 71. n. 28. der Zweifarbig.

Briffon, ornitholog. I. p. 212. n. 26. Pie-grieche bleue de Madagascar.

Büffon, Vögel, II. p. 181. der blaue Würger von Managaskar. Tab. 47. fig. 2.

Latham, Vögel, I. p. 160. n. 29. der blaue Würger.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 75. n. 26. Lanius (Bicolor) cauda subaequali, supra caerulefcens, subtus albus, capillro nigro.

Gerin. ornith. I. p. 75. Tab. 60. fig. 1.

28. LEUCORHYNCHOS. Der weißschnäblige Würger.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 71. n. 27. der Weißbürzel. Lanius Leucorinus.

Müller, Natursyst. Suppl. p. 74. n. 34. der schwarze Neuntödter. Lanius Angrajen.

Briffon, ornithol. I. p. 207. n. 17. Pie-grieche de Manille.

Büffon, Vögel, II. p. 211. der Würger von den manillyschen Inseln. Tab. 52. fig. 1.

Latham, Vögel, I. p. 162. n. 33. *der Würger mit weißem Schnabel.*

Latham, Syft. ornith. I. p. 77. n. 38. Lanius (Leucorhynchus) niger, rostro, pectorè, abdomine uropygioque albis.

Gerin. ornith. I. p. 75. Tab. 62.

34. **FERRUGINEUS.** *Der Würger mit rostigrothem Bauche.*

Latham, Vögel, I. p. 149. n. 8. *der Würger mit rostigrothem Bauche.*

Latham, Syn. Supplem. p. 51. Ferrugineous-bellied Shrike.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 76. n. 33. Lanius (Ferrugineus) nigricans, iugulo pectoreque albis, uropygio fusco, abdomine crissoque ferrugineis.

35. **TABUENSIS.** *Der tabuanische Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 149. n. 9. *der tabuanische Würger.*

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 76. n. 34. Lanius (Tabuanus) olivaceo-fuscus, iugulo pectoreque cinereis, abdomine flavescence-fusco, remigibus nigris, cauda fusca.

36. **PACIFICUS.** *Der Würger vom stillen Ocean.*

Latham, Vögel, I. p. 149. n. 10. *der Würger vom stillen Ocean.*

Latham, Syft. ornith. I. p. 75. n. 28. Lanius (Pacificus) niger, capite colloque virescentibus, abdomine remigibus caudaque nigricantibus.

37. **SEPTENTRIONALIS.** *Der nordamerikanische Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 150. n. 11. *der Nord-Amerikanische Würger.*

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 76. n. 30. Lanius (Septentrionalis) fuscus, gula et pectore cinereis, rectricibus 3 exterioribus extus apice albis.

38. VIRIDIS. *Der Tcha-chert.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 72. n. 32. *der grüne Neuntödter.*

Briffon, ornitholog. I. p. 212. n. 25. Pie-grieche verte de Madagascar.

Büffon, Vögel, II. p. 211. *der Würger von Madagascar.* Tab. 52. fig. 2.

Latham, Vögel, I. p. 160. n. 30. *der grüne Würger.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 75. n. 27. Lanius (Viridis) obscure viridis, subtus albus, rectricibus lateralibus nigricantibus, latere exteriori viridi.

39. LEUCOCEPHALOS. *Der weißköpfige Würger.*
(Tcha-chert-Be.)

Briffon, ornithol. I. p. 211. n. 24. grande Pie-griechische verte de Madagascar.

Büffon, Vögel, II. p. 227. *der große grünliche Würger von Madagascar.*

Latham, Vögel, I. p. 161. n. 32. *der weißköpfige Würger.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 77. n. 36. Lanius (Leucocephalus) nigro-virefcens, capite, collo corporeque subtus albis.

Gerin. ornith. I. p. 75. Tab. 59. fig. 2.

40. DOMINICANUS. *Der schwarze Würger von St. Domingo.* (3)

Latham, Vögel, I. p. 162. n. 33. A. *der Dominikaner-Würger.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 78. B. Lanius niger, abdomine uropygioque albis.

(3) Nach *Latham* eine Varietät von *L. leucorhynchus*.

41. PANAYENSIS. *Der rothe Würger von Panaya.*
Latham, Vögel, I. p. 163. n. 34. *der rothe Würger von Panaya.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 78. n. 40. *Lanius* (Panayensi) fuscus, capite, gula, iugulo, pectore abdomineque rubris.
42. ALBUS. *Der weiße Würger aus Panaya.*
Latham, Vögel, I. p. 168. n. 42. *der weiße Würger aus Panaya.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 77. n. 37. *Lanius* (Albus) albus, tectricibus alarum maioribus reetricibusque nigris, fascia alarum alba.
43. VARIUS. *Der Würger mit weißen Schultern.*
Latham, Vögel, I. p. 168. n. 43. *der Würger mit weißen Schultern.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 73. n. 39. *Lanius* (Varius) cinereo-fuscus, iugulo pectoreque flavescens, abdomine fusco-albo, macula humerali alba.
44. NAEVIUS. *Der gefleckte Würger.*⁽⁴⁾
Latham, Vögel, I. p. 169. n. 45. *der gefleckte Würger.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 81. n. 51. *Lanius* (Naevius) niger, subtus cinereus, dorso, alis caudaque albo maculatis.
45. OBSCURUS. *Der dunkelfarbige Würger.*
Latham, Vögel, I. p. 170. n. 46. *der dunkelfarbige Würger.*
Latham,

(4) Ist nicht mit der gefleckten Spielart von *Lanius Cayanus*, n. 20. zu verwechseln.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 81. n. 52. Lanius (Obscurus) nigricans, abdomine superciliisque albis.

46. FUSCUS. *Der braune Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 170. n. 47. *der braune Würger.*

47. RUBER. *Der rothe surinamische Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 170. n. 48. *der rothe surinamische Würger.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 78. n. 41. Lanius (Ruber) ruber, alis caudaque ocellatis, apice nigris.

48. AMERICANUS. *Der schwarzköpfige amerikanische Würger?* (5)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 228. n. 44. *der Schwarzkopf.*

49. MINOR. *Der kleine graue Würger.* (6)

Bechstein, Naturgesch. I. p. 336. n. 2. *der kleine graue Würger.*

O 3

Bech-

(5) Pennant und Latham rechnen ihn zu *Lanius Ludovicianus*.

(6) Nach Buffon eine Spielart von *Lanius Excubitor*, welches jedoch Bechstein aus eignen Erfahrungen bestreitet. Länge 9 Zoll. Flügelweite 14 Zoll. Fliegt sanft und schön, und schwimmt leicht wie ein Falk in der Luft. Ist ein Zugvogel. Nährt sich vermuthlich mehrentheils von allerley Käfern, wenigstens hat man ihn nicht so häufig nach den Vögeln stossen gesehen, als den grossen grauen Würger. Nistet in Gärten auf Obstbäumen. Bauet ein grosses unregelmässiges Nest, d. s. äusserlich eine Anlage von Wolle und grünen Kräutern hat, die nach der Mitte zu mit Wolle durchwirkt sind; inwendig ist es mit Wolle und grossen und kleinen Federn dicht ausgefuttert. Legt gewöhnlich sechs rundliche, grünlich

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 382. n. 2. der kleine graue Würger. p. 387. der kleine aschgraue Neuntödter, die kleine Bergelster. Tab. 14.

Pennant, arct. Zool. II. p. 231. B. der kleinere graue Würger.

Büffon, Vögel, II. p. 179. der italienische Würger.

Latham, Vögel, I. p. 171. n. 50. der kleine graue Würger.

Latham, Syst. ornith. I. p. 71. n. 13. Lanius (Italicus) cauda cuneiformi, apice alba, corpore cinereo, subtus albido, fronte fasciaque oculari nigris, remigibus nigris, macula alba.

Latham, Syn. Suppl. p. 54. Lesser grey Shrike.

Bechstein, Musterung schäd. Th. p. 91. n. 42. der kleine graue Würger.

Gerin. ornith. I. p. 72. Tab. 54.

50. NATKA. *Der Würger aus Natkasund.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 229. n. 46. der Würger aus Natkasund.

Latham, Vögel, I. p. 172. n. 52. der Nootka.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 80. n. 48. Lanius (Nootka) niger, superciliis, gula, collari rectricibusque alarum maioribus albis, remigibus secundariis rectricibusque quatuor extimis apice albis.

51. MELANOCEPHALOS. *Der schwarzköpfige Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 150. n. 12. der schwarzköpfige Würger. Tab. 7.

Latham,

grünlich weisse violet und braun gefleckte Eyer, die Männchen und Weibchen in 15 bis 16 Tagen wechselsweise ausbrüten.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 76. n. 29. Lanius (Melanocephalos) olivaceus, capite nigro, cauda fascia lata nigra, apice alba.

52. BRACHYURUS. *Der kurzschwänzige Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 150. n. 13. *der kurzgeschwänzte Würger.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 76. n. 32. Lanius (Brachyurus) supra cinereo-griseus, subtus flavescens, fascia oculari nigra, superciliis retractibusque lateralibus apice albis.

Pallas, Reise, Ausz. III. Anh. p. 3. n. 5. Lanius brachyurus.

53. PHOENICURUS. *Der Würger mit rothbraunem Schwanze.*

Latham, Vögel, I. p. 51. n. 14. *der Würger mit rothbraunem Schwanze.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 71. n. 14. Lanius (Phoenicurus) rufo-griseus, subtus albo-flavescens, cauda elongata uropygioque rufis, fascia per oculos nigricante.

Pallas, Reise, Ausz. III. p. 185. *der kleine rothschwänzige Neuntödter.*

Pallas, Reise, Ausz. III. Anh. p. 4. n. 6. Lanius phoenicurus.

16. DOLIATUS. *Der schwarz und weiße Würger.*

Müller, Natursyst. II. p. 116. n. 16. *der gereifte Neuntödter.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 165. n. 2. *schwarz und weißer Neuntödter.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 657. *der schwarz und weiße Würger.*

Briffon, ornitholog. I. p. 210. n. 21. *Pie-grieche rayée de Cayenne.*

Büffon, Vögel, II. p. 198. *der surinamische schwarz und weiße Neuntödter.*

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 5. *der schwarz u. weiße Neuntödter.*

Latham, Vögel, I. p. 169. n. 64. *der bunte cayanische Würger.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 80. n. 50. *Lanius (Doliatus) cauda rotundata, corpore albo nigroque, confertim subfasciato.*

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 92. *der schwarz und weiße Fleischervogel.*

24. **Iocosus.** *Der Spassvogel.* (7)

Müller, Natur syst. II. p. 118. n. 24. *der Spottvogel.*
Onomat. hist. nat. V. p. 180. *Merula Sinensis cristata minor.*

Briffon, ornith. I. p. 229. n. 22. *Petit merle hupé de la Chine.*

Büffon, Vögel, II. p. 250. *der chinesische gehäubte Würger.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 317. *die kleine gehäubte Ansel von China; m. 1 Fig.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 73. n. 22. *Lanius (Iocofus) cauda cuneiformi, capite cristato, corpore griseo, palpebra inferiore purpurea, ano sanguineo.*

25. **INFAUSTUS.** *Der Unglücksvogel.* (8)

Müller, Natur syst. II. p. 119. *der Unglücksvogel.*
Borowsky,

(7) *Latham* rechnet hieher auch die *Sitta Chinenfis*, Linn. S. N. p. 442. n. 8.

(8) Im Syst. ornithol. hat *Latham* diesen Vogel unter das Rabengegeschlecht aufgenommen, und den *Corvus Sibiricus*, Linn. S. N. p. 373. n. 36. mit dazu gerechnet. Ueberhaupt muß ich

- Borowsky*, Thierreich, II. p. 84. n. 4.
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 53. n. 52. *der Unglücksvogel, Steinrötel, Gertraudsvogel, Bergamsel.*
Pennant, arch. Zoolog. II. p. 241. F. *der Unglücksvogel, Steinrötel.*
Onomat. hist. nat. V. p. 179. *die Bergamsel.*
Klein, av. p. 70. n. 32. *Turdus f. Merula saxatilis.*
Klein, Vorbereit. p. 132. n. 32. *Bergamsel.*
Klein, verbesserte Vögelhist. p. 69. n. 32. *Bergamsel.*
Gesner, Vögelb. p. 448. *Steinrötelein.*
Briffon, ornith. I. p. 224. n. 13. *Merle de Roche.*
Büffon, Vögel, II. p. 252. *der Unglücksvogel.*
Latham, Vögel, I. p. 158. n. 27. *der Unglücksvogel, die Stein-Amsel.*
Latham, Syst. ornith. I. p. 159. n. 22. *Corvus (Infaustus) dorso cinereo, rectricibus rufis, intermediis duabus cinereis fascia nigricante, cauda rotundata.*
Lepetchin, Tageb. d. russ. Reise, II. p. 5. *Steinmerlen?*

O 5

Pontop.

ich bemerken, daß unter den Synonymen dieser Gattung, der dahin gerechneten Varietät, und des *Turdus Saxatilis* p. 833. n. 114. große Verwechslung herrscht; so, daß die Ornithologen darüber mit sich selbst oft nicht einig sind. *Latham* setzte in der Synops. den *Lanius infaustus* unter die *Würger*, und nahm, wie in unserm System, die *Steinamsel* als eine Spielart davon an. In dem Syst. ornithol. setzt er, wie schon gesagt, den *L. Infaustus* unter die *Raben*, macht aus der *Steinamsel* eine eigne Gattung unter den *Drosseln*; zieht *Gmelins Lanius Infaustus* und *Turdus Saxatilis*, unter seinen *Turdus Infaustus* p. 335. n. 32. und rechnet dazu die Synonymen aus *Brünnich*, *Olin. Raj. Albin.* und *Büffon*. Einige sehen auch den *Lanius infaustus* Linn. als das Weibchen von *Turdus Saxatilis* Linn. XII. p. 294. n. 14. an, u. s. w.

- Pontoppidan*, Naturg. von Dännemark, p. 166. n. 9. *Unglücksvogel*, *Gertraudsvogel*.
- Pontoppidan*, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 142. *Gertruds-fugl*.
- Linné*, auserl. Abhandl. II. p. 288. n. 58. *die Unglücksrabe*.
- Lapeirouse*, neue schwed. Abhandl. III. p. 103. *Lanius infaustus*.
- Tengmalm*, neue schwed. Abh. III. p. 112. *Lanius infaustus*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 107. n. 12. *Corvus (Infaustus) dorso cinereo, rectricibus rufis, intermediis duabus cinereis, fascia nigricante*.
- Linné*, Fn. Suec. I. p. 187. *Turdus rectricibus rufis, duabus intermediis cinereis, fascia nigricante, proximis apice cinereis*.
- Müller*, zool. dan. prodr. p. 12. n. 93. *Corvus infaustus*.
- Hermann*, tab. affin. animal. p. 179. 200. *Lanius infaustus*.
- Donndorff*, Handb. der Thiergesch. p. 218. n. 5. *der Unglücksvogel*.

β. MINOR. *Der kleinere Unglücksvogel.* (9)

- Müller*, Naturfyft. II. p. 534. n. 14. *die Steinmerle*.
- Borowsky*, Thierreich, III. p. 168. n. 7.
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 396. n. 325. *die Steinamsel*, *Steinröthel*.
- Onomat. histor. natur.* VII. p. 634. *die Steindrossel*, *oder blauköpfige rothe Amsel*.
- Klein*, av. p. 67. n. 8. *Turdus ruber, cyaneo capite*.
- Klein*, Vorber. p. 126. n. 8. *blaue Drossel*, *blauköpfige rothe Drossel*.

Klein,

(9) S. die vorhergehende Anmerkung.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 67. n. 15. *blauköpfige rothe Drossel*.

Briffon, ornithol. I. p. 225. n. 14. *petit Merle de roche*.

Büffon, Vögel, IX. p. 75. *die Steinamsel*.

Batsch, Thiere, I. p. 342. *die Steinamsel*.

Latham, Vögel, I. p. 159. A. *der kleinere Unglücksvogel, die kleinere Steinamsel*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 336. n. 33. *Turdus (Saxatilis) capite caeruleo, cauda ferruginea*.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 414. n. 69. *Steinmerle*.

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 94. n. 137. *Steinmerle*.

Naturforsch. XVII. p. 83. n. 169. *Steinmerle*.

Lapeiroussé, neue schwed. Abhandl. III. p. 108. *Turdus Saxatilis*.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 163. n. 199. *die Steindrossel*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 55. *Stein-Amsel*.

Forst-Fisch- u. Jagdlexicon, I. p. 88. *Steinamsel*.

Linné, Syst. Natur. Edit. XII. I. p. 294. n. 14. *Turdus (Saxatilis) capite caeruleo, cauda ferruginea*.

Kramer, Austr. p. 360. n. 2. *Turdus capite caeruleo, cauda ferruginea. Steinröthl.*

26. FAUSTUS. *Der Glücksvogel.*

Müller, Naturf. II. p. 119. n. 26. *der Glücksvogel.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 658. *der chinesische Würger*.

Büffon, Vögel, II. p. 254. *der Glücksvogel*.

Latham, Vögel, I. p. 160. n. 28. *der Glücksvogel*.

A. *Veränderungen gegen die XIIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 134. n. 5. *Lanius Macrourus.* p. 842. n. 2. *Colius Senegalensis.*

In der XII. Edition hat dies Geschlecht 26 Gattungen; in der XIII. 53 es ist also hier um 27 Gattungen stärker. Da aber die fünfte Gattung aus der XII. Edit. in ein anderes Geschlecht versetzt, und an deren Stelle ein anderer Vogel gesetzt worden, so beträgt sich die Anzahl der neu hinzugekommenen Vögel auf 28. Ueberdem sind bey der 11ten Gattung *drey*, bey der 12ten *fünf*, bey der 13ten *vier*, bey der 20ten *zwey*, und bey der 25ten gleichfalls *zwey* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Ein dem Lanius Excubitor ähnlicher Vogel.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 28. n. 40.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der Würger mit schwarzer Mütze; (in Cayenne.)*

Latham, Vögel, I. p. 171. n. 51.

Latham, Syn. Suppl. p. 54. Black-capped Shrike.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 76. n. 31. Lanius (Pileatus) cristatus cinerescens, capite, iugulo pectoreque nigris, tectricibus alarum albo fasciatis, cauda apice nigra.

2. *Der malabarische Würger.*

Latham, Vögel, I. p. 172. n. 53. Tab. 8.

Latham, Syn. Supplem. p. 56. Malabar Shrike. Tab. 108.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 66. n. 2. *Lanius* (Malabaricus) caeruleo niger, remigibus caudaque nigris, rectricibus extremis utrinque longissimis denudatis, apice latere exteriori pennatis.

Sonnerat, voy. Ind. II. Tab. III. Gobe-mouche de Malabar.

3. *Der Boulboul*; (in Indien.)

Latham, Vögel, I. p. 173. n. 54.

Latham, Syn. Suppl. p. 57. Boulboul Shrike.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 80. n. 49. *Lanius* (Boulboul) niger, pectore abdomineque cinerascens, alis fuscis, fasciis duabus albidis.

4. *Der orangefarbne Würger aus Cayenne.*

Latham, Vögel, I. p. 173. n. 54.

Latham, Syn. Suppl. p. 57. Orange Shrike.

Latham, Syst. ornith. I. p. 79. n. 44. *Lanius* (Aurantius) fulvo flavus, gula pectoreque rufescentibus, capite supra oculos nuchaque nigris, rectricibus alarum, remigibus caudaque fuscis.

5. *Der rothbraune amerikanische Würger mit weißer Kehle.* (10)

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 69. n. 9. *Lanius* (Americanus) rufo-fuscus, subtus flavescens, pileo griseo, remigibus caudaque nigris, gula rectricumque apicibus albis.

Buffon, pl. enl. 397. Pie-grieche de la Louisiane.



Latham rechnet das Geschlecht *Lanius* unter die Ordnung *Picae*.

ZWEYTE

(10) Das angeführte Synonym von *Buffon* rechnet *Gmelin* im System p. 296. zu *Lanius Ludovicianus*, n. 6. *Latham* trennt



ZWEYTE ORDNUNG.

P I C A E. (*Spechtartige Vögel.*)45. GESCHLECHT. PSITTACUS. *Der Papagey, Sittig.*

Müller, Naturfyst. II. p. 121. Gen. XLV.

Leske, Naturgesch. p. 238. Gen. XIV.

Borowsky, Thierreich, II. p. 86. Gen. V.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 163.
Gen. V.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 341. Gen. V.

Halle, Vögel, p. 110.

Neuer Schaupl. der Natur, VI. p. 319.

Onomat. hist. nat. VI. p. 650.

Klein, av. p. 24. Gen. I.

Briffon, ornithol. II. p. 93. Gen. LIII.

Büffon, Vögel, XIX. p. tot.

Batsch, Thiere, I. p. 300. Gen. LIII.

Latham, allg. Ueberf. d. Vögel, I. p. 174. Gen. V.

Latham, Syst. ornith. I. p. 82. Gen. V.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 218. Gen. V.

Hermann, tab. affin. anim. p. 181.

* *Langschwänzige, mit keilförmigem Schwanze.*

1. MACAO. *Der Aras.*

Müller, Naturfystem, II. p. 126. n. 1. *westindischer Rabe.* Tab. 28. fig. 1.

Leske, Naturgesch. p. 239. n. 1. *der westindische Papagey.*

Borowsky,

es davon, macht eine eigne Gattung daraus, läßt *Gmelins L. Americanus* p. 308. n. 48. eingehen, und nimmt *Pennants Bluck-crowned Shrike* zu seinem *Ludovicianus*.

- Borowsky*, Thierreich, II. p. 89. n. 2. *der westindische Rabe, rothe Papagey.*
- Blumenbach*, Handb. der Naturgesch. p. 164. n. 1. *Psittacus (Macao) macrourus ruber, remigibus supra caeruleis, subtus rufis, genis nudis rugosis; der Aras, indianische Rabe.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 167. *der westindische Papagey.*
- Bechstein*, Naturg. I. p. 342. n. 1. *der westindische Papagey.*
- Funke*, Naturgesch. I. p. 334. *der indianische Rabe.*
- Ebert*, Naturl. II. p. 47. *indianische Raben.*
Tab. 23. fig. 2.
- Halle*, Vögel, p. 113. n. 20. *der flachköpfige Papagey, roth mit blauen Flügelschuppen.*
- Onomat. hist. nat.* VI, p. 683. *der rothblaue grofse Papagey.*
- Klein*, av. p. 24. n. 1. *Psittacus alter Aldr. Macao w f. Macao.*
- Klein*, Vorbereit. p. 46. n. 1. *der andre Papagey.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 25. n. 1. *rother Papagey vom ersten Range mit blauen Flügeln und Schwanz.*
- Gesner*, Vögelb. p. 466. *Erythrocyanus; mit 1 Figur.*
- Brisson*, ornith. II. p. 94. n. 1. *Ara du Brésil.*
- Buffon*, Vögel, XIX. p. 218. *der grofse rothe Ara; m. 1 Fig.*
- Seligmann*, Vögel, VI. Tab. 53. *rother Papagey vom ersten Range mit blauen Flügeln und Schwanz.*
- Latham*, Vögel, I. p. 175. n. 1. *der Aras, der indianische Rabe.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 83. n. 1. Pfittacus (Macao) macrourus ruber, remigibus supra caeruleis, subtus rufis, genis nudis rugosis.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 192. n. 42. westindischer, indianischer Rabe.

Bankroft, Naturgesch. v. Guiana, p. 93. der roth und blaue Markaw.

Fermin, Besch. von Surinam, II. p. 153. die erste Art.

Schlözer, Erdbeschreib. von Amer. p. 684 der Moaw.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 19. n. 21. der rothe Papagey von der ersten Größe mit himmelblauen Flügeln und Schwanze.

Bock: Naturforsch. IX. p. 40. n. 41. westindischer Rabe.

Goeze: Naturf. XIX. p. 80. westindischer Rabe.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 18. n. 1. Pfittacus cauda cuneiformi, temporibus nudis rugosis.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 96. n. 1. Pfittacus (Macao) macrourus ruber, remigibus supra caeruleis, subtus rufis, genis nudis rugosis.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 343. Pfittacus Erythrocyanus; ein rothblauer Papagey, oder Sittich, Papagey von mancherley Farben.

Barrere, Franc. equinox. p. 145. Pfittacus puniceus.

Du Tertre, hist. des Antill. II. p. 247. Arras.

Lery, Voy. au Bresil. p. 170. Arras.

Rocheport, hist. des Antill. p. 154. Arras.

Jonston, av. p. 38. Pfittacus Erythrocyanus Gesneri.

Gerin. ornith. I. p. 93. Tab. 102.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 219. n. 1. der Arras.

52. ARACANGA. *Der Aracanga.* (1)

Halle, Vögel, p. 113. n. 27. *der rothe Papagey mit der Schnabelmaske.*

Klein, av. p. 24. n. 3. *Psittacus capite caeruleo.*

Klein, Vorbereitung, p. 46. n. 3. *der bunte mit dem himmelblauen Kopfe.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 25. n. 3. *Blaukopf vom ersten Range.*

Gesner, Vögelbuch, p. 465. *rothgelber Sittich.*

Briffon, ornitholog. I. p. 95. n. 2. *Ara de la Jamaïque.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 219. 236. *der kleine rothe Ara; in. I Fig.*

Latham, Vögel, I. p. 176. n. 2. *der roth und gelbe Makao.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 83. n. 2. *Psittacus (Aracanga) macr. dilute coccineus, scapularibus luteis, viridi terminatis, remigibus supra caeruleis, subtus rufis, genis nudis coccineis.*

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 94. *der roth und gelbe Mackaw.*

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 343. *Psittacus Erythroxaanthus; ein geelber Sittich, Sickenst der viel gelbes auff den Flügeln hat.*

Charleton, exercit p. 74. n. 15. *Psittacus erythroxaanthus.*

Jonston, av. p. 38. *Erythroxaanthus Gesneri.*

2. MI-

(1) Nach *Büffon* u. a. eine Varietät; — nach *Latham* vielleicht ein Jung r vom vorigen. Die Synonymien zwischen beyden werden häufig verwechselt.

2. MILITARIS. *Der große grüne Aras.* (2)

Müller, Naturfyst. II. p. 127. n. 2. *der grüne Husar.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 256. *der große grüne Ara des Edwards*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 177. n. 3. *der militärische Makao.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 83 n. 3. Pfittacus (Militaris) macr. viridis, alis caeruleis, fronte caudaque rubris, genis nudis, lineis plumosis.

Bankroft, Naturg. v. Guiana, p. 95. *der größte Papagey von Guiana, Akushe.*

3. ARARAUNA. *Der blau und gelbe Aras.*

Müller, Naturfyst. II. p. 127. n. 3. *der blaugelbe Rabe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 342. n. 2. *der Regenbogenpapagey.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 88. n. 1. *der Regenbogenpapagei.*

Halle, Vögel, p. III. n. 22. *der blau und gelb mondirte Papagey mit langem Schwanze und Knebelbarte.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 664. *der große blaue und gelbe Papagey.*

Klein, av. p. 24. n. 4. Pfittacus vertice viridi, caudae cyanea.

Klein, Vorbereit p. 46 n. 4. *Papagey mit dem grünen Scheitel, und lasurblauem Schwanze.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 25 n. 4. *Grünmütze mit blauem Schwanze vom ersten Range.*

Briffon, ornithol. II. p. 96. n. 4. *Ara bleu et jaune du Brésil.*

Büffon,

(2) Im System ist das Vaterland dieses Vogels nicht angegeben, *Latham* vermuthet Guiana. Sollte *Bankrofts Akushe* wirklich hierher gehören?

Buffon, Vögel, XIX. p. 298. *der blaue Ara*;
m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 54. *der blau und gelbe Papagey vom ersten Range*.

Latham, Vögel, I. p. 178. n. 4. *der blau und gelbe Makao*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 83. n. 4. *Psittacus* (Ararauna) macr. supra caeruleus, subtus luteus, genis nudis, lineis plumosis.

Fermin, Surinam, II. p. 153. *der blaue Aras*.

Bankroft, Guiana, p. 93. *der blau- und gelbe Makaw*.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 20. n. 22. *der Papagey mit dem grünen Scheitel und lachtblaunem Schwänze*.

Linne, Syst. Natur. Edit. VI. p. 18. n. 2. *Psittacus cauda cuneiformi, temporibus nudis, lineis plumosis*.

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 96. n. 2. *Psittacus* (Ararauna) macrourus, subtus caeruleus, genis nudis, lineis plumosis.

Schwenkfeld, aviar. Sil.-f. p. 343. *Psittacus cyano-croceus; ein rothgelber Papagey*.

Charleton, exercit. p. 74. n. 1. *Psittacus maximus cyano-croceus*.

Barrere, fr. equinox. p. 145. *Psittacus maximus alter Jonstonii*.

Jonston, av. p. 36. *Psittacus maximus cyano-croceus*.

Gerin. ornith. I. p. 94. Tab. 103.

β. CAERULEUS. *Der blaue Aras.* (3)

Klein, av. p. 24. n. 2. *Psittacus caeruleo-luteus*.

P 2

Klein,

(3) Nach *Klein*, *Briffon* u. a. eine eigne Gattung.

Klein, Vorbereit. p. 46. n. 2. *der Himmelblaus gelblichte.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 25. n. 2. *Blau und gelber vom ersten Range.*

Briffon, ornithol. II. p. 96. n. 3. *Ara bleu et jaune de la Jamaïque.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 238. *der blau und gelbe Ara von Jamaika.*

Latham, Vögel, I. p. 179. A. *der blaue Makao.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 84. β. *Pfittacus macr. supra cyaneus, subtus croceus, genis nudis candidis, rectricibus supra cyaneis, subtus croceis.*

53. MAKAWUANNA. *Der Makawuanna.*

Latham, Vögel, I. p. 179. n. 5. *der Papagey-Makao.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 84. n. 6. *Pfittacus (Makavouanna) macr. viridis, genis nudis, subtus rufescens, abdomine virescente, remigibus caeruleis, apicibus extus fuscis.*

Büffon, Vögel, XX. p. 78. *der Araparkit; m. I Figur.*

54. ATER. *Der schwarze Aras.*

Latham, Vögel, I. p. 180. n. 6. *der schwarze Makao.*

Latham, -Syst. ornithol. I. p. 84. n. 7. *Pfittacus (Ater) macr. nigricans, viridi-splendidissimus, rostro oculisque rubentibus, pedibus flavis.*

4. OBSCURUS. *Der dunkelbraune Papagey.*

Müller, Naturst. II. p. 128. n. 4. *der braune Papagey.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 688. *der braune Papagey.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 89. *brauner Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 280. n. 7. *der dunkelbraune Papagey.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 84. n. 8. Pfittacus (Obscurus) macr. fuscus, genis nudis rubris, vertice cinereo - nigricante vario, cauda cinerea.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 97. n. 3. Pfittacus (Obscurus) macrourus viridis, genis nudis, vertice cinereo-nigrescente vario, cauda cinerea.

5. NOBILIS. *Der edle Papagey.*

Müller, Naturfyft. II. p. 129. n. 5. *der Amazon.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 687. *der edle Papagey.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 267. *Linnés grüner Papagey, mit nackten Backen und rothen Schultern.*

Latham, Vögel, I. p. 180. n. 8. *der edle Papagey.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 85. n. 9. Pfittacus (Nobilis) macr. viridis, genis nudis, humeris coccineis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 97. n. 4. Pfittacus (Nobilis) macrourus viridis, genis nudis, humeris coccineis.

6. SEVERUS, *Der Maracana.*

Müller, Naturfyft. II. p. 130. n. 6. *der grüne Brasilianische.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 89. n. 3. *der grüne brasilianische Ara.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 694. *der große grüne Brasilianische Papagey.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 162. n. 1. *grüner Papagey mit blauem Scheitel und rothem Schwanz.*

Briffon, ornitholog. II. p. 98. n. 6. *Ara verd du Brésil.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 245. *der grüne Ara;*
m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 10. *der Brasilianische grüne Papagey mit blauer Scheitel und roth m Schwanz.*

Latham, Vögel, I. p. 181. n. 9. *der Brasilianische grüne Makao.*

Lotham, Synopf. Suppl. p. 58. *Brasilian green Maceaw.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 85. n. 10. *Psittacus (Severus) macr. viridis, genis nudis, remigibus rectricibusque caeruleis, subtus purpurascens.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 21. n. 23. *der grüne Papagey mit unten rothen Flügeln und Schwanz.*

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 97. n. 5. *Psittacus (Severus) macrourus viridis, genis nudis, remigibus rectricibusque caeruleis, subtus purpurascens.*

β. Briffon, ornitholog. II. p. 99. n. 7. *Ara verd et rouge du Brésil. (eigne Gattung.)*

7. EUPATRIA. *Der Papagey aus Gingi.*

Müller, Natursystem, II. p. 130. n. 7. *die Edeldame.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 676. *die Edeldame.*

Briffon, ornitholog. II. p. 136. n. 64. *Perruche de Gingi.*

Büffon,

Büffon, Vögel, XIX. p. 174. *der große Sittich mit röthlichen Flügeln*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 182. n. 10. *der Papagoy aus Gingi*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 85. n. 11. Psittacus (Eupatria) macr. viridis, subtus flavicans, collo inferiore cinerascente - viridi, rectricibus alarum minoribus macula rubra.

8. JAPONICUS. *Der japanische Papagey.*

Müller, Naturyst. II. p. 131. n. 8. *Japanische*.

Onomat. histor. nat. VI. p. 680. *der japanische Papagay*.

Briffon, ornitholog. II. p. 141. n. 71. *Perruche du Japon*.

Büffon, Vögel, XIX. p. 181. *der grün und rothe Sittich*.

Latham, Vögel, I. p. 182. n. 11. *der japanische Papagoy*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 86. n. 12. Psittacus (Japonicus) macr. viridis, subtus rectricibusque lateralibus ruber, remigibus caeruleis.

Charleton, exercit. p. 74. n. 11. Psittacus erythrochlorus macrourus.

Forstner, av. p. 38. Psittacus erythrochlorus macrourus.

9. AMBOINENSIS. *Der Papagey aus Amboina.*

Müller, Naturyst. II. p. 131 n. 9. *der Amboinische*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 664. *der Amboinische Papagay*.

Briffon, ornithol. I. p. 146. n. 79. *Perruche rouge d'Amboine*.

Büffon, Vögel, XIX. p. 128. *der dreifarbige Sittich-Lori*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 185. n. 12. *der Papagoy aus Amboina.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 86. n. 13. *Psittacus (Amboinensis) macr. coccineus, dorso caeruleo, alis macula viridi, rectricibus violaceis.*

10. **CYANOCEPHALUS.** *Der blauköpfige Papagey.*

Müller, Naturyst. II. p. 131. n. 10. *der Blaukopf.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 673. der Blaukopf.

Briffon, ornithol. II. p. 140. n. 70. *Perruche à tête bleue.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 143. *der Sittich mit dem blauen Kopfe; m. 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. p. 183. n. 13. *der blauköpfige Papagoy.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 86. n. 14. *Psittacus (Cyanocephalus) macr. viridis, capite gulaque caeruleis.*

Gerin. ornith. II. p. 20. Tab. 129.

50. **HAEMATOTUS.** *Der rothbrüstige Papagey.*

Müller, Naturyst. Supplem. p. 73. n. 6. *b. der Blutpapagey.*

Briffon, ornithol. II. p. 141. n. 72. *Perruche variée d'Amboine.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 158. *der Sittich mit dem blauen Gesichte; m. 1 Fig.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 163. n. 4. *rothbrüstiger Papagey.*

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 17. *der rothbrüstige Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 184. n. 14. *der Papagoy mit rother Brust.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 87. n. 17. *Psittacus (Haematotus) macr. viridis, pectore rubro, facie caerulea, lunula cervicis flava,*

β. Der

β. *Der Papagey mit orangefarbner Brust.*

Latham, Vögel, I. p. 185. n. 14. Var. A. *der Papagey mit orangefarbner Brust.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 87. n. 17. β. Psittacus macr. viridis, pectore rubro flavo vario, capite, gula abdomineque medio caeruleis.

γ. *Der blaubäuchige Papagey.*

Buffon, Vögel, XIX. p. 161. *der blaubäuchige Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 185. n. 14. Var. B. *der Papagey mit blauem Bauche.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 87. n. 17. γ. Psittacus macr. viridis, pectore rubro, flavo vario, capite, gula abdomineque toto caeruleis.

δ. *Blue-bellied Parrot.* Latham, Syn. Supplem. p. 59. C. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 87. n. 17. δ. Psittacus praecedenti similis, pennis scapularibus rubro flavoque maculatis, nuchae margine rubentibus.

55. ATRICAPILLUS. *Der schwarzköpfige Papagey.*

Halle, Vögel, p. 121. n. 45. *der blaubunte orientalische Papagai, mit grün- und rothem Halsringe.*

Briffon, ornitholog. II. p. 97. n. 5. Ara varié des Moluques.

Buffon, Vögel, XIX. p. 178. *der große Sittich mit der schwarzen Kopfbinde; m. 1 Fig.*

Klein, Vorber. p. 47. n. 16. *mit dem schwarzen Kopfe und grünen Kragen, Loeri genannt.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 20. *Schwarzkopf mit grünem Halsbande.*

Latham, Vögel, I. p. 185. n. 15. *der Schwarzköpfige Papagey.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 88. n. 18. *Pſittacus* (*Atricapillus*) *macr. caeruleus, subtus viridis, rubro variegatus, pileo nigro, iugulo pectoreque rubris.*

56. *TABUENSIS. Der Papagey aus Taboa.*

Latham, Vögel, I. p. 186. n. 16. *der Papagey aus Taboa; Tab. 16.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 88. n. 19. *Pſittacus* (*Tabuensis*) *macr. viridis, capite, collo pectoreque subtus purpureo-coccineis, cervice basi lunula caerulea, remigibus rectricibusque caeruleis.*

β. *Pſ. macr. viridis, capite, collo corporeque subtus coccineis, lunula cervicis, uropygioque caeruleis, alis viridibus, cauda fusca. **

Latham, Syst. ornith. I. p. 88. n. 19. β.

57. *PAPUENSIS. Der Papagey aus Papua.*

Latham, Vögel, I. p. 186. n. 17. *der Lory aus Papua.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 88. n. 20. *Pſittacus* (*Papuenſis*) *macr. ruber, alis caudaque viridibus, nucha caerulea, cervice lunulis 2. nigris, rectricibus femorum, maculaque ad basin alarum flavis.*

β. *Latham*, Vögel, I. p. 187. n. 17. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 88. n. 20. β. *Pſittacus taenia abdominis transversa nigra margine viridi.*

γ. *Latham*, Vögel, I. p. 187. n. 17. Var. B.

Latham, System. ornithol. I. p. 89. γ. *Psittacus* coccineus, dorsi parte posteriore caeruleo-atra, macula inter alas viridi.

δ. *Latham*, Vögel, I. p. 187. n. 17. Var. C.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 89. δ. Pf. abdominis medio viridi.

11. BORNEUS. *Der Papagey aus Borneo.*

Müller, Natursystem, II. p. 132. n. 11. *der roths Parkit.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 666. *der rothe Parkit.*

Briffon, ornith. II. p. 144. n. 77. Perruche rouge de Borneo.

Büffon, Vögel, XIX. p. 124. *der rothe Sittich-Lori*; m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 68. *der langgeschwänzte Scharlach-Lory.*

Latham, Vögel, I. p. 188. n. 18. *der Lory aus Borneo.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 89. n. 21. *Psittacus* (Borneus) macr. ruber, remigibus rectricibusque apice viridibus, alis macula caerulea, orbitis fuscis.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 97. n. 6. *Psittacus* (Borneus) macrourus, ruber, remigibus rectricibusque apice viridibus, alis macula caerulea.

38. INDICUS. *Der indianische Papagey.*

Briffon, ornith. II. p. 145. n. 78. Perruche rouge des Indes.

Büffon, Vögel, XIX. p. 126. *der violet und rothe Sittich-Lori*; m. 1 Fig.

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 188. n. 19. *der indianische Lory*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 89. n. 22. *Psittacus* (Coccineus) macr. coccineus, subtus fusco violaceoque varius, capite et collo superioribus, pectore et taenia pone oculos caeruleo violaceis, remigibus rectricibusque violaceo-fuscis.

59. ELEGANS. *Der prächtige Papagey*.

Latham, Vögel, I. p. 189. n. 20. *der prächtige Papagey*.

Latham, Syst. ornitholog. p. 89. n. 23. *Psittacus* (Elegans) macr. fuscus, pennis rubro viridique marginatis, capite, collo pectoreque subtus coccineis, humeris, remigum rectricumque marginibus caeruleis.

β. *Latham*, Vögel, I. p. 189. n. 20. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 90. n. 23. β. *Psitt.* viridis, capite, collo pectoreque coccineis.

60. GUEBIENSIS. *Der Papagey von der Insel Gueby*. (4)

Büffon, Vögel, XIX. p. 118. *der rothe und violette Lory*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 189. n. 21. *der Lory aus Gueby*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 90. n. 24. *Psittacus* (Guebiensis) macr. coccineus, pectore, interscapulis abdomineque purpureis, hoc saturatione, remigibus nigris fascia rubra.

61. JAN-

(4) Nach *Latham* gehört auch die folgende Gattung als eine Spielart mit hierher.

61. JANTHINUS. *Der violette Papagey.*⁽⁵⁾

Latham, Vögel, I. p. 190. n. 21. Var. A. *der violette Lory.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 90. n. 24. β . *Psitt. macr. coccineus*, pectore abdomineque violaceis, scapularibus caeruleis, alis caudaque viridibus, rubro mixtis.

Fermin, Surinam, II. p. 155. *der violenblaue Papagey.*

62. VARIEGATUS. *Der bunte Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 190. n. 22. *der bunte Lory.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 90. n. 25. *Psittacus (Variegatus) macr. coccineus*, dorso anteriore corporeque subtus purpureo-caeruleis, remigibus intus flavis, cauda viridi.

63. NOVAE GUINEAE. *Der Papagey von Neu-Guinea.*

Latham, Vögel, I. p. 191. *der schwarze Lori.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 91. n. 27. *Psittacus (Novae Guineae) macr. caeruleo nigricans nitidus*, orbitis nudis fuscis, cauda subtus rubra.

64. JAVANICUS. *Der Papagey aus Java.*

Briffon, ornitholog. II. p. 146. n. 80. *Perruche rouge lupée de Java.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 163. *der gehaubte Sittich.*

Latham, Vögel, I. p. 192. n. 25. *der javanische Parkit.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 92. n. 29. *Psitt. (Bontii) macr. coccineus*, gula grisea, alis et scapu-

(5) S. die vorhergehende Anmerkung.

scapularibus viridi variis, rectricibus lateralibus
roseis, apice caeruleis.

Bont. ind. orient. p. 63. Psittacus parvus.

65. JANDAYA. *Der Jandaya.*

Halle, Vögel, p. 126. n. 59. das bläulich-gelbe
Papagaychen.

Briffon, Vögel, XX. p. 51 der Jandaya.

Briffon, ornithol. II. p. 152. n. 91. petite Perru-
che jaune du Bresil.

Latham, Vögel, I. p. 193. n. 26. der Jandaya.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 92. n. 30. Psittacus
(Jendaya) macr. viridis, capite, collo abdo-
mineque flavis.

Jonston, av. p. 201. Jendaya.

12. SOLSTITIALIS. *Der gelbe Papagey aus
Angola.*

Müller, Natursystem, II. p. 132. n. 12. der gel-
be Angolische.

Onomat. hist. nat. VI. p. 696. der langschwänzige
gelbe Papagay.

Halle, Vögel, p. 120. n. 43. der gelbe lang-
schwänzige Papagai.

Klein, av. p. 25. n. 15. Psittacus croceus, cauda
longa, oculis in circulo rubro, extremis remi-
gibus et penna infima caudae caeruleis.

Klein, Vorbereit. p. 47. n. 15. der Saffrangel-
be, mit einem langen Schwanze, rothem Zir-
kel um die Augen, bey dem die äußersten Ru-
derfedern, und die unterste Feder am Schwanz-
ze himmelblau sind.

Klein, verb. Vögelhist. p. 26. n. 18. Gelber lang-
geschwänzter, um die Augen roth, die äußer-
sten Schwing edern, und die untersten am
Schwanzes blau.

Briffon,

Briffon, ornithol. II. p. 144. n. 76. Perruche jaune d'Angola.

Büffon, Vögel, XIX. p. 148. *der gelbe Sittich*; m. I Fig.

Latham, Vögel, I. p. 193. n. 27. *der gelbe Papagoy aus Angola*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 93. n. 31. Pfittacus (Solstitialis) macr. luteus. alarum tectricibus viridibus, orbitis rubris, rectricibus lateralibus extus caeruleis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 97. n. 7. Pfittacus (Solstitialis) macrourus luteus, alarum tectricibus viridibus, cauda forficata.

66. GUAROUBA. *Der Guiaruba. (Quijubatui.)*

Halle, Vögel, p. 127. n. 63. *das ganz gelbe Papagaichen, mit dunkelgrünen Schwungfedern*.

Büffon, Vögel, XX. p. 71. *der Guaruba, oder der gelbe Parkit*; m. I Fig.

Briffon, ornithol. II. p. 14. n. 74. Perruche jaune du Brésil.

Latham, Vögel, I. p. 194. n. 28. *der Guarouba*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 92. n. 32. Pfittacus (Luteus) macr. luteus, remigibus maioribus viridibus.

Gerin. ornith. II. p. 18. Tab. 122.

Jonston, av. p. 202. Quijubatui.

β. MEXICANUS. *Der mexicanische Guiaruba.*

Halle, Vögel, p. 132. n. 71. *der langschwänzige rothköpfige Mexikanerpapagai*.

Briffon, ornithol. II. p. 143. n. 75. Perruche jaune du Mexique.

Büffon, Vögel, XX. p. 73. *der gelbe Parkit von Mexiko*.

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 194. n. 28. Var. A. *der mexikanischen Guarouba.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 93. n. 32. β . *Pfittacus macr. luteus*, capite rubescente, collo aurantio-rubro, tectricibus alarum viridi rubro et aurantio variegatis, remigibus viridibus.

13. *CAROLINENSIS.* *Der carolinische Papagey.* ⁽⁶⁾

Müller, Natursyst. II. p. 132. n. 13. *der grüne Carolinische.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 231. n. 48. *der carolinische Papagey.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 669. *der grüne Papagey aus Carolina.*

Klein, av. p. 25. n. 19. Pf. *Carolinensis.*

Klein, Vorbereit. p. 48. n. 19. *der Karoliner.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 23. *Grüner, mit rothem Kopfe und gelbem Halse.*

Briffon, ornithol. II. p. 138. n. 67. *Perruche de la Caroline ou des Amazones.*

Büffon, Vögel, XX. p. 74. *der Parkit mit gelbem Kopfe; m. 1 Fig.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 22. *der Papagey aus Carolina.*

Latham, Vögel, I. p. 195. n. 29. *der Papagey aus Carolina.*

Latham, Syn. Supplem. p. 59. *Carolina Parrot.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 93. n. 33. *Pfittacus (Carolinensis) macr. viridis*, capite, collo genibusque luteis.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 22. n. 25. *der grüne Papagey mit gelbem Kopfe, Halse und Schenkel.*

Fermin,

(6) Nach *Latham* gehört der *Pfittacus Ludovicianus* p. 347. n. 126. unsers Systems mit hierher.

Fermin, Surinam, II. p. 156. die siebente Art.

Schöpf, Reise durch Nordamerika, II. p. 386.
die kleinen.

Linné, auserles. Abb. II. p. 279. n. 2. der Caro-
linische Papagey.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 97. n. 8. Psittacus
(Carolinensis) macrourus viridis, capite, col-
lo genisque luteis.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 220. n. 2.
der carolinische Papagey.

14. ALEXANDRI. *Der Alexanderspapagey.*

Müller, Naturfyft. II. p. 133. n. 14. der Krage-
papagey.

Borowsky, Thierreich, II. p. 94. n. 14. der grün-
gelbe Parkit.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 164. n. 2.
Psittacus (Alexandri) macrourus viridis, colla-
ri pectoreque rubro, gula nigra.

Halle, Vögel, p. 124. n. 51. das grüne Papagai-
chen der Alten.

Onomat. hist. nat. VI. p. 661. der grünelbe Pa-
pagay mit rothm Halskragen.

Briffon, ornitholog. II. p. 130. n. 55. Perruche à
collier. (7)

Büffon, Vögel, XIX. p. 131. der große Sittich
mit dem lebhaft rothen Halsbande; m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 82. obere Fig. der
Papagey mit einem Halsstreif.

Latham, Vögel, I. p. 200. n. 37. Alexanders Pa-
pagoy.

Latham,

(7) *Latham* rechnet dies Synonym zur folgenden Varietät β ,
und die im System angeführten Synonymen aus dem *Mus.*
Ad. Frid. und *Anoen. acad.* zur Varietät γ .

- Latham*, Syft. ornitholog. I. p. 97. n. 46. Pfittacus (Alexandri) macr. viridis, collari rubro, gula nigra, macula alarum purpurea.
- Hasselquist*, Reise nach Palästina, p. 292. n. 17. Pfittacus (Cubicularis) cauda cuneiformi, digito interiore postice truncato.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 23. n. 26. *der grüne Papagey mit rothem Halse und Brust.*
- Linné*, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 97. n. 9. Pfittacus (Alexandri) macrourus viridis, collari pectoreque rubro, gula nigra.
- Schwenkfeld*, aviar. Siles. p. 343. Pfittacus viridis, torque miniaceo; *ein grünger Papagey, mit ein pomerantzenfarben Zirkel umb den Hals.*
- Charleton*, exercit. p. 74. n. 10. Pfittacus torquatus macrourus antiquorum.
- Jonston*, av. p. 38. Pfittacus torquatus macrourus.
- Plin.* hist. nat. L. X. c. 41. 42. Pfittacus.
- Dandorff*, Handb. der Thiergesch. p. 220. n. 3. *der Alexanderspapagey.*
- β. *Müller*, Naturfyft. II. p. 135. *b. ostindianischer grüner Papagey.* (8)
- Büffon*, Vögel, XIX. p. 165. *der Sittich mit der rosenrothen Halsbinde; m. 1 Fig.*
- Latham*, Vögel, I. p. 201. n. 37. Var. A. *Alexanders Papagey mit rosenrothem Halsbande.*
- Latham*, Syft. ornitholog. I. p. 98. β. Pfittacus macr. viridis, gula nigra, collari roseo, cervice caerulefcente.
- Gerin.* ornith. II. p. 18. Tab. 123.

γ. *Bris-*(8) Nach *Büffon* eine eigne Gattung.

- γ. *Briffon*, ornitholog. II. p. 131. n. 56. Perruche à collier des Indes. (9)
- Latham*, Vögel, I. p. 202. n. 37. Var. B. *Alexanders Papagoy mit purpurfarbnem Halsbande.*
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 98. γ. *Psittacus macr. viridis, gula nigra, vertice caeruleo-viridi, collari purpureo, iugulo pectoreque roseis.*
- Gerin*. ornith. II. p. 19. Tab. 124.
- δ. *Müller*, Naturfyst. II. p. 135. c. *Kragenpapagey von der Insel Bourbon.* (10)
- Briffon*, ornith. II. p. 132. n. 57. Perruche à collier de l'Isle de Bourbon.
- Büffon*, Vögel, XIX. p. 138. *der Sittich mit dem doppelten Halsbande.*
- Latham*, Vögel, I. p. 202. n. 37. Var. C. *Alexanders Papagoy mit doppeltem Halsbande.*
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 98. δ. *Ps. macr. viridis, collari roseo, antice dilatato, gula strigata flava, lateribus colli sub mandibula inferiore altera nigra.*
- ε. *Müller*, Naturfyst. II. p. 135. d. *der kleine Blaukopf aus Indien* (1)
- Briffon*, ornith. II. p. 155. n. 96. Perruche à tête bleue des Indes.
- Büffon*, Vögel, XIX. p. 150. *der Sittich mit dem lasurblauen Kopfe; m. i Fig.*
- Seligmann*, Vögel, VIII. Tab. 82. unt. Fig. *der blauköpfige Papagey.*

Q 2

Latham,(9) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.(10) Nach *Briffon* und *Büffon* eine eigne Gattung.(1) Nach *Briffon*, *Büffon*, und *Latham* eine eigne Gattung. Letzterer nahm ihn aber in der Synops. noch als Spielart an.

Latham, Vögel, I. p. 202. n. 37. Var. D. *Alexanders Papagoy mit azurblauem Kopfe.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 86. n. 15. Psittacus (Indicus) macr. viridis, capite gulaque cyaneis, macula in alis lutea, cauda caerulea, subtus lutea.

§. Latham, Vögel, I. p. 203 n. 37. Var. E. *Alexanders Papagoy aus Java.* (2)

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 87. n. 16. Psittacus (Osbeckii) macr. viridis, capite caeruleo flavoque vario, temporibus nigris, guttore pectoreque rubris, macula tectricum flava.

15. PERTINAX. *Der illinesische Papagey.*

Müller, Natursystem, II. p. 135. n. 15. *der Gelbschnabel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 94. n. 15. *der gelbbäckige Parkit.*

Halle, Vögel, p. 125. n. 56. *das blaßgrüne Papagaichen.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 232. n. 49. *der illinesische Papagey.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 691. *der ilinoifische Parkit.*

Klein, av. p. 25. n. 20. Psittacus viridis, cauda longa, malis croceis.

Klein, Vorber. p. 48. n. 20. *der grüne mit dem langen Schwanze und saffrangelben Backen.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 24. *grüner langgeschwänzter, mit gelbrothen Backen vom dritten Range.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 163. n. 6. *grüner Papagey mit gelben Backen.*

Briffon,

(2) Nach Latham eine eigne Gattung, die er aber in der Synops. noch als Spielart annahm.

Briffon, ornitholog. II. p. 138. n. 68. Perruche illinoise.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 21. grüner Papagey mit gelben Backen.

Büffon, Vögel, XX. p. 64. der Apute-Juba.

Latham, Vögel, I. p. 196, n. 30. der illinoifische Papagoy.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 94. n. 34. Psittacus (Pertinax) macr. viridis, subtus flavicans, genis fulvis, remigibus rectricibusque canescentibus.

Linné, Syst. Nat. Edit. X, I. p. 98. n. 10. Psittacus (Pertinax) macrourus viridis, genis fulvis, remigibus rectricibusque canescentibus.

Jonston, av. p. 200. Tui apute iuba.

67. LEVERIANUS. *Der Papagey mit carmoisinrothem Steiß.*

Latham, Vögel, I. p. 197. n. 31. der leverianische Papagoy.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 94. n. 35. Psittacus (Erythropygius) macr. viridis, capite colloque flavis, crisso coccineo, remigibus rectricumque apice caeruleis.

68. SMARAGDINUS. *Der Smaragd-papagey.*

Müller, Naturyst. Suppl. p. 75. der Rostbauch.

Büffon, Vögel, XX. p. 53. der Smaragd-Parkit; m. I Fig.

Latham, Vögel, I. p. 197. n. 32. der Smaragd-Papagoy.

Latham, Syn. Suppl. p. 60. Emerald Parrot.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 94. n. 36. Psittacus (Smaragdinus) macr. viridis nitens, abdomine postico caudaque ferrugineo-castaneis.

16. *CANICULARIS.* *Der roth- und blauköpfige Papagey.*

Müller, *Natursf.* II. p. 136. n. 16. *der Rothkopf.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 669. *der Rothkopf.*

Klein, *verbess. Vögelhist.* p. 27. n. 39. *Roth und Blaukopf mit langem Schwanze.*

Briffon, *ornith.* II. p. 134. n. 61. *Perruche du Brésil.*

Seligmann, *Vögel*, VI. Tab. 71. *der roth- und blauköpfigte Parakeet.*

Büffon, *Vögel*, XX. p. 61. *der Parkit mit der rothen Stirne; n. 1 Fig.*

Latham, *Vögel*, I. p. 206. n. 40. *der roth- und blauköpfige Parkit.*

Latham, *Syst. ornithol.* I. p. 94. n. 37. *Pittacus (Canicularis) macr. viridis, fronte rubra, occipite remigibusque extimis caeruleis, orbitis fulvis.*

Linné, *System. Natur. Edit. X.* I. p. 98. n. 11. *Pittacus (Canicularis) macrourus viridis, fronte rubra, occipite remigibusque extimis caeruleis.*

β. *Pf. macr. viridis subtus lutescens, fronte fusco-flavescente, vertice remigibusque caeruleis. **

Latham, *Vögel*, I. p. 217. n. 135. *der Parkit mit röthlicher Stirn.*

Latham, *Syn. Suppl.* p. 61. n. 135. *Ruff-fronted Parakeet.*

Latham, *Syst. ornith.* I. p. 95. n. 37. β.

Büffon, *pl. enl.* 8:8. *Perruche à front jaune.*

17. *AERUGINOSUS.* *Der braunkehlige Papagey.* (3)

Müller, *Natursyst.* I. p. 137. n. 17. *Braunkehle.*

Onomat.

(3) Nach *Latham* gehört *Pittacus Plumbens* p. 326. n. 75. mit hierher.

Onomat. hist. nat. VI. p. 659. *der kleine Papagay mit brauner Kehle.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 27. n. 40. *Braunkehl.*

Briffon, ornithol. II. p. 239. n. 69. *Perruche de la Martinique.*

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 72. *der Parakeet mit der braunen Kehle.*

Büffon, Vögel, XX. p. 42. *der Parkit mit der braunen Kehle; m. 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. p. 207. n. 41. *der Parkit mit brauner Kehle.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 95. n. 38. *Pfittacus (Aeruginosus) macr. viridis, vertice remigibusque primoribus caeruleis, genis colloque inferiore cinerascens.*

Bankroft, Naturg. v. Guiana, p. 97. *der braunkehllichte Papagoy.*

Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 98. n. 12. *Pfittacus (Aeruginosus) macr. viridis, vertice remigibusque primoribus caeruleis.*

18. **RUFIROSTRIS.** *Der rothschnäblige Papagey.*
(Sincialo.)

Müller, Naturfyst. II. p. 137. n. 18. *Rothschnabel.*

Halle, Vögel, p. 124 n. 52. *das grüne langschwänzige Papogaichen mit rothem Schnabel und Füßen.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 27. n. 38. *grüner Langschwanz.*

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 70. *der langgeschwänzte grüne Parakeet.*

Büffon, Vögel, XX. p. 58. *der Sincialo; m. 1 Fig.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 693. *der Rothschnabel.*

Briffon, ornithol. II. p. 129. n. 54. *Perruche.*

Latham, Vögel, I. p. 198. n. 33. *der grüne langgeschwänzte Parkit.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 95. n. 39. Psittacus (Rufirostris) viridis, rostro pedibusque rubris, rectricibus apice caeruleis, orbitis incarnatis.

Bankroft, Naturgesch. v. Guiana, p. 97. *der langgeschwänzte grüne Papagoy.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 98. n. 13. Psittacus (Rufirostris) macr. viridis, rostro pedibusque rubris, rectricibus apice caeruleis.

Schwenkfeldt, aviar. Siles. p. 343. Psittacus viridis minor; *ein grüner Papagey.*

Forstön, av. p. 38. Psittacus minor macrourus totus viridis.

Gerin. ornith. II. p. 19. Tab. 125.

Aldrov. ornithol. I. p. 678. Psittacus minor macrourus totus viridis, Hispanis Sincialo, Italis Parochino.

β. GUJANENSIS. *Der weißschnäblige Papagay.* (Ajuru-catinga.) (†)

Müller, Naturyst. II. p. 137. ad n. 18. *Parkite mit weißen Schnäbeln.*

Hallé, Vögel, p. 122. n. 26. *der grüne langgeschwänzte Papagai, mit rothem Augenkreise.*

Briffon, ornithol. II. p. 132. n. 58. Perruche de la Guadeloupe.

Latham, Vögel, I. p. 138. n. 33. Var. A. *der gujanische Parkit.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 96. n. 39. β. Pf. macr. viridis, rostro pedibusque candidis.

Bankroft,

(†) Nach *Briffon* u. a. eine eigne Gattung. Nach *Büffon* eine Spielart von *Psittacus Agilis*; p. 330. n. 20.

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 96. *der grüne Papagay von Guiana.*

Jonston, av. p. 202. Aiurucatinga.

Jonston, av. p. 202. Aiuruapara.

19. ORNATUS. *Der Paradiespapagey.*

Müller, Natursystem, II. p. 137. n. 19. *Paradiesparkit.*

Leske, Naturgesch. p. 239. n. 2. *der Paradiesparkit.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 94. n. 16. *der Paradiesparkit.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 343. n. 3. *der Paradiesparkit.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 688. *der langschwänzige Paradies Parkit.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 27. n. 37. *Papagey mit rother Kehle und blauer Scheitel, sonst grün und gelbbunt.*

Briffon, ornithol. II. p. 142. n. 73. *Perruche variée des Indes.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 145. *der Lori Sittich.*

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 69. *der Lory-Parakeet.*

Latham, Vögel, I. p. 191. n. 24. *der Papagoy-Lory.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 91. n. 28. *Psittacus (Ornatus) macr. luteo-viridis, occipite, gula pectoreque rubris, vertice cruribusque caeruleis, orbitis cinereis.*

Bankroft, Guiana, p. 97. *der Lory-Papagoy.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 98. n. 14. *Psittacus (Ornatus) macr. luteo-viridis, occipite, gula pectoreque rubris, vertice auribusque caeruleis.*

Hermann, tab. affin. animal. p. 182. Psittacus ornatus.

69. JAGUILMA. *Der Jaguilma.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 96. n. 40. Psittacus (Jaguilma) macr. viridis, remigibus apice fuscis, orbitis fulvis.

70. GUJANENSIS. *Der Pavouane.*

Briffon, ornithol. II. p. 133. n. 59. Perruche de la Guiane.

Büffon, Vögel, XX. p. 39. *der Pavuane*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 199. n. 34. *der Pavouane.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 96. n. 41. Psittacus (Guianensis) macr. viridis, genis rubro-maculatis, tectricibus alarum minoribus inferioribus coccineis, maioribus luteis, armillis rubris.

71. MARGINATUS. *Der Papagey mit blauem Wirbel von der Insel Luçon.*

Latham, Vögel, I. p. 199. n. 35. *der Papagoy von der Insel Luçon.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 96. n. 42. Psittacus (Marginatus) macr. viridis, vertice caeruleo, tectricibus alarum nigro, fusco-flavo, caeruleoque variegatis.

72. SONNERATI. *Der Papagey mit blauem Halsbande.*

Latham, Vögel, I. p. 200. n. 36. *der Papagoy mit dem blauen Halsbande.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 98. n. 47. Psittacus (Sonneratii) macr. viridis, capite, collo abdomineque griseo-viridibus, torque caeruleo, basi alarum macula rubra.

73. PONDICERIANUS. *Der Papagey von Pondichery.*

Müller, Naturfyft. Supplem. p. 74. n. 6. f. *der Weißkopf.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 155. *der Sittich mit Knebelbärten; m. 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. p. 203. n. 38. *der Parkit aus Pondifchery.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 99. n. 48. Psittacus (Pondicerianus) macr. viridis, capite anteriorum caeruleo alboque vario, mystacibus nigris, pectore purpurascente, tectricibus alarum flavo notatis.

β. Büffon, Vögel, XIX. p. 157. *eine Abänderung des bartigen Sittichs.*

Latham, Vögel, I. p. 203. n. 38. Var. A. *der Bart-Parkit.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 99. n. 48. β. Psittacus macr. viridis, rostrum inter et oculos castaneus, medio linea nigra, mystacibus nigris, nucha purpurascente, remigibus extus, caeruleis.

74. ERYTHROCEPHALUS. *Der rothköpfige Papagey aus Gingi.*

Müller, Naturfyft. Suppl. p. 74. n. 6. d. *der Purpurkopf.*

Briffon, ornith. II. p. 136. n. 65. *Perruche à tête rouge de Gingi.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 141. *der Sittich mit dem rothen Kopf; m. 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. p. 204. n. 39. *der rothköpfige Parkit aus Gingi.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 99. n. 50. Psittacus (Ginginianus) macr. viridi - flavicans, capite caeru-

caeruleo - purpurascende, gula nigra, torque nigro et pallide viridi, macula alarum obscure rubra.

Gerin. ornith. II. p. 21. Tab. 132.

β. *Halle*, Vögel, p. 130. n. 68. *das kleine Bengalerpapagaichen, mit schwarzem Halsbande und langem zertheilten Schwanz.* (5)

Klein, av. p. 25. n. 25. *Pfittacus sub mento niger, capite rubro, cervice purpurea, inferiore mandibula nigra, superiore crocea, pedibus caeruleis.*

Klein, *Vorbereit.* p. 48. n. 25. *der Papagey von Bengala.*

Klein, *verbess. Vögelhist.* p. 26. n. 29. *Schwarzbart mit rothem Kopfe.*

Klein, *verb. Vögelhist.* p. 163. n. 5. *rosenköpfiger Ringpapegey.*

Briffon, *ornitholog.* I. p. 187. n. 66. *Perruche de Bengale.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 169. *der kleine Sittig mit dem rosenrothen Kopfe und den langen Schwanzfedern; m. 1 Fig.*

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 18. *der rosenköpfige Ringpapagey. (Fridytutah.)*

Latham, Vögel, I. p. 204. n. 39. *Var. A. der rothköpfige Parkit aus Bengalen.*

Latham, *Syst. ornitholog.* I. p. 100. β. *Pfittacus macr. viridi-flavicans, capite genisque roseis, occipite caeruleo, linea faucium gulaque nigris, macula alarum obscure rubra.*

γ. *Latham*, Vögel, I. p. 205. n. 39. *Var. B. der rothköpfige Parkit aus Borneo.*

Latham,

(5) Nach *Briffon*, *Büffon* u. a. eine eigene Gattung.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 100. γ. Psittacus macr. viridis, capite caeruleo purpurascente, sincipite viridi, linea frontali fasciaque maxillari oblique nigris, collo subtus pectoreque castaneo-nigris.

δ. *Büffon*, Vögel, XIX. p. 172. *der große Sittich mit den langen Schwanzspitzen*; m. 1 Fig. (6)

Latham, Vögel, I. p. 205. n. 39. Var. C. *der rothköpfige Parkit aus Malakka*.

Latham, Syn. Suppl. p. 60. Malacca Parakeet.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 100. δ. Psittacus macr. viridi-flavicans, orbitis nuchaque roseis, tectricibus alarum medio caeruleo-viridibus.

75. PLUMBEUS. *Der Papagey mit bleyfarbenem Schnabel und Füssen*. (7)

Latham, Vögel, I. p. 207. n. 41. Var. A. *der Parkit mit brauner Stirn*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 95. n. 38. β. Psittacus macr. viridis, vertice caeruleo, fronte, genis gulaque fuscescentibus.

76. OLIVACEUS. *Der olivenfarbene Papagey*.

Büffon, Vögel, XIX. p. 163. *der Sittich mit den verbräunten Flügeln*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 208. n. 42. *der olivenbraune Parkit*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 97. n. 43. Psittacus (Olivaceus) macr. fusco-olivaceus, occipitis macula caeruleo-viridi et aurantio variegatis.

Gerin. ornith. II. p. 21. Tab. 130.

77. VI-

(6) Nach *Büffon* eine eigne Gattung.

(7) Nach *Latham* eine Varietät von Psitt. *Aeruginosus*, p. 223-n. 17.

77. **VIRESCENS.** *Der gelbflüglichte Papagey.*
Briffon, ornithol. II. p. 133. n. 60. Perruche de Cayenne.
Büffon, Vögel, XX. p. 46. *der Parkit mit den bunten Flügeln*; m. 1 Fig.
Latham, Vögel, I. p. 208. n. 43. *der Parkit mit gelben Flügeln.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 100. n. 51. Psittacus (Virescens) macr. virescens, remigibus intermediis candidis, oris flavescens, rectricibus intus flavicante marginatis.
78. **VERSICOLOR.** *Der vielfarbige Papagey.*
Büffon, Vögel, XX. p. 44. *der Parkit mit der bunten Kehle*; m. 1 Fig.
Latham, Vögel, I. p. 209. n. 44. *der vielfarbige Parkit.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 101. n. 52. Psittacus (Versicolor) macr. viridis, capite corporeque subtus fuscis, pennis iuguli auroreo-, abdominis caeruleo-rubro undatis.
Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 158. *die zwote Art der Zwergpapageyen.*
79. **INCARNATUS.** *Der rothflüglichte Papagey.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 163. n. 9. *kleiner rothflüglichter Papagey.*
Briffon, ornithol. II. p. 135. n. 63. Perruche des Indes.
Büffon, Vögel, XIX. p. 176. *der Sittig mit der rothen Kehle*; m. 1 Fig.
Seligmann, Vögel, VII. Tab. 24. *der kleine Papagey mit rothen Flügeln.*
Latham, Vögel, I. p. 210. n. 46. *der Parkit mit rothen Flügeln.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 101. n. 54. Psittacus (Incar-natus) macr. viridis, gula coccinea, rectricibus alarum rubris, rostro pedibusque incarnatis.

80. MURINUS. *Der graubrüstige Papagey.*
Buffon, Vögel, XIX. p. 153. *der Maus-Sittich*;
m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 210. n. 47. *der Parkit mit grauer Brust.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 101. n. 55. Psittacus (Murinus) olivaceus, facie, gula et pectore argenteo-griseis, remigibus viridibus.

81. CORNUTUS. *Der gehörnte Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 210. n. 48. *der gehörnte Papagey.* Tab. 10.

Latham, Syst. ornitholog. p. 102. n. 56. Psittacus (Bifetis) macr. viridi-flaves-cens, capite coc-cineo, pennis duabus elongatis, torque et uropygio flavescentibus, rectricibus remigibusque exterioribus extus caeruleis.

82. CALEDONICUS. *Der neucaledonische Pa-pagey.*

Latham, Vögel, I. p. 211. n. 49. *der Neu-Kale-donische Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 102. n. 57. Psittacus (Caledonicus) macr. viridi-flaves-cens, capite laevi, capistro supra coccineo, subtus caeruleo, rectricibus remigibusque exterioribus extus caeruleis.

83. NOVAE SEELANDIAE. *Der neu-seeländische Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 211. n. 50. *der Neu-See-ländische Papagoy.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I p. 102. n. 58. Psitt. (Zealandicus) macr. fusco-viridis, capistro purpureo-nigro, vertice viridi-castaneo, striga per oculos, uropygioque coccineis.

84. NOVAE HOLLANDIAE. *Der neuholländische Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 212. n. 51. *der Neu-Holländische Parkit.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 102. n. 59. Psittacus (Novae-Hollandiae) macr. fusco-olivaceus, capite e pennis senis cristato luteo, pone oculos macula coccinea, fascia alarum alba.

85. ULIETANUS. *Der Papagey aus Ulietea.*

Latham, Vögel, I. p. 212. n. 52. *der Papagey aus Ulietea.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 103. n. 61. Psittacus (Ulietanus) macr. capite fusco, uropygio obscure coccineo, corpore viridi-olivaceo, marginibus pennarum, remigibus rectricibusque nigricantibus.

86. MULTICOLOR. *Der Papagey mit weißem Halsbände.*

Latham, Vögel, I. p. 213. n. 53. *der Papagey mit weißem Halsbände.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 103. n. 62. Psittacus (Semicollaris) macr. viridis, capite, gula abdomineque caeruleis, cervice lunula alba, pectore supra rubro, subtus luteo, femoribus luteo caeruleoque variis.

87. AUREUS. *Der Goldpapagey.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 163. n. 7. *goldgekrönter Papagey.*

Briffon,

Briffon, ornitholog. II. p. 134. n. 62. Perruche à front rouge du Brésil.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 22. goldgekrönter Papagey.

Büffon, Vögel, XX. p. 68. der mit Gold gekrönte Parkit; m. 1. Fig.

Latham, Vögel, I. p. 213. n. 54. der Gold-Parkit.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 103. n. 68. Psittacus (Brasilienfis) macr. viridis, vertice aurantio; iugulo flavo-rubescente, fascia alarum remigibusque extus caeruleis.

Gerin. ornith. I. p. 19. Tab. 126.

48. LINEATUS. *Der gestreifte Papagey.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 73. n. 6. a. der lineirte Papagey.

Latham, Vögel, I. p. 214. n. 55. der gestreifte Papagay.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 104. n. 64. Psittacus (Lineatus) macr. viridis, remigibus supra fuscis, margine interiore pallidis.

88. PACIFICUS. *Der Papagey vom stillen Ocean.*

Latham, Vögel, I. p. 214. n. 56. der Parkit vom stillen Ocean.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 104. n. 65. Psittacus (Pacificus) macr. viridis, fronte, temporibus uropygioque lateribus rubris.

β. *Latham*, Vögel, I. p. 214. n. 56. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 104. n. 65. β. Psitt. macr. viridis, fronte coccineo, remigibus caeruleis.

γ. *Latham*, Vögel, I. p. 215. n. 56. Var. B.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 104. n. 65. γ. Psittacus macr. viridis, fronte, temporibus uropygioque toto rubris.

δ. *Latham*, Vögel, I. p. 215. n. 56. Var. C.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 104. n. 65. δ. Psittacus macr. viridis, fronte rubro, vertice flavo.

ε. Psittacus macr. viridis, sincipite macula suboculari et hypochondriis coccineis. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 105. n. 65. ε.
 Mus. Carlf. fascic. II. Tab. 28. Psitt. novae Zealandiae.

89. PALMARUM. *Der Palmenpapagey.*

Latham, Vögel, I. p. 215. n. 57. *der Palm-Papagoy.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 105. n. 68. Psittacus (Palmarum) submacr. viridis, rostro pedibusque rubentibus, rectricibus 3. exterioribus utrinque margine apiceque flavis.

90. AUSTRALIS. *Der Papagey mit blauem Federbusche.*

Latham, Vögel, I. p. 215. n. 58. *der Parkit mit blauem Federbusche.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 105. n. 69. Psittacus (Pipilans) submacr. viridis subcristatus, vertice pallide caeruleo, collo subtus et abdomine medio coccineis, abdomine imo femoribusque extus sapphirinis.

91. TAITIANUS. *Der Arimanon.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 213. *der Arimanon;*
 in. 1 Fig.

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 216. n. 59. *der blaue otaheitische Parkit.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 105. n. 70. *Psittacus* (Taitianus) submacr. saphirinus, capite pennis elongatis, gula iuguloque albis, rostro pedibusque rubris.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 182. *Psittacus Arimanon.*

β. *Pf.* submacr. cyaneus, corpore toto saturate et splendide caeruleo. *Latham*, Syst. ornithol. I. p. 105. n. 170. β.

Mus. Carl. fasc. II. Tab. 27. *Psittacus Cyaneus.*

92. PYGMAEUS. *Der Zwergpapagey.*

Latham, Vögel, I. p. 217. n. 60. *der Zwerg-Parkit.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 106. n. 72. *Psittacus* (Pygmaeus) submacr. viridis, pennarum apice ex virescente - flavo, remigibus intus obscuris.

20. AGILIS. *Der Krik.*

Müller, Naturfyft. II. p. 138. n. 20. *cayennischer Parkit.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 92. n. 10. *der kleine grüne Papagay.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 661. *der Cajennische Parkit.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 31. *Grüner mit blau, roth und gelbbunt.*

Briffon, ornitholog. II. p. 109. n. 23. *Perroquet de Cayenne.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 305. *der Krik; m. i Fig.*

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 63. *der kleine grüne Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 249. n. 101. *der grüne Papagoy von Cayenne.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 106. n. 73. Psittacus (Agilis) submacr. viridis, tectricibus remigum primorum caerulefcenti - fulvis, cauda subtus rubra, orbitis cinereis.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 99. n. 15. Psittacus (Agilis) submacrourus viridis, tectricibus remigum primorum caerulefcentium fulvis, cauda subtus rubra.

Barrere, Fr. equinox. p. 144. Psittacus maior vulgaris prafinus?

** *Kurzschwänzige mit gleichen Schwänzen.*

21. CORONATUS. *Der guianische Kakadu.*

Müller, Naturfyst. II. p. 139. n. 21. *der Haubenspapagey.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 671. *der HaubensPapagay.*

Latham, Vögel, I. p. 221. n. 65. *der KronenKakatoo.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 106. n. 74. Psittacus (Coronatus) brach. viridis, crista plicatili rubra apice caerulea.

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 96. *der guianische Cackatu.*

93. ATERRIMUS. *Der ganz schwarze Kakadu.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 54. n. 5. *der schwarze Kakatu.*

Seligmann, Vögel, IX. Tab. 6. *der große schwarze Kakatua.*

Latham, Vögel, I. p. 221. n. 66. *der schwarze Kakatoo.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 107. n. 75. Psittacus (Gigas) brach. niger, crista occipitis dilutiore elongata, genis nudis rubris.

Linne, Syst. Nat. Edit. XII. p. 144. n. 22. posit. ult.

94. **SULPHUREUS.** *Der weiße Kakadu mit schwefelgelbem Federbusch.*

Klein, av. p. 25. n. 5. Kakatoeha alba, Cakatoon, plumis croceis in capite.

Klein, Vorbereitung, p. 46. n. 5. *der weiße Kakatöha.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 25. n. 6. *weißer Kakatoeha mit gelbem Busche.*

Briffon, ornitholog. II. p. 100. n. 9. Kakatoes à hupe jaune.

Büffon, Vögel, XIX. p. 41. *der Kakatu mit der gelben Haube*; m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, IX. Tab. 7. *der kleine weiße Kakatua mit einem gelben Federbusche.*

Latham, Vögel, I. p. 220. n. 64. *der kleine weiße Kakatoo.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 109. n. 81. Psittacus (Sulphureus) albus crista plicatili acuminata et macula infra oculos sulphureis.

Frisch, Vögel, IV. Tab. 50. *großer weißer Papagey oder Cacadou?*

Seb. thes. I. p. 94. Tab. 59. fig. 1. Avis Kakatoeha orientalis, ex insulis Moluccis, cristata, candidissima et sulphurea?

Gerin. ornith. I. p. 96. Tab. 117.

95. **PHILIPPINARUM.** *Der weiße Kakadu mit rothem Steiß.*

Müller, Naturyst. Suppl. p. 77. n. 51. Psittacus haematuropygius; *rother Kakadu.*

Briffon, ornitholog. II. p. 102. n. 11. petit Kakatoes.

Büffon, Vögel, XIX. p. 50. *der kleine Kakatu mit dem fleischfarbenen Schnabel; mit 1 Figur.*

Latham, Vögel, I. p. 220. n. 63. *der Kakatoo mit rothem Steiß.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 108. n. 79. Psittacus (Philippinarum) albus, crista sulphurea plicatili, apice alba, orbitis flavicante, rubris, rectricibus caudae inferioribus rubris, albo punctatis.

Gerin. ornith. I. p. 96. Tab. 119.

96. *MOLUCCENSIS.* *Der Kakadu mit rothem Federbusche.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 90. n. 4. *der große weiße Kakatu.* Tab. 4. B.

Halle, Vögel, p. 112. n. 23. *der weiße gehaubte Papagey mit rothem Federbusche.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 25. n. 5. *weißer Kakatoeha mit ponzofarbenem Busche vom ersten Range.*

Briffon, ornitholog. II. p. 101. n. 10. Kakatoes à huppe rouge.

Büffon, Vögel, XIX. p. 45. *der Kakatu mit der rothen Haube; m. 1 Fig.*

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 55. *der größere Kakatoeha.*

Latham, Vögel, I. p. 219. n. 62. *der Kakatoo mit rothem Federbusche.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 108. n. 78. Psittacus (Rosaceus) rosaceo - albus, crista plicatili subtus rubra, rectricibus lateralibus intus a basi ad medium usque sulphureis.

Barchewitz, ostind. Reisebeschreib. p. 147. und
p. 604.

Gerin. ornith. I. p. 96. Tab. 118.

22. CRISTATUS. *Der gemeine Kakadu.* (8)

Müller, Naturfyst. II. p. 139. n. 22. *Kakadu.*

Leske, Naturgesch. p. 239. n. 3. *der Kakatu.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 164. n. 3.

Psittacus (Cristatus) brachyurus, crista plicatili flava.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 343. n. 1. *der weiße Kakatu.*

Funke, Naturgesch. I. p. 334. *der Kakadu.*

Halle, Vögel, p. 115. n. 31. *der weiße mit rothgelbem Federbusche.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 672. *der Kakatu.*

Klein, av. p. 24. n. 6. *Kakatocha tota alba.*

Klein, Vorbereit. p. 46. n. 6. *der ganz weiße Kakatoeha.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 25. n. 7. *ganz weißer Kakatoeha.*

Brisson, ornithol. II. p. 99. n. 8. *Kakatoes.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 39. *der Kakatu mit der weißen Haube; m. 1 Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 302. *der große Kakatu.*

Latham, Vögel, I. p. 219. n. 61. *der große weiße Kakatoo, der gemeine Kakatoo.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 108. n. 77. *Psittacus* (Cristatus) albus, crista plicatili flava.

Frisch, Vögel, IV. Tab. 50. *großer weißer Papagey oder Cacadou.*

Mannichfalt. IV. p. 411. *der große Kakatu oder Kakatoeha; m. 1 Fig.*

R 4

Linné,

(8) Unter den Synonymen dieser und der 94. Gattung, p. 330. herrscht große Verwechslung.

Linne, Syst. Nat. Ed. X, I. p. 99. n. 16. Psittacus (Cristatus) brachyurus albus, crista dependente flava. (Mit *Psittacus Sulphureus* verwechselt.)

Kramer, Austr. p. 333. n. 6. Psittacus albus, rostro nigro, capite cristato, crista plicatili lutea; indianischer Wiedhopf.

Charleton, exercit. p. 74. n. 3. Psittacus albus cristatus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 183. Pf. Cristatus.

Jonston, av. p. 36. Psittacus albus cristatus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 220. n. 4. der Kakadu.

23. ERYTHROLEUCUS. *Der roth und weiße Papagoy.*

Miller, Natursystem, II. p. 140. n. 23. der Rothschwanz.

Borowsky, Thierreich, II. p. 90. n. 5. der rothschwänzige Kakatu.

Halle, Vögel, p. 112. n. 24. der weiße ungehaubte Papagai.

Briffon, ornithol. II. p. 102. n. 12. Kakatoes à ailes et queue rouges.

Büffon, Vögel, XIX. p. 51. der Kakatu mit rothen Flügeln und rothem Schwanze.

Latham, Vögel, I. p. 222. n. 67. der roth und weiße Papagoy.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 109. n. 82. Psittacus (Erythroleucus) cinereus, uropygio, remigibus rectricibusque coccineis.

Linne, Syst. Nat. Edit. X, I. p. 99. n. 19. Psittacus (Erythroleucus) brachyurus cinereus, uropygio, rectricibus remigibusque coccineis.

Jonston, av. p. 38. Psittacus erythroleucos.

24. ERITHACUS. *Der Jaco.*

Müller, Naturfyft. II. p. 140. n. 24. *Guineifcher.*

Blumenbach, Handb. der Naturgefch. p. 164. n. 4.

Pittacus (Erithacus) brachyurus canus, temporibus nudis albis, cauda coccinea.

Bechstein, Naturgefch. I. p. 344. n. 2. *der guineifche Papagey.*

Halle, Vögel, p. 116. n. 32. *der afchfarbne Papagai, mit rothem Schwanz.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 675. *der guineifche afchgraue Papagay.*

Klein, av. p. 25. n. 13. Pittacus cinereus cauda rubra.

Klein, Vorbereit. p. 47. n. 13. *der Afchgraue mit dem rothen Schwanz.*

Klein, verbesserte Vögelhif. p. 26. n. 19. *grauer mit rothem Schwanz.*

Briffon, ornitholog. II. p. 126. n. 49. *Petroquet: cendré de Guinée.*

Biffon, Vögel, XIX. p. 58. *der Jaco oder afchfarbne Papagey; mit 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. p. 323. n. 68. *der gemeine afchgraue Papagey.*

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 109. n. 83. Pittacus (Erithacus) canus, temporibus nudis albis, cauda coccinea.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgefch. I. p. 25. n. 30. *der afchgraue Papagey mit rothem Schwanz.*

Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 99. n. 20. Pittacus (Erithacus) brachyurus canus, temporibus albis, cauda coccinea.

Kramer, Auftr. p. 332. n. 2. Pittacus cinereus, cauda cuneiformi phoenicea; *grauer Paperl.*

Charleton, exercit. p. 74. n. 8. Pittacus cinereus.

Jonfton, av. p. 32. Pittacus cinereus.

Gerin. ornith. I. p. 95. Tab. 112.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 227. n. 5.
der Jaco.

β. *Der aschgraue Papagey mit rothen Flügeln.*

Briffon, ornithol. II. p. 127. A. Perroquet de Guinée à ailes rouges.

Büffon, Vögel, XIX. p. 75. *der guineische Papagey mit rothen Flügeln.*

Latham, Syn. I. p. 262. n. 68. A. Red-winged ashcoloured Parrot.

Latham, Vögel, I. p. 223. n. 68. Var. A. *der aschgraue Papagoy mit rothen Flügeln.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 110. β. Pf. guineensis alis rubris.

γ. *Der rothbunte Papagey.*

Briffon, ornitholog. II. p. 127. B. Perroquet de Guinée varié de rouge.

Büffon, Vögel, XIX. p. 75. *der guineische rothgeschäckte Papagay.*

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 58. *der aschfarbne und rothe Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 223. n. 68. Var. B. *der roth- und aschgraue Papagoy.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 110. γ. Pfittacus guineensis, rubro varius.

Gerin. ornith. I. p. 95. Tab. 113.

δ. *Der roth und weiße Papagey, mit rothem Schwanze und aschfarbenem Kopfe.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 32. *Aschfarbner und rothbunt mit weißen Backen.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 75. not. *.

Latham, Vögel, I. p. 224. n. 68. Var. C.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 110. d. Psittacus capite cinereo, genis nudis, remigibus primariis ex cinereo fuscis.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 26. n. 31. der rothe Papagey mit aschfarbenem Kopfe.

97. CINEREUS. *Der Marakana.*

Briffon, ornitholog. II. p. 127. n. 50. Perroquet cendré du Brésil.

Büffon, Vögel, XX. p. 29. grauer Papagai.

Latham, Vögel, I. p. 224. n. 69. der brasilianische aschgraue Papagoy.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 110. n. 84. Psittacus (Cinereus) corpore toto ex caerulescente cinereo.

Jonston, av. p. 202. Maracana Brasiliensibus (prima).

98. MERIDIONALIS. *Der mittägliche Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 225. n. 70. der mittägliche Papagoy.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 110. n. 85. Psitt. (Nestor) fuscus, capite incano, collo inferiore castaneo, uropygio crissoque castaneo-rubris.

49. MASCARINUS. *Der Maskarin. (9)*

Müller, Naturfyst. Supplem. p. 76. n. 49. der Maskarin.

Briffon, ornitholog. II. p. 128. n. 52. Perroquet Mascarin.

Büffon, Vögel, XIX. p. 87. der Maskarin; mit I Figur.

Latham, Vögel, I. p. 225. n. 72. der Maskarin.

Latham,

(9) Soll, nach *Briffon*, der *P. Obscurus* Linn. seyn.

Latham, Syst. ornithol. I. p. III. n. 87. Pfittacus (Mascarinus) fuscus, facie nigra, cauda albente.

99. FUSCUS. *Der braune Papagey.*⁽¹⁰⁾

Briffon, ornith. II. p. 128. n. 51. Perroquet brun.

Büffon, Vögel, XIX. p. 88. *Briffons brauner Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 226. n. 73. *der braune Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. III. n. 88. Pfittacus (Fuscus) totus cinereo-fuscus.

95. GARRULUS. *Der Lory von Ceram.*⁽¹⁾

Müller, Natursystem, II. p. 141. n. 25. *der Plauderer.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 91. n. 6. *der Auro-rapapagei.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 344. n. 3. *der Plauderer.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 678. *der Plauderer, Aurov-Parkit.*

Klein, av. p. 25. n. 8. Pfittacus Rufus femoribus alisque viridibus.

Klein, Vorbereit. p. 47. n. 8. *der Feuerrothe mit grünen Schenkeln und Flügeln.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 26. n. 12. *ganz rother Papagey mit grünen Flügeln und Schenkeln.*

Briffon, ornitholog. II. p. 103. n. 13. *Lory de Ceram.*

Halle,

(10) Nach *Büffon* eine Spielart von *Pfittacus Mascarinus*.

(1) Unter den zu dieser Gattung und denen Varietäten gehörigen Synonymen herrscht große Verwechslung. *Büffon* betrachtet auch den *Lory von Ceram* nicht als die Hauptgattung, sondern als Spielart von *Lory Noira*.

Halle, Vögel, p. 118. n. 37. *der rothe Papagai mit grünen Flügeln und Dickbein.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 104. *Lori von Ceram.*

Latham, Vögel, I. p. 228. n. 76. *der Lory von Ceram.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 113. n. 96. Pfittacus (Garrulus) coccineus, orbitis cinereis, genis alisque viridibus, rectricibus medietate postica caeruleis.

Linné, Westgoth. Reis. p. 159. Pfittacus Garrulus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 18. n. 3. Pfitt. ruber, alis viridibus, remigibus rectricibusque introrsum purpureis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 100. n. 21. Pfitt. (Garrulus) brachyurus ruber, genis alisque viridibus, rectricibus medietate postica caeruleis.

β. AURORAE. *Der Aurora-Parkit.* (2)

Müller, Naturyst. II. p. 141. n. 25. *Aurorparkit.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 91. n. 7. *der Plauderer.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 104. *Spielart des Noira; mit 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. p. 229. n. 76. Var. A. *der Noira-Lory.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 113. β. Pfittacus coccineus, alis viridibus nigrisque, rectricibus flavis, medietate postica virescentibus.

γ. MOLUCCENSIS. *Der Lory-Noira.* (3)

Müller, Naturyst. II. p. 141. n. 25. *der Moluccische Laurey, Lory oder Lorry.*

Klein,

(2) Nach der Büffonschen Uebersetzung soll *Frischens ganz rother Papagay* Tab. 45. hieher gehören. Nach *Guslin und Latham* ist es der *Lory von Ceram.*

(3) Nach *Briffon u. Klein* eine eigne Gattung.

- Klein*, verb. Vögelhist. p. 27. n. 36. *Scharlatvogel*.
Briffon, ornithol. II. p. 103. n. 14. Lory des Mo-
 luques.
- Büffon*, Vögel, XIX. p. 101. *der Lori - Noi-
 ra*; mit 1 Fig.
- Seligmann*, Vögel, VI. Tab. 67. *der Scharlach-
 Lory*.
- Latham*, Vögel, I. p. 229. n. 76. Var. B. *der schar-
 lachrothe Lory*.
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 114. γ. Pfittacus
 coccin. macula interscapulari tectricibusque ala-
 rum minoribus luteis, rectricibus lateralibus
 basi caeruleis.
- Clus.* exot. p. 364. Noyra.
- Gerin.* ornith. I. p. 94. Tab. 106.
- δ. *Latham*, Vögel, I. p. 230. *eine Spielart, bey der
 viele von den Deckfedern der Flügel blaue Spi-
 tzen haben*.
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 124. δ. Pfittacus
 tectricibus alarum plurimis caeruleo punctatis.
26. DOMICELLA. *Der Lory mit purpurfarbener
 Kappe*.
- Müller*, Naturfyst. II. p. 142. n. 26. *die Jungfer*.
- Borowsky*, Thierreich, II. p. 92. n. 8. *der Lory
 mit der schwarzen Kappe*.
- Onomat. hist. nat.* VI. p. 674. *der Lory mit der
 schwarzen Kappe*.
- Klein*, av. p. 24. n. 7. Pf. rufus, vertice nigro,
 alis viridibus, femoribus caeruleis.
- Klein*, Vorbereit. p. 47. n. 7. *der Feuerrothe, mit
 einem schwarzen Wirbel, grünen Flügeln und
 himmelblauen Schenkeln*.
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 25. n. 8. *Rother Pa-
 pagey mit schwarzer Platte, grünen Flü-
 geln*

geln und blauen Schenkeln vom ersten Range.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 25. n. 10. Roth mit blauer Brust, Bauch, Schwanz und Nacken, schwarzer Platte und grünen Flügeln.

Briffon, ornithol. II. p. 104. n. 15. Lory des Indes orientales.

Büffon, Vögel, XIX. p. 107. der Lory mit dem Halsbande; m. 2 Figg.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 66. der zweyte Lory mit schwarzer Kappe.

Latham, Vögel, I. p. 230. n. 77. der Lory mit purpurfarbner Mütze.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 184. n. 97. Pfittacus (Domicella) ruber, pileo violaceo, alis viridibus, humeris genisque caeruleis, orbitis fuscis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 100. n. 23. Pfittacus (Domicella) brachyurus ruber, pileo fusco, alis viridibus, humeris genisque caeruleis.

Gerin. ornith. II. p. 94. Tab. 104.

β. Der Lory mit blauer Kappe. (4)

Halle, Vögel, p. 112. n. 25. der Braslische Papagai, rosenfarben mit gelbem Halsringe.

Fig. 5.

Klein, av. p. 25. n. 17. Pf. capite cyaneo, colli luteo.

Klein, Vorber. p. 47. n. 17. mit dem lasurblauen Kopfe und bleichgelben Kragen.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 21. Blaukopf mit gelbem Halsbande.

Briffon, ornithol. II. p. 106. n. 18. Lory à collier des Indes.

Büffon,

(4) Nach *Briffon*, u. a. eine eigene Gattung.

Büffon, Vögel, XIX. p. 109. *ostindischer Lory mit dem Halsbande.*

Latham, Vögel, I. p. 230. n. 77. Var. A. *der Lory mit blauer Mütze.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 114. n. 97. β. *Pfittacus coccineus*, vertice remigibusque primoribus cyaneis, torque colli luteo, rectricibus purpureis fusco - rubefcente adumbratis.

27. **LORY.** *Der Lory mit schwarzer Kappe.*

Müller, Naturfyst. II. p. 142. n. 27. *der Lory.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 92. n. 9. *der Lory.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 680 *der Lory.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 25. n. 11. *Roth mit schwarzer Kappe, gelbem Schnabel, gelb, blau und grün bunten Flügeln.*

Briffon, ornitholog. II. p. 105. n. 16. *Lory des Philippines.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 110. *der dreyfarbige Lory; m. 1 Fig.*

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 65. *der erste Lory mit schwarzer Kappe.*

Latham, Vögel, I. p. 231. n. 78. *der Lory mit schwarzer Mütze.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 115. n. 98. *Pfittacus (Lory) coccineus*, pileo violaceo, alis viridibus, pectore, genibus caudaque caeruleis, orbitis incarnatis.

Linné, System. Natur. Edit. X. I. p. 100. n. 24. *Pfittacus (Lory) brachyurus purpureus*, pileo nigro, alis viridibus, pectore, genibus caudaque caeruleis.

Gerin. ornith. I. p. 94. Tab. 105.

100. PUNICEUS. *Der karmoisinrothe Papagey.*

Briffon, ornithol. I. p. 107. n. 20 Lory d'Amboine.

Büffon, Vögel, XIX. p. 113. *der karmoisinfarbne Lory*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 232. n. 79. *der karmoisinrothe Lory.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 115. n. 99. Psittacus (Puniceus) coccineus, subtus violaceus, rectricibus saturate coccineis, apice rubescentibus.

101. RUBER. *Der rothe Papagey. (Lory von Gilolo.)*

Büffon, Vögel, XIX. p. 116. *der rothe Lory*; mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p. 232. n. 80. *der rothe Lory.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 115. n. 100. Psittacus (Ruber) coccineus, remigibus primoribus orbitisque nigris, macula alarum, tectricibusque caudae inferioribus caeruleis.

β. *Der dunkelrothe Papagey mit lichtblauen Schultern. (5)*

Latham, Vögel, I. p. 233. n. 80. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 116. n. 101. Psittacus (Moluccensis) coccineus, scapularibus imoque ventre pallide caeruleis, tectricibus alarum maioribus remigibusque secundariis apice cyaneis.

102. GRANDIS. *Der große Lory.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 219. *der große Lory*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 233. n. 81. *der große Lory.*

Latham,

(5) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 16. n. 102. *Psittacus* (Grandis) ruber, corpore subtus rubro, caeruleo, violaceo viridique variegato, remigibus cyaneis, cauda apice flavo.

β. *Latham*, Vögel, I. p. 234. n. 81. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 116. n. 102. β. *Psitt. coccineus*, cauda supra fusco, viridi caeruleoque varia, pectore, imo abdomine, margine alarum remigibusque extus caeruleis, femoribus castaneis.

103. GUINEENSIS. *Der gelbbrüftige Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 234. n. 82. *der Lory mit gelber Brust.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 116. n. 104. *Psittacus* (Guineensis) capite colloque coccineis, superciliis et pectore flavescentibus, gula, genis corporeque subtus albis, tectricibus alarum viridibus, remigibus caeruleis, flavo marginatis.

104. PARAGUANUS. *Der Papagay von Paraguay.*

Halle, Vögel, p. 117. n. 34. *der schwarze Papagai mit rother Brust und Rücken.*

Buffon, Vögel, XX. p. 28. *der Paragua.*

Briffon, ornitholog. II. p. 106. n. 17. *Lory du Bresil.*

Latham, Vögel, I. p. 234. n. 83. *der Lory von Paraguay.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 117. n. 105. *Psittacus* (Paraguanus) coccineus, capite, cervice, crisso, cauda, humeris alisque nigris.

Jonston, av. p. 202. *Paragua.*

29. NIGER. *Der Vaza.*

Müller, Naturfyst. II. p. 143. n. 29. *der schwarze Papagey.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 686. *der schwarze Papagey aus Madagafcar.*

Klein, av. p. 28. n. 23. Psittacus ex nigro caeruleus, rostro brevissimo.

Klein, Vorbereitung, p. 48. n. 23. *der schwärzlich himmelblaue Papagey mit dem kürzesten Schnabel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 27. *schwarzer Papagey.*

Briffon, ornith. II. p. 129. n. 53. Perroquet noir de Madagafcar.

Buffon, Vögel, XIX. p. 84. *der Vaza, oder der schwarze Papagey; m. 1 Fig.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 9. *der schwarze Papagey von Maagaskar.*

Latham, Vögel, I. p. 225. n. 71. *der schwarze Papagoy von Maagaskar.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. III. n. 86. Psittacus (Niger) corpore caerulefcente nigro, rostro orbitisque albidis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 99. Psittacus (Niger) brachyurus niger.

Gerin. ornith. II. p. 20. Tab. 128.

28. CAERULEOCEPHALUS. *Der roth- und blaue Papagey.*

Müller, Naturf. II. p. 143. n. 28. *der guajanische Blaukopf.*

Halle, Vögel, p. 122. n. 48. *der blauköpfige Papagai.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 668. *der Gujanische Blaukopf.*

Briffon, ornitholog. II. p. 124. n. 46. Perroquet bleu de la Guiane.

Büffon, Vögel, XIX. p. 300. *der roth und blaue Krik.*

Latham, Vögel, I. p. 235. n. 84. *der roth- und blaue Papagey.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 117. n. 106. Psittacus (Caeruleocephalus) caeruleus, ventre, uropygio caudaque viridibus, vertice flavo, remigibus rectricibusque rubris.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 100. n. 25. Psittacus (Caeruleocephalus) brachyurus, capite, pectore dorsoque caeruleis, ventre, uropygio caudaque viridibus, vertice flavo.

Jonston, av. p. 37. Psittacus erythrocyanus.

105. **VARIUS.** *Der braun - und blaubunte Papagey.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 112. n. 90. Psittacus (Varius) ex fusco et cyaneo varius, genis, gula iuguloque albicantibus, remigibus rectricibusque obscure fuscis, latere exteriori cyaneis.

106. **VIOLACEUS.** *Der violetköpfige Papagey.*

Briffon, ornithol. II. p. 124. n. 44. Perroquet de la Guadalupe.

Büffon, Vögel, XIX. p. 316. *der Krik mit dem violetten Kopfe; der tapizirte Papagey; mit 1 Figur.*

Latham, Vögel, I. p. 228. *der violette Papagey.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 112. n. 91. Psittacus (Violaceus) corpore supra viridi, subtus caerulefcente, capite colloque violaceis, viridi nigroque variegatis, macula rectricum rosea bifida.

Labat,

Labat, voy. aux iles de l' Amer. II. p. 214. Perroquet de la Guadeloupe.

107. FRINGILLACEUS. *Der Finkenpapagey.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 112. n. 92. Psittacus (Fringillaceus) viridis, capite cyaneo, genis, gula, iugulo maculaque abdominis ex lacteo sanguineis, abdomine violaceo.

108. CHORAEUS. *Der Choroi.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 112. n. 93. Psittacus (Choraeus) viridis, subtus cinereus, orbitis incarnatus.

109. SINENSIS. *Der chinefsche Papagey.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 163. n. 3. grün und rother Papagey aus China.

Briffon, ornithol. II. p. 120. n. 39. Perroquet de la Chine.

Büffon, Vögel, XIX. p. 78. der grüne Papagey; mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 13. grün und rother Papagey aus China.

Latham, Vögel, I. p. 235. n. 85. der chinefsche Papagey.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 117. n. 107. Psittacus (Sinensis) viridis, lateribus tectricibusque alarum inferioribus rubris, alis margine caeruleis, tectricibus apice fusco-flavicantibus.

110. MACRORHYNCHOS. *Der dickschnäblige Papagey.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 93. der Papagey mit dem blutfarbigen Schnabel; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 236. n. 86. der Großschnäbler-Papagey.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 117. n. 108. Pf. (*Macropythos*) viridis, corpore antice flavo-virescente, dorso caeruleo viridi, tectricibus alarum nigris, flavo-aureo marginatis.

III. GRAMINEUS. *Der grasgrüne Papagey.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 95. *der große grüne Papagey mit dem blauen Kopf*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 236. n. 87. *der grasgrüne Papagey aus Amboina.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 118. n. 110. Psittacus (Gramineus) viridis, subtus olivaceus, pileo caeruleo, cauda subtus obscure flava.

30. LEUCOCEPHALUS. *Der weißköpfige Papagey.*

Müller, Naturfyst. II. p. 143. n. 30. *der Weißkopf.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 93. n. 11. *der weißköpfige Papagey.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 681. *der weißköpfige Papagey.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 27. n. 34. *Weißkopf mit blauem Wirbel.*

Briffon, ornith. II. p. 110. n. 26. *Perroquet de la Martinique.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 273. *die Amazoninpapagey mit dem weißen Kopfe*; m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 61. *der weißköpfige Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 236. n. 88. *der Papagey mit weißer Stirn.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 118. n. 111. Psittacus (Leucocephalus) viridis, vertice remigibusque caeruleis, gula rubra, fronte orbitisque albis,

Linneé,

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 100. n. 26. Psittacus (Leucocephalus) brachyurus viridis, remigibus caeruleis, fronte alba.

Charleton, exercit. p. 74. n. 7. Psittacus leucocephalus.

β. *Halle*, Vögel, p. 120. n. 41. der grünblaus Papagey mit weißer Stirn.

Klein, av. p. 25. n. 9. Psittacus viridis, fronte alba, collo rubro.

Klein, Vorbereit. p. 47. n. 9. der Grüne mit weißer Stirn und rothem Halse.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 26. n. 13. Grüner mit weißer Stirn und rothem Halse.

Briffon, ornitholog. II. p. III. n. 27. Perroquet à gorge rouge de la Martinique. (6)

Latham, Vögel, I. p. 237. n. 88. Var. A. der weißköpfige Papagoy.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 118. β. Psittacus viridis, fronte alba, collo subtus rubefcente, marginibus pennarum albis, abdomine purpureo, remigibus extus caeruleis.

Frisch, Vögel, IV. Tab. 46. (Abbild. nicht ganz richtig.)

Barrere, ornith. Cl. 3. Gen. 2. Sp. 9. Psittacus viridis albo capite.

Jonston, av. p. 37. Psittacus Leucocephalus.

γ. *Latham*, Vögel, I. p. 237. n. 88. Var. B. der Papagey mit weißem Wirbel. (7)

Latham, Syst. ornith. I. p. 119. n. 113. Psittacus (Albifrons) viridis, rostro flavo, fronte alba, vertice et remigibus caeruleis, oculorum regionibus, alulaque rubris, pedibus cinereis.

(6) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

(7) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

Mus. Carl. fasc. III. Tab. 52. Psittacus albifrons.

d. *Briffon*, ornith. II. p. 112. n. 26. Perroquet à tête bleue de la Martinique. (8)

Latham, Vögel, I. p. 238. n. 88. Var. C. der Papagey mit aschgrauem Wirbel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 119. γ. Psittacus viridis, vertice cinereo-caeruleo, fronte alba, abdomine rubro maculato.

Büffon, Vögel, XX. p. 14. der Papagai, mit purpurfarbenem Bauch; m. 1 Fig.

112. OCHROCEPHALUS. Der gelbköpfige Papagey.

Briffon, ornith. II. p. 117. n. 35. Perroquet Amazonie du Bresil.

Büffon, Vögel, XIX. p. 265. die Amazoninpapagey mit gelbem Kopfe; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 238. n. 89. der gelbköpfige Amazonen-Papagey.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 119. n. 114. Psittacus (Amazonicus) viridis, vertice flavo, remigibus ex viridi, flavo, violaceo et rubro variis, margine alarum rectricibusque 4. exterioribus basi rubris.

β. *Büffon*, Vögel, XIX. p. 269. der grün und rothe Papagey von Cayenne.

Latham, Vögel, I. p. 239. n. 89. Var. A. der Papagey mit hellgelbem Wirbel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 120. β. Psittacus viridis fronte flava.

γ. *Halle*, Vögel, p. 116. n. 33. der Harlekin; Schnabel grünblau.

Briffon,

(8) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

Briffon, ornitholog. II. p. 116. n. 34. Perroquet
Amazoné à bec varié. (9)

Briffon, Vögel, XIX. p. 270. die zweyte Spielart.

Latham, Vögel, I. p. 239. n. 89. Var. B. der
buntschnäblichte Papagoy.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 120. γ. Psittacus
maior poikilorynchos.

Charleton, exercit. p. 74. n. 5. Ps. poikilorinchos.

Jonston, av. p. 37. Psittacus poikilorinchos.

Aldrov. av. I. p. 170. Ps. poikilorinchos.

113. BARBADENSIS. *Der Papagey aus Barbados.*

Klein, av. p. 25. n. 24. Ps. viridis et luteus, ca-
pite cinereo, Barbadensis.

Klein, Vorbereitung, p. 48. n. 24. der grün und
bleichgelbe mit aschgrauem Kopfe von Bar-
bados.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 28. grün und
gelber Graukopf.

Briffon, ornitholog. II. p. 108. n. 22. Perroquet
de Barbades.

Latham, Vögel, I. p. 240. n. 90. der Papagoy
aus Barbados.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 120. n. 115. Psitta-
cus (Barbadensis) viridis, fronte cinerascens,
vertice, genis, collo inferiore, tectricibus alarum
cruribusque luteis, remigibus intermediis ex-
tus prima medietate rubris.

Albin. av. III. Tab. 2. Green and yellow Par-
rot from Barbadoes.

31. LUCONIENSIS. *Der grüne Papagey von der
Insel Luçon.*

Müller, Naturhist. II. p. 144. n. 31. Philippinische.
S 5 Onomat.

(9) Nach *Briffon*, u. a. eine eigene Gattung.

Onomat. histor. natur. VI. p. 682. *der luçonische Papagay.*

Briffon, ornitholog. II. p. 121. n. 41. Perroquet de l'isle de Luçon.

Latham, Vögel, I. p. 248. n. 98. *der grüne Papagoy von der Insel Luçon.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 120. n. 116. Psittacus (Luconiensis) viridis, occipite uropygionque caeruleis, alis nigro-caeruleo-rubroque notatis.

32. AESTIVUS. *Der Ajurucurau.*

Müller, Natursystem, II. p. 144. n. 32. *bunter Amazon.*

Bechstein, Naturg. I. p. 344. n. 4. *der Amazon.*

Halle, Vögel, p. 118. n. 38. *der grüne Papagai mit buntem Schwanz und Flügeln.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 606. *der bunte amazonische Papagey.*

Klein, av. p. 25. n. 10. Psittacus viridis, capite croceo, fronte cyanea.

Klein, Vorbereit. p. 47. n. 10. *der Grüne, mit saffrangelbem Kopfe, und lasurblauer Stirne.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 26. n. 14. *Grüner mit gelbem Kopfe und blauer Stirn.*

Briffon, ornitholog. II. p. 114. n. 31. Perroquet Amazone.

Büffon, Vögel, XIX. p. 280. *der Ajurucurau; mit 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. p. 240. n. 91. *der gemeine Amazonen-Papagey.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 121. n. 117. Psittacus (Aestivus) viridis, facie flava, fronte caerulea, humeris rectricibusque 4. extimis basi rubro notatis,

Frisch

Frisch, Vögel, Tab. 47?

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 101. n. 27. Psittacus (Aestivus) brachyurus viridis, fronte caerulea, humeris sanguineis.

Jonston, av. p. 200. Aiurucuran.

β. *Briffon*, ornithol. I. p. 107. n. 20. Perroquet à tête jaune de Jamaïque. (10)

Büffon, Vögel, XIX. p. 282. der grüne schwarzschnablichte Papagey.

Latham, Vögel, I. p. 240. n. 91. Var. A. der Papagey aus Jamaika.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 121. β. Ps. viridis, capite pectoreque flavis, fronte gulaque caeruleis, entibus, margine alarum crissoque rubris.

Charleton, exercit. p. 74. n. 6. Psittacus melanorinchos.

Jonston, av. p. 37. Psittacus viridis melanorinchus.

γ. *Borowsky*, Thierreich, II. p. 93. n. 12. Psittacus Nobilis; der Amazon.

Briffon, ornitholog. II. p. 117. n. 36. Perroquet Amazone de la Jamaïque. (1)

Büffon, Vögel, XIX. p. 284. ein Papagey der eine Stirn von aquamarinblau hat, mit einer Binde von eben dieser Farbe über den Augen.

Latham, Vögel, I. p. 241. n. 91. Var. B. der See-Papagey.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 121. γ. Psittacus viridis, vertice flavo, genis gulaque luteis, fronte caerulea, tectricibus alarum minoribus remi-

(10) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

(1) Soll, nach *Briffon*, der *P. Nobilis* Linn. n. 5. seyn, daher auch die häufige Verwechslung der Synonymen zwischen beyden.

remigibus 5. intermediis prima medietate, re-
ctricibusque 4. extremis basi intus rubris.

Charleton, exercit. p. 74. n. 4. *Psittacus viridis*
cum alarum costa superne rubente.

Barrere, ornith. Cl. III. Gen. 2. Sp. 5. *Psittacus*
viridis alarum costa superne rubente.

Sloane, Jamaic. p. 297. n. 7. *Psittacus viridis* ala-
rum costa superne rubente.

Jonston, av. p. 36. *Psittacus viridis* alarum co-
sta superne rubente.

Gerin. ornith. I. p. 95. Tab. 108.

1. *Halle*, Vögel, p. 119. n. 40. *der grüne Papagai*
mit blauer Kehle und Platte.

Briffon, ornitholog. II. p. 108. n. 21. *Perroquet*
à tête bleue du Brésil.(²)

Büffon, Vögel, XX. p. 287. *Ajurucuruca.*

Latham, Vögel, I. p. 241. n. 91. Var. C. *der Pa-*
pagoy mit blauem Wirbel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 121. 3. *Psittacus vi-*
ridis, pileo caeruleo, nigro vario, macula ver-
ticitis subocularique flava, gula caerulea.

Jonston, av. p. 200. *Ajurucuruca.*

2. *Klein*, av. p. 25. n. 12. *Pf. viridis maior*, maculis
rubris luteisque, fronte caerulea.

Klein, Vorbereit. p. 47. n. 12. *der große Grü-*
ne, mit rothen und bleichgelben Flecken und
himmelblauer Stirne.

Klein, verb. Vögelhist. p. 26. n. 16. *Grüner mit*
gelb und rothen Flecken und blauer Stirn.

Briffon, ornithol. II. p. 118. n. 37. *Perroquet Ama-*
zone varié.(³)

Büffon,

(2) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

(3) Nach *Briffon* eine eigne Gattung. Ueberhaupt muß ich
bemerkten, daß die zu dieser ganzen Gattung und deren Va-
rietäten

Büffon, Vögel, XIX. p. 289. *eine vierte Abart.*

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 57. *der große grüne Papagey aus Westindien.*

Latham, Vögel, I. p. 241. n. 91. Var. D. *der grüne West-Indianische Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 122. e. Pfittacus viridis, vertice, genis gulaque flavis, fronte caerulea, remigibus 5. intermediis extus rectricibusque 4. extremis intus prima medietate rubris.

Frisch, Vögel, Tab. 49.

Gerin. ornith. I. p. 96. Tab. 115.

6. Pfittacus viridis, fronte caerulea, vertice, genis gula, abdomine medio genibusque flavis, axillis totis, macula remigum rectricibusque lateralibus basi rubris. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 122. η.

7. Pfittacus viridis, capite colloque flavis, humeris, macula remigum rectricibusque lateralibus, basi rubris. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 123. θ.

Gerin. ornith. I. p. 95. Tab. 110. Pfittacus viridis, colloque flavo.

8. Pfittacus viridi flavoque varius, fronte caerulea, humeris, macula remigum, rectricibusque lateralibus basi rubris. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 123. ι.

Büffon, pl. enl. 120. Perroquet Amazone varié du Brésil.

33. AMAZONICUS. *Der Amazonen-Papagey.* (4)

Müller, Naturf. II. p. 145. n. 33. *Surinamischer.*

Blumen-

rietäten gehörige Synonymen, sowohl unter sich, als auch mit der folgenden Gattung häufig verwechselt werden.

(4) Nach *Büffon* und *Latham* eine Spielart vom vorigen.

Blumenbath, Handb. der Naturgesch. p. 164. n. 5.
Pfittacus (Amazonicus) brachyurus viridis. fronte caerulea, temporibus fulvis; *Amazonen-Papagey*.

Quomat histor. nat. VI. p. 663. *der grüne amazonische Papagey mit gelber Stirn*.

Briffon, ornitholog. II. p. 114. n. 32. Perroquet Amazone à front jaune.

Büffon, Vögel, XIX. p. 291. *Amazonen-Papagey mit gelber Stirne*.

Latham, Vögel, I. p. 242. n. 91. Var. E. *der brasilianische Papagey mit hellgelber Stirn*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 122. ♂. Pfittacus viridis, pileo, genis gulaque flavis, superciliis caeruleis, remigibus 4. intermediis extus, rectricibusque lateralibus basi rubris.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 221. n. 6. *der Amazonen-Papagey*.

114. LUTEUS. *Der Papagey mit gelben Schultern*.

Latham, Vögel, I. p. 243. n. 92. *der Papagey mit gelben Schultern*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 123. n. 118. Pfittacus (Luteolus) viridis, pileo cyaneo, capistro subtus, gula humerisque flavis, tectricibus alarum maioribus macula magna fulva.

115. OCHROPTERUS. *Der Papagey mit hellgelben Flügeln*.

Halle, Vögel, p. 148. n. 28. *der grünbunte Papagai mit gelben Schilden*.

Klein, av. p. 25. n. 11. Pf. viridis, capite, humeris et femoribus luteis.

Klein, Vorbereit. p. 47. n. 11. *der Grüne, mit bleichgelben Kopfe, Schultern und Schenkeln*.

Klein,

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 15. *Grüner*, mit gelbem Kopfe, Flügelschilden und Schenkeln.

Briffon, ornitholog. II. p. 119. n. 38. Perroquet Amazone à gorge jaune.

Büffon, Vögel, XIX. p. 294. der Krik mit dem gelben Kopfe und der gelben Kehle; mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p. 243. n. 93. der Papagoy mit hellgelben Flügeln.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 123. n. 119. Psittacus (Ochropterus) viridis, fronte orbitisque albidis, vertice, genis, collo subtus femoribusque flavis, tectricibus alarum minimis extrioribus flavis, interioribus rubris, flavo marginatis.

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 95. der gelbkuppichte Papagoy.

Frisch, Vögel, Tab. 48.

116. PULVERULENTUS. Der gepuderte Papagey.

Büffon, Vögel, XIX. p. 298. der Müller, oder der gepuderte Krik; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 245. n. 94. der bestäubte grüne Papagoy.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 123. n. 120. Psittacus (Pulverulentus) viridis, supra albo pulveratus, vertice macula flava, remigibus caeruleo-nigris, alarum macula magna rubra.

Barrere, Fr. equ. p. 144. Psittacus maior albicans, capite luteo?

117. HAVANENSIS. Der Papagey aus Havanna.

Briffon, ornitholog. II. p. 115. n. 33. Perroquet Amazone à gorge bleue.

Büffon,

Büffon, Vögel. XIX. p. 303. *der Krik mit dem blauen Gesichte.*

Latham, Vögel, I. p. 245. n. 95. *der Papagoy aus Havanna.*

Latham, Syst. ornithol. I p. 124. n. 121. *Psittacus (Havanensis) viridis, facie, gula iuguloque cinereo. caeruleis, pectoris remigumque intermediarum macula rubra, crisso flavo, rectricibus lateralibus basi rubris.*

Gerin. ornith. II. p. 95. Tab. 114.

34. PARADISI. *Der Paradiespapagey aus Cuba.*

Müller, Natursystem, II. p. 145. n. 34. *gelber Papagey.*

Halle, Vögel, p. 123. n. 49. *der gelbe Paradiespapagey.*

Quomat. hist. nat. VI. p. 689. der kurzschwänzige Paradiespapagey.

Klein, av. p. 25. n. 18. *Pf. Paradisi ex Cuba.*

Klein, Vorbereit. p. 48. n. 18. *der Paradiespapagey aus Cuba.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 22. *gelb mit rothem Halsbande und Unterleibe.*

Briffon, ornithol. II. p. 125. n. 48. *Perroquet jaune de Cuba.*

Büffon, Vögel, XX. p. 5. *der Paradies-Papagai; m. 1 Fig.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 20. *der Paradiespapagey aus Cuba.*

Latham, Vögel, I. p. 252. n. 105. *der Paradies-Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 127. n. 132. *Psittacus (Paradisi) luteus, gula, ventre rectricumque basi rubris.*

50. AURORA. *Der gelbe Amazonenpapagey.*

Müller, Naturfyst. Supplem. p. 76. n. 48. *Glutpapagey.*

Briffon, ornitholog. II. p. 125. n. 47. *Perroquet jaune.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 277. *die gelbe Amazonin; m. 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. p. 252. n. 106. *der Aurora-Papagoy.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 127. n. 133. *Psittacus (Aurora) flavus, axillis lateribusque extimis alarum caudaeque rubris.*

47. PASSERINUS. *Der Sperlingspapagey.*

Müller, Naturfyst. II. p. 150. n. 47. *der Sperlingspapagey.*

Leske, Naturgesch. p. 240. n. 6. *der Sperlingspapagei.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 95. n. 17. *der Sperlingsparkit.*

Halle, Vögel, p. 126. n. 60. *das grüne blaue gefleckte Papagaichen. (Tuiete.)*

Büffon, Vögel, XX. p. 88. *der Ete oder Tui-Ete; m. 1 Fig.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 690. *der kleinste Parkit.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 163. n. 8. *kleinster, grün und blauer Papegey.*

Briffon, ornithol. II. p. 147. n. 83. *Petite Perruche à cul bleu du Bresil.*

Latham, Vögel, I. p. 265. n. 127. *der blau- und grüne Parkit.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 133. n. 156. *Psittacus (Passerinus) luteo-virens, macula alarum, uropygio alisque subtus caeruleis.*

Bankroft, Naturgesch. v. Guiana, p. 97. *der kurzschwänzige gelblich grüne Papagey.*

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 22. *der kleinste grün und blaue Papagey.*

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 103. n. 37. Pfittacus (Passerinus) brachyurus luteo-virens, macula alarum alisque subtus caeruleis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 183. Pfittacus Passerinus.

Jonston, av. p. 201. Tuiete.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 221. n. 7. *der Sperlingspapagey.*

118. CYANOLYSEOS. *Der Thecau.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 127. n. 134. Pfittacus (Cyanolyseos) luteo-virens, collari caeruleo, uropygio rubro.

Vidaure, Chil. p. 75. *der Papagey.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 221. n. 8. *der Thecau.*

40. SORDIDUS. *Der graue Papagey mit blauer Kehle, grünen Flügeln und Schwanz.*

Müller, Naturfyft. II. p. 148. n. 40. *grauer Papagey.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 696. der graue Papagey.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 27. n. 35. *Blaukehl mit brauner Brust, Bauch und Schenkeln, blauer Kehle, rothem Schnabel, grünem Kopfe und Flügeln.*

Briffon, ornitholog. II. p. 124. n. 45. *Perroquet de la nouvelle Espagne.*

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 62. *der dunkle Papagey.*

Büffon,

Büffon, Vögel, XX. p. 24. *der braune Papagai*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 254. n. 110. *der Schmutzige? Papagoy*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 127. n. 135. Psittacus (Sordidus) subfuscus, gula caerulea, alis caudaque viridibus, rostro crissoque rubris.

119. DOMINICENSIS. *Der Papagey von St. Domingo.*

Latham, Vögel, I. p. 251. n. 104. *der Papagoy von St. Dominik*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 126. n. 131. Psittacus (Dominicensis) viridis, remigibus caeruleis, frontis fascia rubra.

Büffon, Vögel, XX. p. 12. *der Papagai mit der rothen Stirbinde*; mit 1 Fig.

120. ERYTHROPTERUS. *Der karmoisinrothflügelichte Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 251. n. 103. *der Papagoy mit karmoisinrothen Flügeln*.

Latham, Syn. Suppl. p. 60. *Crimson-winged Parrot*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 126. n. 130. Psittacus (Erythropterus) viridis, dorso antice nigro, postice caeruleo, rectricibus alarum coccineis.

35. FESTIVUS. *Der Tavoua.*

Müller, Naturfyst. II. p. 145. n. 35. *der Festvogel*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 677. *der Festvogel*.

Büffon, Vögel, XX. p. 10. *der Tavua*; mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p. 250. n. 102. *der Tavoua*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 126. n. 139. Psittacus (Festivus) viridis, fronte purpurascente, superciliis gulaque caeruleis, dorso sanguineo.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 101. n. 29. Psittacus (Festivus) brachyurus viridis, fronte purpurascente, superciliis gulaque caeruleis, dorso sanguineo.

121. ROBUSTUS. *Der robuste Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 249. n. 100. *der robuste Papagey.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 112. n. 94. Psittacus (Robustus) viridis, capite cinerascente, capistro nigro, tectricibus alarum nigricantibus, macula coccinea.

122. MAGNUS. *Der grüne Papagey von Neu-guinea.*

Latham, Vögel, I. p. 249. n. 99. *der grüne Papagey von Neu-Guinea.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 125. n. 125. Psittacus (Viridis) viridis, remigibus primoribus caeruleis, minoribus subtus rubris.

123. TARABA. *Der Taraba.*

Briffon, ornith. II. p. 109. n. 24. Perroquet à tête rouge du Brésil.

Latham, Vögel, I. p. 248. n. 97. *der Taraba.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 125. n. 124. Psittacus (Tarabe) viridis, capite, collo subtus, pectore, tectricibusque alarum minoribus rubris.

Jonston, av. p. 202. Tarabe.

36. BRASILIENSIS. *Der brasilianische grüne Papagey.* (5)

Müller, Naturf. II. p. 146. n. 36. *Brasilianischer.*
Onomat.

(5) Nach *Latham* eine Spielart von *Psittacus Autumnalis*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 667. *der brasilianische Papagay.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 30. *grüner Papagay mit blauen Backen.*

Briffon, ornith. II. p. 113. n. 30. *Perroquet à front rouge du Brésil.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 313. *grüne brasilianische Papagey; m. 1 Fig.*

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 56. *der brasilianische grüne Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 247. n. 96. Var. C. *der brasilianische grüne Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 125. ♂, *Pittacus viridis, facie rubra, temporibus caeruleis, orbitis cinereis.*

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 96. *der brasilische grüne Papagey.*

Linne, System. Natur. Edit. X. I. p. 102. n. 30. *Pittacus (Brasilienfis) brachyurus viridis, facie rubra, temporibus caeruleis.*

Gerin. ornith. I. p. 96. Tab. 116.

37. AUTUMNALIS. *Der Herbstpapagey.*

Müller, Natursystem, II. p. 146. n. 37. *Herbstpapagey.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 666. *der amerikanische Papagay.*

Briffon, ornitholog. II. p. 121. n. 40. *Perroquet d'Amérique.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 311. *der kleine grüne Papagey; m. 1 Fig.*

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 59. *der kleinere grüne Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 247. n. 96. Var. B. *der Herbst-Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 124. n. 122. *Psittacus* (*Autumnalis*) *viridis*, fronte remigumque macula coccinea, vertice remigibusque primoribus caeruleis.

Bankroft, Naturgesch. v. Guiana, p. 96. *der kleineren grünen Papagoy*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 102. n. 31. *Psittacus* (*Autumnalis*) *brachyurus viridis*, fronte remigumque macula coccinea, vertice remigibusque primoribus caeruleis.

Gerin, ornith. II. p. 22. Tab. 135.

β. *Der Papagey mit blauer Stirn und Kehle.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 162. n. 2. *grüner Papagey mit blauer Stirn und rother Kehle.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 308. *der Krik mit dem blauen Kopfe*; mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 13. *der grüne Papagey mit blauen Backen.*

Latham, Vögel, I. p. 246. n. 96. *der Papagoy mit dem blauen Gesichte.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 124. b. *Psittacus viridis*, capite gulaque caeruleis, iugulo pectoraque rubris, remigibus caeruleis, intermediis basi rubris.

Bankroft, Guiana, p. 95. *der blauköpfige Papagoy.*

γ. *Der Papagey mit roth- und weißbuntem Kopfe.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 310. *der Cocho, Catharina.*

Latham, Vögel, I. p. 247. n. 96. Var. A. *der Papagoy mit roth und weißem Gesichte.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 124. γ. *Psittacus capite ex rubro et albedo vario.*

38. ACCIPITRINUS. *Der Papagey mit dem Geyerkopfe.*

Müller, Naturfyst. II. p. 147. *Braunkopf.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 93. n. 13. *der gescheckte Papagei.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 658. *der braunköpfige Papagay.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 26. n. 33. *Geyerpapagey mit braunem Geyerkopfe, sonst bunt.*

Briffon, ornith. II. p. 123. n. 43. *Perroquet varié des Indes.*

Biffon, Vögel, XIX. p. 81. *der bunte Papagey; mit 1 Fig.*

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 60. *der Papagey mit dem Geyerkopfe.*

Latham, Vögel, I. p. 226. n. 74. *der Papagoy mit dem Habichtskopfe.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 111. n. 89. *Pfittacus (Accipitrinus) viridis, capite griseo, collo pectoreque subviolaceo vario, remigibus rectricibusque apice caeruleis.*

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 102. *Pfittacus (Accipitrinus) brachyurus viridis, capite griseo, collo pectoreque subviolaceo vario, remigibus rectricibusque apice caeruleis.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 181. *Pfitt. Accipitrinus.*

Gerin. ornith. I. p. 96. Tab. 120.

β. *Der gesprenkelte Geyerpapagey.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 82. 83. *Perroquet maillé.*

Büffon, Vögel, XX. p. 8. *der gefleckte Papagai.*

Latham, Vögel, I. p. 227. n. 74. *Var. A. der gesprenkelte Papagey.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 112. n. 89. β.

39. **MENSTRUUS.** *Der Blauhals.*
Müller, Naturfyft. II. p. 147. n. 39. *Blauhals.*
Onomat. hist. nat. VI. p. 685. *der Blauhals.*
Briffon, ornitholog. II. p. 112. n. 28. *Perroquet à tête bleue de la Guiane.*
Büffon, Vögel, XX. p. 16. *der Papagai mit blauem Kopfe und blauer Kehle.*
Latham, Vögel, I, p. 252. n. 107. *der Blauhals.*
Latham, Syft. ornithol. II. p. 113. n. 95. *Psittacus (Menstruus) viridis capite caerulefcente, criffo rubro.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgefch. I. p. 28. n. 33. *der grüne Papagey mit dunkelblauem Kopfe.*
124. **PURPUREUS.** *Der purpurfarbne Papagey.*
Latham, Vögel, I. p. 253. n. 108. *der purpurfarbne Papagey.*
Latham, Syft. ornithol. I. p. 129. n. 140. *Psittacus (Purpureus) atro-fufcus, fubtus purpureus, vertice genisque nigris, torque ferrugineo maculis nigricantibus.*
Büffon, Vögel, XX. p. 19. *der violette Papagai; mit 1 Fig.*
Seligmann, Vögel, IX. Tab. 4. *der kleine fchwärzliche Papagei.*
41. **MELANOCEPHALUS.** *Der fchwarzplattige Papagey mit weißer Bruft.*
Müller, Naturfyft. II. p. 148. n. 41. *Schwarzkopf.*
Onomat. histor. nat. VI. p. 685. *der fchwarzköpfige Papagey mit weißer Bruft.*
Klein, verbefst. Vögelhifft. p. 25. n. 9. *roth mit weißer Bruft und fchwarzer Platte.*
Briffon, ornith. II. p. 122. n. 42. *Perroquet à poitrine blanche du Mexique.*

Büffon,

Büffon, Vögel, XX. p. 32. *der Maipuri*; mit
1 Figur.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 64. *der weißgebrü-*
stete Papagey.

Latham, Vögel, I. p. 255. n. 112. *der Papagoy*
mit weißer Brust.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 128. n. 136. *Psittacus*
(*Melanocephalus*) *viridis*, *subtus luteus*, *pileo*
nigro, *pectore albo*, *orbitis incarnatis.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 102. n. 33. *Psittacus*
(*Melanocephalus*) *brachyurus viridis*, *subtus*
luteus, *pileo nigro*, *pectore albo.*

Hermann, tab. affin. animal. p. 182. *Psittacus me-*
lanocephalus.

125. PILEATUS. *Der Caica.*

Latham, Vögel, I. p. 256. n. 113. *der Caica.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 128. n. 117. *Psittacus*
(*Caica*) *viridis*, *capite nigro*, *orbitis albis*,
collo flavo, *humerorum macula et rectri-*
cum apicibus caeruleis.

Büffon, Vögel, XX. p. 36. *der Caica*; m. 1 Fig.

126. LUDOVICIANUS. *Der orangeköpfige Pa-*
pagey.⁽⁶⁾

Klein, av. p. 25. n. 14. *Psittacus capite luteo*, *fron-*
te rubra, *cauda longa.*

Klein, Vorbereit. p. 47. n. 14. *mit dem bleich-*
gelbem Kopfe, rother Stirn, und langem
Schwanze.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 26. n. 17. *Grüner,*
langgeschwänzter, mit gelbem Kopfe, und po-
meranzfarbener Stirn.

Büffon, Vögel, XIX. p. 26. *der Papagai mit*
dem aurorenfarbigen Kopfe.

T 5

Latham,

(6) Nach *Latham* eine Spielart von *Psittacus Carolinense*.

Latham, Vögel, I. p. 254. n. 111. *der orange-köpfige Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 93. n. 33. β . *Pfittacus viridis capite luteo, versus rostrum rubro.*

Gein. ornith. II. p. 17. Tab. 121.

Frisch, Vögel, Tab. 52.

42. COLLARIUS. *Der Xaxabes.*

Müller, Naturfystem, II. p. 148. *Rothkragen.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 671. *der gemeine Papagay von Jamaika, mit dem rothen Krage.*

Briffon, ornitholog. II. p. 110. n. 25. *Perroquet à gorge rouge de la Jamaïque.*

Büffon, Vögel, XX. p. 22. *der Saffebe.*

Latham, Vögel, I. p. 254. n. 109. *der Papagoy mit rother Kehle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 128. n. 139. *Pfittacus (Collarius) viridis, gula rubente.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 102. n. 34. *Pfittacus (Collarius) viridis, gula rubente.*

43. SENEGALUS. *Der senegalische Papagey.*

Müller, Naturf. II. p. 149. n. 43. *Senegalischer.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 693. *der kleine Papagey aus Senegal.*

Briffon, ornitholog. II. p. 153. n. 92. *petite Perruche du Senegal.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 96. *der Papagey mit dem grauen Kopfe; m. I Fig.*

Latham, Vögel, I. p. 257. n. 114. *der senegalische Papagoy.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 128. n. 138. *Pfittacus (Senegalus) viridis, subtus luteus, capite cinereo, orbitis nigris nudis.*

127. TUIPARA. *Der Tuipara.*

Briffon, ornithol. II. p. 147. n. 82. petite Perruche à tête rouge du Brésil.

Latham, Vögel, I. p. 257. n. 115. *der Tuipara.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 129. n. 141. Psittacus (Tuipara) viridis, lunula frontis rubra, macula alarum lutea, rostro incarnato.

Jonston, av. p. 201. Tuipara.

44. CHRYSOPTERUS. *Der goldflügelichte Papagey.*

Müller, Naturf. II. p. 149. n. 44. *der Goldflügel.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 670. *der Goldflügel.*

Briffon, ornithol. II. p. 155. n. 97. petite Perruche aux ailes d'or.

Büffon, Vögel, XIX. p. 202. *der Sittich mit vergoldeten Flügeln*; m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 83. fig. 2. *der Papagey mit Goldflügeln.*

Latham, Vögel, I. p. 257. n. 116. *der Parkit mit goldnen Flügeln.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 129. n. 142. Psittacus (Chrysopterus) viridis, alis macula caerulea fulvaque, orbitis nudis albis.

45. PULLARIUS. *Der Zwergpapagey.*

Müller, Naturf. II. p. 149. n. 45. *der Zwergpapagey.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 95. n. 18. *der Zwergpapagey.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 164. n. 6. Psittacus (Pullarius) brachyurus viridis, fronte rubra, cauda fulva, fascia nigra, orbitis cinereis. (*Pinseparable.*)

Onomat.

- Onomat. histor. nat. VI. p. 692. *der guineische Parkit.*
- Klein*, av. p. 25. n. 21. Pf. viridis minimus, fronte et gula rubris.
- Klein*, Vorbereit, p. 48. n. 21. *der allerkleinste Grüne, mit rother Stirn und Kehle.*
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 26. n. 15. *kleiner Grüner mit rother Stirn und Kehle.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 164. n. 10. *kleiner rothköpfiger Papagey.*
- Briffon*, ornithol. II. p. 148. n. 85. *petite Perruche de Guinée.*
- Büffon*, Vögel, XIX. p. 191. *der Sittich mit dem rothen Kopfe, oder der guineische Sperling; mit 1 Fig.*
- Seligmann*, Vögel, I. Tab. XI. fig. 2. *der kleine grüne Papagey aus Ostindien.*
- Latham*, Vögel, I. p. 258. n. 117. *der rothköpfige guineische Parkit.*
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 129. n. 143. Pfittacus (Pullarius) viridis, fronte gulaque rubris, uropygio caeruleo, cauda fulva fascia nigra, orbitis cinereis.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 28. n. 34. *der kleinste grüne Papagey mit rother Stirn und Kehle.*
- Wirsing*, Vögel, Tab. 12. *indianische Spatz.*
- Bossmann*, Reise nach Guinea, p. 320. fig. 23. und 24.
- Linne'*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 102. n. 35. Pfittacus (Pullarius) brachyurus viridis, fronte rubra, cauda fulva, fascia nigra.
- Gerin*, ornith, II. p. 21. Tab. 133.

128. INDICUS. *Der roth und grüne indianische Papagey.*(7)

Briffon, ornitholog. II. p. 149. n. 86. petite Peruche des Indes.

Büffon, Vögel, XIX. p. 197. *der sehr kleine grün und rothe Papagey.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. XI. fig. 1. *der kleinste grüne und rothe indianische Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 259. n. 118. *der roth und grüne indianische Papagoy.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 130. n. 146. Psittacus (Asiaticus) viridis, rostro, pileo dorsoque postico fulvis, remigibus rectricibusque subtus caeruleo-viridibus, orbitis pedibusque incarnatis.

Gerin. ornith. II. p. 21. Tab. 134.

46. GALGULUS. *Der Hangvogel.*

Müller, Natursyst. II. p. 149. n. 46. *der Hangvogel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 95. n. 19. *der Hangvogel.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 677. *der Hangvogel.*

Briffon, ornitholog. II. p. 148. n. 84. petite Peruche de Malaca?

Büffon, Vögel, XIX. p. 187. *der Sittich mit dem blauen Kopfe*; m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 83. fig. 1. *der mit Saphir gekrönte Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 260. n. 119. Var. A. *der Parkit mit sapphir-blauem Wirbel.* p. 261. *Parckicki.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 131. n. 148. Psittacus (Galgulus) viridis, uropygio pectoreque coccineis,

(7) Nach *Büffon* eine Spielart vom vorigen; nach *Briffon* der Psittacus Galgulus.

neis, vertice caeruleo, lunula cervicis lutea, tectricibus caudae rubris.

Beckmann, Naturhist. p. 39. *Galgulus*.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 103. n. 36.

Pfittacus (*Galgulus*) brachyurus viridis, uropygio pectoreque coccineis, vertice caeruleo.

β. *Der Coulacissi*.⁽⁸⁾

Briffon, ornithol. II. p. 150. n. 87. petite Perruche des Philippines.

Büffon, Vögel, XIX. p. 199. *der Coulacissi*; mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p. 259. n. 119. *der Philippinen-Parkit*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 131. n. 148. β. Pfitt. viridis, capite viridi-lutescente, fronte, collo subtus tectricibusque caudae rubris, nucha lunula flava.

129. ANACA. *Der Anaca*.

Halle, Vögel, p. 127. n. 62. *das braunköpfige bunte Papagaichen*.

Briffon, ornitholog. II. p. 153. n. 93. petite Perruche brune du Brésil.

Büffon, Vögel, XX. p. 49. *der Anaka*.

Latham, Vögel, I. p. 261. n. 120. *der Anaka*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 131. n. 149. Pfittacus (*Anaca*) viridis, subtus rufo-fuscus, pileo castaneo, gula cinerea, macula dorsali caudaque pallide fuscis, margine alarum rubro.

Jonston, av. p. 201. *Anaca*.

130. PUR-

(8) Nach *Büffon* eine eigne Gattung.

130. PURPURATUS. *Der Papagey mit purpurfarbenem Schwanze.*

Latham, Vögel, I. p. 262. n. 121. *der Parkit mit purpurfarbnem Schwanze.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 132. n. 150. Psittacus (Purpuratus) viridis, vertice cerviceque cinereis, dorso postico margineque alarum caeruleis, rectricibus lateralibus purpureis, apice nigris.

131. CANUS. *Der grauköpfige Papagey.*

Briffon, ornithol. II. p. 151. n. 88. *petite Perruche de Madagascar.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 204. *der Sittich mit dem grauen Kopfe; mit 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. p. 262. n. 122. *der grauköpfige Parkit.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 132. n. 151. Psittacus (Canus) viridis, capite colloque subtus viridi-griseis, cauda rotundata, fascia lata nigra.

132. MELANOPTERUS. *Der schwarzflüchtige Papagey.*

Büffon, Vögel, XIX. p. 206. *der Sittich mit den bunten Flügeln; mit 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. p. 263. n. 123. *der Parkit mit schwarzen Flügeln.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 132. n. 152. Psittacus (Melanopterus) pallide viridis, dorso alisque nigris remigibus secundariis luteis apice caeruleis, rectricibus purpureis, fascia nigra.

133. CAPENSIS. *Der capsche Papagey.*

Müller, Natursyst. Suppl. p. 80. n. 66. *der Blauroandparkit.*

Büffon,

- Büffon, Vögel, XIX. p. 208. *der Sittich mit den blauen Flügeln*; m. 1 Fig.
- Latham, Vögel, I. p. 263. n. 124. *der kapische Parkit.*
- Latham, Syst. ornithol. I. p. 132. n. 153. Psittacus (Capensis) viridis, alis supra caeruleo-variis, subtus caeruleis, rostro pedibusque rubescens.
134. TORQUATUS. *Der Papagey mit dem Halsbande.*
- Büffon, Vögel, XIX. p. 209. *der Sittich mit der Halsbinde*; m. 1 Fig.
- Latham, Vögel, I. p. 264. n. 125. *der Parkit mit dem Halsbande.*
- Latham, Syst. ornithol. I. p. 133. n. 154. Psittacus (Torquatus) viridis, fascia nuchae lutescente nigro-undulata.
135. MINOR. *Der kleine grüne Papagey mit karmoisirothem Scheitel und blauer Brust von der Insel Luçon.*
- Büffon, Vögel, XIX. p. 211. *der Sittich mit schwarzen Flügeln.*
- Latham, Vögel, I. p. 264. n. 126. *der Parkit von der Insel Luçon.*
- Latham, Syst. ornithol. I. p. 133. n. 155. Psittacus (Minor) viridis, pileo tectricibusque caudae coccineis, pectore caeruleo.
136. TOVI. *Der Tovi.*
- Briffon, ornitholog. II. p. 151. n. 89. *petite Peruche à gorge jaune.*
- Büffon, Vögel, XX. p. 81. *der Tui mit der gelben Kehle.*
- Latham, Vögel, I. p. 265. n. 128. *der Tovi.*
- Latham,

Latham, Syst. ornith. I. p. 134. n. 157. *Psittacus* (Tovi) viridis, gula macula parva pallide fulva, tectricibus alarum macula castanea viridi-aureo varia.

137. *TIRICA*. *Der Tirica*.

Halle, Vögel, p. 126. n. 57. *das grüne blaufüßige Papagaichen*.

Büffon, Vögel, XX. p. 85. *der Tirica*; m. i Fig.

Briffon, ornithol. II. p. 147. n. 81. *petite Perruche du Bresil*.

Latham, Vögel, I. p. 265. n. 129. *der Tirica*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 134. n. 158. *Psittacus* (*Tirica*) viridis, rostro incarnato, pedibus caerulefcentibus.

Jonston, av. p. 202. *Tui-Tirica*.

138. *SOSOVÉ*. *Der Sosové*.

Latham, Vögel, I. p. 266. n. 130. *der Sosové*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 134. n. 159. *Psittacus* (*Sosové*) viridis, macula alarum tectricum-que flava, rostro pedibusque griseis.

Büffon, Vögel, XX. p. 83. *der Sosové*; m. i Fig.

139. *TUI*. *Der Tui*.

Halle, Vögel, p. 125. n. 55. *das grüne langschwänzige Papagaichen*.

Halle, Vögel, p. 126. n. 58. *das blaßgrüne Papagaichen*.

Briffon, ornithol. II. p. 152. n. 90. *petite Perruche à tête jaune du Bresil*.

Büffon, Vögel, XX. p. 91. *der goldköpf. Tui*; m. i F.

Latham, Vögel, I. p. 266. n. 131. *der Tui*.

Latham, Syst. ornith. I. p. 134. n. 160. *Ps.* (*Tui*) viridis, fronte aurantia, orbitis flavis, rostro nigro.

Jonston, av. p. 201. *Tui*, quarta species.

140. ERYTHROCHLORUS. *Der roth und grüne Papagey mit dem Federbusche.*

Büffon, Vögel, XX. p. 93. n. 7.

Briffon, ornith. II. p. 154. n. 94. petite Perruche hupée.

Latham, Vögel, I. p. 267. n. 132. *der roth und grüne Parkit mit dem Federbusche.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 134. n. 161. Pfittacus (Erythrochlorus) viridis cristatus, occipite, alis caudaque rubris.

Jonston, av. p. 38. Pfittacus erythrochlorus cristatus.

141. MEXICANUS. *Der mexicanische Papagey mit dem Federbusche.*

Klein, av. p. 25. n. 22. Pfittacus collo rubro, plumis in capite purpureis.

Klein, Vorbereit. p. 48. n. 22. *der Vogel von Cocho mit rothem Halse und Purpurfedern auf dem Kopfe.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 26. n. 26. *Rothhals mit purpurfarbenem Busche.*

Halle, Vögel, p. 131. n. 70. *das scharlachrothe Mexikanerpapagaichen mit kurzem Kalotchen.*

Briffon, ornithol. II. p. 154. n. 95. petite Perruche hupée du Mexique.

Büffon, Vögel, XX. p. 93. n. 8.

Latham, Vögel, I. p. 267. n. 133. *der mexicanische Parkit mit dem Federbusche.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 135. n. 162. Pfittacus (Mexicanus) ruber, fronte cristata, tectricibus alarum purpurascens, gula flava, remigibus viridibus albo marginatis.

Gerin. ornith. II. p. 21. Tab. 131.

A. Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Die Anzahl der langschwänzigen Papageyen ist um 57, der kurzschwänzigen 37, also das ganze Geschlecht mit 94 Gattungen vermehrt. Bey der ersten Gattung ist der *Aras* vom *Aracanga*, so auch bey der 22sten der weiße *Kakadu* mit schwefelgelbem Federbusch vom gemeinen *Kakadu* getrennt, und daraus n. 52. und 93. zwey besondere Gattungen gemacht; und eben so ist bey der vierten Gattung *Hasselquists Psittacus obscurus*, von *Brissons Psitt. Mascarinus* getrennt, und letzterer n. 49. als eine eigne Gattung aufgeführt. Ueberdem sind bey der 3ten Gattung zwey, bey der 6ten zwey, bey der 14ten drey, bey der 18ten zwey, bey der 24ten vier, bey der 25ten zwey, bey der 26ten zwey, bey der 30ten vier, bey der 32ten drey, bey der 37ten drey, bey der 38ten zwey, und bey der 46ten zwey Varietäten aus einander gesetzt.

B. Unbestimmtere Thiere.

1. Der grüne Papagey mit einem rothen Huth u. Stirn.

Scopoli, an. i. n. 32. *Psittacus pileatus*.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 27. n. 32.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 125. n. 123. *Psittacus* (*Pileatus*) *viridis*, *vertice et fronte coccineis*, *uropygio luteo-virescente*, *remigibus et rectricibus latere exteriorè cyaneis*.

Büffon, Vögel, XIX. p. 314.

Vielleicht eine Spielart von *Psittacus Brasiliensis*?

2. *Psittacus cauda corpore sesquilongiore. Indianischer Rabe.*

Kramer, Austr. p. 332. n. 1.

Wahrscheinlich *Psitt. Macao*.

3. Psittacus viridis, remigibus rectricibusque introrsum caeruleis, phoeniceis et flavis. *Grüner Paperl.*
Kramer, Austr. p. 332. n. 3.
4. Psittacus viridis cauda longitudine corporis. *Großes Peruquetl.*
Kramer, Austr. p. 332. n. 4.
5. Psittacus viridis rostro carneo, anteriore capitis parte miniacea. *Kleines Peruquetl.*
Kramer, Austr. p. 333. n. 5.

C. Neuere Gattungen.

a. Langschwänzige.

1. Psittacus (Hyacinthinus) macr. violaceo - caeruleus, capite colloque dilutioribus, orbitis gulaque nudis flavis.
Latham, Syst. ornith. I. p. 84. n. 5.
2. *Der Parkit mit schüppiger Brust; (aus Cayenne.)*
Latham, Syn. I. p. 246. n. 45. Scaly-breasted Parakeet.
Latham, Vögel, I. p. 209. n. 45.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 101. n. 53. Psittacus (Squamofus) macr. viridis, capite, collo pectoreque marginibus pennarum aurantiis, humeris coccineis, uropygio abdomineque medio sanguineis.
3. *Der Pennantische Papagey; (in Neusüdwallis.)*
Latham, Vögel, I. p. 217. n. 134.
Latham, Syn. Suppl. p. 61. Pennantian Parrot.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 90. n. 26. Pf. (Pennantii) macr. coccineus, dorso antice nigro cocc-

coccineo undulato, lateribus corporis gulaque caeruleis, remigibus intus macula alba.

- β. Pf. macrourus coccineus, dorso nigro rubro undulato, gula, alis caudaque caeruleis, medio alarum fascia pallidiore.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 91. n. 26. β.

4. *Der unbestimmte Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 218. n. 136.

Latham, Syn. Suppl. p. 62. Dubious Parrot.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 97. n. 44. Psittacus (Dubius) macr. viridis, collo rufescente, remigibus toto, rectricibusque 4. intermediis apice caeruleis, orbitis nudis flavescens.

5. *Der Papagey mit orangefarbenem Bauche.*

Latham, Vögel, I. p. 218. n. 137.

Latham, Syn. Supplem. p. 62. Orange-bellied Parrot.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 97. n. 45. Psittacus (Chrysoaster) macr. viridis, tectricibus alarum maioribus extus caeruleis, intus macula alba, abdomine postico aurantio, rectricibus 4. extimis apice luteis.

6. *Der grüne Papagey mit zwey schwarzen Flecken am Halse*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 99. n. 49. Psittacus (Bimaculatus) macr. viridis, maculis colli duabus elongatis nigris, utriusque alae macula magna et sulphurea.

Mus. Carif. fasc. II. Tab. 30. Psitt. bimaculatus.

7. *Der schöne Papagey aus Neusüdwallis.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 103. n. 60. Psittacus (Formosus) macr. viridis, rectricibus 4.

intermediis nigro viridique, reliquis nigro flavoque fasciatis, remigibus medio fascia interrupta flava.

8. *Der südliche Papagey.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 104. n. 66. Psittacus (Australis) macr. viridis, vertice caeruleo, nucha maculis, axillisque toto flavis.

Vielleicht eine Spielart von *Psitt. Pacificus*.

9. *Der ausländische Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 218. n. 138.

Latham, Syn. Suppl. p. 62. Peregrine Parrakeet.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 105. n. 67. Psittacus (Peregrinus) macr. viridis, macula alarum longitudinali fusca.

10. Psittacus (Puffillus) macr. fusco - olivaceus, capistro basique rectricum intus coccineis.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 106. n. 71.

b. *Kurzschwänzige.*

11. *Des Ritters Banks Kakatoo*; (aus Neuholland.)

Latham, Vögel, I. p. 222. n. 139. Tab. XI.

Latham, Syn. Suppl. p. 63. Tab. 109. Bankian Cockatoo.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 107. n. 76. Psittacus (Bankii) brach. atro-nitens subcristatus, capite tectricibusque alarum flavescente punctatis, rectricibus lateralibus medio coccineis, nigro fasciatis.

β. Ps. brach. atro-nitens subcristatus, collo, lateribus, gula iuguloque flavis, rectricibus lateralibus medio coccineis, nigro fasciatis.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 107. β.

γ. Psit-

γ. Pfittacus brach. atro-nitens subcrissatus, capite colloque fusco-olivaceis, rectricibus laterali-bus medio coccineis.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 107. γ.

12. *Der Haubenpapagey aus Neusüdwallis.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 109. n. 80. Pfittacus (Galeritus) brach. albus, crista plicatili acuminata, elongata, basique caudae sulphureis.

13. *Der Papagey aus Cochinchina.*

Latham, Vögel, I. p. 268. n. 143.

Latham, Syn. Suppl. p. 65. Cochinchina Parrot.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 116. n. 103. Pfittacus (Cochinchinensis) caeruleus, fronte, nucha collo inferiore, pectore abdomineque medio coccineis, tectricibus alarum fascia, remigibus caudaque nigris.

14. *Der rothschnäblichte chinesische Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 268. n. 141. *der sprenglichte? chinesische Papagey.*

Latham, Syn. Supplem. p. 64. Grisled Parrot.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 118. n. 109. Pfittacus (Nafutus) viridis, capite pectoreque virefcentegriseis, tectricibus alarum flavis.

15. *Gerins-Papagey; (aus Brasilien.)*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 119. n. 112. Pfittacus (Gerini) viridis, capite albo, humeris remigibus intermediis, rectricibusque basi intus rubris.

Gerin. ornithol. I. p. 95. Tab. 109. Pfit. brasil. viridis capite albo.

16. *Der östliche Papagey.*

Latham, Vögel, I. p. 267. n. 140.

Latham, Syn. Suppl. p. 64. Eastern-Parrot.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 125. n. 126. Psittacus (Orientalis) viridis, margine alarum exteriori remigibusque primoribus caeruleis, cauda apice flava.

17. *Der Papagey mit blauen Wangen.*

Latham, Vögel, I. p. 268. n. 142.

Latham, Syn. Suppl. p. 64. Blue-cheeked Parrot.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 126. n. 127. Psittacus (Adscitus) viridis, genis alisque caeruleis, dorso antice nigro-luteo striato, postice lutescente, crisso rubra.

18. *Der Papagey von Batavia.*

Latham, Vögel, I. p. 268. n. 144.

Latham, Syn. Suppl. p. 65. Amber-Parrot.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 126. n. 128. Psittacus (Batavensis) viridis striis flavis, occipite nuchaque nigricantibus, facie femoribusque coccineis.

19. *Der Papagey mit blauem Steiß; (aus Malacca.)*

Latham, Vögel, I. p. 269. n. 146.

Latham, Syn. Suppl. p. 66. Blue-rumped Parakeet.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 130. n. 144. Psittacus (Malaccensis) viridis, fronte uropygioque caeruleis, tectricibus alarum inferioribus rubris.

Somm. voy. Ind. II. p. 212. petite Perruche de Malacca.

20. *Der Papagey mit rothem Nacken.*

Latham, Vögel, I. p. 269. n. 147.

Latham, Syn. Suppl. p. 66. Red-naped Parakeet.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I p. 130. n. 145. Pfitt.
(*Cervicalis*) viridis, fronte, lunula cervicis, col-
lo subtus pectoreque coccineis.

21. *Der Frühlingspapagey.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 130. n. 147. Pfitta-
cus (*Vernalis*) laete viridis, alis prasinis, uro-
pygio caudaeque pagina superiore sanguineis,
rostro pedibusque pallidis.

Mus. Carlf. fasc. II. 29. *Pfittacus vernalis*,

46. GESCHLEHT, RAMPHASTOS. *Der*
Pfefferfraß.

Müller, Natur Syst. II. p. 153. Gen. XLVI.

Leske, Naturgesch. p. 240. Gen. XV.

Borowsky, Thierreich, II. p. 96. Gen. VI.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 165,
Gen. VI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 344. Gen. VI.

Neuer Schaupl. d. Natur, VI. p. 462. IX. p. 93.

Onomat. hist. nat. VI. p. 774.

Klein, av. p. 36. Gen. VI.

Briffon, ornithol. II. p. 156. Gen. LIV.

Ratsch, Thiere, I. p. 300. Gen. LIV.

Latham, allg. Ueberf. d. Vögel, I. p. 270. Gen. VI.

Latham, Syst. ornith. I. p. 135. Gen. VI.

Hermann, tab. affin. anim. p. 184.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 221.
Gen. VI.

1. VIRIDIS. *Der grüne Pfefferfraß aus Cayenne.*(9)

Müller, Natur System, II. p. 154. n. 1. *der grüne*
Toukan. Tab. 22. fig. 4.

V 5

Leske,

(9) In *Latham* Syst. ornith. h. c. ist aus Versehen das Synonym
aus *Edw. glean.* Tab. 329. nochmals angeführt, welches zu
n. 5. gehört.

Leske, Naturgesch. p. 241. n. 1. *der grüne Pfefferfraß.* Tab. 6. fig. 3.

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 94. n. 1. *grüner Toucan.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 783. *der grüne Toukan.*

Briffon, ornith. II. p. 162. n. 8. Toucan verd de Cayenne.

Latham, Vögel, I. p. 276. n. 9. *der grüne Pfefferfraß.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 138. n. 9. Ramphastos (Viridis) abdomine flavo, uropygio luteo.

9. PAVONIUS. *Der Pfauen-Pfefferfraß.*

Müller, Naturyst. Supplem. p. 84. n. 15. Ramphastos pulcher; *der Scheck.*

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 95. n. 13. *schöner Toucan.*

Briffon, ornitholog. II. p. 161. n. 7. Toucan du Mexique.

Latham, Vögel, I. p. 275. n. 8. *der Pfauen-Pfefferfraß.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 137. n. 8. Ramphastos (Pavonius) toto corpore viridi rubro pavonioque colore variegatus, rostro luteo nigroque vario.

2. PIPERIVORUS. *Der Koulik.* (10)

Müller, Naturyst. II. p. 155. n. 2. *der Pfefferfresser.* Tab. 5. fig. 1.

Rorowsky, Thierreich, II. p. 97. n. 2. *der Pfeffervogel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 344. *der Pfeffervogel.*
Bech-

(10) Wird oft mit *R. Tucanus* verwechselt, wie ich auch bey *Briffon* finde.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 165. *der eigentliche Pfeffervogel.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 780. *der Pfefferfresser.*

Briffon, ornitholog. II. p. 163. n. 10. Toucan à collier de Cayenne, ou queue de rat.

Batsch, Thiere, I. p. 303. *der Pfeffervogel.*

Latham, Vögel, I. p. 277. n. 11. *der Koulik.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 138. n. 12. Ramphastos (Piperivorus) viridis, antice niger, macula aurium aurea, lunula cervicis aurantia, crisso femoribusque rubris.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 103. n. 1. Ramphastos (Piperivorus) rostro nigro, carina crassissima.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 184. Ramphastos piperivorus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 222. n. 1. *der grüne Pfefferfraß.*

3. ARACARI. *Der Aracari.*

Müller, Natursystem, II. p. 156. n. 3. *der Brasilianische.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 98. n. 3. *der brasilianische Fischer.*

Halle, Vögel, p. 158. n. 96. *der brasilianische Fischer mit gebogenem zackigen Schnabel.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 58. n. 64. *der brasilische Fischer.*

Neuer Schauplatz d. Natur, IX. p. 94. n. 3. *Aracari.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 775. *der brasilianische Toucan.*

Klein, av. p. 30. n. 4. Cuculus brasiliensis,

Klein, Vorbereit. p. 58. n. 4. *der Kuckuck von Brasilien.*

Klein,

Klein, verbess. Vögelhist. p. 33. n. 4. *brasilianischer Kuckuck*.

Brissou, ornithol. II. p. 162. n. 9. Toucan verd du Brésil.

Batsch, Thiere, I. p. 303. *der brasilian. Fischer*.

Latham, Vögel, I. p. 276. n. 10. *der Arakari*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 138. n. 11. Ramphastos (Aracari) viridis, macula aurium castanea, fascia abdominali, crisso uropygioque rubris, abdomine flavo.

Wirsing, Vögel, Tab. 41. *der kleine Toucan*.

Gerin. ornith. II. p. 61. Tab. 204.

Jonston, av. p. 211. Aracari Brasiliensibus.

10. TORQUATUS. *Der Cothicat*.

Brissou, ornithol. II. p. 161. n. 6. Toucan à collier du Mexique.

Latham, Vögel, I. p. 275. n. 7. *der Pfefferfraß mit dem Halsbände*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 137. n. 7. Ramphastos (Torquatus) supra niger, collo subtus albido, abdomine viridi, postice rubro, torque rubro.

Neuer Schauplatz der Natur, IX. p. 95. n. 12. *Rothbauch*.

4. PISCIVORUS. *Der brasilianische Pfefferfraß*.

Müller, Natursyst. II. p. 156. n. 4. *der Fischfresser*. Tab. 5. fig. 2.

Ebert, Naturl. II. p. 49. *der Toukan oder Pfefferfresser, Hohlschnäbler*. Tab. 24. fig. 2.

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 94. n. 4. *Fischesser*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 781. *der Fischfresser*.

Brissou, ornithol. II. p. 158. n. 3. Toucan à gorge blanche du Brésil.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 23. die brasilianische Elster, Toucan genannt.

Latham, Vögel, I. p. 272. n. 4. der brasilianische Pfefferfraß.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 136. n. 4. Ramphastos (Piscivorus) nigricans, fascia abdominali crissoque rubris, genis, iugulo, pectore uropygioque albidis.

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 98. der Toucan von Guiana.

II. ERYTHORHYNCHOS. Der rothschnäblige Pfefferfraß.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 164. rothschnäbliger Toucan.

Briffon, ornitholog. II. p. 159. n. 4. Toucan à gorge blanche de Cayenne.

Latham, Vögel, I. p. 273. n. 5. der roth-schnäblichte Pfefferfraß.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 136. n. 3. Ramphastos (Erythrorhynchus) nigricans, genis colloque subtus albis, fascia pectoris crissoque coccineis, uropygio sulphureo.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 28. der Toucan mit rothem Schnabel.

Wirsing, Vögel, Tab. 42. großer Toucan.

3. TUCANUS. Der Tucan.

Müller, Naturfyst. II. p. 156. n. 5. der Rothschnabel.

Borowsky, Thierreich, II. p. 97. n. 1. der rothschnäblige Tucan. Tab. 6.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 165. n. 1. Ramphastos (Tucanus) nigricans, rostro flavescente, versus basin fascia nigra, fascia abdominali flava.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 58. n. 63. *der Tukan.*

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 94. n. 5. *eigentlicher Toucan.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 782. *der Roth-schnabel.*

Briffon, ornithol. II. p. 160. n. 5. Toucan à gorge jaune du Brésil.

Batsch, Thiere, I. p. 303. *der eigentliche roth-schnäblige Tukan.*

Latham, Vögel, I. p. 272. n. 3. *der Tucan.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 136. n. 3. Ramphastos (Tucanus) nigricans, fascia abdominali, crisso uropygioque flavis.

Nau, Entdeck. a. d. Naturgesch. I. p. 248. Ramphastos Tucanus. Tab. 5.

Murr, Reif. der Missionar. p. 547. *Toukan.*

Eberhard, Thiergesch. p. 107. *der Pfeffervogel.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 19. n. 2. Piperivora nigra uropygio luteo.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 103. n. 2. Ramphastos (Tucanus) rostro rubro carina obtusa alba.

Gerin. ornith. II. p. 61. Tab. 203.

Jonston, av. p. 180. Tucana.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 222. n. 2. *der Tukan.*

6. PICATUS. *Der Prediger.*

Müller, Naturfyst. II. p. 157. n. 6. *Elstertoukan.*

Halle, Vögel, p. 159. n. 98. *der brasiliſche Polypthem, großſchnablige Pfeffervogel.*

Funke, Naturgesch. I. p. 335. *der Prediger.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere,
II. p. 57. n. 62. *der Pfeifferfresser.*

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 94. n. 6. *Schwarzer Toucan.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 779. *die brasilianische Elster.*

Klein, av. p. 38. n. 1. *Nasutus simpliciter.*

Klein, Vorbereit. p. 73. n. 1. *der eigentliche Hohlschnäbler.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 39. n. 1. *Hohl Schnäbler, Pfefferfraß.*

Briffon, ornithol. II. p. 156. n. 1. *Toucan.*

Latham, Vögel, I. p. 274. n. 6. *der Prediger.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 137. n. 6. *Ramphastos (Picatus) nigricans, pectore luteo, crisso rectricumque apicibus rubris, uropygio nigro.*

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 19. n. 1. *Pica brasiliensis, uropygio coccineo.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 103. n. 3. *Ramphastos (Picatus) rostro rubro, apice nigro, carina compressa.*

Forstön, av. p. 46. *Pica brasiliica, aliis Ramphastos, Hipporynchos et Burynchos, aliis Barbara et Piperivora.*

7. DISCOLORUS. *Der gelbkehlige Pfefferfraß.*

Müller, Natursystem, II. p. 157. n. 7. *die Gelbkehle.*

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 94. n. 7. *Gelbbrust.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 777. *der cayennische Toukan mit gelber Kehle.*

Briffon, ornith. II. p. 157. n. 2. *Toucan à gorge jaune de Cayenne.*

Latham, Vögel, I. p. 271. n. 2. *der Pfefferfraß mit gelber Kehle.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 135. n. 2. Ramphastos (Discolorus) nigricans, pectore, abdomine, crisso uropygioque rubris, gula lutea.

12. **TOCO.** *Der Toco.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 82. n. 9. *der Toco.*

Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 94. n. 8. *Toco.*

Latham, Vögel, I. p. 271. n. 1. *der Toco.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 135. n. 1. Ramphastos (Toco) nigricans, collo subtus, uropygioque albis, orbitis, lunula pectoris crissoque rubris.

13. **LUTEUS.** *Der schwarzschnäblige Pfefferfraß.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 84. n. 16. *der gelbe Toucan.*

Neuer Schaupl. d. Natur, IX. p. 95. n. 14. *gelber Toucan.*

Briffon, ornitholog. II. p. 164. n. 11. *Toucan jaune.*

Latham, Vögel, I. p. 278. n. 12. *der schwarz-schnäbliche Pfefferfraß.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 139. n. 13. Ramphastos (Luteus) flavescens, lateribus colli utrinque striga longitudinali nigra, cauda et alis albo nigroque variis, tectricibus alarum minoribus flavis.

Jonston, av. p. 171. Xochite nacatl.

14. **CAERULEUS.** *Der blaue Pfefferfraß.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 84. n. 17. *der blaue Toucan.*

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 95. n. 15. *blauer Toucan.*

Briffon, ornitholog. II. p. 165. n. 12. *Toucan bleu.*

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 279. n. 13. *der blaue Pfefferfraß.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 139. n. 14. Ramphastos (Caeruleus) caeruleus, cinereo-variegatus, rostro corpore longiore, iridibus fulvis.

15. DUBIUS. *Der unbestimmte Pfefferfraß.*

Latham, Vögel, I. p. 279. n. 14. *der Pfefferfraß mit blauer Kehle.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 139. n. 15. Ramphastos (Dubius) gutture caeruleo.

16. ALBUS. *Der weiße Pfefferfraß.*

Latham, Vögel, I. p. 279. n. 15. *der weiße Pfefferfraß.*

8. MOMOTA. *Der Momot. (1)*

Müller, Natursyst. II. p. 158. n. 8. *der Großkopf.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 98. n. 4. *der Momot.*

Neuer Schaupl. d. Nat. IX. p. 95 n. 16. *Momot.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 777. *der Momot.*

Briffon, ornitholog. II. p. 175. n. 1. *Momot.*

Batsch, Thiere, I. p. 303. *der Momot.*

Latham, Vögel, I. p. 281. *der brasilianische Großkopf.* Tab. 13.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 140. Gen. VII. Sp. 1.

Momotus (Brasilienfis) viridis, fronte caeruleo-viridi, occipite violaceo, vertice et striga per oculos nigris, rectricibus duabus intermediis longioribus.

Janston, av. p. 189. Guira Guainumbi.

Dom.

(1) Latham hat mit Briffon, wegen Stellung der Zehen, aus diesem Vogel ein eignes Geschlecht gemacht. *Momotus*: Rostrium validum, incurvatum, lateribus dentatum. Nares testae, Lingua pinnacea. Cauda cuneiformis. Pedes gressorii.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 222. n. 3.
der großköpfige Pfefferfraß.

β. Der bunte Momot. (2)

Briffon, ornithol. II. p. 173. n. 2. Momot varié.

Latham, Vögel, I. p. 282. n. 1. Var. A. der bun-
te Großkopf.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 140. β. Momotus
varius.

Jonston, av. p. 172. Jacauquitototl.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Ver-
mehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit 8 Gattungen von n. 9.
bis 16. vermehrt; und bey der achten Gattung sind
2 Varietäten aus einander gesetzt.

B. Neuere Gattungen.

1. Der glattschnäblige Pfefferfraß.

Latham, Syn. Supplem. p. 67. Smooth-billed
Toucan.

Latham, Vögel, I. p. 280. n. 16.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 138. n. 10. Ram-
phastos (Glaber) corpore viridi, subtus vire-
scente-flavo, capite colloque castaneis, uropy-
gio rubro, rostro lateribus glabro.

NEUES GESCHLECHT. SCYTHROPS.

Der Trauervogel; (3) Fratzenvogel.

Rostrum magnum, convexum, cultratum, api-
ce adunco.

Nares

(2) Nach Briffon eine eigne Gattung.

(3) In unserm System ist dieses Geschlecht noch nicht befind-
lich. Latham hat es im Syst. ornith. zwischen seinem Momot
und

Nares rotundatae, nudaе, ad basin rostri.
Lingua cartilaginea, apice bifida.
Pedes scanforii.

1. NOVAE HOLLANDIAE. *Der Trauervogel.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 141. Gen. VIII. n. 1.
 Scythrops Novae Hollandiae. Habitat in no-
 va Hollandia, magnitudine *Corvi*. — 2 ped.
 3 poll. longus.
Latham, Vögel, I. 2. p. 647. n. 1. *der neuhollän-
 dische Fratzenvogel.*

47. GESCHLECHT. BUCEROS. *Der Horn-
 vogel.*

Müller, Naturyst. II. p. 160. Gen. XLVII.
Leske, Naturgesch. p. 241. Gen. XVI.
Borowsky, Thierreich, II. p. 98. Gen. VII.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 165.
 Gen. VII.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 345. Gen. VII.
Ebert, Naturl. II. p. 53.
 Onomat. hist. natur. II. p. 328. IV. p. 433.
Briffon, ornith. II. p. 202. Gen. 61. Hydrocorax.
Batsch, Thiere, I. p. 301. Gen. LV.
Latham, allg. Uebersicht der Vögel, I. p. 282.
 Gen. VIII.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 141. Gen. IX.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 223.
 Gen. VII.

1. BICORNIS. *Der philippinische Hornvogel.*
Müller, Naturyst. II. p. 160. n. 1. *Zweyhörnige.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 99. n. 2. *der philip-
 pinische Nashornvogel.*

X 2

Ebert,

und *Buceros* aufgeführt, daher ich es hier mit eingerückte
 habe.

Ebert, Naturl. II. p. 54. *der Hornvogel von den philippinischen Inseln.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 59. n. 66. *der zweyhörnige Nashornvogel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 436. der Wasserrabe von den philippinischen Inseln.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 177. der philippinische Calao.

Briffon, ornithol. II. p. 203. n. 2. Calao des Philippines.

Batsch, Thiere, I. p. 304. *der philippinische Nashornvogel.*

Latham, Vögel, I. p. 285. n. 3. *der Philippinen-Hornvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 142. n. 3. Buceros (Bicornis) fronte ossea plana, antrorsum bicorni, corpore nigro, subtus maculaque remigum alba, rectricibus 10. intermediis nigris.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 104. n. 1. Buceros (Bicornis) fronte ossea plana, antrorsum bicorni.

β. *Der Calao oder Cayao.*

Latham, Vögel, I. p. 285. n. 3. Var. A.

Latham, Syst. ornith. I. p. 143. Calao vel Cayao.

8. *ABYSSINICUS. Der abyssinische Hornvogel.*

Latham, Vögel, I. p. 286. n. 4. *der abyssinische Hornvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 143. n. 4. Buceros (Abyssinicus) rostro nigro compresso, fronte gibbosa, orbiculata, caerulea, corpore nigro, remigibus primoribus albis, secundariis fulvofuscis.

Bruce, Reis. n. d. Quellen des Nils, V. p. 172. Tab. 34. *Erkoom oder Abba Gumba?*

6. AFRICANUS. *Der afrikanische Hornvogel.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 434. *der afrikanische Wasserrabe.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 177. *der afrikanische Calao.*

Briffon, ornith. II. p. 204. n. 3. Calao d'Afrique.

Latham, Vögel, I. p. 287. n. 5. *der afrikanische Hornvogel; Trompetervogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 143. n. 5. Buceros (Africanus) niger, subcristatus, fronte ossea, plane antrorsum subulata, corpore nigro, abdomine rectricibusque apice albis.

7. MALABARICUS. *Der malabarische Hornvogel.*

Latham, Vögel, I. p. 288. n. 6. *der malabarische Hornvogel.* Tab. 14.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 143. n. 6. Buceros (Malabaricus) niger subcristatus, rostro incurvato, ifronte ossea antrorsum cultrata, abdomine, femoribus, crisso, remigibus rectricibusque lateralibus apice albis.

Sonnerat, Reif. n. Ostind. und China, III. p. 168. *der Nashornvogel von der Küste Malabar.* Tab. 121.

β. B. niger, rostro incurvato, fronte ossea, antrorsum cultrata, dimidiato nigra, abdomine, crisso, femoribus, macula suboculari rectricibusque lateralibus 4. toto albis. *

Latham, Syn. I. p. 350.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 143. β.

Buffon, pl. enl. n. 873.

γ. B. niger, rostro incurvato, fronte ossea ovata, gula, abdomine, remigibus rectricibusque albis. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 144. γ.

3. HYDROCORAX. *Der indianische Rabe.*
 Müller, Naturfyst. II. p. 162. n. 2. *der Wasserrabe.*
 Borowsky, Thierreich, II. p. 100. n. 3. *der Wasserrabe.*
 Ebert, Naturl. II. p. 53. *indianischer Rabe,*
 Halle, Vögel, p. 247. n. 185. *der große schwarze Rabe, mit grauem Halsringe?*
 Neuer Schauplatz der Natur, VII. p. 2 n. 2. *Ringelrabe.*
 Onomat. hist. nat. III. p. 435. *der indianische Rab.*
 Handbuch der Naturgesch. p. 177. *der moluckische Calao.*
 Klein, av. p. 58. n. 2. *Corvus torquatus, pedibus cinereis, rostro arcuato?*
 Klein, Vorbereitung, p. 110. n. 2. *Ringelrabe?*
 Klein, verb. Vögelhist. p. 57. n. 2. *Ringelrabe?*
 Brisson, ornith. II. p. 203. n. 1. *Calao.*
 Buffon, Vögel, VII. p. 69. *der indianische Rabe des Bontius.*
 Batsch, Thiere, I. p. 304. *der Wasserrabe.*
 Latham, Vögel, I. p. 290. n. 7. *der indianische Hornvogel; Wasser-Rabe.*
 Latham, Syst. ornitholog. I. p. 144. n. 7. *Buceros (Hydrocorax) fronte ossæ plana, antice mutica, postice tegens verticem, rotundata, corpore fusco, abdomine infimo flavescente, genis gulaque nigris, albido marginatis.*
 Feuill. III. p. 14. *Corvus torquatus, rostro arcuato, pedibus cinereis?*
 Moehring, av. gen. p. 31. n. 7. *Caryocatactes?*
 Hermann, tab. affinit. animal. p. 199. *Hydrocorax.*
 Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 223. n. 1. *der indianische Rabe.*

3. RHINOCEROS. *Der Nashornvogel.*

Müller, Naturf. II. p. 162. n. 3. *der Nashornvogel.*

Tab. 25. fig. 6.

Leske, Naturgesch. p. 241. n. 1. *der Nashornvogel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 99. n. 1. *der Nashornvogel.* Tab. 7.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 165. n. 1.

Buceros (Rhinoceros) processu rostri frontali recurvato.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 346. *der Nashornvogel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 171. *der Nashornvogel.*

Ebert, Naturl. II. p. 54. *der Nashornvogel, Topau.*

Halle, Vögel, p. 160. n. 99. *Nashornvogel.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,

II. p. 59. n. 65. *Nashornvogel, Fägervogel.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 435. *der indianische*

Wasserrabe.

Klein, av. p. 38. n. 2. *Nasutus Rhinoceros,*

Klein, Vorbereit. p. 74. n. 2. *das geflügelte Nashorn.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 39. n. 2. *geflügeltes*

Nashorn, Topau.

Briffon, ornith. II. p. 205. n. 4. *Calao des Indes.*

Batsch, Thiere, I. p. 304. *der eigentliche Nashornvogel.*

Latham, Vögel, I. p. 283. n. 1. *der Nashornvogel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 69. *Rhinoceros Hornbill.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 141. n. 1. *Buceros*

(*Rhinoceros*) cornu mandibulari frontis recurvato, corpore nigro, abdomine infimo, uropygio crissoque albis, cauda alba fascia nigra.

Berlin. Samml. IV. p. 289. *der Trompeter.*

Moehring, av. gen. p. 30. n. 4. *Tragopan.*

Jonston, av. p. 46. *Rhinoceros.*

Donnderff, Handb. der Thiergesch. p. 223. n. 2.
der Naschornvogel.

8. *GALEATUS.* *Der Helmvogel.*

Latham, Vögel, I. p. 284. n. 8. *der gshelmte
Hornvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 142. n. 2. Buceros
(Galeatus) rostro conico, basi mandibulae su-
perioris supra maxime gibbosa, subquadrata.

9. *PANAYENSIS.* *Der Hornvogel aus Panaya.*

Latham, Vögel, I. p. 291. n. 8. *der Hornvogel aus
Panaya.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 144. n. 8. Buce-
ros (Panayensis) rostro compresso, fronte of-
fesa, parum elevata, cultrata, corpore nigro,
subtus fusco-rubro, rectricibus flavo-fuscis,
apice late nigris.

10. *MANILLENSIS.* *Der Hornvogel aus Manilla.*

Latham, Vögel, I. p. 292. n. 9. *der Hornvogel
aus Manilla.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 145. n. 9. Buceros
(Manillensis) rostro plano, supra carinato,
cultrato, corpore fusco-nigricante, capite, col-
lo, et subtus albescente, macula aurium nigra,
rectricibus fascia rubra.

4. *NASUTUS.* *Der senegalische Hornvogel; (der
Tock.)*

Müller, Naturfyst. II. p. 163. n. 4. *Ungehörnte.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 100. n. 4. *der sene-
galische Hornvogel.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 438. *der senegalische
Wasserrabe mit schwarzem Schnabel.*

Briffon, ornitholog. II. p. 296. n. 5. *Calao à bec
noir, du Sénégal.*

Batsch,

Batsch, Thiere, I. p. 304. *senegalische Nasshornvogel*.

Latham, Vögel, I. p. 292. n. 10. *der schwarzschnäblichte Hornvogel*,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 145. n. 10. Buceros (Nasutus) fronte laevi, rectricibus basi apiceque albis.

Forskål, fn. orient. p. IV. n. 4. *Crotophaga griseo maculata*; *Tullaek*, vel *Dymhudj*.

β. *Der senegalische Hornvogel mit rothem Schnabel*. (4)

Onomat. histor. nat. IV. p. 437. *der Wasserrabe mit dem rothen Schnabel von Senegal*.

Briffon, ornithol. II. p. 206. n. 6. Calao à bec rouge du Senegal.

Latham, Vögel, I. p. 203. n. 10. Var. A. *der rothschnäblichte Hornvogel*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 145. n. 10. β. Buceros rostro rubro, corpore grifescente nigroque vario, subtus colloque albido, capite gulaque nigro lineatis, rectricibus lateralibus nigris, apice albis.

II. ALBUS. *Der weiße Hornvogel*.

Latham, Vögel, I. p. 294. n. 11. *der weiße Hornvogel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 146. n. 11. Buceros (Albus) rostro maxime incurvato nigro, corpore niveo, pedibus nigris.

12. OBSCURUS. *Der unbestimmte Hornvogel*.

Latham, Vögel, I. p. 294. n. 12. *der Hornvogel mit gewundenem? Schnabel*.

Latham, Syn. Suppl. p. 70. Wreathed Hornbill.

(4) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 146. n. 12. Buceros (Plicatus) rostro incurvo, fronte elevata septemplicata, corpore nigro, rectricibus albis.

β. B. vertice nigro, corpore griseo nigroque nebuloso, remigibus primoribus nigris apice albis, cauda nigra, rectrice extima utrinque dimidiata alba. *

Latham, Syn. Suppl. p. 71. 2.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 146. n. 12. β.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 8 Gattungen vermehrt, und bey der *ersten* und *vierten* Gattung sind 2 Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Der unregelmäßige Rhinocerosvogel.* Schnabel wie ein Hornvogel; Beine wie ein Toucan; Zunge wie eine Krähe; Grösse einer Krähe.

White Reif. nach Neu-Süd-Wallis; in dem Magazin merkwl. Reisebeschr. V. p. 127.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der Hornvogel aus Gingi.*

Latham, Syn. Supplem. p. 71. Gingi Hornbill.

Latham, Vögel, I. p. 295. n. 13.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 146. n. 13. Buceros (Ginginianus) rostro compresso incurvato, fronte ossæ antrorsum subulata, corpore griseo, subtus albo, remigibus fasciaque rectricum intermediarum apice nigris.

Sommerat, voy. Ind. II. p. 214. Tab. 121. Calao de Gingi.

2. *Der*

2. *Der neuholländische Hornvogel.*

Latham, Syn. Supplem. p. 72. New - Holland Hornbill.

Latham, Vögel, I. p. 296. n. 14.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 147. n. 14. *Buceros* (*Orientalis*) rostro convexo, carinato, basi gibbosiore, orbitis nudis rugosis, cinereis, corpore, alis caudaque nigricantibus.

3. *Der graue Hornvogel.*

Latham, Syn. Supplem. p. 72. Grey Hornbill.

Latham, Vögel, I. p. 296. n. 15.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 147. n. 15. *Buceros* (*Griseus*) fronte ossea, antice declinata, postice truncata, corpore griseo, vertice nigro, tectricibus alarum nigro variegatis, remigibus apice albis.

4. *Der Hornvogel mit grünen Flügeln.*

Latham, Syn. Supplem. p. 73. Green - winged Hornbill.

Latham, Vögel, I. p. 296. n. 16.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 147. n. 16. *Buceros* (*Viridis*) fronte ossea truncata, corpore nigro, alis virescentibus, rectricibus exterioribus, basi remigum abdomineque albis.

48. GESCHLEHT. BUPHAGA. *Der Ochsenhacker.*

Müller, Naturfyft. II. p. 164. Gen. XLVIII.

Leske, Naturgesch. p. 242. Gen. XVII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 100. Gen. . .

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 172.

Gen. VII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 346. Gen. VIII.

Bechstein

- Bechstein*, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 168.
Gen. XIII.
Briffon, ornithol. I. p. 279. Gen. XXV.
Latham, allg. Ueberf. d. Vögel, I. p. 297. Gen. IX.
Latham, Syst. ornith. I. p. 147. Gen. X.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 223.
Gen. VIII.

I. AFRICANA. *Der afrikanische Ochsenhacker.*

- Müller*, Naturf. II. p. 164. n. 1. *der Afrikanische.*
Leske, Naturgesch. p. 242. *Buphaga Africana.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 100. *der Ochsenhacker, Ochsenfeind.*
Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 172. n. 1.
Buphaga africana.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 168. *der Ochsenhacker.*
Briffon, ornithol. I. p. 279. n. 1. *Pique-boeuf.*
Büffon, Vögel, VII. p. 360. *der Ochsenhacker;*
mit 1 Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 305. *der Ochsenhacker.*
Latham, Vögel, I. p. 297. n. 1. *der afrikanische Ochsenhacker.* Tab. 15.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 147. n. 1. *Buphaga Africana.*
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 223. *der afrikanische Ochsenhacker.*

49. GESCHLECHT. CROTOPHAGA. *Der Madenfresser.*

- Müller*, Natursystem, II. p. 165. Gen. XLIX.
Leske, Naturgesch. p. 242. Gen. XVIII.
Borowsky, Thierreich. II. p. 101. Gen. VIII.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 172.
Gen. XVIII.

Bechstein,

Bechstein, Naturgesch. I. p. 347. Gen. IX.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 167.
Gen. VIII.

Briffon, ornithol. II. p. 91. Gen. LII.

Batsch, Thiere, I. p. 300. Gen. LVI.

Latham, Vögel, I. p. 298. Gen. X.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 148. Gen. XI.

Hermann, tab. affin. anim. p. 190.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 224.
Gen. IX.

I. ANI. *Der kleine Madenfresser.*

Müller, Natursystem, II. p. 165. n. 1. *der Afrikanische.* Tab. V. fig. 4.

Leske, Naturgesch. p. 242. n. 1. *der afrikanische Madenfresser.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 101. n. 1. *der afrikanische Madenfresser.* Tab. 8.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 172. n. 1.
Crotophaga (Ani) pedibus scanforiis.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 167. *der afrikanische Madenfresser.*

Halle, Vögel, p. 253. n. 194. *die große schwarze Dohle.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 351. n. 3. *Dohle mit gewölbtem Schnabel.*

Onomat. histor. nat. V. p. 219. *die große schwarze Dohle.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 193. *der kleine Crotophage.*

Klein, av. p. 64. n. 12. *Pica nigra Jamaicensis plumis interspersis purpureis, e viridi resplendentibus, rostro novaculaeformi.*

Klein, Vorbereit. p. 112. n. 7. *Dohle mit gewölbtem Schnabel.*

Klein,

Klein, verbeff. Vögelhist. p. 59. n. 12. *Dohle mit gewölbtem Schnabel.*

Klein, verbeff. Vögelhist. p. 62. n. 11. *schwarzer Heher.*

Briffon, ornithol. II. p. 92. n. 1. *Bout-de-Petun.*

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 105. *die ganz schwarze Dohle.*

Batsch, Thiere, I. p. 305. *der afrikanische Madenfresser.*

Latham, Vögel, I. p. 298. n. 1. *der kleine Madenfresser.* Tab. 16.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 148. n. 1. *Crotophaga (Ani) nigro-violacea*, marginibus pennarum cupreo-viridi micantibus, remigibus reetricibusque concoloribus.

Samml. zur Physik und Naturgesch. I. p. 227. *Madenfresser.*

Neueste Mannichfalt. I. p. 566. *Maritzjemaat.*

Gerin. ornith. II. p. 53. Tab. 190.

Jonston, av. p. 189. *Ani Brasiliensibus.*

Hermann, tab. affin. animal. p. 191. *Crotophaga pedibus scanforiis.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 224. *der afrikanische Madenfresser.*

3. MAIOR. *Der große Madenfresser.*

Briffon, ornithol. II. p. 93. n. 2. *Grand Bout-de-Petun.*

Latham, Vögel, I. p. 299. n. 2. *der große Madenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 148. n. 2. *Crotophaga (Maior) nigro violacea*, marginibus pennarum viridibus, remigibus obscure viridibus, caudā concolore.

Gerin. ornith. II. p. 54. Tab. 191.

2. AMBULATORIA. *Der surinamische Madenfresser.*

Müller, Naturfyft. II. p. 166, n. 2. *Surinamischer.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 162. n. 2. *der surinamische Madenfresser.*

Batsch, Thiere, I. p. 305. *der surinamische Madenfresser.*

Latham, Vögel, I. p. 300. n. 3. *der surinamische Madenfresser.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 149. n. 4. *Crotophaga (Ambulatoria) pedibus ambulatoriis.*

Hermann, tab. affinit. anim. p. 191. *Crotophaga pedibus ambulatoriis.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit einer Gattung vermehrt, denn die dritte ist neu hinzugekommen.

B. *Neuere Gattungen.*1. *Der roth- und schwarzbunte Madenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 149. n. 3. *Crotophaga (Varia) rufo nigroque varia.*

Gerin. ornith. II. p. 54. Tab. 192. *Crotophagus varius indicus.*

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT.

GLAUCOPIS. *Der Bartvogel.*

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 168. Gen. XIV.

Latham, Vögel, I. p. 300. Gen. XI.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 149. Gen. XII. *Callaeas.*

Donndorff, Handb. der Thiergeschichte, p. 224. Gen. X.

I. CINEREA. *Das Blauauge.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 168. *das aschgraue Blauauge.*

Latham, Vögel, I. p. 300. n. 1. *der aschgraue Bartvogel.* Tab. 17.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 149. n. 1. *Callaeas Cinerea.*

Forster, Reif. Ed. in 8. I. p. 155. *der Bartvogel.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 224. *das Blauauge.*

50. GESCHLECHT. CORVUS. *Der Rabe.*

Müller, Naturfyst. II. p. 167. Gen. L.

Leske, Naturgesch. p. 243. Gen. XIX.

Borowsky, Thierreich, II. p. 102. Gen. IX.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 172. Gen. XIX.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 360. Gen. XV.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 401. Gen. V.

Funke, Naturgesch. I. p. 291 sqq.

Ebert, Naturl. II. p. 55.

Halle, Vögel, II. p. 242.

Pennant, arct. Zool. II. p. 233.

Neuer Schaupl. d. Natur, VII. p. 1. IV. p. 716.

Onomat. hist. nat. III. p. 424.

Klein, av. p. 57. Gen. II.

Briffon, ornithol. I. p. 154. Gen. XIII. p. 156. Gen. XIV.

Büffon, Vögel, VII. p. 27 sqq.

Batsch, Thiere, I. p. 316. Gen. LXIX.

Latham, Vögel, I. p. 301. Gen. XII.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 150. Gen. XIII.

Hermann, tab. affin. animal. p. 198.

Donndorff, Handb. d. Thierg. p. 225. Gen. XI.

1. HOTTENTOTTUS. *Der Hottentotten-Rabe.*

Müller, Natursystem, II. p. 167. n. 1. *hottentottischer Rabe.* Tab. 6. fig. 1.

Borowsky, Thierreich, II. p. 103. n. 2. *der hottentottische Rabe.*

Neuer Schauplatz d. Natur, VII. p. 3. n. 4. *kapfcher Rabe.*

Briffon, ornitholog. I. p. 163. n. 10. Choucas au Cap de bonne Esperance.

Büffon, Vögel, VII. p. 258. *die Bartdohle;* mit 1 Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 328. *die Bartdohle.*

Latham, Vögel, I. p. 314. n. 10. *die Hottentotten-Kräh.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 156. n. 12. Corvus (Hottentottus) virescenti-ater, cauda aequali, mystacibus longissimis.

Gerin. ornith. II. p. 36. Tab. 148.

2. CORAX. *Der Kolkkrabe.*

Müller, Naturyst. II. p. 168. n. 2. *der Kolkkrabe.*

Leske, Naturgesch. p. 243. n. 1. *der Rabe.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 103. n. 3. *der gemeine Rabe.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 172. n. 1. Corvus (Corax) ater, dorso atro caerulecente, cauda subrotunda; *der Kolk-Rabe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 360. n. 1. *der gemeine Rabe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 402. n. 1. *der gemeine Rabe.* p. 412. *der Rabe, Rab, Raab, Raue, schwarze Rabe, Ausrabe, Steinrabe, Kielrabe, größte Rabe, große Galgenvogel, Kolkraue, Colgrave, Golk-Kulk-Kolk-oder Goldrabe.*

- Funke*, Naturgesch. I. p. 291. *der Kolkrabe.*
Ebert, Naturl. II. p. 55. *die eigentlichen Raben.*
Halle, Vögel, p. 242. n. 184. *der gemeine schwarze Rabe.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 334. n. 280. *der Rab u. f. w.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 233. n. 50. *der Rabe.*
Beckmann, Naturhist p. 40. a. *die gemeine Krähe.*
 Neuer Schauplatz der Natur, VII. p. 2. n. 1. *gemeiner großer Rabe.*
Onomat. histor. nat. III. p. 410. *der Rab, der Rapp.*
Handb. d. Naturgesch. II. p. 158. *der Rabe.*
Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 118. *Kolkrabe.*
Klein, av. p. 58. n. 1. *Corvus simpliciter.*
Klein, Vorbereit. p. 109. n. 1. *der Rabe.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 57. n. 1. *gemeiner Rabe, großer Galgenvogel.*
Briffon, ornithol. I. p. 156. n. 1. *Corbeau.*
Büffon, Vögel, VII. p. 27. *der Rabe; m. 1 Fig.*
Batsch, Thiere, I. p. 328. *der gemeine Rabe.*
Gesner, Vögelb. p. 417. *Rapp. Fig. p. 418 gut.*
Latham, Vögel, I. p. 302. n. 1. *der gemeine Rabe.*
Latham, Syn. Suppl. p. 74. *Raven.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 150. n. 1. *Corvus (Corax) ater, dorso caerulefcente, cauda subrotunda.*
Beske, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 30. n. 42. *der Kolkrabe.*
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 292. n. 43. *Colkrabe, gemeiner Rabe.*
Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 68. *der Rabe.*
Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 70. n. 54. *schwarzer Rabe.*

Lepechin,

- Lepechin*, Tagebuch der russ. Reis. III. p. 13. *die Raben.*
- Leem*, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 128. *die Raben.*
- Steller*, Kamtschatka, p. 194. *Raben.*
- Krascheninnikow*, Kamtschatka, p. 200. *Raben.*
- Cranz*, Hist. von Grönl. p. 112. *Raben.*
- Pontoppidan*, Naturh. v. Norw. II. p. 172. *Raue.*
- Olaffen*, Reise durch Island, I. p. 32. *der Rabe.*
p. 118. *Raben.*
- White*, Naturgesch. v. England, p. 66. n. 1. *Rabe.*
- Pontoppidan*, Naturg. von Dännemark, p. 166.
n. 1. *der Rabe.*
- Kolbe*, Vorgeb. d. g. Hoffnung, Edit. in 4. p. 401.
die Raben?
- Fabricius*, Reis. n. Norwegen, p. 312. *Raben.*
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 29. n. 35.
der größte Rabe.
- Linné*, auserl. Abh. II. p. 288. n. 56. *Kolkrabe.*
- Carver*, Reise d. Nordamerika, p. 383. *Raben.*
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 261. *Aos-Rabe.*
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 82. *Kolk-Rabe.*
- Naumann*, Vogelsteller, p. 162. n. 1. *die Raben.*
- Naturf. IX. p. 40. n. 42. *Kolkrabe.*
- Anweis. Vögel zu fangen, u. s. w. p. 442. *der Rab.*
- Jabronsky*, allgem. Lex. p. 864. *Rabe, Kolkrabe.*
- Groffroy*, mat. med. VII. p. 402. *der Rabe.*
- Mellin*, von Anleg. der Wildbahnen, p. 347. *der große Gokkrabe.*
- Bechstein*, Musterung schäd. Th. p. 96. n. 1. *der gemeine Rabe.*
- Günther*, Nester und Eyer, Tab. 71. *Rabe.*
- Bloch*: Beschr. der berlin. Gesellsch. IV. p. 605.
der Kolkrabe.

- Eberhard*, Thiergesch. p. 71. *der gemeine Rabe.*
Oekonom. Zool. p. 67. n. 5. *der gemeine Rabe.*
Meidinger, Vorles. I. p. 116. n. 1. *der Rabe.*
Goese, nützl. All. II. p. 227. n. 30. *der Kolkrabe.*
Merklein, Thierreich, p. 341. *Raab.*
Loniceri, Kräuterbuch, p. 672. *Rapp, Raabe.*
Kraft, Ausrott. grauf. Th. I. p. 254. *der Rabe.*
Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 52. Corvus.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 19. n. 1. Corvus.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 105. n. 1. Corvus (Corax) ater, dorso caerulefcente, cauda subrotunda.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 11. n. 86. Corvus (Corax) ater, dorso atro-caerulefcente, cauda subrotunda.
Kramer, Auftr. p. 333. n. 1. Corvus ater dorso caerulefcente.
Brünich, ornith. bor. p. 8. n. 27. Corvus Corax.
Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 244. Corvus; *ein Kol Rabe, Rabe, Rappe.*
Moehring, av. gen. p. 31. n. 6. Corvus.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 199. Corvus Corax.
Jonston, av. p. 38. Corvus.
Plin. hist. nat. L. X. c. 12. Corvi.
Aristot. hist. anim. L. VI. c. 6. n. 74. Κοραξ.
Gerin. ornith. II. p. 32. Tab. 14.
Rangon. diff. de Corvo. Stettin 1670. 8.
Baer. Korakophonia etc. Brem. 1700. 4.
Nessel, diff. de avibus Apollinis, Cygno et Corvo. Ups. 1725. 8.
Tourner, diff. de av. Apoll. Cygno et Corvo. Ups. 1725. 8.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 225. n. 1. *der Kolkrabe.*

β. CORVUS VARIUS. *Der bunte Rabe.*

Müller, Naturfyst. II. p. 171. *Cacaloth.*

Briffon, ornithol. I. p. 157. *Corbeau varié.*

Büffon, Vögel, VII. p. 55. *der Rabe aus Mexico.*

Latham, Vögel, I. p. 303. n. 1. Var. A. *der bunte Rabe.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 150. β. *Corvus varius.*

Berlin. Samml. VIII. p. 361.

γ. CORVUS ALBUS. *Der weiße Rabe.*

Müller, Natursystem, II. p. 171. *weiße Raben.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 412. *ganz weiße Raben.*

Briffon, ornith. I. p. 157. B. *Corbeau blanc.*

Büffon, Vögel, VII. p. 55. *weiße Raben.*

Latham, Vögel, I. p. 304. n. 1. Var. B. *der weiße Rabe.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 151. γ. *Corvus candidus.*

Zorn, Petinoth. II. p. 53. *ein weißer Rabe.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 57. ad n. 1. *ein weißer Rabe.*

Götz: Naturforsch. XVI. p. 46. n. 2. *ein schneeweißer Rabe.* n. 3. *ein weißer Rabe.* p. 48. n. 4. *ein weißer Rabe.*

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 112. n. 2. *ein schneeweißer Rabe.* p. 115. n. 3. *ein weißer Rabe.*

Geoffroy, mat. med. VII. p. 409. *die weißen Raben.*

Berlin. Samml. VIII. p. 359.

Witzel: Eph. nat. curios. Dec. I. an. 3. obs. 57. p. 81.

Francheville: nouv. mem. de l'acad. roy. à Berl. 1773. p. 23.

δ. *Der nördliche schwarz und weißbunte Rabe.* (5)

Müller, Naturfyst. II. p. 171.

Briffon, ornitholog. I. p. 163. *Corvus borealis albus*; *Corbeau blanc du Nord*.

Biffon, Vögel, VII. p. 56. *der weiße nordische Rabe*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 151. δ. *Corvus borealis albus*.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 233. ad n. 1. *eine Race von schwarz und weißer Farbe*.

Pontoppidan, Naturgesch. von Norwegen, p. 172. *halb weiße und halb schwarze Raben*.

Berlin. Samml. VII. p. 359. *der weiß und schwarzbunte Rabe*, Titelpf.

Eberhard, Thiergesch. p. 72. *der nordische weiße Rabe*.

Mus. Worm. p. 292. *Corvus versicolor Feroensis*.

20. CLERICUS. *Der Pfaffe.* (6)

Latham, Syst. ornithol. I. p. 152. n. 4. β. *Corvus totus niger, mento albo, rostri basi cinerea*.

21. AUSTRALIS. *Der Süd-See-Rabe.*

Latham, Vögel, I. p. 304. n. 2. *der Süd-See-Rabe*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 151. n. 2. *Corvus (Australis) nigricans, gulae pennis laxioribus, remigibus fuscescentibus*.

3. CORONE. *Die Rabenkrähe.* (7)

Müller, Naturfyst, II. p. 172. n. 2. *die schwarze Krähe*.

Leske,

(5) Nach Briffon eine eigne Gattung.

(6) Nach Latham eine Spielart von *Corvus Corone*.

(7) Flügelweite über 3 Fufs. Gewicht 20 bis 22 Unzen. Liebt vorzüglich die Feldhölzer und Waldungen, die ans Feld gränzen.

Leske, Naturgesch. p. 243. n. 2. die schwarze Krähe.

Borowsky, Thierreich, II. p. 110. n. 11. die schwarze Krähe, Rabenkrähe.

Jumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 173. n. 2. Corvus (Corone) atro-caerulescens totus, cauda rotundata, rectricibus acutis; die Rabenkrähe.

Bechstein, Naturg. I. p. 362. n. 2. die Rabenkrähe.

Y 4

Bechstein,

gränzen. Sie sind Strich- und Standvögel, nachdem ihr Sommeraufenthalt beschaffen ist. Diejenigen, die in kleinen Feldhölzern wohnen, schlagen sich im Herbst in grossen Schaa- ren zusammen, ziehen am Ende des Octobers bey eintretender stürmischen Witterung von ihrer Heimath weg, von einer grossen Wiese zur andern, suchen im Winter am Tage bergige Gegenden, Wiesenründe, offene Felder, wo Mist hingefahren ist, und ziehen des Nachts mit grossem Geschrey in die Wälder, wo sie Schutz vor Sturm und Wetter haben. Im März gehen sie wieder in ihre Heimath zurück. Diejenigen hingegen, die am Fufs eines waldigen, vorzüglich mit Schwarzholz besetzten Kettengebirgs wohnen, ziehen niemals weg, und begeben sich im October in einige Familien zusammen. Die Standvögel bauen einzeln, die Strichvögel aber zusammen in Feldhölzern, und es giebt Gegenden, wo sich, wie bey den Saatkrähen, 20 bis 30 Nester auf einem Baume befinden, die oft mit ihren Unterlagen, die gewöhnlich aus Dornen bestehen, unter einander, und mit denen auf den nahe stehenden Bäumen verbunden sind. Das Weibchen legt 5 bis 6 Eyer, welche blaugrün, und mit grossen und kleinen aschgrauen, und olivenbraunen Flecken besetzt sind, die am stumpfen Ende zusammenfliessen. Männchen und Weibchen brüten sie in 18 bis 20 Tagen gemeinschaftlich aus. Die Landleute essen in manchen Gegenden das Fleisch, und vergleichen es mit dem Taubenfleisch. Besser sind die Eyer. Sie können auch gezähmt werden, und Worte nachsprechen lernen. — *Briffon* rechnet den *Corvus versicolor Feroensis*, aus dem *Mus. Worm.* und *Latham* den vorher angeführten *Corvus Australis*, als Spielart mit hierher.

- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 412. n. 2. die Rabenkrähe. p. 424. die Krähe, Krähe, schwarze Krähe, der schwarze Rabe, der schwarze Krährabe, der kleine Rabe, die Hauskrähe; in Thüringen: der Rabe.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 293. die schwarze Krähe.
- Ebert*, Naturl. II. p. 56. die gemeine Krähe.
- Halle*, Vögel, p. 247. n. 187. die schwarze Rabenkrähe.
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 340. n. 281. die Rabenkrähe.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 234. n. 51. die Aaskrähe.
- Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 716. n. 1. Rabenkrähe.
- Onomat. histor. nat.* III. p. 427. die Hauskrähe, schwarze Krähe.
- Handbuch der Naturgesch. II. p. 162. die Rabenkrähe.
- Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 118. Rabenkrähe.
- Klein*, av. p. 58. n. 1. Cornix nigra.
- Klein*, Vorbereit. p. III. n. 1. schwarze Krähe, Rabenkrähe.
- Klein*, verbesserte Vögelhist. p. 58. n. 3. Rabenkrähe.
- Gesner*, Vögelb. p. 344. Kräe mit 1 zieml. Fig.
- Briffon*, ornithol. I. p. 157. n. 2. Corneille.
- Büffon*, Vögel, VII. p. 77. die Raben - Krähe; mit 1 Fig.
- Batsch*, Thiere, I. p. 329. die Rabenkrähe.
- Latham*, Vögel, I. p. 304. n. 3. die Rabenkrähe.
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 151. n. 4. Corvus (Corone) atro - caerulefcens totus, cauda rotundata, rectricibus acutis,

- Beseke*, Vögel Kurlands, p. 31. n. 43. *die schwarze Krähe.*
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 293. n. 44. *schwarze Krähe, Rabenkrähe.*
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 70. n. 55. *schwarze Krähe.*
- Lepeschin*, Tagebuch d. russ. Reis. III. p. 13. *die Krähen.*
- Steller*, Kamtschatka, p. 194. *Krähen.*
- Carver*, Reis. d. Nordamer. p. 383. *Krähen.*
- Pontoppidan*, Naturgesch. von Dännem. p. 166. n. 2. *Blaa-Raage.*
- Krascheninnikow*, Kamtschatka, p. 200. *Krähen.*
- Foerster*, Reis. Ed. in 8. I. p. 28. *Krähen.*
- S. G. Gmelin*, Reis. durch Russl. I. p. 50.
- Georgi*, Reis. I. p. 165. *Turlak.*
- Meyer*, Thiere, I. Tab. 99.
- Schneider*, zoolog. Abhandl. p. 157. *der gemeine Rabe.*
- Bloch*: Beschäft. d. berlin. Gesellsch. IV. p. 605. *die schwarze Krähe.*
- Krünitz*, Encyklop. XLVI. p. 456. *die Rabenkrähe, schwarze Raubkrähe, Hauskrähe, Feld- oder Mittelrabe.*
- Stopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 30. n. 36. *der gemeine Rabe, schwarze Krähe.*
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 261. *der etwas kleinere ganz schwarze Rabe.*
- Döbel*, Jägerpraktik, I. p. 82. *kleiner Rabe, oder schwarze Krähe.*
- Naumann*, Vogelsteller, p. 162. n. 2. *die schwarzen Krähen.*
- Naturforsch. IX. p. 41. n. 43. *schwarze Krähe.*
- Anweisung Vögel zu fangen u. s. w. p. 145. *die Krähe.*

Mellin, von Anleg. der Wildbahn. p. 348. n. II.
die schwarze Raubkrähe.

Bechstein, Musterung schädli. Th. p. 97. n. 2.
die Rabenkrähe.

Oekonom. Zool. p. 67. n. 6. die Krähe.

Schlesf. patriot. ökon. Nachr. 1776. St. 12. p. 94.

St. 27. p. 212. — 1772. St. 15. p. 114.

Neue Mannichfalt. IV. p. 447.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 105. n. 2. Corvus
(Corone) atro-caeruleus, cauda rotundata,
rectricibus acutis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 11. n. 87. Corvus
(Corone) atro-caeruleus totus, cauda ro-
tundata, rectricibus acutis.

Brinich, ornith. bor. p. 9. n. 29. Corvus Corone.

Hermann, tab. affin. animal. p. 199. 201. Corvus
Corone.

Jonston, av. p. 40. Cornix.

Plin. hist. nat. Lib. X. c. 12. Cornix.

Lucret. de rer. nat. L. 5. v. 1083. Cornices.

Aristot. hist. anim. L. 6. c. 6. n. 89. Κορώνη.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 226. n. 2.
die Rabenkrähe.

β. Die bunte Rabenkrähe.

Müller Natur syst. II. p. 173. Krähen mit weißen
und schwarzen Federn.

Borowsky, Thierreich, II. p. 110. a. die bunte
Krähe.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 424. n. I.
weiß- und schwarz geschäccte Rabenkrähe.

Briffon, ornitholog. I. p. 158. A. Corneille
variée.

Büffon, Vögel, VII. p. . . schwarz- und weißbunte
Rabenkrähen.

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 306. n. 3. Var. A. die bunte Krähe.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 152. γ. Cornix varia.

γ. Die weiße Rabenkrähe.

Müller, Natursystem, II. p. 173. weiße Krähen.

Borowsky, Thierreich, II. p. 110. b. die weiße Krähe.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 424. n. 2. eine weiße Rabenkrähe.

Briffon, ornithol. I. p. 158. B. Corneille blanche.

Briffon, Vögel, VII. p. 85. weiße Krähen.

Latham, Vögel, I. p. 306. n. 3. Var. B. die weiße Krähe.

Latham, Syn. I. p. 372. White Crow.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 152. δ. Cornix candida.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 243. Cornix candida; eine weiße Krähe.

Salerne, ornithol. p. 91. n. 9.

δ. Eine Rabenkrähe mit grauem Halsbande. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 424. n. 3.

4. FRUGILEGUS. Die Saatkrähe. (8)

Müller, Natursyst. II. p. 173. die Saatkrähe.

Leske,

- (8) Länge 1 Fufs 7 Zoll. Flügelweite 3 Fufs 7 Zoll. Vermehrt sich zweymal im Jahre, und legt schon zu Ende des März zum ersten Male Eyer. Die Eyer sind grünlich, mit vielen blauen Flecken, besonders am stumpfen Ende bezeichnet, der Anzahl nach 3 bis 5. Diese Thiere halten sich meistens in großen Gesellschaften beysammen, lieben besonders Feldhölzer, und ziehen im Herbst in Schaaren weg. In Frankreich verkündigen sie als Zugvögel die Ankunft des Winters, und im nördlichen Deutschland die Ankunft des Frühlings

- Leske*, Naturgesch. p. 243. n. 3. *die Saatkrähe.*
- Borowsky*, Thierreich, II. p. 105. n. 4. *die schwarze Saatkrähe, Karechel.*
- Blumenbach*, Handb. der Naturgesch. p. 173. n. 3. *Corvus (Frugilegus) ater, fronte cinerascens, cauda subrotunda; die Saatkrähe, der Karechel.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 362. n. 3. *die Saatkrähe.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 432. n. 4. *die Saatkrähe.* p. 438. *die schwarze Saatkrähe, schwarze Feldkrähe, Saatrabe, Kranveitl (?) Karechel; Ackerkrähe, Rooke, Rooche, Rouch, Ranch, Rück, Karok, Roek, Rouck, der pommerische Rabe; in Thüringen: Nachtschnabel.*
- Funke*, Naturgesch. I. p. 293. *die Saatkrähe.*
- Ebert*, Naturl. II. p. 56. *die Saatkrähe.*
- Halle*, Vögel, p. 250. n. 189. *die schwarze Saatkrähe, um den Schnabel weiß, krätzig.*
- Gatterer*, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 343. n. 282. *die Saatkrähe.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 238. A. *die Saatkrähe.*
- Handb. der deutschen Thiergesch. p. 119. *Saatkrähe.*
- Neuer Schaupl. der Natur, VII. p. 3. n. 5. *der Getraidefresser.*
- Onomat. histor. nat. III. p. 425. *Karechel.*
- Klein*, av. p. 59. n. 3. *Cornix nigra, frugilega.*
- Klein*, Vorbereit. p. III. n. 3. *Karechel, Rooke, Rooche, Rouch.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 58. n. 6. *Karechel.*
- Klein*, stemmat. av. p. 10. Tab. 10. fig. 3. a. b.
- Klein,*

Frühlings. In manchen Provinzen Deutschlands wird nicht nur das Fleisch der jungen, sondern auch der alten als schmackhaft gegessen. Auch die Eyer werden zu diesem Gebrauch ausgenommen.

- Klein*, Vögeleyer, p. 21. Tab. 8. fig. 10.
Briffon, ornithol. I. p. 158. n. 3. Corneille moif-
fonneufe.
Büffon, Vögel, VII. p. 98. *die Saat - Krähe*;
mit 1 Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 330. *die Saatkrähe*.
Latham, Vögel, I. p. 307. n. 4. *die Saat-Krähe*.
Latham, Syn. Supplem. p. 76. Rook.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 152. n. 5. Corvus
(Frugilegus) ater, fronte cinerascens, cauda
subrotundata.
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 293. n. 45.
Saatkrähe.
Fischer, Zuf. z. Naturgesch. von Livland, p. 44.
n. 492. *schwarze Saatkrähe*, *Ackerkrähe*.
White, Naturgesch. von Engl. p. 66. n. 4. *schwar-*
ze Krähe.
Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 166.
n. 3. *Raage*.
Pallas, Reise, I. p. 98. II. p. 290. *Kornkrähen*.
Pallas, nord. Beyträge, III. p. 11. *die Kornkrähen*.
Linné, auserles. Abhandl. II. p. 288. n. 61. *die*
Saatkrähe.
Naturforsch. VIII. p. 41. n. 44. *Saatkrähe*.
Döbel, Jägerprakt. p. 83. *Rücke*.
Naumann, Vogellsteller, p. 163. *die schwarzen*
Feldkrähen.
Bechstein, Musterung schädli. Thiere, p. 100. n. 4.
die Saatkrähe.
Eberhard, Thiergesch. p. 72. *die Saatkrähe*.
Meidinger, Vorles. I. p. 116. n. 3. *die Saatkrähe*.
Goeze, nützl. All. II. p. 306. n. 1. *die Saatkrähe*.
Krünitz, Encykl. XLVI. p. 488. *die Saat-Krähe*.
Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 19. n. 2. Cor-
nix frugivora.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 105. n. 3. Corvus (Frugilegus) ater fronte cinerascens.

Kramer, Austr. p. 333. n. 2. Corvus ater; *schwarze Kran*, *schwarze Krähe*.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 242. Cornix nigra frugilega; *ein Rooke*, *fil. Rooche*, *Rouch*, *schwarze Kraye*.

Jonston, av. p. 41. Cornix frugivora.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 226. n. 3. *die Saatkrähe*.

5. CORNIX. Die Nebelkrähe. (9)

Müller, Naturf. II. p. 174. n. 5. *die Nebelkrähe*.

Leske, Naturgesch. p. 244. n. 4. *die Nebelkrähe*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 105. n. 5. *die Nebelkrähe*, *der Mehlrabe*.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 173. n. 4.

Corvus (Cornix) cinerascens, capite, iugulo, alis caudaque nigris; *die Krähe*, *Nebelkrähe*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 664. n. 4. *die Nebelkrähe*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 425. n. 3. *die Nebelkrähe*. p. 432. *Krähe*, *Kräge*, *Holzkrähe*,

(9) Länge 1 Fuß 10 Zoll. Flügelweite 3 Fuß 3 Zoll. Gewicht 23 bis 24 Unzen. Hat in ihrer Lebensart fast alles mit der Rabenkrähe gemein, mit welcher sie sich auch im Nothfall zuweilen paart. Nistet gern in lebendigen Hölzern, auch in Gärten, des Jahrs zweymal. Das Nest steht einzeln, ist nicht allezeit hoch angelegt, besteht aus kleinen, fest zusammen gebauten Reisern, mit Wolle und Haaren ausgefütert. Legt 4 bis 6 längliche, hellgrüne mit feinen braunen Strichen und Flecken verfehene Eyer, die 18 Tage bebrütet werden. Stellt besonders den Enten-Hühner-Fasanen- u. a. Eyern nach. Kommt bey großer Kälte häufig in Städte und Dörfer, und frisst alles was ihr vorkommt. Das Fleisch ist völlig ungenießbar.

Kröhe, Aßkröhe, Aaskröhe, Winterkröhe, Schildkröhe, Sattelkröhe, bunte und graue Kröhe, grauer Rabe, grauer Krährabe, Mehlrabe, graubunte Kröhe, Kranweidl, Urana.

Funke, Naturgesch. I. p. 294. die graue Kröhe, Mantelkröhe.

Ebert, Naturl. II. p. 57. die Nebelkröhe.

Halle, Vögel, p. 249. n. 122. die graue Kröhe.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 346. n. 283. die Nebelkröhe.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 239. B. die Nebelkröhe.

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 716. n. 2. graubunte Kröhe.

Onomat. hist. nat. III. p. 424. die Schildkröhe.

Handbuch der Naturgesch. II. p. 162. die Nebelkröhe.

Handbuch der deutschen Thiergeschichte, p. 119. die Nebelkröhe.

Klein, av. p. 59. n. 2. Cornix cinerea.

Klein, Vorbereitung, p. III. n. 2. graue bunte Kröhe.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 58. n. 5. graubunte Kröhe.

Klein, stemm. av. p. 9. Tab. II. fig. 1. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 21. Tab. 8. fig. 9.

Gesner, Vögelb. p. 347. Nebelkröhe; mit 1 Fig.

Briffon, ornithol. I. p. 150. n. 4. Corneille mantelée.

Büffon, Vögel, VII. p. 114. die graue Kröhe; mit 1 Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 330. die Nebelkröhe.

Latham, Vögel, I. p. 308. n. 5. die Nebelkröhe, Holzkröhe.

Latham, Syn. Suppl. p. 77. Hooded Crow.

Latham,

- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 153. n. 9. Corvus
(Cornix) cinerascens, capite, iugulo, alis caudaque nigris.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 31. n. 44. die Nebelkrähe.
- Bork*, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 294. n. 46.
Nebelkrähe, gemeine Krähe.
- Cetti*, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 70.
die Nebelkrähe.
- Fischer*, Livland, p. 70. n. 56. gemeine Krähe.
- Leem*, Lappland, p. 128. Krähen.
- Pontoppidan*, Naturg. von Dännemark, p. 166.
n. 4 Krähe.
- Pontoppidan*, Norwegen, p. 156. Krage, Kraako, die Krähe.
- White*, Engl. p. 61. n. 4. graue Krähe.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 31. n. 37.
graubunte Krähe.
- Linné*, auserles. Abh. II. p. 288. n. 62. die Nebelkrähe.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 263. die Krahe, Nebelkrähe.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 82. Krähe.
- Naumann*, Vogelsteller, p. 162. Schildkrähen.
Naturforsch. IX. p. 41. n. 45. Nebelkrähe.
- Anweis. Vögel zu fangen, p. 347. Nebelkrähe.
- Mellin*, Wildbahn. p. 348. n. 12. die Nebelkrähe,
Schild- oder Sattelkrähe.
- Bechstein*, Musterung schäd. Thiere, p. 99. n. 3.
die Nebelkrähe.
- Schwed. Abbandl. XXXVIII. p. 247. Nebelkrähe.
- Loniceri*, Kräuterb. p. 672. Kräe.
- Meidinger*, Vorles. I. p. 116. n. 4. die Nebelkrähe.
- Goetze*, nützl. All. II. p. 362. n. 2. die Nebelkrähe.
- Krinitz*, Encyklop. XLVII. p. 509. die graue
oder graubunte Krähe.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 52. Cornix.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 18. n. 3. Cornix cinerea.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 105. n. 4. Corvus (Cornix) cinerascens, capite, gula, alis caudaque nigris.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 11. n. 88. Corvus (Cornix) cinerascens, capite, iugulo, alis caudaque nigris.

Kramer, Austr. p. 333. n. 3. Corvus, capite, gula, alis caudaque nigris, trunco cinerascente.

Brinich, ornith. bor. p. 9. n. 3. Corvus Cornix.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 241. Cornix cinerea; eine Schilt-Krahe, fil. Nabelkraye, Winter-Krahe.

Hermann, tab. affin. anim. p. 199. C. Cornix.

Jonston, av. p. 41. Cornix cinerea.

Gerin, ornith. II. p. 35. Tab. 146. 147.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 277. n. 4. die Nebelkrähe.

β. Die weiße Nebelkrähe. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 432. n. 1.

Bock, Preussen, IV. p. 295.

Büffon, Vögel, VII. p. 131.

Masch: Naturforsch. XIII. p. 17.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 11. ad n. 88.

γ. Die schwarz- und weißbunte Nebelkrähe. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 432. n. 2.

δ. Die schwarze Nebelkrähe. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 432. n. 3.

Büffon, Vögel, VII. p. 131.

22. DAURICUS. Der daurische Rabe.

Büffon, Vögel, VII. p. 153. der daurische Rabe.

Latham, Vögel, I. p. 310. n. 6. *die daurische Krähe.* Tab. 18.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 154. n. 8. Corvus (Dauricus) ater, nucha canescente, cervice pectoreque albis.

Pallas, Reise, Ausz. III. Anh. p. 4. n. 8. Corvus dauricus; Mongalo-Buraetis *Alaciu*.

β. *Büffon*, Vögel, VII. p. 153. *eine beynahe ganz schwarze Abart.*

Latham, Vögel, I. p. 311. *eine fast ganz schwarze Spielart.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 154. β. Corvus totus niger, cervice iuguloque fuscis.

Pallas, Reise, Ausz. III. Anh. p. 4. Varietas fere tota nigra.

23. CALCEDONICUS. *Die neucaledonische Krähe.*

Latham, Vögel, I. p. 311. n. 7. *die Neu-Kaledonische Krähe.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 154. n. 9. Corvus (Calcedonicus) cinereus, rostro, pedibus, palpebris caudaque nigris.

24. JAMAICENSIS. *Die Krähe aus Jamaica.*

Briffon, ornithol. I. p. 160. n. 5. *Corneille de la Jamaïque.*

Büffon, Vögel, VII. p. 134. *die jamaikaische Krähe.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 351. n. 4. *Dohle mit weißen Nasenlöchern.*

Klein, av. p. 59. n. 5. *Cornix nigra, garrula.*

Klein, Vorbereitung, p. 112. n. 5. *Dohle mit weiten Nasenlöchern.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 59. n. 13. *Dohle mit weiten Nasenlöchern.*

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 311. n. 8. die Krähe aus Jamaika.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 154. n. 10. Corvus (Jamaicensis) toto corpore artubasque nigris.

6. MONEDULA. Die Dohle. (10)

Müller, Naturfyst. II. p. 174. n. 6. die Dohle.

Lfke, Naturgesch. p. 244. n. 5 die Dohle.

Borowsky, Thierreich, II. p. 106. n. 6. die Dohle.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 173. n. 5.

Corvus (Monedula) fuscus, occipite incano, fronte, alis caudaque nigris; die Dohle.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 364. n. 4. die Dohle.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 439. die

Dohle. p. 446. Tul, Dhul, Thale, Dachicke,

Tole, graue Dohle, Zschokerll, Tahe, Doel,

Aelke, Kayke, Gacke, Schneegacke, Thalk,

Klaas, Wachtel, Schneedohle.

Funke, Naturgesch. I. p. 295. die Dohle.

Ebert, Naturl. II. p. 57. die Dohle.

Halle, Vögel, p. 251. n. 190. die Dohle.

Meyer, Thiere, p. 6. Tab. 20.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere,

II. p. 354. n. 284. die Dohle.

Pennant, arct. Zool. II. p. 239. C. die Dohle.

Beckmann, Naturhist. p. 41. b. die Dohle.

Z 2

Neuer

(10) Ein scheuer; furchtsamer Vogel, der schwer zu schießen ist. Lebt gern in Gesellschaft der Rabenkrähen und Saarkrähen. Brüret jährlich zweymal. Frisst Regenwürmer, Erdmaden, Getraide, Hülsenfrüchte, grüne Saat, Kirschen u. d. seltener Fleisch. Sucht auch die Rebhühner- und Lercheneyer auf. Lernt sprechen. Die gezähmten stehen wie die Raben, alles was glänzt; ja die in der Freyheit rauben sich sogar unter einander die Materialien zum Bau des Nestes. Ist in den nördlichen Gegenden Zugvogel. Das Fleisch wird in verschiedenen Ländern gegessen.

- Neuer Schaupl. d. Natur, II. p. 350. *Dohle*.
 Onomat. hist. nat. V. p. 217. *die Dohle, Thole*.
 Handbuch der Naturgesch. II. p. 163. *die Dohle*.
 Handbuch d. deutschen Thiergesch. p. 119. *die Dohle*.
Klein, av. p. 59. n. 4. *Cornix gracula, Monedula, Graculus, Garrulus*.
Klein, Vorbereit. p. 112. n. 4. *Dohle, Thale, Thole, Aelke*.
Klein, verbess. Vögelhist. p. 59. n. 10. *Dohle*.
Klein, stemmat. av. p. 10. Tab. II. fig. 2. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 21. Tab. 8. fig. 4.
Gesner, Vögelb. p. 532. *Tul.* Fig. p. 534.
Brisson, ornithol. I. p. 160. n. 6. *Choucas*.
Buffon, Vögel, VII. p. 137. *die Dohle*. p. 145. *die graue Dohle*; m. 1 Fig.
Batsch, Thiere, I. p. 328. *die Dohle*.
Latham, Vögel, I. p. 312. n. 9. *die gemeine Dohle*.
Latham, Syn. Suppl. p. 78. *Jackdaw*.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 154. n. 11. *Corvus (Monedula) fusco-nigricans, occipite incano, fronte, alis caudaque nigris*.
Beseke, Vögel Kurl. p. 32. n. 45. *die Dohle*.
Bock, Preussen, IV. p. 296. n. 47. *die Dohle*.
Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 71. *die schwarze Dohle?*
Fischer, Livl. p. 71. n. 57. *Dohle*.
Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 166. n. 5. *Dohle*.
Pontoppidan, Norwegen, II. p. 124. *Allike, Kaa, Kaye, Raage*.
Georgi, Reise d. Rufsl. I. p. 165.
Pallas, Reise, II. p. 290. *Dohlen*.
Pallas, nord. Beytr. III. p. 11. *Dohlen*.
Scopoli,

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 32. n. 38.
die Dohle oder Thole.

Linné, auserles. Abh. II. p. 289. n. 63. die Dohle.

Zorn, Petinotheol. II. p. 141. 263. die Dohle.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 83. die Dohle.

Naumann, Vogelsteller, p. 163. n. 5. die Dohlen
oder Schneekrähen.

Naturforsch. IX. p. 42. n. 46. Dohle.

Anweis. Vögel zu fangen, p. 145. die Dohle.

Jablonsky, allg. Lex. p. 273. Dohle.

Krünitz, Encyklop. IX. p. 358. Dohle.

Bechstein, Musterung schäd. Th. p. 101. n. 5. die
Dohle.

Günth. Nest. u. Eyer, p. 51. Tab. II. Dohle.

Eberhard, Thiergesch. p. 72. Dohlen.

Oekonom. Zool. p. 67. n. 7. die Dohle.

Meidinger, Vorles. I. p. 116. n. 5. die Dohle.

Merklein, Thierreich, p. 333. Doolen oder Fuler.

Kraft, Ausrott. grauf. Th. I. p. 239. Dohlen.

Loniceri, Kräuterbuch, p. 672. Dohle; m. 1 mit-
telmäfs. Fig.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 52. Monedula.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 19. n. 5. Monedula.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 106. n. 5. Cor-
vus (Monedula) fusca, occipite incano, fron-
te, alis caudaque nigris.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 89. Corvus
(Monedula) fuscus, occipite incano, fronte,
alis caudaque nigris.

Kramer, Austr. p. 334. n. 4. Corvus fronte ni-
gra, occipite incano, corpore fusco, alis cau-
daque nigris; *Tagerl*, Dohle, *Tschockerl*.

Brünnich, ornith. bor. p. 9. n. 31. Corvus Monedula.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 305. Monedula; ein
Thale, Tole, Tule, Aelcke.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 199. Monedula.

Jonston, av. p. 42. Monedula.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 29. L. 17. c. 14. Monedula.

Aristot. hist. anim. L. IX. c. 31. n. 199. Λυκος.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 228. n. 5.
die Dohle.

β. *Die Dohle mit dem Halsbände.*

Müller, Naturfyst. II. p. 175. a. die Schweitzerdohle mit weißem Kragen.

Borowsky, Thierreich, II. p. 106. a. die Schweitzerdohle mit weißem Kragen.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 446. n. 1. die Dohle mit dem Halsbände.

Briffon, ornithol. I. p. 161. A. Choucas à collier.

Büffon, Vögel, VII. p. 146. die Dohle aus der Schweiz.

Latham, Vögel, I. p. 313. n. 9. Var. A. die Dohle mit dem Halsbände.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 155. β. Monedula torquata.

Jonston, av. p. 43. aliud Monedulae genus.

γ. *Die weiße Dohle.*

Müller, Naturfystem, II. p. 175. b. der schlesische kleine weiße Rabe.

Borowsky, Thierreich, II. p. 106. b. die weiße Dohle.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 446. n. 2. die weiße Dohle.

Briffon, ornith. I. p. 161. B. Choucas blanc.

Büffon, Vögel, VII. p. 146. die weißen Dohlen.

Latham, Vögel, I. p. 313. n. 9. Var. B. die weiße Dohle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 155. γ. Monedula candida.

δ. *Die*

δ. Die schwarze Dohle. (1)

Müller, Natursystem, II. p. 175 c. die schwarze Dohle.

Borowsky, Thierreich, II. p. 107. c. die schwarze Dohle.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 447. n. 3. die schwarze Dohle.

Briffon, ornithol. I. p. 162. n. 7. Choucas noir.

Büffon, Vögel, VII. p. 145. die schwarze Dohle, Chough, Chouc; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 313. n. 9. Var. C. die schwarze Dohle.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 155. δ. Corvus splendide niger, punctulis albis, oculos ambientibus.

ε. Die ganz schwarze Dohle mit rothen Schnabel und Füßen.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 155. ε. Monedula nigerrima, rostro pedibusque miniatis.

ζ. Die krummschnäblige Dohle.

Büffon, Vögel, VII. p. 147. Dohle mit weißen Flügeln, und krummem Schnabel.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 306. Monedula rostro adunco; krummschnablichte Tale.

η. Die Kreuzdohle.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 447. n. 4. die Kreuzdohle.

Büffon, Vögel, VII. p. 147. Dohle, mit kreuzweise gelegtem Schnabel.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 306. Monedula crucigera; eine Creutz-Tale.

θ. Die bräunliche Dohle mit weißen Schultern.

Z 4

i. Die

(1) Nach Briffon eine eigne Gattung.

i. Die bunte Dohle. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 447. n. 5.
 Bunte Dohle, vorzüglich mit weißen Schwanz
 und Flügeln.

ii. Die ganz schwarze Dohle, mit grauem Hinter-
kopfe. *

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 156. ♂. Corvus
 totus niger; occipite incano.

Philos. Transact. IVII. p. 347. Monedula tota
 nigra.

7. GLANDARIUS. Der Holzheher. (2)

Müller, Naturfyst. II. p. 175. der Holzhäher.

Leske, Naturgesch. p. 244. n. 6. der Nußheher.

Borowsky, Thierreich, II. p. 108. n. 8. der Holz-
 häher; Nußbeißer, Waldhäher.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 174. n. 6.

Corvus (Glandarius) tectricibus alarum caeruleis,
 lineis transversis albis nigrisque, corpore
 ferrugineo-variegato; der Holzheher, Mar-
 colph, Hetzle, Herrenvogel.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 366. n. 7. der Holz-
 heher.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 149.

n. 7. der Holzheher. p. 457. Nußheher, Wald-
 heher, Nußbeißer, Heher, Heyer, Eichelhe-
 her,

- (2) Einer der schönsten europäischen Vögel. Wird nicht so leicht gezähmt, als Raben und Krähen, lernt aber doch leichter als jene Worte nachsprechen. Hält sich vorzüglich in Schwarz- und Laubwäldern auf. Wandert vom Ende des Octobers bis im März in Gesellschaft von zweyen bis sechsen, wo immer einer hinter dem andern herfliegt. Nistet auf Eichen, Buchen und Fichten, hoch und niedrig. Legt 5 bis 7 grünlich graue, mit kleinen schwarzen Flecken bezeichnete Eyer. Brütet 16 Tage. Wird 8 bis 10 Jahr alt. Das Fleisch ist, vorher gekocht, und dann gebraten, eßbar.

her, Eicheltrabe, Hätzler, Hatzler, Baumhazel, Jäk, Marcolph, Holzschreyer, Horrevogel, Häger, Markwart, Markolfus, Heerholz, Herold, Nußhacker, Bröfexter, Eichelköhr, Schoia.

Funke, Naturgesch. I. p. 297. der Nußheher.

Halle, Vögel, p. 258. n. 203. der rothgraue Holzschreier, Eichelheher.

Meyer, Thiere, II. p. 13. Tab. 45.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 356. n. 285. der Heher.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 240. E. der Nußheher.

Neuer Schaupl. der Natur, III. p. 741. n. 1. Holzheher.

Onomat. histor. nat. III. p. 434. der Holzheher.

Handbuch der Naturgesch. II. p. 167. der Holzheher, Hatzler.

Handb. der deutschen Thiergesch. p. 120. Holzheher, Jäk.

Klein, av. p. 61. n. 2. Pica glandaria.

Klein, Vorbereit. p. 115. n. 2. Holzheher, Heerholz, Holzschreyer, Hatzler.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 60. n. 2. Holzheher.

Klein, stemmat. av. p. 10. Tab. 12. fig. 4. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 22. Tab. 8. fig. 2.

Gesner, Vögelb. p. 26. Häher oder Hatzler. Fig. p. 27. gut.

Briffon, ornithol. I. p. 168. Geay.

Büffon, Vögel, VII. p. 219. der Heher; m. I Fig. Batsch, Thiere, I. p. 326. der Holzhäher.

Latham, Vögel, I. p. 318. n. 19. der Nußheher, Holzheher.

Latham, Syn. Supplem. p. 79. Jay.

- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 157. n. 18. *Corvus*
(*Glandarius*) tectricibus alarum caeruleis, li-
neis transversis albis nigrisque, corpore ferrugi-
neo variegato.
- Beseke*, Vögel Kurlands, p. 32. n. 46. *der Holz-
heher.*
- Bock*, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 297. n. 48.
der Holzheher.
- Cetti*, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 75.
der Nußheher.
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 71. n. 58.
Heher, Marquard.
- Lepetchin*, Tagebuch d. russ. Reif. II. p. 5. *Nuß-
heher.*
- Georgi*, Reif. d. Rufsl. I. p. 165.
- S. G. Gmelin*, Reif. durch Sibirien, I. p. 50.
- Pontoppidan*, Naturg. von Dännemark, p. 166.
n. 6. *Schwarzspecht.*
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 33. n. 39.
der Waldhäher.
- Linné*, auserles. Abh. II. p. 288. n. 59. *Holz-
heher.*
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 265. *der Wald-Heher.*
- Döbel*, Jägerpraktik, I. p. 50. *Heyer, Nuß-Heher.*
- Naumann*, Vogelsteller, p. 129. *Häger, Nußheher.*
- Naturforsch. IX. p. 43. n. 47. *der Holzhäher.*
- Pallas*, nord. Beyträge, III. p. 15. *der Häher.*
- Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde,
VII. p. 451. n. 14. *der Holzheher.*
- Anweisung Vögel zu fangen u. f. w. p. 274. *der
Häher.*
- Loniceri*, Kräuterb. p. 673. *Heher, Fäckel.*
- Bechstein*, Musterung schädli. Thiere, p. 103. n. 7.
der Holzhäher.
- Goetze*, nützl. All. II. p. 362. n. 3. *der Holzheher.*
- Jablonsky,*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 441. *Heher*.

Krünitz, Encyklop. XX. p. 637. *Holzheher*.

Meidinger, Vorles. I. p. 116. n. 6. *der Nußsheher*.

Merklein, Thierreich, p. 251. *Häher*.

Kraft, Ausrott. grauf. Th. I. p. 242. *Hetzet-oder Häher*.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 52. Glandaria.

Linné, System. Natur. Edit. VI. p. 19. n. 7. *Pica glandaria*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 106. n. 7. *Corvus* (Glandarius) tectricibus alarum caeruleis, lineis transversis albis nigrisque, corpore ferrugineo variegato.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 90. *Corvus* (Glandarius) tectricibus alarum caeruleis, lineis transversis albis nigrisque, corpore ferrugineo variegato.

Kramer, Austr. p. 334. n. 7. *Corvus variegatus*, tectricibus alarum caeruleis, lineis transversis albis nigrisque; *Nußsheher*.

Brünnich, ornithol. bor. p. 9. n. 33. *Corvus Glandarius*.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 336. *Pica glandaria*; *ein Nus-Här, Nuß-Hecker, Hätzler, Holzschreier, Herrenvogel, Marcolfus*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 198. C. Glandarius.

Jonston, av. p. 44. *Pica glandaria*.

Gerin. ornith. II. p. 43. Tab. 161.

Schaefer, elem. ornith. Tab. 39.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 228. n. 6. *der Holzheher*.

β. *Der weiße Holzheher*.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 456. *der weiße Holzheher*.

Briffon,

Briffon, ornithol. I. p. 169. A. Geay blanc.

Büffon, Vögel, VII. p. 229. *der weiße Heher*.

Latham, Vögel, I. p. 319. n. 19. Var. A. *der weiße Heher*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 158. Garrulus albus *Briff.*

Gerin. ornith. II. p. 44. Tab. 162.

7. *Der geschückte Holzheher*. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 457. n. 2.

25. ARGYROPTHALMUS. *Die Krähe von Karthagena.*⁽³⁾ (Vogel von Plata.)

Latham, Vögel, I. p. 329. Corvus Argyroptthalmus.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 164. n. 38. Corvus (Argyroptthalmus) viridinitens, nucha cyanea, remigibus primoribus apice caeruleis, rectricibus apice albis.

26. DUBIUS. *Der unbestimmte Rabe*.

8. CRISTATUS. *Der Haubenheher*.

Müller, Natursystem, II. p. 176. n. 8. *der Haubenhäher*.

Bo. vovsky, Thierreich, II. p. 102. n. 1. *der Haubenhäher, der blaue Häher mit dem Federbusch*. Tab. 9. A.

Hall'e, Vögel, p. 260. n. 204. *der blaue Heher mit dem Federbusche*.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 237. n. 54. *die blaue Krähe, der blaue Nufsheher*.

Neuer Schauplatz d Natur, III. p. 741. n. 2. *blauer Holzheher, Schopfheher, gehaubter Heher*.

Onomat.

(3) Nach *Latham* mit *Corvus Surinamensis* p. 375. n. 43. einerley.

Onomat. histor. nat. III. p. 433. *der blaue Holzheher, der Herold.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 168. *blaue Haxler.*

Klein, av. p. 61. n. 3. *Picaglandaria cristata, purpureo caerulea.*

Klein, Vorbereit. p. 116. n. 3. *blauer Holzheher, Heerold.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 60. n. 3. *blauer Holzheher.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 166. n. 1. *blauer Heher.*

Briffon, ornithol. I. p. 170. n. 4. *Geay bleu de Canada.*

Büffon, Vögel, VII. p. 246. *der blaue nordamerikanische Heher; mit 1 Fig.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 30. *der blaue Heher.*

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 29. *der blaue Häher.*

Batsch, Thiere, I. p. 326. *der blaue nordamerikanische Häher.*

Latham, Vögel, I. p. 320. n. 20. *der blaue Heher, Haubenheher.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 158. n. 19. *Corvus (Cristatus) tectricibus alarum lineis transversis nigris, corpore caeruleo, collari nigro.*

Carver, Reis. durch Nordamer. p. 390. *der blaue Häher.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 106. n. 8. *Corvus (Cristatus) tectricibus alarum lineis transversis nigris, corpore caeruleo, collari nigro.*

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 229. n. 7. *die blaue Krähe.*

27. STELLERI. *Stellers Krähe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 237. n. 55. *Stellers Krähe.*

Latham,

Latham, Vögel, I. p. 320. n. 21. *Stellers Krähe*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 158. n. 20. *Corvus* (Stelleri) subcristatus, corpore atro, alis caeruleis, transversim striatis, caudaque caerulea.

9. CAYANUS. *Der cayennische Häher*.

Müller, Naturyst. II. p. 177. n. 9. *cayennischer Häher*.

Neuer Schauplatz der Natur, VII. p. 3. n. 6. *Schwarzkehle*.

Briffon, ornitholog. I. p. 169. n. 2. *Geay de Cayenne*.

Büffon, Vögel, VII. p. 242. *der cayennische Heher*.

Latham, Vögel, I. p. 321. n. 22. *der kayennische Heher*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 160. n. 24. *Corvus* (Cyanus) subviolaceus, subtus candidus, iugulo fronteque nigris, cauda apice alba.

10. CARYOCATACTES. *Der Nufsheher*. (4)

Müller, Naturyst. II. p. 177. n. 10. *der Nufshäher*.
Tab. 6. fig. 4.

Leske, Naturg. p. 244. n. 7. *der Tannenheher*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 108. n. 9. *der Nufshäher*.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 174. n. 7. *Corvus* (Caryocatactes) fuscus, alboque punctatus, alis caudaque nigris, rectricibus apice albis, intermediis apice detritis; *der Nufsheher*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 366. n. 8. *der Tannenheher*.

Bechstein,

(4) *Bechstein* will das Durchbohren der Bäume nach Art der Spechte bey diesem Vogel nicht zugeben. *Pennant* und *Büffon* behaupten es, und mir ist es von glaubwürdigen Jagdverständigen versichert worden.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 457. n. 2. *der Tannenheher*. p. 462. *Nußheher*, *Nußbrecher*, *Nußpicker*, *Nußkretscher*, *Nußknacker*, *Nußnacker*, *Waldstaël*, *türkischer Holzschreyer*, *schwarzer Markward*, *Marcolph*, *Nußkrähe*, *Steinheher*, *Tannenelster*, (*türkischer*, *italienischer*, *afrikanischer Vogel*) *Nußbeißer*.

Funke, Naturgesch. I. p. 298. *der Tannenheher*.

Ebert, Naturl. II. p. 58. *der Nußheher*.

Halle, Vögel, p. 261. n. 205. *der rothbraune Nußheher*, *mit herzförmigen Flecken und kurzer Zunge*.

Halle, Vögel, p. 261. n. 206. *der schwarzbraune Tannenheher*, *mit dichten weißen herzförmigen Schuppen*.

Meyer, Thiere, II. p. 13. Tab. 46.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 359. n. 286. *der Nußheher*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 240. D. *der Nußknacker*, *Tannenheher*.

Neuer Schauplatz der Natur, III. p. 741. n. 3. *Nußheher*.

Onomat. histor. nat. II. p. 659. *der Nußbrecher*.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 168. *der Nußheher*.

Handb. der deutsch. Thiergesch. p. 120. *Nußheher*.

Klein, av. p. 61. n. 4. *Pica nucifraga*. *Nucifragus*.

Klein, Vorbereit. p. 116. n. 4. *Nußbrecher*, *Nußbreischer*, *Nußheher*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 60. n. 4. *Nußheher*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 166. n. 2. *Nußbrecher*.

Klein, stemm. av. p. 10. Tab. 12. fig. 2. a. b.

Gesner, Vögelb. p. 385. *Nußbrecher*. Fig. p. 386. *zieml. gut*.

Briffon, ornithol. I. p. 171. n. 1. *Casse-noix*.

Büffon.

- Büffon*, Vögel, VII. p. 251. *der Nußheher.*
Seligmann, Vögel, VII. Tab. 30. *der Nußbeißer.*
Batsch, Thiere, I. p. 326. *der Nußhäher.*
Latham, Syn. I. p. 400. n. 38. *Nutcracker.*
Latham, Syn. Suppl. p. 82. *Nutcracker.*
Latham, Vögel, I. p. 332. n. 38. *der Tannenheher, die Nußkrähe.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 164. n. 39. *Corvus* (Caryocatactes) fuscus albo punctatus, alis caudaque nigris, rectricibus apice albis, intermediis apice detritis.
Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 32. n. 47. *der Nußheher.*
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 298. n. 49. *Nußhäher, Nußkrähe, Tannenheher.*
Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 71. n. 59. *Nußheher, Nußpicker.*
Lepechin, Tagebuch der ruff. Reif. II. p. 5. *Nußbrecher.*
Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 166. n. 7. *Nußbeißer.*
Pontoppidan, Naturh. v. Norw. II. p. 168. *Nödde-Skriger.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 34. n. 40. *der Nußbrecher.*
Linne, auserl. Abh. II. p. 288. n. 60. *der Nußheher.*
Günther, Nester und Eyer, Tab. 38. *Nußhäher.*
Georgi, Reif. d. Rufsl. I. p. 165.
Zorn, Petinotheol. II. p. 268. *der Nuß-Heher.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 81. *Tannen-Heher, oder schwarzer Holz-Schreyer.*
Naumann, Vogelsteller, p. 129. *Tannenheher.*
 Naturf. IX. p. 44. n. 48. *der Nußhäher.*
 Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII. p. 451. n. 15. *der Nußheher.*

Bechstein, Musterung schäd. Th. p. 104. n. 8.
der Tannenheher.

Wittenberg, Wochenbl. XV. p. 9. *Nußheher.*

Eberhard, Thiergesch. p. 73. *Nußkrähe.*

Meidinger, Vorles. I. p. 116. n. 7. *der Tannenheher.*

Krünitz, Encyklop. XLVI. p. 519. *die Nußkrähe.*

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 52. Caryocatactes.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 19. n. 6. Caryocatactes.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 106. n. 9. Corvus (Caryocatactes) fuscus alboque punctatus, alis, caudaque nigris, rectricibus apice albis, intermediis apice detritis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 91. Corvus (Caryocatactes) fuscus alboque punctatus, alis caudaque nigris, rectricibus apice albis, intermediis apice detritis.

Kramer, Austr. p. 334. n. 5. Corvus alis cauda, pedibus rostroque nigris: trunco fusco, excepto vertice, maculis albis guttato.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 310. Nucifraga; ein *Nußbicker, Nußhacker.*

Brünicb, ornith. bor. p. 9. n. 34. Corvus Caryocatactes.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 200. C. Caryocatactes.

Schäffer, elem. ornith. Tab. 49.

Gerin, ornith. II. p. 44. Tab. 163.

Jonston, av. p. 107. Merula Saxatilis. Tab. 40. Caryocatactes.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 229. n. 8. *der Nußheher.*

α. *Der braunrothe Nußheher.* *

Müller, zool. dan. prodr. p. 12. ad n. 91. Corvus Rufus.

β. *Der schwarz und weiß gefleckte Nußheher.* *

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. ad n. 91. C. albo nigroque maculatus.

γ. *Der weiße Nußheher.* *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 462.

II. BALICASSIUS. *Der Balicassio.*

Müller, Naturyst. II. p. 178. n. II. *die philippinische Dohle.*

Briffon, ornitholog. I. p. 163. n. 9. Choucas des Philippines.

Büffon, Vögel, VII. p. 170. *der philippinische Balicassio*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 315. n. 12. *der Balicassio.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 156. n. 13. Corvus (Balicassius) virefcenti-ater, cauda forficata.

Gerin. ornith. II. p. 40. Tab. 154.

Hermann, tab. affinit. anim. p. 200. Corvus Balicassius.

28. NOVAE GUINEAE. *Die Dohle von Neu-Guinea.*

Büffon, Vögel, VII. p. 162. *die Dohle von Neu-Guinea*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 315. n. 3. *die Neu-Guineische Krähe.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 156. n. 14. Corvus (Novae Guineae) cinereus, capistro, fascia per oculos caudaque nigris, dorso postico, uropygio, abdomine, femoribus crissoque albo nigroque fasciatis.

β. Cor-

β. *Corvus cinereus*, capite colloque caerulefcentibus, capifiro fasciaque per oculos nigris, pectore abdomineque pallide ferrugineis. *

Latham, Syn. Supplem. p. 78.

Latham, Vögel, I. p. 215.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 156. n. 14. β.

29. *PAPUENSIS. Der Choucari.*

Büffon, Vögel, VII. p. 164. *der Choucari*; m. 1 F.

Latham, Vögel, I. p. 316. n. 14. *die papuanische Krähe.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 157. n. 15. *Corvus (Papuenfis) cinereo-grifeus*, abdomine albo, remigibus fusco-nigricantibus, macula per oculos nigra.

30. *NUDUS. Der Colnud.*

Batsch, Thiere, I. p. 327. *der Colnud.*

Büffon, Vögel, VII. p. 166. *der Colnud von Cayenne*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 316. *der kayennische Kahlhals.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 190. n. 4. *Gracula (Nuda) nigra*, capite tomentoso, sericeo, postice et lateribus subcalvo, remigibus extus oblique grifefcentibus.

31. *CALVUS. Die glatzige Dohle.*

Batsch, Thiere, I. p. 327. *die glatzige Dohle.*

Büffon, Vögel, VII. p. 160. *die glatzige Dohle*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 317. n. 16. *der kayennische Kahlkopf.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 153. n. 6. *Corvus (Calvus) ferrugineo fufcus*, subtus rufefcens, facie ultra oculos nuda.

32. PACIFICUS. *Die Krähe vom stillen Ocean.*
Latham, Vögel, I. p. 317. n. 17. *die Krähe vom stillen Ocean.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 157. n. 16. Corvus (Pacificus) cinereus, subtus rufescens, capistro pallido, occipite, nucha, alis caudaque nigricantibus, apicibus remigum rectricumque laterali-um albidis.
33. TROPICUS. *Die Krähe von der Insel Owhy-hee.*
Latham, Vögel, I. p. 318. n. 18. *die Wendezirkel-Krähe.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 157. n. 17. Corvus (Tropicus) niger nitidus, subtus niger, crisso, hypochondriisque albo variegatis, alis caudaque viridi-nigris.
34. ERYTHROHYNCHOS. *Der rothschnäblige Heher.*
Büffon, Vögel, VII. p. 233. *der chinesische Heher mit rothem Schnabel; m. 1 Fig.*
Latham, Vögel, I. p. 322. n. 24. *der rothschnäblichte Heher.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 161. n. 29. Corvus (Erythrorhynchus) violaceo-fuscus, subtus albicans, fronte, collo subtus pectoreque nigris, cauda basi violacea, medio nigra, apice alba.
35. SINENSIS. *Der chinesische Heher.*
Latham, Vögel, I. p. 323. n. 25. *der chinesische Heher.*
36. SIBIRICUS. *Der sibirische Heher. (5)*
Büffon, Vögel, VII. p. 240. *der sibirische Heher; mit 1 Fig.*

Latham,

(5) Nach *Latham* eine Spielart von *Lanius insaufus*.

Latham, Vögel, I. p. 323. n. 26. *der sibirische Heher.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 159. n. 22. β . *Corvus cinerascens, subcristatus, facie colloque subtus caerulefcenti-albis, uropygio, corpore subtus reetricibusque lateralibus ferrugineo-fulvis.*

37. PERUVIANUS. *Der peruanische Heher.*

Büffon, Vögel, VII. p. 235. *der peruanische Heher*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 324. n. 27. *der peruanische Heher.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 161. n. 30. *Corvus (Peruvianus) dilute viridis, fronte caerulea, vertice colloque supra albidis, gula iuguloque atris, abdomine reetricibusque lateralibus flavis.*

38. FLAVUS. *Der gelbbäuchige Heher.*

Büffon, Vögel, VII. p. 244. *der gelbbäuchige Heher*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 324. n. 28. *der Heher mit gelbem Bauche.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 162. n. 31. *Corvus (Flavigaster) virescente fuscus, subtus flavus, vertice striga aurea, superciliis gulaque albis.*

12. AFER. *Die afrikanische Dohle.* ⁽⁶⁾

Müller, Naturfyst. II. p. 178. n. 12. *die afrikanische Dohle.*

39. CYANEUS. *Die Chadara.*

Büffon, Vögel, VII. p. 218. *die blaue Elster.*

Latham, Vögel, I. p. 326. n. 30. *die blaue Krähe.*

A a 3

Latham,

(6) Ist nach *Latham* mit *Corvus Senegalensis* p. 374. n. 14. eignerley.

Latham, Syft. ornithol. I. p. 159. n. 21. *Corvus* (Cyanus) cinereus, vertice atro-nitido, alis caudaque cuneiformi cyaneis, rectricibus intermediis apice albis.

Pallas, Reise, Ausz. III. p. 211. *Corvus Cyanus*.

Pallas, Reif. Ausz. III. Anh. p. 4. n. 7. *Corvus Cyanus*. *Mongola-Dauris Chadara*.

13. *PICA. Die Aelster.* (7)

Müller, Naturfyft. II. p. 179. n. 13. *die europäische Elfter*.

Leske, Naturgesch. p. 244. n. 8. *die Elfter*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 109. n. 10. *die Elfter*.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 174. n. 8.

Corvus (*Pica*) albo nigroque varius, cauda cuneiformi; *die Aelster, Atzel, Aegerste, Heifter*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 365. n. 6. *die Elfter*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 462. n. 9.

die Elfter. p. 469. *Aelster, Atzel, Hutsche, Scholaster, Alaster, Aegerst, Agelaster, Agerluster, Algarte, Häster, Heifter, Egeste, Afler, Heste, gemeiner Heher, Aelster, Egerste, Elsterrabe, Praka*.

Funke, Naturgesch. I. p. 296. *die Elfter*.

Ebert,

- (7) Gewicht 9 Unzen. Legt 7 bis 8 Eyer. Brütet 16 Tage. Fliegt schwer. Kann über 20 Jahr alt werden. Fleisch essbarer als das von den Krähen. Dafs eine Elfter, wenn man ihr das Nest zerstört, oder in Unordnung bringt zum zweyten und dritten male ein neues macht, auch zum zweyten und dritten male, wiewohl immer weniger, Eyer legt, hat seine Richtigkeit; ob sie aber überhaupt, der Regel nach, zweymal brütet, und ob Männchen und Weibchen bey diesem Geschäfte abwechseln oder nicht, ist nicht so ganz ausgemacht. Das Nest ähnelt dem russischen Fahrwerke *Kibitka*, Ohngefähr wie eine Postkalesche mit halbem Verdeck.

- Ebert*, Naturl. II. p. 57. *die gemeine Aelster.*
Halle, Vögel, p. 256. n. 202. *die gemeine Elster.*
Meyer, Thiere, II. p. 22. Tab. 100.
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
 II. p. 360. n. 287. *die Elster.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 235. n. 52. *die Elster.*
Beckmann, Naturhist. p. 41. c. *die Elster.*
 Neuer Schaupl. der Natur, I. p. III. *die gemeine Aelster.*
 Onomat. hist. nat. VI. p. 488. *die gemeine Elster.*
 Handbuch der Naturgesch. II. p. 165. *die Aelster.*
 Handbuch der deutschen Thiergeschichte, p. 120. *Elster.*
Klein, av. p. 60. n. 1. *Pica rusticorum; vulgaris.*
Klein, Vorbereitung, p. 114. n. 1. *gemeiner Heher, Aelster, Alester.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 60. n. 1. *gemeine Elster.*
Klein, stemm. av. p. 10. Tab. 12. fig. 1. a. b. c.
Klein, Vögeleyer, p. 22. Tab. 8. fig. 3.
Gesner, Vögelb. p. 24. *Aegerst oder Atzel; Fig.*
 p. 25. mittelm.
Briffon, ornithol. I. p. 164. n. 1. *Pie.*
Büffon, Vögel, VII. p. 173. *die Elster; m. 1 Fig.*
Batsch, Thiere, I. p. 327. *die Elster.*
Latham, Syn. I. p. 392. n. 29. *Magpie.*
Latham, Syn. Supplem. p. 80. *Magpie.*
Latham, Vögel, I. p. 324. n. 29. *die gemeine Aelster, Azel.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 162. n. 32. *Corvus (Pica) albo nigroque varius, cauda cuneiformi.*
Beseke, Vögel Kurl. p. 32. n. 48. *die Elster.*
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 298. n. 50. *Elster, Heister.*

- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 71. n. 60.
Elster.
- Schlözer*, Erdbeschreib. von Amerika, p. 281.
Elstern.
- Leem*, Nachr. von den Lappen in Finnmarken,
p. 129. *die Elster*.
- Forster*, Reif. Ed. in 8. I. p. 28. *Elstern*.
- Steller*, Kamtschatka, p. 194. *Aelstern*.
- Krascheninnikow*, Kamtschatka, p. 200. *Elstern*.
- Pontoppidan*, Naturgesch. v. Dänemark, p. 166.
n. 8. *Elster*, *Hauselster*.
- Pontoppidan*, Naturhist. von Norwegen, p. 178.
Skade, *Skiare*, *Skiör*.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 35. n. 41.
die Elster.
- Linné*, auserl. Abl. II. p. 288. n. 57. *die Aelster*.
- Pallas*, nord. Beytr. I. p. 315. IV. p. 24. *die Elster*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 141. 264. 553. *die Aelster*.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 83. *Alaster oder Elster*.
- Georgi*, Reif. d. Rufsl. I. p. 165.
- Günther*, Nester und Eyer, Tab. 53. *Aelster*.
- Naumann*, Vogelsteller, p. 164. *die Elster*.
- Naturf. IX. p. 44. n. 49. *Elster*.
- Anweisung Vögel zu fangen, p. 85. *Alster oder Hetze*.
- Jablonsky*, allgem. Lex, p. 27. *Aglaster, Atzel, Elster*.
- Geoffroy*, mat. med. p. 646. *Elster*.
- Eberhard*, Thiergesch. p. 72. *die gemeine Elster*.
- Oekonom. Zool. p. 68. n. 8. *die Elster*.
- Meidinger*, Vorles. I. p. 116. n. 8. *die Elster*.
- Mellin*, von Anleg. der Wildbahnen, p. 348. n. 13.
die Elster.
- Loniceri*, Kräuterb. p. 673. *Atzel, Hetz, Alster*.
Bechstein,

Bechstein, Musterung schädli. Thiere, p. 104. n. 9.
die *Elster*.

Merklein, Thierreich, p. 247. *Atzel*.

Kraft, Ausrott. grauf. Th. I. p. 241. *Aglaster*.

Mannichfalt. I. p. 249. die *Elster*.

Krünitz, Encyklop. X. p. 768. *Elster*.

Bonnet, Betracht. über die Natur, II. p. 431. die
Aelster.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 19. n. 8. *Pica caudata*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 106. n. 10. *Corvus* (*Pica*) albo nigroque varius, cauda cuneiformi.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 92. *Corvus* (*Pica*) albo nigroque varius, cauda cuneiformi.

Kramer, Austr. p. 335. n. 8. *Corvus cauda cuneiformi*; *Alster*.

Brünnich, ornith. bor. p. 9. n. 32. *Corvus Pica*.

Heerkens, av. Fris. p. 27. *Pica*.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 333. *Pica*; ein *Aglaster*, *Algaster*, *Algarte*, *Atzle*, *Egerste*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 178. *Corvus Pica*,
Gerin. ornith. II. p. 40. Tab. 155.

Schaefer, elem. ornith. Tab. 56.

Philos. Transact. IXII. p. 387.

Jonston, av. p. 44. *Pica varia feu caudata*.

Martial. epigr. XIV. 76. *Pica*.

Plin. hist. nat. Lib. X. c. 29. c. 39. *Picae*?

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 20. n. 169. *Κίττα*?

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 229. die
Aelster.

β. *PICA CANDIDA*. Die weiße *Aelster*.

Müller, Naturf. II. p. 179. ganz weiße *Elstern*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 469. n. 1.
die weiße *Elster*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 60. *eine weiße Elster.*

Briffon, ornithol. I. p. 165. A. Pie blanche.

Büffon, Vögel, VII. p. 186. *weiße Elstern.*

Latham, Vögel, I. p. 326. n. 29. Var. A. *die weiße Elster.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 162. β. Pica candida.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 299. *zwei weiße Elstern.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 35. t. *eine ganz weiße Elster.*

Pontoppidan, Naturg. v. Dänemark, p. 166. n. 8. Naturforscher, I. p. 61. n. 2. *eine ganz weiße Elster.*

Mus. Wormian. p. 293. Pica alba.

γ. Pica corpore longitudinaliter albo nigroque striato. *Mus. Lep. **

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 163. γ.

δ. C. corpore fuliginoso alboque vario, oculis rubicundis, rostro pedibusque nigris. *

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 163. δ.

Mus. Carl. fasc. III. Tab. 53. Corvus Pica, var.

ε. *Die bunte Elster. **

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 470. n. 2.

Günther: Naturforsch. I. p. 62. n. 3.

ξ. *Die aschgrau und weiß gefleckte Elster. **

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 470. n. 3.

14. SENEGALENSIS. *Die senegalische Elster.*

Müller Naturyst. II. p. 179. n. 14. *die senegallische Elster.*

Briffon, ornitholog. I. p. 166. n. 2. Pie du Sénégal.

Büffon,

Büffon, Vögel, VII. p. 192. *die senegalische Elfler*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 326. n. 31. *die senegalische Krähe*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 163. n. 33. Corvus (Senegalensis) nigro-violaceus, cauda cuneiformi, remigibus rectricibusque fuscis.

40. CARIBAEUS. *Die caribäische Krähe*.

Halle, Vögel, p. 262. n. 208. *der blaubraune indianische Heher*.

Briffon, ornitholog. I. p. 176. n. 6. *Rollier des Antilles*.

Büffon, Vögel, VII. p. 201. *die Elfter der Antillen*.

Latham, Vögel, I. p. 327. n. 32. *die karibäische Krähe*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 163. n. 35. Corvus (Caribaeus) ferrugineus, subtus albus, collo caeruleo, torque albo, uropygio luteo, rectricibus caeruleis, albo variis.

Du Tertre, hist. des Antilles, II. p. 258. *Pie des Antilles*.

Willughb. ornitholog. p. 90. n. 1. *Pica caudata indica*.

Aldrov. ornith. I. p. 788. *Pica caudata indica*.

Jonston, av. p. 44. *Pica caudata indica*.

41. AFRICANUS. *Die afrikanische Krähe*.

Latham, Vögel, I. p. 327. n. 33. *die afrikanische Krähe*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 163. n. 34. Corvus (Africanus) subcristatus fuscus, abdomine cinerascens, capite colloque purpureis, cauda cuneiformi, rectricibus apice albis.

42. MEXICANUS. *Der Hozitzanatl.*⁽⁸⁾
Briffon, ornithol. I. p. 167. n. 4. grande Pie du Mexique.
Büffon, Vögel, VII. p. 209. *der Hozitzanatl.*
Latham, Vögel, I. p. 328. n. 34. *die große mexikanische Krähe.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 164. n. 36. Corvus (Mexicanus) totus caeruleo-niger.
43. SURINAMENSIS. *Die surinamische Krähe.*⁽⁹⁾
Latham, Syn. Suppl. p. 81. Surinam Crow.
Latham, Vögel, I. p. 328. n. 35. *die surinamische Krähe.*
44. ZANOE. *Der Tfanahoei.*
Briffon, ornitholog. I. p. 167. n. 5. petite Pie du Mexique.
Büffon, Vögel, VII. p. 217. *der Tfanahoei.*
Latham, Vögel, I. p. 329. n. 36. *die kleine mexicanische Krähe.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 164. n. 37. Corvus (Zanoe) nigricans, cauda longissima, capite colloque subfulvis.
15. BRACHYURUS. *Die kurzschwänzige Krähe.*
Müller, Natursystem, II. p. 180. n. 15. *der kurzgeschwänzte Rabe.*
Briffon, ornith. I. p. 246. n. 56. Merle verd des Moluques.
Büffon, Vögel, IX. p. 190. *bengalische Breve;* mit 1 Fig.
Latham, Vögel, I. p. 329. n. 37. *die kurzgeschwänzte Krähe.*

Latham,

(8) Das Fleisch ist schwarz, aber von gutem Geschmack.

(9) Ist, nach *Latham*, mit *Corvus Argyrophthalmus* p. 369. n. 25. einerley.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 166. n. 43. Corvus (Brachyurus) viridis, subtus lineisque capitis fulvescentibus, alis macula alba.

Hermann, tab. affin. anim. p. 200. Corvus brachyurus.

β. CORVUS PHILIPPENSIS. *Die philippinische kurzschwänzige Krähe.* (10)

Briffon, ornithol. I. p. 246. n. 57. Merle verd à tête noire des Moluques.

Büffon, Vögel, IX. p. 187. *der philippinische Brevue oder Kurzschwanz*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 330. n. 37. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 166. β. C. viridis, capite colloque nigris, uropygio tectricibusque alarum caeruleo-viridibus, caudae inferioris roseis, rectricibus nigris.

γ. CORVUS BENGALENSIS. *Die bengalische kurzgeschwänzte Krähe.*

Klein, av. p. 115. n. 2. Coturnix capensis.

Klein, Vorbereit. p. 213. n. 2. *Kaapwachtel*.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 119. n. 2. *Caapwachtel*.

Büffon, Vögel, IX. p. 188. *kurzgeschwänzte ostindische Aelster*; mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, IX. Tab. XIV. *die Aelster mit kurzem Schwanz*.

Latham, Vögel, I. p. 330. n. 37. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 167. γ. C. viridis, subtus lutescens, capite colloque nigris, aurantio alboque lineatis, remigibus rectricibusque nigris.

δ. COR-

(10) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

δ. CORVUS MADAGASCARIENSIS. *Die kurzgeschwänzte madagascarishe Krähe.*

Büffon, Vögel, IX. p. 191. *madagascarishe Breve*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 331. n. 37. Var. C.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 167. δ. *Corvus viridis*, subtus lutescens, capite nigricante-fusco, nucha flavescente, lunula cervicis fasciæque sub oculis bifida nigris.

ε. *Die malakkische kurzgeschwänzte Krähe.**

Latham, Syn. Supplem. p. 81. 37.

Latham, Vögel, I. p. 331. n. 37. Var. D.

Latham, Syft. ornithol. I. p. 167. ε. *Corvus capite cerviceque nigris, superciliis virescentibus caeruleo marginatis, gula alba, iugulo dorsoque viridibus, abdomine rufo, crisso rubro.*

Sonner. voy. Ind. II. p. 190. Tab. 110. Breve de Malacca.

ζ. *Die malabarische kurzgeschwänzte Krähe.**

Latham, Syn. Supplem. p. 82. E.

Latham, Vögel, I. p. 331. n. 37. Var. E.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 167. ζ. *Corvus capite colloque nigris, vertice fasciæque longitudinali rufa, gula alba, pectore rufescente, abdomine, femoribus crissoque rubris.*

Sonner. voy. Ind. II. p. 191. Breve de la cote de Malabar.

η. *Die chinesische kurzgeschwänzte Krähe.**

Latham, Syn. Suppl. p. 82. F.

Latham, Vögel, I. p. 332. n. 37. Var. F.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 167. η. *Corvus viridis, vertice fusco, collo torque albo, nucha vittaque*

vittaque per oculos ducta nigra, abdomine albo, medio macula, criffoque coccineis.

16. CANADENSIS. *Der canadifche Heher.* (1)

Müller, Naturfyft. II. p. 180. n. 16. *der canadifche Rabe*. Tab. 6. fig. 3.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 236. n. 53. *die afchgraue Krähe*.

Onomat. histor. nat. IV. p. 10. *die dunkelbraune Dohle aus Canada*.

Briſſon, ornithol. I. p. 170. n. 4. *Geay bleu de Canada*.

Büſſon, Vögel, VII. p. 237. *der braune kanadiſche Heher*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 322. n. 23. *die kanadiſche Krähe*.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 160. n. 23. *Corvus (Canadensis) fuscus, fronte flavicante, subtus rectricumque apicibus albidis.*

Philof. tranſact. IXII p. 386.

Donndorff, Handb. d. Thiergeſch. p. 230. n. 10. *der canadifche Heher*.

17. PYRRHOCORAX. *Die Bergdohle.* (2)

Müller, Naturfyſtem, II. p. 180. n. 17. *die Bergdohle*.

Gatte.

(1) Flügelweite 15 Zoll. Gewicht dritthalb Unzen. Hat 2, ſelten 3 Junge auf einmal. Die Jungen ſind ganz ſchwarz, und bleiben es auf einige Zeit. Stirbt in der Gefangenſchaft. Dieſe Vögel ſind ſo dreift, daß ſie in die Zelte kommen, und die Speiſen aus den Schüſſeln freſſen.

(2) Nach *Lapeirouſe* iſt die ſchwarze Farbe der Füſſe kein ſicheres Merkmal, weil ſie ſich nach Alter und Geſchlecht ändert, und bald ſchwarz, bald pomeranzenfarben, bey den Alten aber allemal zinnoberfarben ſeyn ſoll.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 363. n. 288. *die Bergdohle, Bergdol, Bergtul, Wildetul, Steinhez, Alpkachel, Alprapp, Feuerräbe.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 351. n. 7. *wilde Duhle, Alpkachel.*

Onomat. hist. nat. III. p. 435. VI. p. 724. *Pyrrhocorax.*

Gesner, Vögelb. p. 33. *Alprappe*; m. 1 Fig.

Briffon, ornitholog. I. p. 162. n. 8. *Choucas des Alpes.*

Büffon, Vögel, VII. p. 154. *die Bergdohle; mit 1 Figur.*

Latham, Vögel, I. p. 314. n. 11. *die Alpenkrähe.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 168. n. 40. *Corvus (Pyrrhocorax) nigricans, rostro luteo, pedibus nigris.*

Linné, auserles. Abhandl. II. p. 285. n. 52. *die Krähendohle?*

Lapeirouse: neue schwed. Abhandl. III. p. 104. *Corvus (Pyrrhocorax) nigricans, rostro luteo.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 199. *Pyrrhocoraces.*

Jonston, av. p. 42. *Pyrrhocorax.*

Plin. hist. nat. L. 10. c. 48. *Pyrrhocorax.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 230. *die Bergdohle.*

18. GRACULUS. *Der Waldkrähe.*

Müller, Naturfyst. II. p. 181. n. 18. *die Schweizerkrähe.*

Leske, Naturg. p. 244. n. 9. *die Schweizerkrähe.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 174. n. 9. *Corvus (Graculus) violaceo-nigricans, rostro pedibusque luteis; der Waldkrähe, Alprabe.*

Bechstein,

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 447. n. 6. die *Steindohle*. p. 449. *Steintule*, *Steintahle*, *Steinkräh*e, *Krähendohle*, *Schweitzerkräh*e, *Schweitzerrabe*, *Feuerrabe*, *schwarzer Geist mit feurigen Augen*.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 363. n. 289. die *Steindohle*.

Halle, Vögel, p. 253. n. 195. die *schwarze Krähdohle*.

Neuer Schaupl. d. Natur, III. p. 741. n. 7. *Bergheher*.

Onomat. hist. nat. III. p. 284. die *Bergdohle*; (mit der vorhergehenden verwechselt.)

Handb. der Naturgesch. II. p. 161. die *Bergkräh*e.

Klein, av. p. 60. n. 11. *Cornix rostro pedibusque rubris*. *Coracias*.

Klein, Vorbereit. p. 113. n. 11. *schwarze Geist mit feurigen Augen, rothen Schnabel und Füßen*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 58. n. 7. *schwarzer Geist mit feurigen Augen*.

Gesner, Vögelb. p. 532. *Taha*, mit *roten Schnabel und Füßen*; *Steintahen*.

Briffon, ornithol. I. p. 155. n. 1. *Coracias*.

Buffon, Vögel, VII. p. 5. die *Steindohle*; [mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p. 333. n. 39. die *Schweitzerkräh*e, *Steinkräh*e.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 165. n. 41. *Corvus (Graculus) violaceo-nigricans, rostro pedibusque luteis*.

Pallas, Reise, III. p. 185. die *fogenannten Steirappen*, mit *rothen Füßen und Schnabel*.

Hasselquist, Reise nach Palästina, p. 294. *Monedula Pyrrhocorax*.

Shaw, Reise, p. 161. *Graab el Sahara*.

Scopoli, Bemerck. a. d. Naturgesch. I. p. 41. n. 46.
der *Feuer-Rabe*.

Pennant, britt. Thiergesch. Tab. 33.

Lapeirouse: neue schwed. Abhandl. III. p. 104.
Corvus (Coracias) violaceo-nigricans, rostro
pedibusque miniatis.

Bechstein, Musterung schäd. Th. p. 102. n. 6. die
Steindohle.

Eberhard, Thiergesch. p. 71. *Krähendohle*.

Meidinger, Vorles. I. p. 116. n. 9. die *Schweitzer-
krähe*.

Krünitz, Encyklop. XLVI. p. 522. *Alpen-Krähe*,
Schweitzer-Krähe.

Hermann, tab. affin. anim. p. 196. Corv. Gracula.

Jonston, av. p. 42. Coracia.

Gerin. ornith. II. p. 37. Tab. 149.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 231. n. 12.
der *Waldrabe*.

β. *Der weiße Waldrabe*. *

Lapeirouse: neue schwed. Abhandl. III. p. 104.

45. AUSTRALIS. *Die cayennische Krähe*. (3)

Latham, Vögel, I. p. 334. n. 14. die *kayennische
Krähe*.

19. EREMITA. *Der Alpenrabe*. (4)

Miller, Naturfyst. II. p. 181. n. 19. der *Eremit*.

Leske, Naturgesch. p. 244. n. 10. der *Eremit*.

Borowsky,

(3) Der Trivialname *Corvus Australis* kommt im System schon
p. 305. n. 21. vor. Vielleicht könnte man den letztern *Cor-
vus Maculatus* nennen, wenn er anders nicht, wie *La-
tham* im Syst. ornith. I. p. 206. n. 18. annimmt, mit *Bucco
cinereus* einerley ist.

(4) *Blumenbach* bezweifelt die Wirklichkeit dieses Vogels, und
hält ihn mit *Corvus Graculus* für einerley. S. Handb. der Na-
turgesch. a. a. O.

- Borowsky*, Thierreich, II. p. 107. n. 7. *der Alpenrabe, Berg-Eremit.* Tab. 9. b.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 470. n. 10. *der Alpenrabe.* p. 472 *Waldrabe, Waldrapp, Steinrapp, Steinrabe, Nachtrabe, Thurm-wiedehopf, Klausrapp, Eremit, Eremitrabe, Bergeremit, Schweitzereremit, Scheller.*
- Halle*, Vögel, p. 516. n. 598. *der Thurm-wiedehopf, Schweitzereremit.*
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 364. n. 290. *der Waldrabe.*
- Neuer Schauplatz der Natur, VII. p. 3. n. 12. *Einsiedler.*
- Onomat. histor. nat. III. p. 283. *der Alpenrapp, der Einsiedler.*
- Klein*, av. p. III. n. 16. *Upupa montana. Eremita montanus helveticus.*
- Klein*, Vorbereitung, p. 205. n. 16. *Waldrappe, Steinrappe.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 116. n. 3. *Waldhoff, Schweitzereinsiedler, Bergeinsiedler.*
- Gesner*, Vögelb. p. 424. *Waldrapp; m. 1 Fig.*
- Briffon*, ornith. I. p. 155. n. 2. *Coracias hupé.*
- Büffon*, Vögel, VII. p. 22 *der Waldrabe oder Scheller; m. 1 Fig.*
- Latham*, Vögel, I. p. 334. n. 41. *der Eremit, Waldrabe, Alprabe.*
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 166. n. 42. *Corvus (Eremita) virescens, capite flavescente, occipite subcristato, rostro pedibusque rubris.*
- Bechstein*, Musterung schäd. Thiere, p. 105. n. 10. *der Alpenrabe.*
- Meidinger*, Vorles. I. p. 116. n. 10. *der Eremit.*
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 245. *Corvus alpinus; ein Alprappe, Waldrappe, Nachtrabe, Steinrabe.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 199. Eremita.
Jonston, av. p. 131. Corvus Sylvaticus.

A. *Veränderungen gegen die XIIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 26 Gattungen vermehrt. Bey der 2ten Gattung sind vier, bey der 3ten drey, bey der 6ten acht, bey der 7ten zwey, bey der 13ten zwey, und bey der 15ten gleichfalls zwey Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Der weißhülfige Rabe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 75. 2. South-Sea Raven.

Latham, Vögel, I. p. 304. ad n. 2.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 151. n. 3. Corvus (Albicollis) nigricans, rostro carinato valido, tectricibus alarum fuscescentibus, lunula cervicis lata alba.

Vielleicht eine Spielart von *Corvus Australis* p. 365. n. 21?

2. CORVUS LEUCOPYX. *Die weißbäuchige Elfter.*

White, Reis. nach Neufüdwallis; in dem Magazin merkwl. Reisebeschreib. V. p. 128.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der weißhörige Heher.*

Latham, Syn. Suppl. p. 83. White-eared Jay.

Latham, Vögel, I. p. 335. n. 42.

Latham, Syft. ornithol. I. p. 160. n. 25. Corvus (Auritus) subcristatus fusco-cinereus, capistro gulaque nigris, macula frontis auriumque alba, remigibus nigris griseo maculatis.

Sonner.

Sonner. voy. Ind. II. p. 188. Tab. 107. Petit Géay de la Chine.

2. *Die purpurköpfige Krähe; (in China.)*

Latham, Syn. Supplement. p. 83. Purple-headed Crow.

Latham, Vögel, I. p. 336. n. 43.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 161. n. 26. Corvus (Purpurascens) rufescens, subtus luteus, capite purpurascente, remigibus caudaque longiore nigris.

3. *Die Macao-Krähe; (in China.)*

Latham, Syn. Suppl. p. 84. Macao Crow.

Latham, Vögel, I. p. 336. n. 44.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 161. n. 27. Corvus (Sinensis) cinereo-griseus, dorso, tectricibus alarum crissoque rufis, sincipite nigro, remigibus caudaque nigris, secundariis albo bima- culatis.

Sonner. voy. Ind. II. p. 187. Pie de Macao.

4. *Die braunrothe Krähe; (in China.)*

Latham, Syn. Suppl. p. 84. Rufous Crow.

Latham, Vögel, I. p. 336. n. 45.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 161. n. 28. Corvus (Rufus) rufus, subtus rufo-albus, capite collo- que fuscis, tectricibus alarum maioribus remi- gibusque secundariis griseis, tectricibus latera- libus fusco griseoque dimidiatis apice albis.

Sonner. voy. Ind. II. p. 186. Tab. 106. Pie rousse de la Chine.

51. GESCHLECHT. CORACIAS. *Der Birkheher.* (*Blaukrähe, Racke.*)

Müller, Naturfyft. II. p. 182. Gen. LI.

Leske, Naturgesch. p. 245. Gen. XX.

Borowsky, Thierreich, II. p. 110. Gen. X.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 175. Gen. XX.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 367. Gen. XVI.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 472. Gen. VI.

Onomat. hist. nat. III. p. 286.

Briffon, ornithol. I. p. 172. Gen. XVIII. *Galgulus.*

Büffon, Vögel, VII. p. 275 ff.

Batsch, Thiere, I. p. 316. Gen. LXVIII.

Latham, allgem. Uebers. der Vögel, I. p. 337. Gen. XIII.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 168. Gen. XIV.

Hermann, tab. affin. anim. p. 197.

Donndorff, Handb. d. Thierng. p. 231. Gen. XII.

I. GARRULA. *Die Mandelkrähe.* (5)

Müller, Naturfyft. II. p. 182. n. 1. *die Mandelkrähe.* Tab. 6. fig. 5.

Leske,

- (5) Länge 13 Zoll. Flügelweite 2 Fufs 3 Zoll. Zieht aus Deutschland im September weg, und kehrt erst im May zurück. Ueberwintert vermuthlich in der Barbarey und am Senegal, weil man sie im Herbst schaarenweise daselbst bemerkt hat. Nistet auf Bäumen, auch in Höhlungen alter Bäume. Legt 4 bis 7 Eyer, welche von beyden Geschlechtern in 20 Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen lassen sich durchaus nicht zähmen, und sterben schon in den ersten 14 Tagen, ob gleich der Vogel im Stande der Freyheit ein zähes Leben hat. Seine vollkommene Schönheit erhält er erst im dritten Jahre. Merkwürdig ist, dafs die jungen Weibchen mehr Eyer legen als die ältern.

- Leske*, Naturgesch. p. 245. n. 1. *die Mandelkrähe*.
Borowsky, Thierreich, II. p. III. n. 1. *die Mandelkrähe*. Tab. 10.
Blumenach, Handb. d. Naturgesch. p. 175. Coracias (*Garrula*) caerulea dorso rubro, remigibus nigris; *die Mandelkrähe*, *Racke*, *Blauracke*.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 367. n. 1. *der gemeine Birkheher*.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 472. n. 1. *die Mandelkrähe*. p. 477. *der blaue Rabe*, *Heideneiſter*, *Kugelſter*, *Kriechelſter*, *blaue Krähe*, *Garbenkrähe*, *wilde Goldkrähe*, *Straßburger Krähe*, *Grünkrähe*, *blaue Holzkrähe*, *Galgenregel*, *Helkregel*, *Gelsregel*, *Halsregel*, *Racker*, *Racher*, *Rake*, *Raake*, *Rackervogel*, *Plauderrackervogel*, *deutsche Papagey*, *Birkheher*, *Meerheher*, *Roller*, *Blaurack*, *Blabrach*, *Blaurock*, *leberfarbiger Birkheher*, *europäischer Racker*.
Funke, Naturgesch. I. p. 299. *der Birkheher*.
Ebert, Naturl. II. p. 18. *der Birkheher*.
Halle, Vögel, p. 264. n. 212. *der leberfarbige Birkheher*.
Meyer, Thiere, II. p. 14. Tab. 47.
Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 365. n. 291. *die Mandelkrähe*.
Pennant, arch. Zoolog. II. p. 241. G. *die Mandelkrähe*.
Beckmann, Naturhist. p. 41. *die blaue Krähe*.
 Neuer Schaupl. der Natur, I. p. 758. *Birkheher*.
 Neuer Schaupl. d. Natur, V. p. 350. *Mandelkrähe*.
 Onomat. hist. nat. III. p. 292. *die Mandelkrähe*.
 Handbuch der Naturgesch. II. p. 169. *der Birkheher*.

- Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 121. *die Mandelkrähe.*
- Klein*, av. p. 62. n. 7. *Pica feu garrulus argentoratenfis.*
- Klein*, Vorbereit. p. 117. n. 7. *Mandelkrähe, Raucher, Galgenrekel, Galskregl, wilde Goldkrähe.*
- Klein*, verbesserte Vögelhist. p. 61. n. 6. *Mandelkrähe.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 62. n. 9. *vielfarbige Aelster.*
- Klein*, stemmat. av. p. 10. Tab. 12. fig. 3. a. b.
- Klein*, Vögeleyer, p. 21. Tab. 8. fig. 1.
- Gesner*, Vögelb. p. 348. *wilde Holzkrähe*; mit einer schl. Fig.
- Briffon*, ornithol. I. p. 173. n. 1. *Rollier.*
- Biffon*, Vögel. VII. p. 275. *der europäische Raucher*; m. 1 Fig.
- Seligmann*, Vögel, V. Tab. 4. *die Mandelkrähe.*
- Latham*, Vögel, I. p. 337. n. 1. *die Mandelkrähe.*
- Latham*, Syn. Supplem. p. 85. *Roller.*
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 168. n. 1. *Coracias (Garrula) caerulea, dorso rubro, remigibus nigris.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 324. *die Mandelkrähe.*
- Befke*, Vögel Kurl. p. 33. n. 49. *die Mandelkrähe, kurländische Papagey.*
- Bock*, Preussen, IV. p. 300. n. 51. *Mandelkrähe.*
- Fischer*, Livl. p. 72. n. 61. *Mandelkrähe*
- Lepechin*, Tagebuch der russ. Reis. I. p. 262. *blaue Krähen.*
- Adanson*, Reise nach Senegal, p. 24. *die blaue Raake.* p. 86. *die blaue Krähe.*
- Pontoppidan*, Naturgesch. von Dännem. p. 167. n. 1. *Ellekrage.*

- Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 38. n. 44.
die Mandelkrähe.
- Shaw, Reise, p. 162. Shagarag?
- Linné, auserles. Abb. II. p. 289. n. 64. die Mandelkrähe.
- Zorn, Petinotheol. II. p. 141. 267. der Birkheher.
- Döbel, Jägerprakt. I. p. 53. Mandelkrähe, Blabrack.
- Naumann, Vogelsteller, p. 163. die blauen oder Mandelkrähen.
- Naturforsch. IX. p. 45. n. 50. Mandelkrähe.
- Schriften der berlin. Gefellsch. naturf. Fr. VII. p. 451. n. 16. die Mandelkrähe.
- Hellenius: neue schwed. Abhandl. VIII. 2. p. 15. Mandelkrähe.
- Lange, Briefe über die Naturgesch. p. 37. Blaukrähe.
- Bechstein, Musterung schädli. Thiere, p. 106. n. 11. die Mandelkrähe.
- Wirsing, Vögel, Tab. 5. Nußsheher.
- Lichtenberg u. Voigt, Magaz. f. d. Neueste u. f. w. VI. 1. p. 145. Mandelkrähen.
- Goeze, nützl. All. II. p. 363. n. 4. Mandelkrähe.
- Anweisung Vögel zu fangen u. f. w. p. 348. Blaukrähe.
- Meidinger, Vorles. I. p. 117. die Mandelkrähe.
- Jablonsky, allgem. Lex. p. 635. Mandel-Krähe, Blarack, Grün-Krähe.
- Krünitz, Encyklop. XLVI. p. 516. die Blaukrähe.
- Neue gefellsch. Erzähl. I. p. 168. Mandelkrähe.
- Neu-Hamburg. Magazin, St. 116. p. 105.
- Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 52. Garrulus argent.
- Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 19. n. 4. Cornix caerulea.

Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 107. n. 1. Coracias (Garrulus) caerulea, dorso rubro, remigibus nigris.

Linné, fn. Suec. I. 73. Corvus dorso sanguineo, remigibus nigris, rectricibus viridibus.

Müller, zool. dan. prodr. p. 12. n. 94. Coracias (Garrula) caerulea, dorso rubro, remigibus nigris.

Kramer, Austr. p. 334. n. 6. Corvus caeruleo viridis, dorso ex rufo lutescente; *Mandlkran*, *Meerheher*.

Brünnich, ornithol. bor. p. 10. n. 35. Coracias Garrulus.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 243. Cornix caerulea; *ein Mandel-Krahe*, *Rache*, *Heiden-Elster*, *Kugel-Elster*, *Holz-Krae*, *Gals-Kregel*.

Moehring, av. gen. p. 30. n. 5. Coracias.

Mus. Worm. p. 296. Cornix caerulea.

Schaefer, elem. ornith. Tab. 35.

Gerin. ornith. II. p. 45 Tab. 164.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 197. Coracias Garrula.

Jonston, av. p. 41. Cornix caerulea.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 231. n. 1. *die Mandelkrähe*.

2. INDICA. *Der indianische Birkheher.*

Müller, Natursystem, II. p. 183. n. 2. *der ostindische Häher*.

Latham, Vögel, I. p. 341. n. 7. *die indianische Rache*.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 170. n. 7. Coracias (Indica) caerulea, antice testacea, pileo viridi.

3. CAFFRA. *Der äthiopische Birkheher.*

Müller, Naturfyft. II. p. 183. n. 3. *die äthiopische Dohle.*

Büffon, Vögel, VII. p. 310. *der äthiopische Raker.*

Latham, Vögel, I. p. 342. n. 8. *die Kap-Racke.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 170. n. 8. Coracias (Caffra) caerulea, remigibus margine exterioribus luteis.

7. ABYSSINICA. *Der abyssinische Birkheher.*

Büffon, Vögel, VII. p. 292. *der abyssinische Raker*; mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. p. 339. n. 2. *die abyssinische Racke.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 169. n. 5. Coracias (Abyssinica) rufo-fusca, capite, collo, corpore subtus rectricibusque alarum viridibus, humeris, remigibus primoribus uropygioque cyaneis, rectricibus extimis longissimis.

Bruce, Reif. n. d. Quellen des Nils, V. p. 185. Tab. 37. *Sheregrig?*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 197. Coracias abyssinica.

8. SENEGALENSIS. *Der senegalische Birkheher.* (6)

Büffon, Vögel, VII. p. 294. *der senegalische Raker*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 339. n. 3. *die senegalische Racke.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 169. n. 4. Coracias (Senegala) rubro-fusca, subtus, capite, cauda alarumque parte superiore caerulescente-thalassinis, facie alba, humeris remigibusque caeruleis, rectricibus extimis longissimis.

Shaw,

(6) Nach *Büffon* eine Spielart von der vorhergehenden.

Shaw, Reife, p. 162 *Shagarag?*

Büffon, Vögel, VII. p. 286. *der Shagarag?*

9. MADAGASCARIENSIS. *Der madagaskarische Birkheher.*

Büffon, Vögel, VII. p. 306. *der madagaskarische Raker*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 342. n. 11. *die madagaskarische Racke.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 170. n. 10. *Coracias* (Madagascariensis) purpureo-fusca, uropygio, crisso rectricibusque caeruleo-viridibus, remigibus primoribus nigris, extus caeruleis, rectricibus ad apicem caeruleo-nigricantibus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 197. *Coracias madagascariensis.*

4. ORIENTALIS. *Der orientalische Birkheher.*

Müller, Naturfystem, II. p. 183. n. 4. *Morgenländer.*

Briffon, ornitholog. I. p. 175. n. 4. *Rollier des Indes.*

Büffon, Vögel, VII. p. 304. *der indianische Raker*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 341. n. 6. *die orientalische Racke.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 170. n. 6. *Coracias* (Orientalis) viridis, iugulo caeruleo striato, rectricibus apice nigris.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 197. *Coracias orientalis.*

5. BENGALENSIS. *Der Cuit.*

Müller, Naturf. II. p. 183. n. 5. *bengalischer Rabe.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 112. n. 2. *der bengalische Rabe.*

Briffon,

Briffon, ornitholog. I. p. 174. n. 2. Rollier de Mindanao.

Büffon, Vögel, VII. p. 297. 302. *der mindanoische Raker*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 340. n. 5. *die bengalische Rake*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 168. n. 2. Coracias (Bengalensis) subfulva, subtus caerulescens, collo subtus violaceo pallido striato, cauda integra.

β. *Der Birkheher aus Goa.* *

Büffon, Vögel, VI. p. 301. *ein neuer Raker von Goa*.

Latham, Vögel, I. p. 341. *eine Spielart aus Goa*.

6. CAUDATA. *Der angolische Birkheher.* (7)

Müller, Natursystem, II. p. 184. n. 6. *Langschwanz*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 112. n. 3. *der angolische Rabe*.

Briffon, ornitholog. I. p. 174. n. 3. Rollier d'Angola.

Büffon, Vögel, VII. p. 297. *der angolische Raker*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. p. 339. n. 4. *die angolische Rake*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 169. n. 3. Coracias (Caudata) subfulva, subtus caerulescens, collo violaceo, pallido striato, rectricibus extimis longissimis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 197. Coracias angolensis.

(7) Nach *Büffon* eine Spielart vom vorhergehenden.

10. CAERULEA. *Der blaugrüne Birkheher.*
Latham, Vögel, I. p. 342. n. 9. die blaue Racke.
11. CYANEA. *Der ultramarinblaue Birkheher.*
Latham, Vögel, I. p. 342. n. 10. die Ultramarin-Racke.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 170. n. 9. Coracias (Vivida) caerulea tota vividissima.
12. CAYENNENSIS. *Der cayennische Birkheher.*
*Büffon, Vögel, VII. p. 273. der cayennische Rol-
 ler; mit 1 Fig.*
*Latham, Vögel, I. p. 344. n. 15. die cayennische
 Racke.*
*Latham, Syst. ornithol. I. p. 170. n. 16. Cora-
 cias (Cayana) fusco-viridis, superciliis albis,
 lateribus gulae vitta nigra, collo subtus pecto-
 reque cinerascens, cauda cuneiformi.*
13. MEXICANA. *Der mexicanische Birkheher.*
*Halle, Vögel, p. 263. n. 209. der graurothe me-
 xikanische Heher.*
Klein, av. p. 62. n. 5. Pica, merula mexicana
*Klein, Vorber. p. 117. n. 5. mexicanischer Nuß-
 heher, Nußkrähe.*
*Klein, verbesserte Vögelhist. p. 61. n. 5. mexica-
 nischer Nußheher.*
*Briffon, ornitholog. I. p. 177. n. 8. Rollier du
 Mexique.*
*Büffon, Vögel, VII. p. 308. der mexicanische
 Raker.*
*Latham, Vögel, I. p. 343. n. 12. die mexikani-
 sche Racke.*
*Latham, Syst. ornithol. I. p. 171. n. 11. Cora-
 cias (Mexicana) griseo-rufescens, subtus alis-
 que pallide griseis, flammeo colore variegatis.*

14. STRIATA. *Der blaugestreifte Birkheher.*

Latham, Vögel, I. p. 343. n. 13. *die blaugestreifte Rake.* Tab. 19.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 171. n. 13. Coracias (Striata) caeruleo-atra, striis virescente-caeruleis, rostro, cauda pedibusque nigris.

15. VARIA. *Der bunte Birkheher.*

Latham, Vögel, I. p. 344. n. 16. *die bunte Rake.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 173. n. 22. Coracias (Varia) nigra, alis albo-variegatis, dorso postico, uropygio corporeque subtus albis, rectricibus lateralibus albo terminatis.

16. SINENSIS. *Der chinesische Birkheher.*

Briffon, ornitholog. I. p. 175. n. 5. *Rollier de la Chine.*

Büffon, Vögel, VII. p. 170. *der schinesische Roller; mit 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. p. 343. n. 14. *die chinesische Rake.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 171. n. 14. Coracias (Sinensis) viridis, subtus viridi-flavicans, fascia per oculos alisque nigricantibus, remigibus secundariis caudaque cuneiformi, apicibus albis.

Murr, Naturgesch. von Jap. u. Chin. im Naturf. VII. p. 39. *Galgulus Sinensis Briffonii.*

17. DOCILIS. *Der gelehrige Birkheher.*

Büffon, Vögel, VII. p. 311. *der gelehrige Raker.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 172. n. 17. Coracias (Docilis) alba cum rubicundo intersperso, subtus badia, pedibus luteis, rectricibus nigris apice albo.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 11 Gattungen vermehrt, und also n. 7 bis 17 neu hinzugekommen.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der blaue Birkheher mit schwarzen, blau gefleckten Flügeln; (in Indien.)*

Latham, Syn. Suppl. p. 87. n. 21. Fairy Roller.

Latham, Vögel, I. p. 346. n. 21. *die Feen-? Racke.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 171. n. 12. *Coracias* (Puella) caerulea, collo antice et lateribus, pectore, abdomine, tectricibus alarum maioribus remigibusque nigris.

2. *Der graugeschwänzte Birkheher; (in Indien.)*

Latham, Syn. Suppl. p. 86. Grey-tailed Roller.

Latham, Vögel, I. p. 346. n. 20.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 171. n. 15. *Coracias* (Vagabunda) capite colloque nigris, corpore supra ferrugineo-fusco, subtus cinereo, alis medio albis, cauda longissima cuneiformi, grisea, apice nigra.

3. *Der schwarze Birkheher.*

Latham, Syn. Suppl. p. 85. Black Roller.

Latham, Vögel, I. p. 245. n. 17.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 172. n. 18. *Coracias* (Nigra) corpore toto artubusque nigris, cauda longiore.

4. *Der afrikanische Birkheher.*

Latham, Syn. Suppl. p. 86. n. 18. African Roller.

Latham, Vögel, I. p. 345. n. 18.

Latham,

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 172. n. 19. *Coracias* (*Afra*) testaceo-rubra, subtus purpureo-rufescens, crisso caeruleo-viridi, remigibus rectricibusque caeruleis, apice nigricantibus.

5. *Der schwarzköpfige Birkheher*; (in China.)

Latham, Syn. Suppl. p. 86. n. 19. Black-headed Roller.

Latham, Vögel, I. p. 346. n. 19.

Latham, Syft. ornithol. I. p. 172. n. 20. *Coracias* (*Melanocephala*) caeruleo-purpurea, capite colloque nigris, corpore subtus albo, remigibus fuscis, cauda cuneiformi, apice alba.

6. *Der Birkheher von Norfolk.*

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 173. n. 21. *Coracias* (*Strepera*) nigra, macula alarum, crisso caudaque basi et apice nigris.

52. GESCHLECHT. ORIOIUS. *Der Pirol.*
(*Gelbvogel, Troupial.*)

Müller, Natursystem, II. p. 185. Gen. LII.

Leske, Naturgesch. p. 245. Gen. XXI.

Borowsky, Thierreich, II. p. 115. Gen. XI.

Blumenbach; Handbuch der Naturgesch. p. 178.
Gen. XXVI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 368. Gen. XVII.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 477.
Gen. VII.

Pennant, arct. Zool. II. p. 243.

Onomat. hist. nat. IV. p. 509. V. p. 717. VII.
p. 863.

Briffon, ornithol. I. p. 178. Gen. XIX. *Icterus*.

Buffon, Vögel, VIII. p. 54 ff.

Batsch, Thiers, I. p. 316. Gen. LXVII.

Latham, Vögel, I. 2. p. 347. Gen. XIV.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 173. Gen. XV.

Hermann, tab. affinit. anim. p. 202.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 232.
Gen. XIII.

1. GALBULA. *Der Pfingstvogel.* (8)

Müller, Naturfyft. II. p. 185. n. 1. *die Golddroffel.* Tab. 6. fig. 6.

Leske, Naturg. p. 245. n. 1. *der gemeine Pirol.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 116. n. 2. *die Golddroffel.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 178. n. 1.
Oriolus (Galbula) luteus, pedibus nigris, re-
ctricibus exterioribus postice flavis; *die Gold-*
droffel.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 368. n. 1. *der gemeine Pirol.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 478. *der*
gemeine Pirol. p. 483. *Kirschvogel, Kirsch-*
dieb, Kirschhold, Kersjenriefe, Weidwall, Wie-
dewall, Wittwald, Wittwalch, Viduel, Witt-
well,

(8) Ein muthiger, schwerfliegender, zänkischer und scheuer Vogel. Verläßt Deutschland schon im August, und kömmt erst im May wieder, wenn die Bäume schon ausgeschlagen sind. Nach seiner Ankunft weiß man zuverlässig, daß keine Nachtfrost mehr kommen. Verbirgt sich wenn er singt, und hält oft den ganzen Tag an, besonders wenn es schwüle und gewitterhaft ist. Ist schwer zu zähmen und stirbt bald in der Gefangenschaft. Die Insekten, womit er, in Ermanglung andrer Nahrung, seine Jungen füttert, sind vorzüglich Nachtfalter und ihre Raupen. Auch hat man seinen Magen oft voll eyrunder großer brauner Insekteneyer gefunden. *Sparrmanns* (schwed. Abh a. a. O.) mitgetheilte Nachricht, daß dieser Vogel in der Blandrie lebe, verdiente eine nähere Untersuchung.

well, Pyrol, Byrolt, gemeine Pyrole, Pirol, Bierhold, Bierhof, Bruder Berolft, Tyrolt, Bierole, Gerolft, Bierfel, Gelbvogel, Gelbling, Bülau, Bülow, der Vogel Büloh, Schütz von Milo, Golddrossel, Goldamsel, Goldmerle, Gutmerle, Olimerle, Sommerdrossel, Regenkatze, Kirschdrossel, Wehrauchsvogel, Gugelfahraus, Pfingstvogel, Wehrauch.

Funks, Naturgesch. I. p. 304. der Kirschvogel.

Halle, Vögel, p. 288. n. 239. die gelbe Kirschdrossel.

Meyer, Thiere, II. p. 2. Tab. 7. Kirschvogel.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 370. n. 298. der Kirschvogel.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 319. F. die Golddrossel.

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 507. Kirschvogel.

Onomat. hist. nat. IV. p. 289. der Galbulavogel, Kirschendieb, gelbe Vogel von Bengalen.

Handbuch der Naturgesch. II. p. 205. die Golddrossel, der Kirschvogel.

Handbuch der deutschen Thiergeschichte, p. 121. Goldamsel.

Klein, av. p. 66. n. 7. Turdus aureus, Merula aurea. Oriolus.

Klein, Vorbereitung, p. 126. n. 7. Golddrossel, Witthewale, Beerhold, Goldmeerle.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 66. n. 7. Golddrossel.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 67. n. II. bengalische Golddrossel.

Klein, Stamm. av. p. II. Tab. 14. fig. 8. a. b. c.

Klein, Vögeleyer, p. 23. Tab. 9. fig. 2.

Gesner, Vögelb. p. 144. Chlorion.

- Gesner*, Vögelb. p. 483. *Wittewal*; m. 1 zieml. guten Figur.
- Briffon*, ornithol. I. p. 247. n. 58. Lorient.
- Büffon*, Vögel, VIII. p. 170. *der Pirol*; mit Abbild. des M. des W. und des Nests.
- Seligmann*, Vögel, VI. Tab. 80. *Golddroffel*.
- Batsch*, Thiere, I. p. 322. *der Pfingstvogel*.
- Latham*, Vögel, I. 2. p. 369. n. 43. *der gemeine Pyrol*.
- Latham*, Syn. Supplem. p. 89. Golden Oriole.
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 186. n. 45. Oriolus (*Galbula*) luteus, loris artubusque nigris, re-ctricibus exterioribus postice flavis.
- Beseke*, Vögel Kurlands, p. 33. n. 50. *die Golddroffel*.
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 302. n. 52. *Golddroffel*.
- Cetti*, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 78. *die Golddroffel*.
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 72. n. 62. *Pfingstvogel, Wittewahl*.
- Lepetchin*, Tagebuch d. russ. Reis. I. p. 197. *der Kirschvogel*.
- Georgi*, Reis. d. Rusl. I. p. 165. Oekonom. Zool. p. 206. *der Pfingstvogel*.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 39. n. 44. *die Golddroffel, Bierhold*.
- Lange*, Briefe über d. Naturgesch. p. 39. *Pfingstvogel*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 144. et 320. *die Goldamsel*.
- Döbel*, Jägerpraktik, I. p. 55. *Weyräuch-, Kirsch-, oder Pfingstvogel*.
- Naumann*, Vogelsteller, p. 144. *Pfingstvogel*.
- Naturforsch. IX. p. 46. n. 51. *Golddroffel*.

Anweisung Vögel zu fangen, u. f. w. p. 342.

Kirschvogel.

Beckmann, physikal. ökonom. Bibl. V. p. 610.
der Schulz von Bülow.

Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde,
VII. p. 451. n. 17. *Golddroffel.*

Bechstein, Musterung schädli. Th. p. 116. n. 22.
der Pirof.

Linné: schwed. Abh. XII. p. 130. *ein Vogel.*

Sparrmann: neue schwed. Abhandl. VII. p. 68.
Golddroffel.

Lichtenberg u. *Voigt*, Magaz. f. d. Neueste u. f. w.
IV. 4. p. 105. *Golddroffel.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 533. *Kirsch-Vögel,*
Gugel- oder Kugel-fhaus.

Meidinger, Vorles. I. p. 117. *Golddroffel.*

Stutg. sek. phys. oecon. I. p. 324. *Pyroht oder*
Goldamsel.

Comment. Lips. III. p. 204.

Zückert, Speisen a. d. Thierreich, p. 98.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 29. n. 1. Oriolus
(flavus, alis extremaque cauda nigris, pupillis
rubris) Gesn.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 107. n. 3. Coracias
(Oriolus) flava, alis caudaque nigris.

Kramer, Austr. p. 360. n. 1. Turdus flavus, alis
extremaque cauda nigris; *Gugelfahraus.*

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 312. Oriolus; *ein*
Bierholt, Beerold, Kirschholt.

Moehring, av. gen. p. 33. n. 10. Turdus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 203. Oriolus
Galbula.

Jonston, av. p. 112. Picus nidum suspendens.

Philos. Transact. xxiii. n. 285. p. 1397. 41.

Hist. de la Prov. I. p. 491. l' Auriol.

Plin. hist. nat. Lib. X. c. 25. 33. Galgulus. c. 29. Chlorion. L. 30. c. 11. Icterus avis. L. 37. c. 10. ales luridus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 232. n. 1. die Golddroffel.

β. *Der bengalische Pirol.* (9)

Klein, verb. Vögelhist. p. 64. n. 5. gelber Staar.

Briffon, ornitholog. I. p. 180. n. 6. Troupiale fauve de Madrast.

Büffon, Vögel, VIII. p. 187. 192. Edwards gelber indianischer Staar.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 81. der gelbe indische Staar.

Latham, Syn. II. p. 451. n. 43 B.

Latham, Vögel, I. 2 p. 372. n. 43. Var. B.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 187. γ. O. flavus, maculis nigricantibus variis, capite, collo, remigibus rectricibusque nigricantibus.

γ. *Der indische Pirol.* (10)

Briffon, ornitholog. I. p. 248. n. 60. Lorient des Indes.

Büffon, Vögel, VIII. p. 189. der indische Pirol.

Latham, Vögel, I. 2. p. 373. n. 43. Var. D.

Latham, Syn. II. p. 452. n. 43. D.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 188. ε. Oriol. luteus, fascia capitis transversali caerulea, rectricibus luteis fascia caerulea.

2. CHI-

(9) Nach *Briffon* eine eigne Gattung eines ganz andern Geschlechts. Nach *Büffon* das Weibchen von *Oriolus Melanocephalus*; und diesen *Oriolus Melanocephalus* nimmt *Latham* wieder als Spielart von *Oriolus Galbula* an. Welche Verwechslung!

(10) Nach *Briffon* eine eigene Gattung.

2. CHINENSIS. Der Coulayan. (1) (Cochinchinensis?)

Müller, Natursyft. II. p. 186. n. 2. die chinefifche Drossel.

Onomat. hift. nat. V. p. 718. die chinefifche Drossel.

Briffon, ornitholog. I. p. 248. n. 59. Lorient de la Cochinchine.

Büffon, Vögel, VIII. p. 184. der Coulayan; mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. 2. p. 373. n. 43. Var. C.

Latham, Syn. II. p. 452. n. 43. C.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 188. ♂. O. luteus, artubus nigris apice luteis, fascia capitis nigra.

3. MELANOCEPHALUS. Der ſchwarzköpfige Pirol. (2)

Müller, Natursyft. II. p. 187. n. 3. Braunkopf.

Klein, verbeff. Vögelhift. p. 67. n. 10. ſchwarzköpfige Golddrossel.

Briffon, ornitholog. I. p. 249. n. 61. Lorient de Bengale.

Büffon, Vögel, VIII. p. 186. der chinefifche Pirol; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 372. n. 43. A.

Latham, Syn. II. p. 451. n. 23. A.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 287. ♂. O. luteus, capite apicibusque rectricum intermediarum nigris.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 49. ſchwarzköpfiger Ammer.

Scopoli, ann. hiftor. nat. I. p. 130. n. 190. Sturnus luteolus.

(1) Nach Latham eine Spielart von Oriolus Galbula.

(2) Nach Latham eine Spielart von Oriolus Galbula.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 155. n. 190.
der gelbe Staar.

Linne', Syst. Natur. Edit. X. I. p. 167. n. 2. Stur-
nus (Luteus) capite fusco, pectore maculato,
alis fusco-luteis.

Gerin, ornith. II. p. 41. Tab. 158. Pica america-
na luteo-nigra varia.

31. RADIATUS. *Der gestreifte Pirol.*

Briffon, ornitholog. I. p. 249. n. 62. Lorient à tête
rayée.

Biffon, Vögel, VIII. p. 194. der gestreifte Pirol.

Latham, Vögel, I. 2. p. 373. n. 44. der gestreif-
te Pirol.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 188. n. 46. Oriolus
(Radiatus) luteo-rubescens, capite colloque
subtus nigricantibus albo-punctatis, rectricibus
alarum remigibusque nigris, margine albis.

Jonston, av. p. 107. Merula bicolor.

32. PICUS. *Der Spechtpirol.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 374. n. 45. der Specht-
pirol.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 188. n. 47. Oriolus
(Picus) rufus, capite, collo pectoreque albo va-
riegatis, cauda elongata, rectricibus apice
subulatis.

4. ICTERUS. *Der Troupial.*

Müller, Naturyst. II. p. 187. n. 4. der Schwarz-
kopf.

Onomat. histor. nat. III. p. 294. der schwarzköpfi-
ge Ammer.

Hall, Vögel, p. 296. n. 254. die gelbbäuchige
Drossel?

Klein, av. p. 63. n. 10. Pica ex luteo et nigro varia.

Klein,

- Klein*, Vorber. p. 119. n. 10. *tarnaischer Heher*.
- Klein*, av. p. 69. n. 20. *Turdus oculis caeruleis*.
- Klein*, Vorber. p. 130. n. 20. *blauäugige Drossel*.
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 68. n. 21. *blauäugige Drossel*.
- Klein*, av. p. 70. n. 33. *Turdus luteo-niger*, gutture piloso, capite, gula, rostro, dorso caudaque nigris, cervicè, uropygio et toto ventre luteis, alijs nigris, tectricibus albo fimbriatis, rostro unciali.
- Klein*, Vorbereit. p. 133. n. 33. *die gelbschwarze Drossel*.
- Briffon*, ornithol. I. p. 178. n. 1. *Icterus*; *Troupiale*.
- Buffon*, Vögel, VIII. p. 67. *der Troupial*; m. I F.
- Batsch*, Thiere, I. p. 323. *der Trupial*.
- Seligmann*, Vögel, IV. Tab. 106. *der schwarze und gelbe Heher*.
- Latham*, Vögel, I. 2. p. 351. n. 6. *der gemeine Trupial*.
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 176. n. 7. *Oriolus* (*Icterus*) *fulvus*, capite, iugulo, dorso remigibusque nigris, macula alarum alba.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 36. n. 42. *Coracias Xanthornus*.
- Linné*, Syst. Natur. Edit. VI. p. 19. n. 9. *Cissa nigra cirrhata*, cauda lutea.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 106. n. 6. *Coracias* (*Xanthornus*) *flava*, capite remigibusque primoribus nigris.
- Jonston*, av. p. 189. *Guira-Tangeima*.
- Hermann*, tab. affinit. animal. p. 204. *Troupialis*.
- Donndorff*, Handb. d. Thiergesch. p. 233. n. 2. *der Troupial*.

23. NOVAE HISPANIAE. *Der Acalchichi.*

Halle, Vögel, p. 276. n. 230. *der schwarzgelbe Staar mit gelbem Schnabel.*

Briffon, ornitholog. I. p. 179. n. 2. *Troupiale du Mexique.*

Büffen, Vögel, VIII. p. 73. *der Acalchichi des Seba.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 352. n. 7. *der mexikanische Piral.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 176. n. 8. Oriolus (Novae Hispaniae) luteus, capite, gula, alis re-
ctricibusque nigris, tectricibus alarum, maioribus
apice luteis.

24. ANNULATUS. *Der Ocotzinitzcan.*

Halle, Vögel, p. 256. n. 201. *die gelbe Krähe mit dem Mohrenkopfe.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 511. *die gelbe Krähe.*

Onomat. histor. nat. V. p. 658. *Ocotzinitzcan.*

Klein, av. p. 59. n. 8. *Cornix flava.*

Klein, Vorbereit. p. 112. n. 8. *gelbe Krähe.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 58. n. 9. *gelbe Krähe.*

Briffon, ornitholog. I. p. 179. n. 3. *Troupiale à queue annelée.*

Büffen, Vögel, VIII. p. 75. *der Troupial mit dem Bogen auf dem Schwanze.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 352. n. 8. *der ring-schwänzige Piral.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 177. n. 9. Oriolus (Annulatus) flavus, capite colloque nigris, remigibus nigris luteo marginatis, cauda nigricante annulata.

25. BRASILIENSIS. *Der brasilianische Pirol.* (3)
 Onomat. histor. nat. IV. p. 511. die gelbbraune
 Grasmücke.
Briffon, ornitholog. I. p. 181. n. 8. Troupial du
 Bresil.
Büffon, Vögel, VIII. p. 77. *Sloanens gelb und
 brauner Fliegenschnäpper.* p. 78. *der kleine
 Vogel des Sloane.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 352. n. 9. *der brasiliani-
 sche Pirol.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 177. n. 10. Oriolus
 (Brasilienſis) flavus, pectore maculato, capi-
 te dorſoque faſciis nigro-maculatis, abdomine
 albo, cauda aliſque fuſcis, apice albis.
26. JAPACANI. *Der Japacani.*
Klein, av. p. 75. n. 12. Luscinia pullo-lutea.
Klein, Vorb. p. 141. n. 13. gelbbraune Grasmücke.
Klein, verbess. Vögelhist. p. 76. n. 13. gelbbraune
 Grasmücke.
Büffon, Vögel, VIII. p. 77. *der Japacani.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 353. n. 10. *der Japa-
 cani.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 177. n. 11. Oriolus
 (Japacani) fusco-nigroque, subtus albo-flavo-
 que varius, lineis transversis nigricantibus, ca-
 pite caudaque nigricantibus.
Marcgr. Brasil. p. 212. Japacani.
Jonston, av. p. 207. Japacani brasiliensis.
27. COSTOTOTL. *Der Xochitototl oder Coztototl.*
Briffon, ornithol. I. p. 182. n. 10. Troupiale de
 la nouvelle Espagne.

Büffon,

(3) Wird von *Briffon*, *Klein* u. a. m. mit der folgenden Gat-
 tung verwechselt, und beyder Synonymen zusammen ge-
 zogen.

Büffon, Vögel, VIII. p. 80. *der Xochitototl und der Coztototl.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 353. n. II. *der neuspanische Trupial.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 177. n. 12. Oriolus (Costototl) niger, pectore, abdomine, crisso caudaque fulvis, nigro variegatis, tectricibus alarum subtus albo nigroque variis.

Jonston, av. p. 174. Xochitototl.

38. **GRISEUS.** *Der graue Pirol.*

Onomat. histor. nat. V. p. 656. *der spechtartige Ococolin.*

Briffon, ornithol. I. p. 182. n. II. Troupiale gris de la nouvelle Espagne.

Büffon, Vögel, VIII. p. 84. *der graue Troupial.*

Raj. Syn. p. 163. Ococolin.

Latham, Vögel, I. 2. p. 354. n. 12. *der graue Trupial.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 178. n. 13. Oriolus (Cinereus) flavo nigroque variis, dorso-femoribus abdomineque cinereis.

5. **PHOENICEUS.** *Der Commendeur.*

Müller, Natursystem, II. p. 187. n. 5. *die Purpurdrossel.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 372. n. 300. *der Commandeur.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 243. n. 56. *der Pirol mit rothen Flügeln, der Commendeur.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 518. *der schwarze Caroliner-Staar, Wasserstaar.*

Klein, av. p. 64. n. 2. Sturnus niger, alis superne rubentibus.

Klein, Vorber. p. 121. n. 2. *Karoliner Staar mit rothen Schultern.*

Klein,

Klein, verbeß. Vögelhist. p. 63. n. 2. *Staar mit rothen Schultern.*

Briffon, ornithol. I. p. 182. n. 12. *Troupiale aux ailes rouges.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 87. *der Commandeur; mit 1 Figur.*

Batsch, Thiere, I. p. 324. *der Kommandeur-troupial.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 26. *der schwarze Staar mit den rothen Flügeln.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 354. n. 13. *der rothflügelige Pirol.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 178. n. 14. *Oriolus (Phoeniceus) niger, alarum tectricibus fulvis.*

Jonston, av. p. 222. *Pterophoenicus Indiarum.*

Du Pratz, hist. de la Louis. II. p. 91.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 233. n. 3. *der Commandeur.*

29. AMERICANUS. *Der americanische Pirol.*

Halle, Vögel, p. 293. n. 245. *die indianische Amsel?*

Onomat. hist. nat. IV. p. 512. die zinnoberbrüstige Drossel.

Klein, av. p. 69. n. 24. *Turdus five merula Indica, pectore cinnabrino.*

Klein, Vorbereit. p. 131. n. 24. *zinnoberbrüstige Drossel.*

Klein, verbeß. Vögelhist. p. 69. n. 25. *zinnoberbrüstige Drossel.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 92. *der schwarze, unten von der Kehle bis zum Bauche rothe Troupial.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 355. n. 14. *der cayennische Trupial.*

Latham,

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 178. n. 15. Oriolus (Americanus) niger, gula, iugulo pectoreque ruberrimis, margine alarum rubro.

β. Oriolus niger, vertice, gula, iugulo, pectore margineque alarum rubris. *

Latham, Syft. ornithol. I. p. 179. β.

Bankroft, Naturgeschichte von Guiana, p. 107. Spottvogel.

Schlötzer, Erdbeschreib. von Amerika, p. 238. der Mockvogel.

30. ORYZIVORUS. *Der Reispivol.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 350. n. 5. der Reißpivol.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 176. n. 5. Oriolus (Oryzivorus) niger, capite, collo pectoreque purpureo - nitentibus.

31. LUDOVICIANUS. *Der louisianische Pivol.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 248. n. 63. der Pivol mit dem weißen Kopfe.

Büffon, Vögel, VIII. p. 147. der louisianische Cassike; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 350. n. 4. der weißköpfige Pivol.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 175. n. 4. Oriolus (Leucocephalus) nigro alboque varius, capite, collo, abdomine uropygioque albis, cauda cuneiformi.

β. Or. fusco-nigricans, collo, pectore alisque nigro - maculatis, capite albo, macula verticis nigra. *

Latham, Vögel, I. 2. p. 350. ad n. 4. *Woupaw-chou chuskithow*.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 175. β.

Latham, Syn. Suppl. p. 88. White-headed Oriole.

32. HUDSONIUS. *Der Pirol von der Hudsons-
bay.* (4)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 248. n. 64. *der Pi-
rol mit dem weißen Kopfe von der Hud-
sonsbay.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 350. ad n. 4.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 175. n. 4. γ . Or.
viridi-nigricans, capite, gula, remige exterie-
re, femoribus strigisque pectoris albis.

33. CRISTATUS. *Der gehäubte Pirol.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 142. *der Cassike mit dem
Zopf von Cayenne*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 349. n. 3. *der gehaubte
Pirol.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 174. n. 3. Oriolus
(Cristatus) ater cristatus, dorso infimo, uro-
pygio crissoque castaneis, rectricibus laterali-
bus flavis.

Pallas, Naturgesch. merkwl. Th. VI. p. 3. *der
allergrößte Gelbvogel, oder so genannte Ci-
tronvogel.*

β . Or. fulvo-olivaceus cristatus, dorso infimo, uro-
pygio, abdomine, crisso rectricibusque 2. inter-
mediis castaneis, lateralibus flavis.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 175. n. 3. β .

Latham, Vögel, I. 2. p. 349. n. 3. Var. A.

γ . *Büffon*, Vögel, VIII. p. 141. *der grüne Cassike
von Cayenne*; m. 1 Fig.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 175. n. 3. γ . Or.
capite cristato, corpore antice viridi, postice
casta-

(4) Flügelweite $13\frac{1}{2}$ Zoll. Gewicht $13\frac{1}{4}$ Unzen. Nach *Pennant* und *Latham* eine Varietät vom vorhergehenden.

castaneo, remigibus rectricibusque 2. intermediis nigris, lateralibus flavis.

Latham, Vögel, I. 2. p. 349. n. 3. Var. B.

6. HAEMORRHOUS. *Der rothschwänzige Pirol.*

Müller, Natursystem, II. p. 187. n. 6. *der Blutschwanz.*

Briffon, ornith. I. p. 183. n. 13. Cassique rouge.

Büffon, Vögel, VIII. p. 138. *der Jupujuba*; mit 1 Figur.

Batsch, Thiere, I. p. 323. *der Jupujuba.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 348. n. 2. *der Pirol mit rothem Steiße.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 174. n. 2. Oriolus (Haemorrhous) niger, uropygio crissoque coccineis.

β. *Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 174. n. 2. β. Or. fusco nigricans, uropygio tectricibusque caudae vinaceis, crisso flavo.

Latham, Vögel, I. 2. p. 348. n. 2. Var. A.

7. PERSICUS. *Der Jupujuba.*

Müller, Natursystem, II. p. 188. n. 7. *die amerikanische Drossel.*

Borowsky, Thierrech, II. p. 117. n. 3. *der Jupujuba.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 179. n. 2. Oriolus (Persicus) niger, dorso postico maculae tectricum alarum, basique rectricum luteis; *der Jupujuba.*

Halle, Vögel, p. 293. n. 246. *die brasilische Drossel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 516. *die brasil. Drossel.*

Briffon, ornitholog. I. p. 183. n. 14. Cassique jaune.

Büffon,

- Büffon*, Vögel, VIII. p. 134. *der brasilianische Japu*; mit 1 Fig.
- Batsch*, Thiere, I. p. 323. *der brasilianische Japu*.
- Latham*, Vögel, I. 2. p. 347. n. 1. *der brasilianische Japu*.
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 173. n. 1. Oriolus (Perficus) niger, dorso postico, macula tectricum alarum basique rectricum luteis.
- Linné*, Syst. Natur. Edit. VI. p. 19. n. 2. Cissa nigra alis caudaque luteis.
- Jonston*, av. p. 189. Jupujuba seu Jabu Brasilien-sibus.
- Hermann*, tab. affin. animal. p. 204. Oriolus perficus.
- Donndorf*, Handb. der Thiergesch. p. 234. n. 4. *der Jupujuba*.
- β. *Büffon*, Vögel, VIII. p. 137. *Japu oder Jupujuba des Marcgrav*.
- Latham*, Vögel, I. 2. p. 347. n. 1. Var. A.
- Latham*, Syn. II. p. 419. A.
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 174. n. 1. β. Oriolus niger, dorso postico, macula tectricum rectricumque extrema supra basi flavis, omnibus subtus luteo nigroque dimidiatis.
- γ. *Büffon*, Vögel, VIII. p. 137. *Edwards schwarze und gelbe Elster*.
- Seligmann*, Vögel, IX. Tab. 9.
- Latham*, Vögel, I. 2. p. 347. n. 1. Var. B.
- Latham*, Syn. II. p. 419. B.
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 174. n. 1. γ. Oriolus purpureo-niger, dorso postico, uropygio, abdomine, crisso maculaque alarum luteis.

8. MEXICANUS. *Der mexicanische Pirol.*

Müller, Naturfyst. II. p. 188. n. 8. *mexicanische Drossel.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 512. *die dunkelbraune Drossel aus Neuspanien.*

Briffon, ornith. I. p. 183. n. 17. *Troupiale brun de la Nouvelle Espagne.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 109. *der Troupial mit der schwarzen Kopfplatte; mit 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 357. n. 17. *der Trupial mit schwarzer Mütze.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 179. n. 18. *Oriolus (Mexicanus) nigricans, subtus capiteque luteus.*

34. RUBER. *Der rothe Pirol.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 196. *der rothe Troupial von Antigua.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 356. n. 16. *der rothe Pirol.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 179. n. 17. *Oriolus (Ruber) cinnabrinus, abdomine, remigibus re-ctricibusque nigro-sericeis.*

Sonnerat, Reis. nach Neuguinea, p. 41. *die rothe Golddrossel.*

9. GUIANENSIS. *Der guianische Pirol.* (5)

Müller, Naturfystem, II. p. 188. n. 9. *gujanische Drossel.*

Briffon, ornitholog. I. p. 185. n. 18. *Troupiale de la Guiane.*

Büffon,

(5) Nach *Büffon* eine Spielart von *Oriolus Americanus*, n. 29. womit ihn auch *Briffon* für einerley hält, wie ich aus den von ihm angeführten Synonymen ersehe. *Pennant* rechnet hieher auch den *Xochitototl* des *Fernandez*.

Büffon, Vögel, VIII. p. 93. Troupiale de la Guiane.

Latham, Vögel, I. 2. p. 356. n. 15. *der gujanische Pirol.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 179. n. 16. Oriolus (Guianensis) nigricans, pennis margine griseis, pectore colloque subtus rubris.

35. FLAVUS. *Der goldgelbe Pirol.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 197. *der gelbe Troupial von Antigua.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 357. n. 8. *der Troupial von Antigua.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 179. n. 19. Oriolus (Flavus) flavus, cervice, dorso, alis caudaque sericeo-nigris.

Sommerat, Reif. n. Neuguin. p. 41. *die gelbe Golddrossel von Antigua.* Tab. 41. fig. a.

10. BALTIMORE. *Der Baltimore.*

Müller, Naturst. II. p. 188 n. 10. *Baltimore.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 115. n. 1. *die Baltimoredrossel.* Tab. 11.

Halle, Vögel, p. 294. n. 248. *die Tulpendrossel.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 245. n. 58 *der Baltimore.* Tab. 12. Männchen, Weibchen und Nest abgebildet.

Onomat. histor. nat. III. p. 287. *der Baltimorevogel.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 514. *die gelbbunte Drossel, Wittewall.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 170. *die gelbbunte Drossel.*

Klein, av. p. 68. n. 15. *Turdus Icterus ex auro nigroque varius.*

- Klein*, Vorbereit. p. 129. n. 15. *gelbbunte Drossel*.
Klein, verbess. Vogelhist. p. 67. n. 8. *gelbbunte Drossel*.
Briffon, ornitholog. I. p. 186. n. 19. *Baltimore*.
Buffon, Vögel, VIII. p. 125. *der Baltimore*; mit 1 Figur.
Seligmann, Vögel, II. Tab. 96. *der Baltimorevogel*.
Batsch, Thiere, I. p. 322. *der Baltimorevogel*.
Latham, Vögel, I. 2. p. 357. n. 19. *der Baltimore*.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 180. n. 20. Oriolus (Baltimore) nigricans, subtus fasciaque alarum fulvus.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 204. Oriolus Baltimore.
Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 192. n. 4. Coracias (Galbula) fulva, capite, dorso remigibusque nigris.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 234. n. 3. *der Baltimore*.

II. SPURIUS. *Der unüchte Baltimore.*

- Müller*, Natursystem, II. p. 189. n. II. *Bastarddrossel*.
Halle, Vögel, p. 294. n. 247. *die schwarzköpfige Drossel*.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 246. n. 59. *der Bastard Baltimore*.
Onomat. hist. nat. IV. p. 515. *der schwarzbärtige Wittewall*.
Klein, av. p. 68. n. 14. Turdus minor, guttore nigro.
Klein, Vorbereit. p. 128. n. 14. *schwarzbärtiger Wittewall*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 67. n. 14. *Schwarzbärtiger Wittewall.*

Briffon, ornithol. F. p. 186. n. 20. *Baltimore Bastard.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 129. *der unächte Baltimore.*

Seligmann, Vögel, II. Tab. 98. *der Baltimore-Bastard.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 358. n. 2. *der Bastard-Baltimore.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 180. n. 21. *Oriolus (Spurius) niger, subtus fulvus, fascia alarum alba.*

36. **TEXTOR.** *Der Mohrenkopf.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 119. *der Mohrenkopf; mit 2 Figg.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 359. n. 21. *der Weberpirol.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 180. n. 22. *Oriolus (Textor) fulvo-luteus; capite fusco-aureo, remigibus rectricibusque nigris, margine fulvis.*

12. **BONANA.** *Der Pisangvogel.* ⁽⁶⁾

Müller, Naturyst. II. p. 189. n. 12. *Pisangdroffel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 117. n. 4. *die Pisangdroffel.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 372. n. 299. *der Xochitotl, Pisangvogel.*

Dd 3

Onomat.

(6) *Latham* hat *Sloane's* Tab. 258. fig. 3. bey dieser und der folgenden Gattung angeführt. Das erste ist wohl ein Schreibfehler. Beym *Klein* a a O. sind die Synonymen dergestalt unter einander geworfen, daß sich nicht mit Gewißheit bestimmen läßt: ob *Oriolus Bonana* oder *Nidipendulus* gemeynt sey.

Onomat. hist. nat. IV. p. 519. *die bunte Drossel.*

Klein, av. p. 68. n. 13. *Turdus minor varius?*

Klein, Vorbereit. p. 128. n. 13. *die kleine bunte Drossel?*

Klein, verbeff. Vögelhist. p. 67. n. 13. *spanischer bunter Wittwal?*

Briffon, ornithol. I. p. 187. n. 22. *Carouge.*

Buffon, Vögel, VIII. p. 148. *der Pisangvogel;*
mit 2 Figg.

Batsch, Thiere, I. p. 323. *der Pisangvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 360. n. 22. *der Pisangpirol.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 181. n. 23. *Oriolus (Bonana) fulvus, capite pectoreque castaneis, dorso, remigibus rectricibusque nigris.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 204. *Oriolus Bonana.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 235. n. 7. *die Pisangdrossel.*

37. **NIDIPENDULUS, Der jamaicaische Pirol.**

Latham, Vögel, I. 2. p. 360. n. 23. *der Hangnestpirol.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 181. n. 24. *Oriolus (Nidipendulus) rubro-fuscus, alis albo variis, pectore, abdomine colloque lateribus testaceo-ferrugineis, medio linea nigra.*

38. **VARIUS. Der bunte Pirol.**

Latham, Vögel, I. 2. p. 361. n. 24. *der bunte Pirol.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 181. n. 25. *Oriolus (Castaneus) niger, dorso infimo, uropygio corporeque subtus castaneo-ferrugineis, remigibus secundariis albo-marginatis.*

13. XANTHORNUS. *Der kleine Gelbsteiß von Cayenne.*

Müller, Naturf. II. p. 189. n. 13. *gelbe Drossel.*

Halle, Vögel, p. 223. n. 162. *der goldfarbene singende Würger.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 513. *der goldfarbene singende Würger.*

Klein, av. p. 54. n. 7. *Lanius Ayoquantotl dictus.*

Klein, Vorbereit. p. 102. n. 7. *Golden - Wrangengel.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 53. n. 32. *Golden Wrangengel.*

Briffon, ornitholog. I. p. 188. n. 23. *Carouge du Mexique.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 153. 159. *der kleine Gelbsteiß von Cayenne; mit 1 Fig.*

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 33. *der kleine Vogel Bonana.*

Batsch, Thiere, I. p. 323. *der kleine Gelbsteiß von Cayenne.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 361. n. 25. *der kleine Pifangpirol.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 181. n. 26. *Oriolus (Xanthornus) luteus, gula, remigibus rectricibusque nigris.*

14. DOMINICENSIS. *Der Pirol von St. Domingo. (?)*

Müller, Naturyst. II. p. 190. n. 14. *Domingodrossel.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 517. *die Anset von St. Domingo.*

Briffon, ornitholog. I. p. 189. n. 25. *Carouge de S. Domingue, ou Demoiselle.*

Dd 4

Büffon,

(?) Nach Büffon das Weibchen vom vorhergehenden.

Büffon, Vögel, VIII. p. 158. 162. n. 2. *das Weibchen vom vorigen.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 362. n. 26. *der Pirol von St. Domingo.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 182. n. 27. Oriolus (Dominicensis) niger, corpore postico tectricibus alarum maculaque luteis.

39. JAMACAI. *Der Jamac.* (8)

Onomat. histor. nat. IV. p. 514. Icterus luteus.

Briffon, ornitholog. I. p. 189. n. 24. Carouge du Brésil.

Büffon, Vögel, VIII. p. 157. 163. n. 5. *der Jamac des Marcgrav.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 362. n. 27. *der brasilianische Pirol.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 182. n. 28. Oriolus (Jamacai) flavus, capite, collo subtus, remigibus rectricibusque nigris, dorso fascia nigra, tectricum macula alba.

15. CAYENNENSIS. *Der Pirol von St. Thomas* (9)

Müller, Naturfyft. II. p. 190. n. 15. *Gelbflügel.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 517. *die Amsel von St. Thomas.*

Briffon, ornitholog. I. p. 190. n. 26. Carouge de Cayenne.

Büffon, Vögel, VIII. p. 156. 162. n. 4. *Xanthorn von St. Thomas.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 362. n. 28. *der cayennische Pirol.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 182. n. 29. Oriolus (Cayennensis) niger, macula alarum lutea.

Her.

(8) Nach *Büffon* eine Spielart von *Oriolus Xanthornus*.

(9) Nach *Büffon* eine Spielart von *Oriolus Xanthornus*.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 204. Oriolus
Cayennensis.

40. LEUCOPTERUS. *Der schwarze Pirol mit
weißgefleckten Flügeln.* ⁽¹⁰⁾

Latham, Vögel, I. 2. p. 363. n. 29. *der weißflü-
gelige Pirol.* Fig. 32.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 183. n. 31. Oriolus
(Leucopterus) niger, macula alarum alba.

Mus. Carlf. fasc. II. Tab. 31. Oriolus melaleucus.

β. *Der Pirol mit weißem Rücken.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 245. n. 57.

Kalm, it. II. p. 274.

16. ICTEROCEPHALUS. *Der gelbköpfige Pirol.*

Müller, Naturfyft. II. p. 190. n. 16. *Gelbkopf.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 864. *die gelbköpfige
Drossel aus Cayenne.*

Briffon, ornitholog. I. p. 190. n. 27. *Carouge à
tête jaune de Cayenne.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 164. *der gelbköpfige Xan-
thorn*; m. I Fig.

Seligmann, Vögel, IX. Tab. 13. *der gelbköpfige
Staar.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 363. n. 30. *der gelbkö-
pfige Pirol.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 183. n. 32. Oriolus
(Icterocephalus) niger, capite colloque luteis.

(10) *Latham* rechnet hieher auch die *Tanagra nigerrima* (Linn. Syst. Nat. p. 899. n. 45.) nimmt *Büffons Tanagra noir* IV. p. 257. Pl. enl. n. 179. fig. 2. und seinen eignen *Guiana Tanager*, Syn. III. p. 225. n. 15. für das Männchen, und *Büffons Tanagra roux*, pl. enl. n. 711. für das Weibchen an.

17. MELANCHOLICUS. *Der Trauerpirol.*

Müller, Naturfyft. II. p. 190. n. 17. *misfärbige Drossel.*

Onomat. histor. nat. III. p. 977. *der braune amerikanische Ammer.*

Klein, av. p. 98. n. 17. *Fringilla ex fusco et nigro varia, americana; cauda superbiens.*

Klein, Vorbericht. p. 183. n. 17. *bunter braun und schwarzer Distelflocke aus Amerika.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 98. n. 17. *braun und schwarzbunter Fink.*

Briffon, ornitholog. I. p. 191. n. 29. *Carouge tacheté.*

Seligmann, Vögel, IV. Tab 65. *der braune amerikanische Ammer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 363. n. 31. *der gefleckte Pirol.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 184. n. 3. *Oriolus (Melancholicus) griseus nigro-punctatus fascia oculorum alba; (ein Druckfehler für nigra.)*

Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 180. n. 7. *Fringilla (Melancholica) grisea nigro-punctata, area a rostro per latera colli atra.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 203. *Oriolus melancholicus.*

β. *Büffon, Vögel, VIII. p. III. der gefleckte Troupial von Cayenne; mit 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 364. n. 31. *Var. A.*

Latham, Syn. II. p. 442. n. 31. *A.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 184. n. 33. β. *Or. fusco-nigricans, corporis superioris pennis margine flavis; inferioris, alarum caudaeque fulvis, fascia oculorum gulaque albis.*

13. CAPENSIS. *Der capsche Pirol.*

Müller, Natursystem, II. p. 190. n. 10. *capsche Drossel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 248. n. 65. *der olivenfarbige Pirol.*

Briffon, ornitholog. I. p. 191. n. 30. *Carouge du Cap de bonne Esperance.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 166. *der olivenfarbige Xanthorn; mit 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 365. n. 35. *der capsche Pirol.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 184. n. 36. Oriolus (Capensis) fusco-olivaceus, subtus luteus.

41. CAERULEUS. *Der blaue Pirol.*

Briffon, ornitholog. I. p. 190. n. 28. *Carouge bleu.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 198. *der kleine blaue Xanthorn.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 185. n. 38. Oriolus (Caeruleus) cinereo-nigricans, capite, alis caudaque caeruleis.

Latham, Vögel, I. 2. p. 366. n. 36. *der blaue Pirol.*

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 5. * *die kleine acht u. zwanzigste Gattung des Briffon.*

42. VIRIDIS. *Der grünliche Pirol. (1)*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 249. n. 66. *der Pirol mit gelber Kehle.*

Latham, Syn. Suppl. p. 89.

Latham,

(1) Die Benennung *Or. Viridis* kommt im Syst. p. 395. n. 51. nochmals vor. Zum Unterschiede könnte man die erstere nämlich die 42ste Gattung mit *Latham Virescens* nennen, wenn sie nicht, wie dieser vermuthet, eine Spielart von *Oriolus Capensis* ist.

Latham, Vögel, I. 2. p. 374. n. 46. *der gelbkehlige Pirol.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 185. n. 37. Oriolus (Virescens) virescens, genis, gula superciliisque luteis, tectricibus alarum albo-maculatis.

43. FERRUGINEUS. *Der rostfärbige Pirol.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 247. n. 62. *der rostfarbige Pirol.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 374. n. 47. *der rostfarbige Pirol.*

Latham, Syn. Suppl. p. 89.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 176. n. 6. Oriolus (Ferrugineus) niger, pennas ferrugineo-marginatis, capite cervicisque purpurascens, abdomine obscuro, macula per oculos ad nu-
cham nigra.

44. FUSCUS. *Der braunköpfige Pirol.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 247. n. 61. *der Pirol mit braunem Kopfe.*

45. NIGER. *Der schwarze Pirol. (2)*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 247. n. 60. *der schwarze Pirol.*

Briffon,

(2) Hier herrscht unter den Synonymen grosse Verwechslung. In der XIIten Edition hatte *Linné* den *Icterus niger Briff.* so wie *Sloane's* und *Raj Menedula tota nigra*, zu *Gracula Barita* gerechnet. *Gmelin* und *Latham* ziehen mit *Pennant* den *Icterus niger*, zum *Oriolus niger*. *Latham* rechnet hieher auch *Klein: Cornix parva profunde nigra*, und die Synonymen aus *Sloane* und *Rajus* zu *Gracula Barita*. *Klein* aber führt ausdrücklich den *Sloane* und *Rajus* an; und selbst *Briffon* zieht die Synonymen von *Sloane*, *Rajus* und *Klein* zu seinem *Icterus niger*. *Pennant* giebt die Länge des Vogels an 9 Zoll; die Flügelweite 1 Fuss, und das Gewicht zu $2\frac{1}{2}$ Unzen an.

Briffon, ornitholog. I. p. 164. n. 15. Troupiale noir.

Büffon, Vögel, VIII. p. 104. *der große schwarze Troupial*; mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. 2. p. 366. n. 37. *der große schwarze Pirol*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 185. n. 39. Oriolus (Niger) nigro-virescens, remigibus rectricibusque lateralibus intus fuscusque nigris.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 234. n. 6. *der schwarze Pirol*.

46. MINOR. *Der kleine schwarze Pirol* (3)

Pennant, arct. Zool. II. p. 247. n. 60. in fin.

Büffon, Vögel, VIII. p. 107. *der kleine schwarze Troupial*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 367. n. 38. *der kleine schwarze Pirol*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 185. n. 40. Oriolus (Minor) niger nitidus, capite caerulescente.

47. OLIVACEUS. *Der olivenfarbige Pirol*.

Büffon, Vögel, VIII. p. 117. *der olivenfarbige Troupial von Cayenne*; mit 1 Figur.

Latham, Vögel, I. 2. p. 368. n. 39. *der olivenfarbige Pirol*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 186. n. 41. Oriolus (Olivaceus) olivaceus, capite, gula iuguloque fuscis nitidis, pectore flavescente.

48. UNALASCHKENSIS. *Der Pirol von Unalaskka*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 449. n. 67. *der Pirol von Unalaskka*.

Latham,

(3) Nach *Pennant* eine Varietät vom vorigen.

Latham, Vögel, I. 2. p. 368. n. 40. *der Pirol von Unalafchka.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 186. n. 42. Oriolus (Aoonalafchkenfis) fuscus, collo fubtus ferrugineo-fusco, loris macula alba, gula albida, striga fusca bifida.

49. CAUDACUTUS. *Der spitzschwänzige Pirol.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 249. n. 68. *der Pirol mit zugespitztem Schwanze.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 368. n. 41. *der spitzschwänzige Pirol.* Tab. 20.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 186. n. 43. Or. (Caudacutus) varius, rectricibus apice acuminatis.

50. SINENSIS. *Der Kink.*

Büffon, Vögel, VIII. p. 168. *der Kink; m. 1 F.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 369. n. 42. *der Kink.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 186. n. 44. Oriolus (Sinensis) albus, capite, collo, dorso anteriore pectoreque griseo-cinereis, remigibus chalybeis, rectricibus albo chalybeoque dimidiatis.

19. AUREUS. *Der goldfarbige Pirol.*

Müller, Natursystem, II. p. 191. n. 19. *ostindianische Golddroffel.*

Onomat. hist. nat. III. p. 287. *der goldene Paradiesvogel.*

Klein, verbeff. Vögelhist. p. 67. n. 9. *Merle mit schwarzem Bart.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 122. n. 3. *der goldfarbne Paradiesvogel.*

Briffon, ornithol. I. p. 192. n. 31. *Troupiale des Indes.*

Büffon, Vögel, VII. p. 312. *der Paradies-Raker; mit 1 Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 332. *Paradiesracker*.

Seligmann, Vögel, VII. p. 312. *Paradiesracker*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 396. n. 8. *der goldfarbige Paradiesvogel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 197. n. II. *Paradisea* (Aurea) flavo-fulva, capillro, gula, remigibus rectricibusque nigris.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 108. n. 5. *Coracias* (Aurea) flavo-fulva, gula, tectricibus primariis extremitateque rectricum nigris.

51. VIRIDIS. *Der Pfeifer*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 515. *der grüne Witte-wall*.

Briffon, ornith. I. p. 187. n. 21. Baltimore verd, ou Siffleur.

Büffon, Vögel, VIII. p. 123. *der Pfeifer*; m. I F.

Latham, Vögel, I. 2. p. 365. n. 34. *der Pfeiferpirol*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 184. n. 35. Or. (Viridis) fusco-olivaceus, subtus uropygioque viridi-olivaceus, remigibus fuscis, extus olivaceis, intus albicantibus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 203. Sibilator.

52. FURCATUS. *Der Pirol mit getheiltem Schwanze*.

Onomat. histor. nat. IV. p. 512. *der Staar mit getheiltem Schwanze*.

Klein, av. p. 64. n. 4. *Sturnus cauda divisa*.

Klein, Vorber. p. 122. n. 4. *Staar mit getheiltem Schwanze*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 64. n. 4. *Staar mit getheiltem Schwanze*.

Briffon, ornitholog. I. p. 185. n. 16. *Troupiale à queue fourchue*.

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 365. n. 33. *der Pirol mit dem Gabelschwanz.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 184. n. 34. Oriolus (Furcatus) niger, supra ad caeruleum inclinans, tectricibus caudae inferioribus albis, cauda bifida.

Seba, th. I. p. 107. Tab. 65. fig. 4. Turdus niger mexicanus. *Abbild. schlecht.*

20. CHRYSOCEPHALUS. *Der goldköpfige Pirol.* (4)

Müller, Natursystem, II. p. 191. n. 20. *amerikanische Golddrossel.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 863. *die gelbköpfige Drossel aus Amerika.*

Briffon, ornitholog. I. p. 192. n. 32. Carouge à tête jaune d'Amérique.

Büffon, Vögel, VIII. p. 155. 162. *Briffons schwarzköpfiger Xanthorn.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 364. n. 32. *der goldköpfige Pirol.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 183. n. 30. Oriolus (Chrysocephalus) niger, pileo tectricibus alarum caudaeque luteis.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 32 Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung sind drey, bey der 7ten drey, und bey der 19ten zwey Varietäten aus einander gesetzt.

(4) Nach *Büffon* eine Varietät von Oriolus Xanthornus.

53. GESCHLECHT. GRACULA. *Die Azeldohle.*

Müller, Naturfyst. II. p. 192. Gen. LIII.

Leske, Naturgesch. p. 246. Gen. XXII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 118. Gen. XII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 175.
Gen. XXI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 369. Gen. XVIII.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 169.
Gen. XVII.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 250.

Onomat. hist. nat. IV. p. 32.

Büffon, Vögel, IX. p. 193 sqq.

Batsch, Thiere, I. p. 316. Gen. LXVI.

Latham, allgem. Ueberf. der Vögel, I. 2. p. 376.
Gen. XV.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 189. Gen. XVI.

Hermann, tab. affin. anim. p. 195.

Donndorff, Handb. d. Thierg. p. 235. Gen. XIV.

I. RELIGIOSA. *Der Mino.*

Müller, Naturfyst. II. p. 193. n. 1. *der Plapperer.*
Tab. 6. fig. 8.

Leske, Naturgesch. p. 246. n. 1. *der Mino.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 118. n. 1. *der Mino.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 175. n. 1.
Gracula (Religiosa) nigro-violacea, macula alarum alba, fascia occipitis nuda, flava.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 369. *der Plauderer.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 169. *der Mino.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere,
II. p. 374. n. 303. *der indianische Staar.*

Halle, Vögel, p. 254. n. 197. *die kleine Dohle mit dem gelben Nackenschleife.*

- Onomat. hist. nat. IV. p. 36. die Dohle mit gelbem Nacken-Schleiff.
- Handb. d. Naturgesch. II. p. 203. der Mainate.
- Klein, av. p. 60. n. 12. Cornicula feu Monedula Indiae Orient.
- Klein, Vorbereit. p. 113. n. 12. Dohle mit gelbem Nackenschleiff; (die kleinere.)
- Klein, verbess. Vögelhist. p. 59. n. 14. Dohle mit gelbem Nackenschleiff; (die kleinere.)
- Briffon, ornith. I. p. 242. n. 49. Mainate.
- Büsson, Vögel, IX. p. 193. der Mino; m. I Fig.
- Büsson, Vögel, IX. p. 196. n. 1. der Mino des Herrn Briffon. n. 2. der Mino des Bontius. p. 197. n. 3. der kleine Mino des Edwards.
- Seligmann, Vögel, I. Tab. 33. der Minor oder Mino; obere Fig.
- Batsch, Thiere, I. p. 321. der Mino oder Plapperer.
- Latham, Vögel, I. 2. p. 376. n. 1. der Mino.
- Latham, Syn. Suppl. p. 90. Minor Grakle.
- Latham, Syst. ornithol. I. p. 189. n. 1. Gracula (Religiosa) nigro-violacea, macula alarum alba, fascia occipitis nuda, flava.
- Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 108. n. 1. Gracula (Religiosa) nigro-violacea, macula alarum alba, fascia occipitis nuda, flava.
- Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 235. n. 1. der Mino.

β. Der größere Mino. (5)

- Halle, Vögel, p. 254. n. 196. die schwarz-schielende Dohle mit gelbem Nackenschleife.
- Klein, Vorbereit. p. 113. n. 12. der größere.
- Klein, verb. Vögelhist. p. 59. n. 14. der größere.
- Briffon,

(5) Nach Briffon eine eigne Gattung.

Briffon, ornith. I. p. 243. n. 50. Grand Mainate.
Büffon, Vögel, IX. p. 197. n. 4. *der große Mino des Herrn Edwards*.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 33. untere Figur.

Latham, Vögel, I. 2. p. 377. n. 1. Var. A. *der große Mino*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 189. n. 1. β. *Mainatus maior*.

2. CALVA. *Der Kahlbacken*.

Müller, Naturf. II. p. 194. n. 2. *der Kahlbacken*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 34. *die grünlicht - silberfarbene Amsel*.

Briffon, ornithol. I. p. 236. n. 36. *Merle chauve des Philippines*.

Büffon, Vögel, IX. p. 200. *der Kahlbacken*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 377. n. 2. *die kahle Atzel*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 189. n. 2. *Gracula (Calva) subcinerea, subtus fusco-grisea, capite utrinque nudo, pectore, remigibus rectricibusque fusco-nigricantibus*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 235. *der Kahlbacken*.

3. FOETIDA. *Der Stinkvogel*.

Müller, Naturf. II. p. 194. n. 3. *der Stinkvogel*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 35. *die stinkende Drossel*.

Büffon, Vögel, VII. p. 168. *der Stinkvogel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 190. n. 5. *Gracula (Foetida) nigra, remigibus extus caerulescentibus, fascia collari nuda*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 108. n. 2. *Gracula (Foetida) nigra, remigibus extus caerulescentibus, fascia collari nuda*.

4. BARITA. *Der Schiffschwanz.* (6)

Müller, Naturfyft. II. p. 194. n. 4. *Pifangdohle.*

Onomat. hift. nat. IV. p. 33. *die pechfchwarze kleine Krähe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 251. n. 70. *der Schiffschwanz, die Pifangazeldohle.*

Borowfky, Thierreich, II. p. 119. n. 2. *die Pifangdohle.*

Klein, av. p. 59. n. 6. *Cornix parva, profunde nigra?*

Klein, Vorbereit. p. 112. n. 6. *pechfchwarze kleine Krähe?*

Klein, verb. Vögelhift. p. 59. n. 11. *ganz fchwarze Dohle?*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 191. n. 6. *Gracula (Barita) fubgrifea, humeris caeruleis, remigibus extus viridibus.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 379. n. 5. *die bootfchwänzige Atzel. Tab. 21.*

Linné, Syft. Nat. Ed. X. I. p. 109. n. 3. *Gracula (Barita) fubgrifea, humeris caeruleis, remigibus extus viridibus.*

Donndorff, Handb. der Thiergefch. p. 236. n. 3. *der Schiffschwanz.*

5. CRISTATELLA. *Die gehäubte chinefifche Azeldohle.*

Müller, Naturfyft. II. p. 195. n. 5. *Haubenmerle.*

Onomatol. hift. nat. IV. p. 35. *der Staar mit weifem Touppé.*

Klein, av. p. 64. n. 3. *Sturnus crinibus cinereis, et delibutis calamifstro in vallum ad frontem compositis.*

Klein,

(6) Länge nach Pennant 13 Zoll. S. die vorbergehende zweyte Anmerkung.

Klein, Vorbereit. p. 122. n. 3. *Staar mit weißem Touppé.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 64. n. 3. *Staar mit weißem Touppee.*

Briffon, ornithol. I. p. 228. n. 21. *Merle hupé de la Chine.*

Büffon, Vögel, IX. p. 103. *gehaubte chinesische Amsel.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 37. *der chinesische schwarze Staar.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 382. *die gehaubte Atzel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 90. *Crested Grakle.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 192. n. 8. *Gracula (Cristatella) nigra, remigibus primoribus basi rectricibusque apice albis, rostro flavo.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 109. n. 4. *Gracula (Cristatella) nigra, remigibus primoribus basi rectricibusque apice albis, rostro flavo.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 151. 196. *Gracula Cristatella.*

6. SAULARIS. *Die bengalische Azeldohle.*

Müller, Naturfyst. II. p. 195. n. 6. *bengalische Dohle.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 37. der schwarze bengalische Finken.

Klein, av. p. 98. n. 14. *Fringilla nigra.*

Klein, Vorbereit. p. 182. n. 14. *schwarzer bengalischer Finken.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 98. n. 14. *schwarzer Finken.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 70. n. 36. *Purpurdrossel mit burten Flügeln.*

Briffon, ornith. I. p. 209. n. 19. *Pie-grièche noire de Bengale.*

- Bliffon*, Vögel, IX. p. 206. *die bengalische Dohle.*
Seligmann, Vögel, VI. Tab. 76. *die kleine indianische Aelster.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 382. n. 8. *die bengalische Atzel.*
Latham, Syn. Supplem. p. 91. Dial Grakle.
Latham, Syft. ornitholog. I. p. 192. n. 9. Gracula (Saularis) nigro-caerulescens, abdomine, macula alarum rectricibusque lateralibus albis.
Linne', Syft. Nat. Edit. X. I. p. 109. n. 5. Gracula (Saularis) nigro-caerulescens, abdomine, macula alarum rectricibusque lateralibus albis.
Gerin. ornith. II. p. 41. Tab. 157. Pica minor bengalensis.

7. QUISCULA. *Der Maysdieb.*

- Müller*, Naturfyft. II. p. 196. n. 7. *der Raupentödter.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 119. n. 3. *der Raupentödter, die Purpurdohle.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 175. n. 2. Gracula (Quiscula) nigro-violacea, cauda rotundata; *der Maisdieb.*
Halle, Vögel, p. 255. n. 198. *die purpurblaue Dohle.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 375. n. 305. *die Purpurdohle.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 250. n. 69. *die Purpurazeldohle, Azeldohle von Jamaica.*
Onomat. hist. nat. IV. p. 38. *die Purpurdohle.*
Klein, av. p. 60. n. 13. Monedula purpurea, Cornix purpurea.
Klein, Vorbereit. p. 114. n. 13 *Purpurdohle.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 59. n. 15. *Purpurdohle.*

Briffon,

Briffon, ornitholog. I. p. 166. n. 3. Pie de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, VII. p. 194. die Elster von Jamaika; mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 24. die purpurfarbene Dohle.

Batsch, Thiere, I. p. 322. die Elster von Jamaika.

Latham, Vögel, I. 2. p. 380. n. 6. die Purpuratzel.

Latham, Syn. Suppl. p. 90. Purple Grakle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 191. n. 7. Gracula (Quiscalus) nigro-violacea, cauda rotundata.

Linne, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 109. n. 6. Gracula (Quiscalus) nigro-violacea, cauda subcuneiformi.

Raj. Syn. p. 168. n. 21. Izanatl?

Hermann, tab. affinit. animal. p. 196. Gracula Quiscalus.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 236. n. 4. der Maysdieb.

β. Gr. corpore albo nigroque, capite albo, remigibus caudaque nigris. *

Latham, Syn. Suppl. p. 90.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 191. n. 7. β.

Latham, Vögel, I. 2. p. 381.

8. ATTHIS. Die ägyptische Azeldohle.

Müller, Natursystem, II. p. 196. n. 8. ägyptische Dohle.

Onomat. histor. nat. IV. p. 32. die grünlicht-blaue Drossel.

Büffon, Vögel, IX. p. 208. die ägyptische Gracula.

Latham, Vögel, I. 2. p. 383. die ägyptische Atzel.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 192, n. 10. Gracula (Atthis) viridi-caerulea, abdomine ferrugineo, pedibus sanguineis.

Hasselquist, Reise nach Palästina, (Ed. germ.) p. 296. n. 20. Corvus aegyptius.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 109. n. 7. Gracula (Atthis) viridi-caerulea, abdomine ferrugineo, pedibus sanguineis.

Philos. transact. IVII. p. 347. 2. Gr. corpore viridi, dorso caerulescente, abdomine ferrugineo, pedibus rubris.

9. LONGIROSTRA. *Die langschnäblige Azeldohle.*

Büffon, Vögel, IX. p. 212. *die langschnäbliche Gracula.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 119. n. 4. *die langschnäbliche Atzel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 384. n. 10. *die langschnäblige Atzel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 193. n. 11. Gracula (Longirostra) cinereo-fusca, subtus flavescens, capite, collo caudaque nigris, rectricibus apice maculaque alarum albis.

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VII. p. 7. *die langschnäbliche Atzel.* Tab. 2. fig. 2.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 151. 194. Gracula longirostris.

10. STURNINA. *Die daurische Azeldohle.*

Büffon, Vögel, IX. p. 211. *die daurische Gracula.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 193. n. 12. Gracula (Sturnina) cana, macula verticis, dorsoque inter alas violaceo-atro, alis caudaque violaceo-viridibus, harum striga gemina alba.

Pallas,

Pallas, Reif. Ausz. Anh. III. p. 5. n. II. Gracula Sturnina.

11. CAYENNENSIS. Die gestreifte cayennische Azeldohle.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 193. n. 14. Gracula (Scandens) corpore transversim striato, supra rufo, subtus lutescente, capite rufo alboque vario, rectricibus apice denudatis aculeatis.

Latham, Vögel, I. 2. p. 384. n. II. die cayennische Atzel.

12. CARUNCULATA. Die Azeldohle vom Cap?

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 324. n. 7. Sturnus (Gallinaceus) cinereus, regione oculorum nuda, ad basin mandibulae inferioris palea duplici cristaque verticis membranacea, bifida, erecta, fulva.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit 4 Gattungen vermehrt, und bey der ersten Gattung sind zwey Varietäten aus einander gesetzt.

B. Neuere Gattungen.

1. Die Azeldohle von Neuholland.

Latham, Syn. Suppl. p. 91. Yellow-faced Grakle.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 193. n. 13. Gracula (Icterops) nigra, fascia alarum corporeque subtus albis, regione oculorum nuda rugosa.

Latham, Vögel, I. 2. p. 385. n. 12. die neuholländische Atzel.

54. GESCHLECHT. PARADISEA. *Der Paradiesvogel.*

Müller, Natursystem, II. p. 197. Gen. LIV.

Leske, Naturgesch. p. 246. Gen. XXIII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 120. Gen. XIII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 176.
Gen. XXII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 373. Gen. XXII.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 169.
Gen. XVIII.

Halle, Vögel, p. 267. 2.

Neuer Schauplatz der Natur, VI. p. 342.

Onomat. hist. nat. V. p. 79. VI. p. 164.

Klein, av. p. 63. Gen. XI.

Briffon, ornith. I. p. 193. Gen. XX. *Manucodiata.*

Büffon, Vögel, VII. p. 316 ff.

Batsch, Thiere, I. p. 316. 331. Gen. LXX.

Latham, allg. Uebersicht der Vögel, I. 2. p. 386.
Gen. XVI.

Latham, Syst. ornith. I. p. 194. Gen. XVII.

Hermann, tab. affin. anim. p. 201.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 237.
Gen. XV.

I. APODA. *Der große Paradiesvogel.*

Müller, Natursystem, II. p. 197. n. 1. *Luftvogel.*
Tab. 26. fig. 5.

Leske, Naturgesch. p. 246. n. 1. *der große Paradiesvogel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 121. n. 2. *der Luftvogel.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 176. n. 1.
Paradisea (Apoda) *brunnea*, pennis hypochondriis luteis corpore longioribus, rectricibus duabus intermediis longis setaceis.

Bechstein,

Bechstein, Naturgesch. I. p. 374. n. 1. *der große Paradiesvogel.*

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 171. *der große Paradiesvogel.*

Funke, Naturgesch. I. p. 335. *der eigentliche Paradiesvogel.*

Ebert, Naturl. II. p. 59. *Paradiesvogel.* Tab. 24. fig. 1.

Halle, Vögel, p. 267. n. 216. *der gelbrothe Paradiesvogel, mit goldgelbem Kopfe und zwey Ruderfedern.*

Halle, Vögel, p. 268. n. 217. *der röthlich braune Paradiesvogel.*

Halle, Vögel, p. 268. n. 218. *der weißbraune langleibige Paradiesvogel.*

Halle, Vögel, p. 269. n. 220. *der gemeine Paradiesvogel.*

Halle, Vögel, p. 271. n. 224. *der größte röthliche Paradiesvogel.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 366. n. 292. *der Paradiesvogel, Gottesvogel.*

Beckmann, Naturhist. p. 42. n. 7. *der Paradiesvogel.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 166. *Paradisea apoda.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 194. *der Paradiesvogel.* Tab. 3.

Klein, av. p. 63. n. 1. *Manucodiata, Avis Paradisi.*

Klein, Vorbereit. p. 119. n. 1. *Paradiesvogel mit goldgelbem Kopfe.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 63. n. 1. *Paradiesvogel mit goldgelbem Kopfe.*

Klein, av. p. 63. n. 3. *Manucodiata III. Aldrov.*

Klein, Vorb. p. 121. n. 3. *Manucodiata III. Aldr.*

Klein,

Klein, verbess. Vögelhist. p. 63. n. 3. *Reutervogel*.
Klein, av. p. 63. n. 5. *Manucodiata V. seu vul-*
garis.

Klein, Vorber. p. 120. n. 5. *der gemeine.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 63. n. 5. *gemeiner*
Paradiesvogel.

Klein, av. p. 63. n. 6. *Manucodiata Rex.*

Klein, Vorbereit. p. 120. n. 6. *Königsheher.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 63. n. 6. *Königsheher.*

Klein, av. p. 64. n. 8. *Sebae avis parad. Aroefica.*

Klein, Vorbereit. p. 120. n. 8. *der aroefische des*
Seba.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 63. n. 9. *röthlicher*
Paradiesvogel.

Gesner, Vögelb. p. 392. *Paradiesvogel oder Luft-*
vogel. Fig. p. 393. fehl.

Briffon, ornitholog. I. p. 193. n. 1. *Oiseau de*
Paradis.

Büffon, Vögel, VII. p. 316. *der große Paradies-*
vogel; mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 5. *der große Para-*
diesvogel.

Latham, Vögel, I. 2. p. 387. n. 1. *der große Pa-*
radiesvogel.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 194. n. 1. *Paradi-*
sea (Apoda) castanea, collo subtus viridi- au-
reo, pennis hypochondriis corpore longiori-
bus, rectricibus duabus intermediis longis fe-
taceis.

Batsch, Thiere, I. p. 333. *der große Paradies-*
vogel.

Scopoli, an. hist. nat. I. p. 43. *Paradisea apoda.*

Scopoli, Bemerk. 2. d. Naturgesch. I. p. 42. n. 47.
der ohnbeinigte Paradiesvogel.

Neue Mannichfalt. III. p. 292. *Himmelsvögel.*

·Aller-

Allerneueste Mannichfalt. III. p. 98. *der große Paradiesvogel.*

Sommerat, Reise n. Neuguinea, p. 56. n. 1.

Sander, über die Größe und Schönheit der Natur, IV. p. 131. *der große Paradiesvogel.*

Goeze, nützl. All. II. p. 364. n. 5. *der Paradiesvogel.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 776. *der größere Paradiesvogel.*

Valentin. mus. museor. I. p. 462. *Paradisvögel.*

Loniceri, Kräuterb. p. 662. *Luftvogel, Paradiesvogel.* Fig. p. 663. mittelm.

Linné, Syst. Natur. Edit. II. p. 52. *Avis Paradisea.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 21. n. 1. *Paradisea lutea, cauda, pectore abdomineque brunneis, gula azurea.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 110. p. 51. n. 1. *Paradisea (Apoda) pennis hypochondriis corpore longioribus, rectricibus intermediis longis setaceis.*

Moehring, av. gen. p. 28. n. 2. *Paradisea.*

Jonston, av. p. 170. Tab. 55. *Manucodiata Aldr.* p. 71. *Hippomanucodiata.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 167. *Paradisea apoda.*

Gerin. ornith. I. p. 76. Tab. 63.

Pennant, ind. Zool. p. 31. n. 1.

Kirchmaier, de ave Paradisi *Manucodiata.* Witt. 1662. 8.

Scaliger, Apodes ab India, et *Manucodiata: De subtil.* ex 228. p. 718. 722.

Helwig, de ave manucodiata seu paradisiaca: *Eph. nat. cur.* Dec. I. an. 9. et 10. obs. 194.

P. 453.

Bartholin.

Bartholin. de ave paradisiaca Hist. anat. Cent. 6.
hist. 56. p. 292.

Donndorff. Handbuch der Thiergesch. p. 237.
n. 1. *der große Paradiesvogel.*

β. *Latham.* Vögel, I. 2. p. 389. n. 1. Var. A. *der
kleine Paradiesvogel.*

Latham. Syn. II. p. 474. n. 1. A. Smaller bird of
Paradise.

Latham. Syst. ornitholog. I. p. 194. n. 1. β. Para-
disca minor papuana.

Pennant. ind. Zool. p. 33. n. 2.

α. REGIA. *Der Königsparadiesvogel.*

Müller. Natur Syst. II. p. 199. n. 2. *der Königs-
vogel.* Tab. 6. fig. 9.

Leske. Naturg. p. 246. n. 2. *der kleine Paradies-
vogel.*

Borowsky. Thierreich, II. p. 120. n. 1. *der Kö-
nigsvogel.* Tab. 13.

Bechstein. Naturgesch. I. p. 374. n. 2. *der kleine
Paradiesvogel.*

Halle. Vögel, p. 269. n. 221. *der König der Pa-
radiesvögel.*

Halle. Vögel, p. 270. n. 222. *der König der
großen Paradiesvögel.*

Gatterer. vom Nutzen und Schaden der Thiere,
II. p. 367. n. 293. *der Königsparadiesvogel.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 168. *der Königsvogel.*
Handbuch der Naturgesch. II. p. 195. *der kleine
Paradiesvogel.*

Klein. av. p. 64. n. 7. Rex avium paradisiacarum
maioris moduli.

Klein. Vorbereit. p. 120. n. 7. *der große Para-
diesvogelkönig.*

Klein.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 63. n. 7. *größerer Königsheher*.

Briffon, ornitholog. I. p. 195. n. 2. *Petit oiseau de - Paradis*.

Büffon, Vögel, VII. p. 332. *der Königs-Paradiesvogel*; mit 1 Figur.

Batsch, Thiere, I. p. 333. *der Königsparadiesvogel*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 390. n. 2. *der Königs-Paradiesvogel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 194. n. 2. *Paradisea (Regia) castaneo - purpurea, subtus albida, fascia pectorali viridi - aurea, rectricibus 2. intermediis filiformibus, apice lunato - pennaceis*.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 6. *der sogenannte König der größern Paradiesvögel*.

Sander, über die Größe u. Schönheit in der Nat. IV. p. 131. *der kleinere Paradiesvogel*.

Valentin, mus. museor. I. p. 463. *Manucodiata regia; Königsvogel*.

Sonnerat, Reif. n. Neuguin. p. 56. n. 2. *Königsvogel*.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 776. *der kleinere Paradiesvogel*.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 52. *Manucodiata*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 21. n. 2. *Manucodiata*.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 110. n. 2. *Paradisea (Regia) cirrhis caudalibus filiformibus, apice lunato pennaceis*.

Jonston, av. p. 196. Tab. 55. *Rex avium paradisiacarum*.

Grützmann, diff. de avibus paradisiacis, earumque rege. Jen. 1667.

Gerin. ornith. I. p. 79. Tab. 66.

Pennant,

Pennant, ind. Zool. p. 36. n. 7.

Petiver, gazophyl. Dec. I. Tab. 53. fig. 2.

3. **TRISTIS.** *Der philippinische Paradiesvogel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 201. n. 3. *Bastard.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 170. *Paradisea tristis.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,

II. p. 368. n. 294. *der philippin. Paradiesvogel*

Briffon, ornitholog. I. p. 235. n. 35. Merle des Philippines.

Büffon, Vögel, VII. p. 356. *der philippinische Paradiesvogel.*

Büffon, Vögel, IX. p. 214. *der Martin*; m. I F.

Latham, Vögel, I. 2. p. 378. n. 3. *der Martin.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 190. n. 3. *Gracula* (Tristis) castaneo-fusca, capite colloque fuscis, area pone oculos triangulari nuda, macula remigum tectricibusque lateralibus apice albis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 202. *Paradisea tristis.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 238. n. 2. *der philippinische Paradiesvogel.*

4. **MAGNIFICA.** *Der prächtige Paradiesvogel.*

Büffon, Vögel, VII. p. 339. *der prächtige Paradiesvogel*; mit 1 Figur.

Batsch, Thiere, I. p. 333. *der prächtige Paradiesvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 391. n. 3. *der prächtige Paradiesvogel.* Tab. 22.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 195. n. 3. *Paradisea* (Magnifica) castaneo-fusca, capistro nigro, cervice cirrhata flava, collo subtus pectoreque viridi-nigris, medio nitentibus.

Sonne.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 158. *der fünfte od. prächtige Paradiesvogel.*

Pennant, ind. Zool. p. 38. n. 3.

5. NIGRA. *Der schwarze Paradiesvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 392. n. 4. *der Paradiesvogel mit dem Halsbande.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 196. n. 5. Paradisea (Gularis) purpureo-nigricans, capistro genisque tomentosis, cervice fasciaque pectorali viridi-nitentibus, sub gula lunula cuprea-aurea, fulgidissima.

6. SUPERBA. *Der violettekehlige Paradiesvogel.*

Büffon, Vögel, VII. p. 344. *der violettekehlige Paradiesvogel; mit 1 Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 332. *der violettekehlige Paradiesvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 392. n. 5. *der violettekehlige Paradiesvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 196. n. 7. Paradisea (Superba) fronte cristata, capite, cervice abdomineque viridibus, gula violacea fericea, cauda mediocri caerulefcenti-atra.

Sonnerat, Reis. nach Neugueinea, p. 57. *der dritte, violettekehlige Paradiesvogel.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 166. Paradisea superba.

Pennant, ind. Zool. p. 38. n. 4.

7. AUREA. *Der goldkehlige Paradiesvogel.*

Büffon, Vögel, VII. p. 347. *der sechsfiidigte Paradiesvogel; mit 1 Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 332. *der sechsfiadige Paradiesvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 395. *der sechsfädige Paradiesvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 196. n. 9. *Paradisea (Sexfetacea) cristata atra, vertice, genis gulaque violaceo-nigris, iugulo, macula cervicis pectoreque viridi-nitentibus, regione aurium utrinque pennis fetaceis tribus longissimis.*

Neue-Mannichfalt. VI. p. 587. *der guineische Paradiesvogel, die Goldkehle genannt.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 166. 202. *Paradisea sexfilis.*

Pennant, ind. Zoolog. p. 38. n. 4.

8. **VIRIDIS.** *Der stahlfarbige Paradiesvogel.*

Büffon, Vögel, VII. p. 353. *der stahlfarbige Paradiesvogel; mit 1 Fig.*

Batsch, Thiere, I. p. 332. *der stahlfarbige Paradiesvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 396. n. 7. *der stahlblaue Paradiesvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 197. n. 10. *Paradisea (Chalybea) caeruleo-viridis, capite ferriceo nigro tomentoso, dorso, uropygio, abdomine caudaque chalybeo-nitentibus.*

Sonnerat, Reis. n. Neuginea, p. 59. n. 6. *der grüne Paradiesvogel.*

Pennant, ind. Zoolog. p. 38. n. 6.

9. **ALBA.** *Der weiße Paradiesvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 197. n. 12. *Paradisea (Alba) tota alba.*

Allerneueste Mannichfalt. III. p. 103. *der weiße Paradiesvogel.*

β. Der schwarz- und weiße Paradiesvogel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 197. n. 12. β. Paradisea anterior nigra, posterior alba, pennis 12. fetaceis pene nudis incurvis.

Allerneueste Mannichfalt. III. p. 103. der schwarz und weiße Paradiesvogel.

Gerin. ornith. I. Tab. 65. fig. 1?

A. Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit 6 Gattungen vermehrt, und bey der ersten sind 2 Varietäten aus einander gesetzt.

B. Unbestimmtere Thiere.

1. Der schwarze Paradiesvogel mit stehendem Busche.

Halle, Vögel, p. 268. n. 219.

Klein, av. p. 63. n. 4. Manucodiata IV. Aldr.

Klein, Vorber. p. 120. n. 4. mit krausen Haaren.

Klein, verb. Vögelhist. p. 63. n. 4. Straußvogel.

Briffon, ornithol. I. p. 195. Species quarta Aldr.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 195. n. 4. Paradisea (Cirrhatta) capite, collo alisque nigris, cirrho prope cervicem capistroque flavis.

Aldr. av. I. p. 811. Tab. 814. Manucodiata 4ta, seu cirrhata.

Raj, Synopf. p. 21. n. 4.

Will. ornith. p. 92. Crested Bird of Paradise.

Vielleicht eine Spielart von *Paradisea magnifica*?

2. *Paradisea (Furcata) nigra*, fasciculo sub alis tomentoso, medio abdominis pennis caudae furcatae instar viridi-splendentibus.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 196. n. 8.

Ein unvollständiger Vogel.

C. Ne u e r e G a t t u n g e n.

1. Der weißflügelichte Paradiesvogel.

Latham, Vögel, I. 2. p. 397. n. 9. der weißflügelige Paradiesvogel.

Latham, Syn. Suppl. p. 92. White-winged Paradise-Bird.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 196. n. 6. Paradisea (Leucoptera) nigra, cervice cupreo-splendente, remigibus albis extus nigro-marginatis, cauda longissima cuneiformi.

55. GESCHLECHT. TROGON. Der Baumhacker. (Kuruku.)

Müller, Naturfyst. II. p. 202. Gen. LV.

Leske, Naturgesch. p. 247. Gen. XXIV.

Borowsky, Thierreich, II. p. 122. Gen. XIV.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 176. Gen. XXIII.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 165. Gen. VI.

Onomat. hist. nat. VII. p. 590 fqq.

Briffon, ornith. II. p. 87. Gen. LI.

Batsch, Thiere, I. p. 321.

Latham, Vögel, I. 2. p. 398. Gen. XVII.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 198. Gen. XVIII.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 184. 186.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 238. Gen. XVI.

I. STRIGILATUS. Der gestreifte Baumhacker.

Müller, Naturfyst. II. p. 202. I. gestreifte Baumhacker.

Onomat. histor. nat. VII. p. 592. der graue oder gestreifte Baumhacker aus Cayenne.

Briffon,

Briffon, ornithol. II. p. 88. n. 1. Couroucou cendré de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 401. n. 3. der aschgraue Kuruku.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 20. n. 4. Trogon (Strigilatus) cinereus, abdomine fulvo, alis strigis albis, rectricibus nigris, 3 lateralibus extus albo fasciatis, apice albis.

2. CURUCUI. *Der Curucui.*

Müller, Natursystem, II. p. 203. n. 2. Schwarzkehle.

Borowsky, Thierreich, II. p. 123. n. 1. der schwarzkehlige Baumhacker. Tab. 14.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 165. der schwarzkehlige Baumhacker.

Halle, Vögel, p. 179. n. 87. der rauhfüßige amerikanische Baumhacker.

Onomat. hist. nat. III. p. 535. VII. p. 592. Curucui.

Klein, av. p. 28. n. 16. Picis congener Curucui.

Klein, Vorbereit. p. 54. n. 16. der spechtartige Curucui.

Briffon, ornithol. II. p. 90. n. 4. Couroucou verd du Brésil.

Latham, Vögel, I. 2. p. 398. n. 1. der rothbäuchige Kuruku.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 198. n. 1. Trogon (Curucui) viridi-aureus, subtus fulvo-miniacus, gula nigra, tectricibus alarum rectricibusque 3. extimis albo nigroque fasciatis.

Eberhard, Thiergesch. p. 106. Couroucou.

Moehring, av. gen. p. 85. n. 114. Trogon.

Forster, av. p. 205. Curucui.

Gerin. ornith. II. p. 53. Tab. 187.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 238. n. 1.
der Curucui.

β. Latham, Vögel, I. 2. p. 399. n. 1. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 198. β. Tr. tectricibus alarum fuscis, macula nuda infra oculos nulla.

γ. Latham, Vögel, I. 2. p. 399. n. 1. Var. B.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 199. δ. Tr. viridi-aureus, subtus fulvus, gula nigra, tectricibus alarum rectricibusque 3. extimis, albo nigroque fasciatis.

δ. Latham, Syn. II. p. 486. n. 1. B.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 198. γ. Tr. griseo-cinereus, viridi-nitens, abdomine postico rubro, cauda longiore.

3. VIRIDIS. *Der grüne Baumhacker.*

Müller, Natursystem, II. p. 203. n. 3. *der grüne Baumhacker.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 123. n. 2. *der grüne Baumhacker.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 176. n. 1.
Trogon (Viridis) viridi-aureus, subtus luteus, gula nigra.

Onomat. hist. nat. VII. p. 593. *der grüne Baumhacker aus Cayenne.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 192. *der grüne Curucui.*

Briffon, ornithol. II. p. 88. n. 2. Couroucou verd de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 400. n. 2. *der gelbbäuchige Kurucu.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 199. n. 2. Trogon (Viridis) viridi-aureus, subtus luteus, gula

gula nigra, rectricibus utrinque tribus extimis oblique et dentatim albis.

Gerin. ornith. II. p. 53. Tab. 189.

β. *Briffon*, ornitholog. II. p. 89. n. 3. Couroucou verd à ventre blanc de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 401. n. 2. Var. A. der weißbäuchige Kuruku.

Latham, Syn. I. p. 489. n. 2. A. White-bellied Curucui.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 199. n. 2. β.

4. RUFUS. *Der braunrothe Baumhacker.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 402. n. 4. der gelbrothe Kuruku. Tab. 24.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 200. n. 5. Trogon (Rufus) rufus, corpore subtus flavo, alis griseo nigroque striatis, rectricibus 3. utrinque lateralibus albo nigroque fasciatis, apice albis.

5. VIOLACEUS. *Der violetfarbige Baumhacker.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 402. n. 5. der violette Kuruku.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 199. n. 3. Trogon (Violaceus) violaceus, dorso viridi, tectricibus alarum remigibusque secundariis albo maculatis, rectricibus 3. lateralibus albo nigroque fasciatis, apice albis.

6. MACULATUS. *Der braune, weißgefleckte Baumhacker.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 403. n. 6. der gefleckte Kuruku.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 201. n. 7. Trogon (Maculatus) fusco et nigricante fasciatus, vertice viridi, tectricibus alarum remigibusque

secundariis viridibus apice albis, cauda nigricante fasciis albis.

7. FASCIATUS. *Der bandirte Baumhacker.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 403. n. 7. *der Band-Kuruku.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 200. n. 6. Trogon (Fasciatus) dorso ferrugineo, corpore subtus fulvo-rubro, capite colloque nigricantibus, fascia pectorali alba, alis albo nigroque fasciatis, cauda apice nigra.

Murr: Naturforsch. I. p. 267. *der Curucu mit der Binde.*

Berlin. Samml. IX. p. 191. n. 5. *der bandirte Kuruku.*

Neueste Mannichfalt. I. p. 188. n. 5. *der bandirte Kuruku.*

β. Trogon fusco-flavescens, subtus rubro-flavicans, capite nigricante, collo et pectore cinereis, tectricibus alarum albo-striatis, cauda nigra.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 200. n. 6. β.

Latham, Syn. Suppl. p. 93.

Onomat. histor. nat. VII. p. 591. *der ceylonische Baumhacker.*

Briffon, ornithol. II. p. 91. n. 7. Couroucou de Ceylon.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit vier Gattungen vermehrt, und bey der zweyten sind 4 Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Neue-*

B. Neuerer Gattungen.

1. Der grüne asiatische Baumhacker, mit blauer Kehle.

Latham, Vögel, I. 2. p. 405. n. 8. der blauwangige Kuruku.

Latham, Syn. Suppl. p. 93. Blue-cheeked Curucui.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 201. n. 8. Trogon (Asiaticus) viridis, fronte, vertice cerviceque rubris, gula caerulea macula rubra, remigibus rectricibusque nigris.

2. Der schwärzliche indianische Baumhacker, mit blauem Schnabel.

Latham, Syn. Suppl. p. 94. Indian Curucui.

Latham, Vögel, I. 2. p. 405. n. 9. der indische Kuruku.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 201. Trogon (Indicus) nigricans, supra ferrugineo maculatus, subtus flavescens nigricante fasciatus, capite nigro albo striato, cauda longissima fasciata.

56. GESCHLECHT. Bucco. Das Großmaul.

Müller, Naturyst. II. p. 204. Gen. LVI.

Leske, Naturgesch. p. 247. Gen. XXV.

Borowsky, Thierreich, II. p. 124. Gen. *

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 177. Gen. XXIV.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 168. Gen. XII.

Briffon, ornitholog. II. p. 67. Gen. XLIX.

Latham, allgem. Ueberf. der Vögel, I. 2. p. 406. Gen. XVIII.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 201. Gen. XIX.

Hermann, tab. affin. anim. p. 184.

Donndorff, Handb. d. Thierg. p. 238. Gen. XVII.

2. TAMATIA. *Die Tamatia.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 406. n. 1. *der brasilianische Bartvogel.*

Latham, Syn. Supplem. p. 95. Spotted-bellied Barbet.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 201. n. 1. Bucco (Tamatia) rufo-fuscus, subtus rufo-albus, nigro maculatus, gula fulva, collo lunula rufo nigroque varia, pone oculos macula nigra.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 239. n. 1. *die Tamatia.*

3. CAYENNENSIS. *Das cayennische Großmaul.*

Briffon, ornitholog. II. p. 68. n. 2. Barbu de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 407. n. 2. *der cayennische Bartvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 202. n. 2. Bucco (Cayennensis), niger, pennis margine griseo-aureis, subtus albo-flavicans, fronte gulaque rubris, superciliis albis.

Gerin. ornith. II. p. 51. Tab. 183.

β. *Latham*, Vögel, I. 2. p. 408. n. 2. Var. A. *der schwarzgefleckte Bartvogel.*

Latham, Syn. II. p. 496. n. 2. A. Black-spotted Barbet.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 202. n. 2. β. B. nigricans, subtus albo-flavescens, fronte gulaque rubris, collo subtus, pectore et lateribus maculis nigris.

Briffon, ornitholog. II. p. 68. n. 3. Barbu tacheté de Cayenne. (7)

I. CAPEN-

(7) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

1. CAPENSIS. *Die Tamatia mit dem Halsbande.*⁽⁸⁾

Müller, Naturfyft. II. p. 204. n. 1. *Capfche.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 124. *das capifche Großmaul.*

Blumenbach, Handb. der Naturgefch. p. 177. n. 1. Bucco (Capensis) rufus, fascia humerali fulva, pectorali nigra.

Bechstein, Naturgefch. Deutchl. II. p. 168. *das capifche Großmaul.*

Briffon, ornithol. II. p. 67. n. 1. *Barbu.*

Batsch, Thiere, I. p. 326. *das kapifche Großmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 408. n. 3. *der Bartvogel mit dem Halsbande.*

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 202. n. 3. Bucco (Collaris) rufus, fascia humerali fulva, pectorali nigra.

Gerin. ornithol. II. p. 51. Tab. 182.

4. ELEGANS. *Das bunte Großmaul.*

Müller, Naturfyft, Suppl. p. 88. n. 2. Bucco Versicolor; *der Scheck.*

Briffon, ornitholog. II. p. 69. n. 5. *Barbu des Maynas.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 409. n. 4. *der fchöne Bartvogel.*

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 203. n. 4. Bucco (Maynanensis) viridis, capite gulaque rubris caeruleo-marginatis, iugulo et pectore flavo, abdominis macula rubra.

5. MA-

(8) Da das Vaterland dieses Vogels nicht das Vorgebirge der guten Hoffnung sondern Guiana ist, so ist der Linneische Trivialname nicht richtig, der Lathamfche hingegen weit anpassender.

5. MACRORHYNCHOS. *Das großschnäblichste Großmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 409. n. 5. *der große bunte Bartvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 203. n. 5. Bucco (Macrorhynchos) niger, fronte, gula, iugulo, abdomine rectricibusque apice albis, fascia pectorali nigra.

6. MELANOLEUCOS. *Das schwarz- und weiße Großmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 410. n. 6. *der kleine bunte Bartvogel.*

Latham, Syll. ornitholog. I. p. 203. n. 6. Bucco (Melanoleucos) niger, corpore subtus, fronte, gula, macula scapulari strigaeque pone oculos albis, fascia pectorali lata nigra.

7. PHILIPPINENSIS. *Das philippinische Großmaul.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 88. n. 3. Bucco Haemacephalus; *der Blutkopf.*

Briffon, ornithol. II. p. 69. n. 4. Barbu des Philippines.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 203. n. 7. Bucco (Philippensis) viridis, subtus flavicans maculis olivaceis, genis colloque subtus flavis, fronte fasciaque pectorali rubris.

Latham, Vögel, I. 2. p. 411. n. 7. *der philippinische Bartvogel.*

8. NIGER. *Das schwarze Großmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 411. n. 8. *der schwarze kehlige Bartvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 204. n. 8. Bucco (Niger) niger, supra flavo - varius, sincipite rubro,

rubro, lateribus colli striga bifida, pectore abdomineque albis.

β. Latham, Syst. ornitholog. I. p. 204. n. 8. β.
(Vielleicht ein junger Vogel?)

Latham, Vögel, I. 2. p. 412. n. 8. Var. A.

9. PARVUS. *Das kleine senegalische Großmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 412. n. 9. *der kleine Bartvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 204. n. 9. Bucco (Parvus) fulvo-nigricans, subtus albus fusco-friatus, gula lutea, striga suboculari alba.

10. GRANDIS. *Das große chinesische Großmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 113. n. 10. *der große Bartvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 204. n. 10. Bucco (Grandis) viridis versicolor, remigibus nigro-variegatis, crisso rubro.

β. B. fordide viridis, subtus virefcens, remigibus nigris, orbitis nudis rubicundis. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 204. n. 10. β.

Latham, Syn. Supplem. p. 95. Grand Barbet.

11. VIRIDIS. *Das grüne Großmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 413. n. 11. *der grüne Bartvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 205. n. 11. Bucco (Viridis) viridis, capite colloque griseo-fuscis, supra poneque oculum utrinque macula alba.

12. LATHAMI. *Das olivenfarbige Großmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 413. n. 12. *der Bartvogel mit gelblichem Gesichte.* Tab. 25.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 205. n. 12. Bucco (Lathamii) olivaceus, remigibus caudaque obscuris,

scuris, facie mentoque ex subfusco rufescente.

13. **FUSCUS.** *Das braune Großmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 414. n. 13. *der weißbrüstige Bartvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 206. n. 17. Bucco (Fuscus) fuscus, scapis pennarum flavescentibus, capite tumido, pectoris macula triquetra alba.

14. **RUBRICAPILLUS.** *Das rothköpfige Großmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 414. n. 14. *der rothköpfige Bartvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 205. n. 13. Bucco (Rubricapillus) viridis, vertice gulaque coccineis, humeris macula albida, pectore flavo, fascia rubra, nigro marginata, abdomine albo.

15. **ZEYLANICUS.** *Das zeylanische Großmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 415. n. 15. *der gelbwangige Bartvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 205. n. 15. Bucco (Zeylanicus) viridis, capite colloque pallide fuscis, genis nudis flavis, tectricibus alarum albo maculatis.

16. **DUBIUS.** *Das Großmaul aus der Barbarey.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 415. n. 16. *der Barbikan.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 206. n. 16. Bucco (Dubius) niger, subtus ruber, fascia pectoris, femoribus, crissoque nigris.

β. Bucco caeruleo - nigricans, dorso macula alba, corpore subtus, lunula pone oculos fasciaque alarum rubris. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 206. n. 16. β.

Latham, Syn. Suppl. p. 96. Doubtful Barbet.

Latham, Vögel, I. 2. p. 416.

17. CINEREUS. *Das aschgraue cayennische Großmaul.* (9)

Latham, Vögel, I. 2. p. 416. n. 17. *der rothschnäblige Bartvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 446. n. 42. *der schwarze cayennische Kuckuck.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 206. n. 18. Bucco (Calcaratus) niger, subtus cinereus, tectricibus alarum albo marginatis, flexura spinula alba.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit *sechszehen* Gattungen vermehrt, denn die XII. Edition hat nur *eine* Gattung.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Das indianische Großmaul.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 417. *der indische Bartvogel.*

Latham, Syn. Supplem. p. 97. Indian Barbet.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 205. n. 14. Bucco (Indicus) viridis, supra albus striis viridibus, capite

(9) Nach Latham gehört hierher auch der *Cuculus Tranquillus* p. 417. n. 38. und der *Corvus Australis* p. 377. n. 45. des Linneischen Systems, und die daselbst angeführten Synonymen.

capite nigro, fronte iuguloque rubris, genis,
gula maculaque pectoris flavis.

2. *Das braunrothe indianische Großmaul mit blauen
Flügeln und Schwanz.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 207. n. 19. Bucco
(Gerini) rufus, pectore albido, capite superio-
re, dorso, alis caudaque caeruleis, macula ver-
ticis, gula iuguloque nigris.

Gerin. ornith. II. p. 51. Tab. 181. Picus indi-
cus magna ex parte caeruleus.

57. GESCHLECHT. CUCULUS. *Der Kuckuck.*

Müller, Natursystem, II. p. 205. Gen. LVII.

Leske, Naturgesch. p. 247. Gen. XXVII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 124. Gen. XV.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 177.
Gen. XXV.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 354. Gen. XIV.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 484.
Gen. VIII.

Halle, Vögel, p. 148 ff.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 252.

Neuer Schauplatz der Natur, IV. p. 852 ff.

Onomat. hist. nat. III. p. 480 sqq.

Klein, av. p. 29. Gen. III.

Briffon, ornith. II. p. 70. Gen. L.

Batsch, Thiere, I. p. 316. 319. Gen. LXV.

Latham, allg. Uebersicht der Vögel, I. 2. p. 418.
Gen. XIX.

Latham, Syst. ornith. I. p. 207. Gen. XX.

Hermann, tab. affin. anim. p. 185.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 239.
Gen. XVIII.

I. CANORUS. *Der gemeine europäische Kuckuck.* ⁽¹⁰⁾
 Müller, Naturfyft. II. p. 305. n. 1. *gemeine eu-
 ropäische.*

Leske, Naturgesch. p. 247. n. 1. *der europäische
 Kuckuk.*

Borowsky,

(10) Ein unruhiger und scheuer Vogel, dessen Naturgeschichte von den ältesten Zeiten her mit vielen Fabeln durchwebt gewesen ist. Er hat einen schwimmenden kurzen, unterbrochenen und niedrigen Flug, liebt vorzüglich waldige Gegenden, wo in der Nähe Wiesen liegen, und leidet außer seinem Weibchen, in einem Bezirke von ohngefähr einer Stunde im Umfange, den beyde täglich gesellschaftlich durchstreichen, keinen seines Gleichen. Dafs das Weibchen des Kuckucks, (wenigstens in *Deutschland*) nicht selbst brüret, ist außer Zweifel, und es ist, *Barringtons* u. a. Behauptung ohnerachtet, nicht wahrscheinlich, dafs es sich in England u. s. w. anders verhalte. Die Ursache hievon scheint weder im äußern noch innern Bau des Vogels, sondern in seinem kurzen Aufenthalt in unsern Zonen, und im Ruf der Natur, eine zahlreiche Nachkommenschaft hervorzubringen, zu liegen. Eben so wird auch von den allermehesten Ornithologen einstimmig die Behauptung anderer verworfen, dafs der *Kuckuck* kleine Vögel verzehre, und also gewisser Mafsen als Raubvogel zu betrachten sey. In seinem Magen hat man Fliegen und Käfer von verschiedener Art, kleine Schnecken mit unzerbrochenen Häuschen, Grashüpfer, Raupen, Stückchen von Pferdebohnen, Weizen, kleine Wicken, und andre Pflanzentheile gefunden. So viel ist aber gewifs, dafs der ganz junge Kuckuck die mit ihm zugleich ausgekommenen Grasmücken sowohl, als die neben ihm liegenden Eyer aus dem Neste schiebt, welches er jedoch zu thun nachläßt, so wie er mehrere Tage älter wird. Das Kuckucksey wird in vierzehn Tagen ausgebrüet. In drey Wochen ist der junge Kuckuck flügge, und dann vergehen gewöhnlich noch fünf Wochen, ehe er allein fressen kann. Er wächst ungewöhnlich schnell. Seine Stimme gleicht, so lange er an seinem Geburtsorte verweilt, nie dem Gesang des erwachsenen Kuckucks. *Alte* sterben gleich in der Gefangenschaft.

- Borowsky*, Thierreich, II. p. 125. n. 2. *der gemeine Kuckuk.*
- Blumenbach*, Handb. der Naturgesch. p. 177. n. 1. Cuculus (Canorus) cauda rotundata, nigricante albo-punctata; *der Kuckuck.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 355. n. 1. *der gemeine Kuckuck.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 484. *der gemeine Kuckuck.* p. 595. *der europäische Kuckuck, aschgraue Kuckuck, singende Kuckuck, Guckguck, Guckgu, Gugug, Guckaug, Gugauck, Gukker, Guckufer, krain. Kukauza.*
- Funke*, Naturgesch. I. p. 328. *der Kukuk.*
- Ebert*, Naturl. II. p. 51. *der Guckguck.*
- Halle*, Vögel, p. 148. n. 89. *der gemeine Kuckuk.*
- Gatterer*, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 368. n. 295. *der Kuckuck.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 252. A. *der europäische Kukuk.*
- Beckmann*, Naturhist. p. 39. n. 2. *der gemeine Guckuck.*
- Neuer Schauplatz d. Natur, IV. p. 852. *Kukuk.*
- Onomat. hist. nat. III. p. 483. *der Kuckug, Guckauch, Gucker, Guckufer.*
- Handb. d. Naturgesch. II. p. 188. *der Kukuck.*
- Handbuch d. deutschen Thiergesch. p. 121. *der Kuckuck.*
- Klein*, av. p. 30. n. 1. Cuculus vulgaris, nostras.
- Klein*, Vorbereit. p. 57. n. 1. *Guckauch, Gucker, Guckufer.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 33. n. 1. *gemeiner Kuckuck.*
- Klein*, stemmat. av. p. 5. Tab. 4. fig. 5. a. b. c.
- Gesner*, Vögelb. p. 147. *Gucker*; mit 1 mittelm. Figur.

- Briffon*, ornitholog. II. p. 70. n. 1. Coucou.
- Batsch*, Thiere, I. p. 320. *der gemeine Kuckuk.*
- Latham*, Vögel, I. 2. p. 419. n. 1. *der gemeine Kuckuck.*
- Latham*, Syn. Suppl. p. 98. Common Cuckow.
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 207. n. 1. Cuculus (Canorus) cinereus subtus albidus fusco transversim striatus, cauda rotundata nigricante, albo punctata.
- Beseke*, Vögel Kurlands, p. 34. n. 52. *der gemeine europäische Kuckuk.*
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 304. n. 53. *gemeiner Guckguck.*
- Cetti*, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 86. *der Kuckuk.*
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 73. n. 63. *gemeiner Kuckuk.*
- White*, Naturgesch. von England, p. 33. n. 6. p. 59. n. 8. p. 69. p. 133. *der Kuckuk.*
- Pontoppidan*, Naturgesch. v. Dännemark, p. 167. *Giögen.*
- Pontoppidan*, Naturhistorie von Norwegen, II. p. 142. *Gög.*
- Fabricius*, Reis. n. Norwegen, p. 173. *der Kuckuk.*
- Pallas*, Reise d. Rufsl. III. p. 188. *der Kuckuk.*
- Pallas*, nord. Beyträge, III. p. 15. *der Kuckuk.*
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 43. n. 48. *der gemeine Kuckuk.*
- Linné*, auserles. Abhandl. II. p. 289. n. 65. *der gemeine Kuckuk.*
- Zorn*, Petinotheol. I. p. 360. II. p. 89. 126. 245. 553. 716. *der Guguck.*
- Döbel*, Jägerpraktik, I. p. 61. *Kuckuck.*
- Naumann*, Vogelsteller, p. 133. *Guckguk oder Kuckuk.*

- Naturforscher, IX. p. 48. n. 52. *gemeiner europäischer Guckguck.*
- Anweisung Vögel zu fangen, u. f. w. p. 267. *Guckgu.*
- Jablonsky, allgem. Lex. p. 562. *Kuckuck.*
- Geoffroy, mat. med. VII. p. 423. *der Kukkuk.*
- Lichtenberg u. Voigt, Magaz. f. d. Neueste u. f. w. I. 2. p. 15. — 3. p. 69. *der Kukkuk.*
- Bechstein, in Lichtenbergs u. Voigts Magaz. u. f. w. VI. 1. p. 60. *der gemeine aschgrane Kuckuck.*
- Jenner, in Lichtenbergs u. Voigts Magaz. u. f. w. VI. 4. p. 45. *Kukkuk.*
- Schwed. Abh. XXXVIII. p. 294. 296. *Guckkuck.*
- Tengmalm: neue schwed. Abhandl. IV. p. 46. *Guguck.*
- Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde, VII. p. 451. n. 18. *der gemeine europäische Guckguck.*
- Bechstein, Musterung schädli. Th. p. 107. n. 12. *der Kuckuk.*
- Goetze, nützl. Allerley, I. p. 27. II. p. 312. *der Kukkuk.*
- Beckmann, phys. ökon. Bibl. VII. p. 584. *der Kukkuk.*
- Oekonom. Zool. p. 207. *der Kuckuck.*
- Eberhard, Thiergesch. p. 105. *der Kukkuk.*
- Meidinger, Vorles. I. p. 118. *der europäische Kukkuk.*
- Loniceri, Kräuterbuch, p. 673. *Guckguck, Gutzgäuch, Gauch.*
- Merklein, Thierreich, p. 274. *Guckug.*
- Hamburg. Magazin, IV. p. 414. *Kukkuk.*
- Wirsing, Vögel, Tab. 38. 39. 40. *Kuckuck.*
- Neues bremisches Magazin, II. p. 102. (warum das Weibchen des Kukkuk nicht brütet?)

Heinfii, diff. de impio alite Cuculo. Witt. 1638.
4. pl. 3.

Vinhold, progr. de Cuculo. Cygn. 1711. fol.
pl. 1.

Le Coucou. Discours apologetique sur le Cou-
cou; par *Lottinger*. Nancy 1775. 8.

Der Kukuk, von H. A. I. *Lottinger*; a. d. Franz.
überfetzt. Strasb. 1776. 5½ B. kl. 8.

Clauder; Ephem. nat. cur. Dec. II. an. 7. obs. 172.
p. 330.

Comment. Lips. Dec. III. Suppl. p. 545.

Barchewitz, ostind. Reisebeschreib. L. 2. c. II.
p. 227.

Wiegand, de Cuculo, umbra nocturna, capella
coelesti, Bubone et Margarita. Regiomont.
1588. 4. 4½ Bogen.

Linne', Syst. Natur. Edit. II. p. 53. Cuculus.

Linne', Syst. Nat. Edit. VI. p. 20. n. 1. Cuculus.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 110. n. 1. Cu-
culus (Canorus) cauda aequali nigricante, albo
punctata.

Müller, zool. dan. prodr. p. 12. n. 95. Cuculus
(Canorus) cauda rotundata nigricante, albo-
punctata.

Kramer, Austr. p. 337. n. 1. Cuculus rectricibus
nigricantibus, punctis albis.

Brünnich, ornithol. bor. p. 10. n. 36. *Cuculus Ca-
norus*.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 249. Cuculus; ein Ku-
ckuck, Guckauch, Gucker. p. 251. Cuculus
iunior; ein junger Kuckuck.

Moehring, av. gen. p. 34. n. 12. Cuculus.

Schaefer, elem. ornith. Tab. 31.

Gerin. ornith. I. p. 80. Tab. 67. 69.

Fonston, av. p. 26. Cuculus.

Plin. hist. nat. L. X. c. 9. Coccyx.

Aristot. hist. anim. L. VI. c. 4. n. 14. Κοκκυξ.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 239. n. 1.
der gemeine europäische Kuckuck.

β. Der rothbraune Kuckuck.

Bechstein, Naturgesch. p. 359. n. 2. der braunrothe Kuckuck?

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 495. n. 2. der rothbraune Kuckuck. Tab. 18?

Bechstein, Musterung schäd. Th. p. 108. n. 13. der rothbraune Kuckuck?

Bechstein, in Lichtenbergs u. Voigts Magaz. u. s. f. VI. 1. p. 69. n. 2. der braune Kuckuck?

Briffon, ornitholog. II. p. 72. A. Coucou roux.

Frisch, Vögel, Tab. 42.

Latham, Vögel, I. 2, p. 423. n. 1. Var. der braunrothe Kuckuck.

Latham, Vögel, I. 2. p. 449. n. 49. der rothbraune Kuckuck?

Latham, Vögel, I. 2. p. 449. n. 49. der rothbraune Kuckuck?

Latham, Syn. II. p. 512. n. 1. A. Rufous Cuckow.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 208. n. 1. β. Cuculus rufus.

Gerin. ornith. I. p. 80. Tab. 68. Cuculus ex rufo et albo varius.

γ. Der aschgraue Kuckuck. (1)

Beseke, Naturgesch. d. Vögel Kurl. p. 34. n. 53-54. p. 36. Cuculus cinereus.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 208. n. 1. γ. C. griseo-undulatus, rectricibus intermediis ordi-

ne

(1) Beseke hält ihn für eine ganz eigene Gattung.

ne punctorum alborum duplici notatus, rostro, orbitis pedibusque sulphureis.

23. CAPENSIS. *Der Kuckuck vom Cap.*

Müller, Naturfyft. Suppl. p. 90. n. 23. *der caap-
sche Guckuck.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 856. n. 15. *kap-
scher Kuckuck.*

Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffnung, Edit. in 4. p. 40.
n. 25. *der Edolio?*

Latham, Vögel, I. 2. p. 424. n. 2. *der capische
Kuckuck.*

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 208. n. 2. Cuculus
(Capensis) viridi-fuscus, collo subtus tectrici-
busque alarum rufis, corpore subtus albo, ni-
gro transversim lineato, cauda rufa, api-
ce alba.

2. ORIENTALIS. *Der orientalische Kuckuck.*

Müller, Naturfyftem, II. p. 208. n. 2. *der asia-
tische Guckguck.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 855. n. 2. *der
ostindische Kuckuck.*

Onomat. hist. nat. III. p. 491. *der schwarze in-
dianische Kuckug.*

Briffon, ornitholog. II. p. 81. n. 18. *Coucou noir
des Indes.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 427. n. 10. *der orien-
talische schwarze Kuckuk.*

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 210. n. 10. Cu-
culus (Orientalis) cauda rotundata, corpore
nigro-virente nitente, rostro fusco.

β. Latham, Vögel, I. 2. p. 427. n. 10. Var. A.

Latham, Syn. II. p. 518. n. 10. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 210. n. 10. β .
Cuculus caeruleo-nigricante nitens, remige
extima brevior.

3. MINDANENSIS. *Der Kuckuck von Mindanao.*

Müller, Natursystem, II. p. 209. n. 3. *Philippinische.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 855. n. 3. *der Gefleckte aus Mindanao.*

Onomat. histor. nat. III. p. 495. *der gefleckte Kuckuck von Mindanao.*

Briffon, ornithol. II. p. 77. n. 12. Coucou tacheté de Mindanao.

Latham, Vögel, I. 2. p. 425. n. 5. *der mindanaische Kuckuck.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 209. n. 5. Cuculus (Mindanensis) cauda rotundata, corpore viridi-aureo, fusco-albo maculato, subtus albo-nigricante undulato.

Gerin, ornith. I. p. 82. Tab. 76.

4. VETULA. *Der langschnäblichte jamaicaische Kuckuck.* (Tacco.)

Müller, Naturyst. II. p. 209. n. 4. *Langschnabel.*

Neuer Schaupl. d. Natur, IV. p. 856. n. 4. *Langschnabel.*

Onomat. hist. nat. III. p. 490. *der langschnäblichte Kuckuck von Jamaica.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 747. *das alte Weib.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 369. *der Langschnabel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 129. n. 3. *der langschnäblichte Kuckuck.*

Klein, av. p. 31. n. 8. *Sloan*, Fig. 2.

Klein, Vorbereit. p. 59. n. 8. *Sloan*, Fig. 2.

Klein,

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 33. n. 8. *noch eine andere Art.*

Briffon, ornithol. II. p. 74. n. 5. Coucou à long bec de la Jamaïque.

Latham, Vögel, I. 2. p. 440. n. 32. *der Takko.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 218. n. 36. Cuculus (Vetula) cauda cuneiformi, corpore ſubfulco, ſubtus teſtaceo, ciliis rubris.

Linné, Syſt. Nat. Edit. X. I. p. III. n. 3. Cuculus (Vetula) cauda cuneiformi, corpore ſubfulco, ſubtus teſtaceo, ciliis rubris.

Gerin. ornith. I. p. 83. Tab. 79.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 186. Cuculus longiroſtris. — Cuculus Vetula.

Donndorff, Handbuch der Thiergeſch. p. 240. n. 2. *der langſchnäblichte Kuckuck.*

24. PLUVIALIS. *Der große jamaicaische Kuckuck.*

Halle, Vögel, p. 157. n. 95. *der große Kukuk aus Jamaika.*

Klein, av. p. 31. n. 8. Cuculus jamaicensis maior.

Klein, Vorbereit. p. 59. n. 8. *der Große von Jamaika.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 33. n. 8. *jamaicaischer Kuckuck.*

Briffon, ornith. II. p. 73. n. 4. Coucou de la Jamaïque.

Latham, Vögel, I. 2. p. 441. n. 33. *der Regenkuckuk.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 218. n. 37. Cuculus (Pluvialis) cauda cuneiformi, corpore cinereo-olivaceo, ſubtus rufo, collo inferiore albo, reſtricibus lateralibus nigris, extimis lateribus interiore, omnibus apice albis.

25. MINOR. *Der kleine cayennische Kuckuck.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 442. n. 34. *der kleine Kuckuk.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 219. n. 38. Cuculus (Seniculus) cauda cuneiformi brevior, corpore cinereo, subtus rufescente, gula alba.
5. GLANDARIUS. *Der Kuckuck von Andalusien.*
Müller, Naturyst. II. p. 210. n. 5. *der Afrikanische.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 125. n. 1. *der africanische, andalusische Kuckuck.* Tab. 15.
Halle, Vögel, p. 157. n. 92. *der gelbbäuchige Kuckuk mit liegendem Federbusche.*
 Neuer Schaupl. d. Natur, IV. p. 856. n. 7. *spanischer Kuckuck.*
 Onomat. hist. nat. III. p. 489. *der gefleckte Kuckuk von Andalusien.*
Klein, av. p. 3. n. 5. Cuculus Andalusiae.
Klein, Vorbereit. p. 58. n. 5. *der Kuckuck von Andalusien.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 33. n. 5. *andalusischer Kuckuck.*
Klein, verbesserte Vögelhist. p. 33. n. 9. *pyrenäischer Kuckuck.*
Briffon, ornith. II. p. 76. n. 10. Coucou d'Andalousie.
Seligmann, Vögel, III. Tab. 9. *der große gefleckte Kuckuk.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 424. *der große gefleckte Kuckuk.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 208. n. 3. Cuculus (Glandarius) cauda cuneiformi, capite subcristato, alis albo et cinerascens maculatis, fascia oculari nigra.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. III. n. 4. Cuculus
(Glandarius) cauda cuneiformi, capite subcri-
stato, fascia oculari nigra.

Gerin. ornith. I. p. 81. Tab. 70.

26. SERRATUS. *Der schwarze gehäubte Kuckuck.* (2)
Latham, Vögel, I. 2. p. 428. n. II. *der schwar-
ze gehäubte Kuckuk.*

Latham, Syn. II. p. 519. n. II. Crested black
Cuckow.

Latham, Syn. Supplem. p. 100. Crested black
Cuckow.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 211. n. 12. Cuculus
(Serratus) cauda cuneiformi, capite cristato,
corpore nigro nitido, macula alarum ferrati-
formi alba.

27. TAHITIUS. *Der Kuckuck vom stillen Ocean.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 424. n. 4. *der otahei-
tische Kuckuk.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 209. n. 4. Cucu-
lus (Taitensis) fuscus ferrugineo maculatus,
subtus candidus longitudinaliter fusco striatus,
cauda cuneiformi, fasciis sublunatis ferrugineis.

Mus. Carlf. fasc. II. Tab. 32. Cuculus taitensis.

6. SENEGALENSIS. *Der senegalische Kuckuck.*

Müller, Natur Syst. II. p. 210. n. 6. *der Senegal-
lische.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 129. n. 4. *der se-
galische Kuckuk.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 856. n. 6. *se-
galischer Kuckuck.*

Onomat. histor. nat. III. p. 496. *der Kuckuk vom
Senegal.*

Briffon,

(2) Ist nach *Latham* mit *Cuculus Ater* p. 415. n. 35. einerley.

Briffon, ornitholog. II. p. 75. n. 7. Coucou du Sénégal.

Latham, Vögel, I. 2. p. 433. n. 18. *der senegalische Kuckuck*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 213. n. 19. Cuculus (Senegalensis) cauda cuneiformi, corpore griseo subtus albo, pileo rectricibusque nigricantibus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 186. Cuculus Senegalensis.

28. BENGALENSIS. *Der bengalische Kuckuck*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 433. n. 19. *der bengalische Kuckuck*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 214. n. 20. Cuculus (Bengalensis) cauda cuneiformi, corpore ferrugineo, albo nigroque longitudinaliter striato, abdomine fusco-flavescente, remigibus rectricibusque lateralibus rufis nigro-fasciatis.

7. HONORATUS. *Der malabarische Kuckuck*. Cuil.

Müller, Naturfyst. II. p. 210. n. 7. *der Malabarische*. Tab. 7. fig. 4.

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 856. n. 7. *bunter Kuckuck*.

Briffon, ornitholog. II. p. 79. n. 15. Coucou tacheté de Malabar.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 214. n. 21. Cuculus (Honoratus) cauda cuneiformi, corpore nigricante albo-maculato, subtus albo cinereoque fasciato.

Ess. philosoph. p. 68. Cuil.

8. PUNCTATUS. *Der schwärzliche, braunroth punctirte Kuckuck*.

Müller, Naturf. II. p. 211. n. 8. *der Gesprenkelte*.

Neuer

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 856. n. 8. *gesprenkelter Kuckuck.*

Onomat. hist. nat. III. p. 491. *der gefleckte indianische Kuckug.*

Brisson, ornitholog. II. p. 79. n. 14. Coucou tacheté des Indes.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 210. n. 8. Cuculus (Punctatus) cauda cuneiformi, corpore nigricante rufo-punctato, subtus rufo striis nigris, rectricibus fusco-fasciatis.

29. PANAYANUS. *Der schwarzbraune gefleckte Kuckuck von der Insel Panay.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 426. n. 9. *der panayische Kuckuck.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 210. n. 9. Cuculus (Panayus) cauda integra, corpore fusco, rufo-flavo maculato, subtus caudaque rufo-nigro fasciata, gula nigra maculis flavis.

9. NAEVIUS. *Der gefleckte Kuckuck von Cayenne.*

Müller, Natursystem, II. p. 211. n. 9. *der Gefleckte.*

Neuer Schaupl. d. Nat. IV. p. 856. n. 9. *gestreifter Kuckuck.*

Onomat. histor. nat. III. p. 187. *der gefleckte Kuckug von Cayenne.*

Brisson, ornitholog. II. p. 77. n. 11. Coucou tacheté de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 443. n. 38. *der gesprenkelte Kuckuck.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 220. n. 42. Cuculus (Naevius) cauda cuneiformi, corpore fusco-ferrugineo, iugulo striis fuscis, rectricibus apice rufescentibus.

β. *Latham*, Syft. ornitholog. I. p. 220. n. 42. β.
C. gula grifea, rectricibus lateralibus apice abdomineque albis.

Latham, Vögel, I. 2. p. 444. ad n. 38.

30. PUNCTULATUS. *Der braune, röthlich punctirte Kuckuck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 426. n. 8. *der rothgefleckte Kuckuck.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 220. n. 43. Cuculus (Punctulatus) cauda cuneiformi, corpore fusco nitente, maculis rufescentibus, abdomine criffoque albidis.

31. RIDIBUNDUS. *Der Lachkuckuck.*

Onomatol. hist. nat. VI. p. 737. *der mexicanische Gukuk.*

Briffon, ornithol. II. p. 74. n. 6. Coucou du Mexique.

Latham, Vögel, I. 2. p. 443. n. 37. *der Lachkuckuck.*

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 220. n. 41. Cuculus (Ridibundus) fulvus, subtus niger, collo subtus pectoreque cinereis, rectricibus fulvo-nigricantibus.

Jonston, av. p. 172. Quapachtotl.

32. GUIRA. *Der braslianische gehäubte Kuckuck.*

Onomat. histor. nat. III. p. 483. *der braslianische roth gehäubte Kuckug.*

Briffon, ornithol. II. p. 81. n. 19. Coucou hupé du Brésil.

Latham, Vögel, I. 2. p. 442. n. 36. *der gehäubte braslianische Kuckuck.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 219. Cuculus (Guira) albo-flavescens cristatus, capite, collo, tetrici-

stricibusque alarum fusco flavescenteque variis,
rectricibus fuscis, apice albis.

Halle, Vögel, p. 159. n. 97. *der americanische Halbspecht.*

Jonston, av. p. 210. Guira Acangatara.

Moehring, av. gen. p. 85. n. 14. Trogon.

10. AMERICANUS. *Der karolinische Kuckuck.*

Müller, Naturfyft. II. p. 211. n. 10. *der Americanische.*

Halle, Vögel, p. 156. n. 9. *der graue Kuckuck aus Carolina.*

Neuer Schauplatz der Natur, IV. p. 856. n. 10. *westindischer Kuckuck.*

Onomat. hist. nat. III. p. 479. *der americanische Kuckuck.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 251. n. 71. *der carolinische Kuckuck.*

Klein, av. p. 30. n. 2. Cuculus Carolinensis.

Klein, Vorbereit. p. 57. n. 2 *der Caroliner.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 33. n. 2. *Caroliner.*

Briffon, ornitholog. II. p. 73. n. 3. Coucou de la Caroline.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 18. *der Guckguck aus Carolina.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 442. n. 35. *der carolinische Kuckuck.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 219. n. 39. Cuculus (Americanus) cauda cuneiformi, corpore supra cinereo subtus albo, maxilla inferiore lutea.

Linné, auserl. Abh. II. p. 279. n. 3. *der americanische Kuckuck.*

Schlözer, Erdbeschreib. von Amerika, p. 281. *Kuckucke.*

Linné,

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. III. n. 7. Cuculus (Americanus) cauda cuneiformi, corpore supra cinereo, subtus albo, maxilla inferiore lutea.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 240. n. 2. *der carolinische Kuckuck.*

II. SCOLOPACEUS. *Der Schnepfenkuckuck.*

Müller, Naturyst. II. p. 211. n. II. *der Stachelschnabel.*

Neuer Schaupl. der Nat. IV. p. 856. n. II. *Schnepfenkuckuck.*

Onomat. histor. nat. III. p. 496. *der schwarze Kuckug von Benghala.*

Klein, av. p. 31. n. 7. Cuculus bengalensis, ex fusco, rufo et cinereo, a capite ad caudam varius.

Klein, Vorbereit. p. 59. n. 7. *der braune von Bengalu.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 33. n. 7. *größerer bengalischer Kuckuck.*

Briffon, ornithol. II. p. 78. n. 13. Coucou tacheté de Bengale.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 13. *der braune, gefleckte indianische Guckguck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 425. n. 6. *der indianische gefleckte Kuckuk.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 269. n. 6 Cuculus (Scolopaceus) cauda cuneiformi, corpore undique griseo fuscoque nebuloso.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. III. n. 5. Cuculus (Scolopaceus) cauda cuneiformi, corpore undique griseo fuscoque nebuloso.

33. MACULATUS. *Der gefleckte chinesische Kuckuck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 425. n. 7. *der chinesische gefleckte Kuckuck.*

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 209. n. 7. Cuculus (Maculatus) cauda elongata, corpore viridi-griseo, fusco nitente albo variegato, subtus fasciato, capite nigro.

12. NIGER. *Der schwarze bengalische Kuckuck.* (3)

Müller, Naturfyst. II p. 212. n. 12. *der Schwarze.*

Halle, Vögel, p. 157. n. 93. *der schwarzblaue Kuckuk.*

Neuer Schauplatz der Natur, IV. p. 856. n. 12. *schwarzer Kuckuck.*

Onomat. histor. nat. III. p. 495. *der schwarze Kuckug von Benghala.*

Klein, av. p. 31. n. 6. Cuculus ex caerulescente niger, rostro flavo, pedibus brevibus fordide luteis; Bengalensis.

Klein, Vorbereit. p. 59. n. 6. *der blauschwarze Kuckuck.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 33. n. 6. *bengalischer Kuckuck.*

Briffon, ornithol. II. p. 80. n. 17. Coucou noir de Bengale.

Seligmann, Vögel, III. Tab. II. *der schwarze indianische Guckuck.*

Latham, Syn. II. p. 519. B. Black Indian Cuckow.

Latham, Vögel, I. 2. p. 427. n. 10. Var. B. *der schwarze Kuckuck.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 211. n. 10. γ. Cuculus cauda cuneiformi, corpore nigro, rostro flavo.

Ess. philosoph. p. 68. Coukeel.

Gerin. ornith. I. p. 82. Tab. 72.

Linné,

(3) Nach *Latham* eine Varietät von *Cuculus Orientalis* p. 410. n. 2.

Linne', Syft. Nat. Edit. X. I. p. III. n. 6. Cuculus (Niger) cauda cuneiformi, corpore nigro nitido, rostro flavo.

34. *ATER.* *Der schwarze Kuckuck vom Vorgeb. der guten Hoffnung.*

Ist nach *Latham* mit *Cuculus Serratus* p. 212. n. 26. einerley.

35. *MELANOLEUCOS.* *Der schwarz- und weiße Kuckuck von Coromandel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 429. n. 12. der gehäubte coromandelsche Kuckuk.

Latham, Syft. ornithol. I. p. 211. n. 13. Cuculus (Melanoleucos) cauda cuneiformi, capite cristato, corpore supra nigro, subtus, macula alarum rectricibusque apice albis.

36. *PISANUS.* *Der Kuckuck von Pisa.* (4)

Latham, Vögel, I. 2. p. 429. n. 13. der pifaische Kuckuk.

Latham, Syft. ornithol. I. p. 211. n. 14. Cuculus (Pisanus) cauda cuneiformi, capite cristato, corpore nigro alboque vario, subtus albo, gula, pectore, crisso remigibusque rufis.

Gerin. ornithol. I. p. 81. Tab. 71. Cuculus ex nigro et albo mixtus.

37. *MADAGASCARIENSIS.* *Der olivenfarbige Kuckuck von Madagascar.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 429. n. 37. der große madagascarische Kuckuk.

Latham,

(4) Dieser Kuckuck hat ein einziges Mal im Jahr 1739. in den Hecken um Pisa genistet, und vier Junge ausgebracht. Seit der Zeit hat man ihn nicht weiter beobachtet.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 212. n. 15. Cuculus (Madagascariensis) olivaceus fusco undulatus, gula lutescente, pectore abdomineque antice fulvis, cauda cuneiformi, rectricibus lateralibus apice albis.

β. *Latham*, Syn. II. p. 521. n. 15. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 430. n. 14. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 212. n. 15. β. C. olivaceus fusco undulatus, subtus fulvus, pileo nigro, vertice nudo caeruleo rugoso.

13. DOMINICUS. *Der Kuckuck von St. Domingo.*

Müller, Natursystem, II. p. 212. n. 13. *der Antillische.*

Neuer Schaupl. d. Nat. IV. p. 856. n. 13. *dominogischer Kuckuck.*

Onomat. histor. nat. III. p. 488. *der Kuckug von St. Dominique.*

Briffon, ornitholog. II. p. 72. n. 2. *Coucou de S. Domingue.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 445. n. 40. *der Kuckuck von St. Domingo.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 221. n. 44. Cuculus (Dominicanus) cauda cuneiformi, corpore griseo-fusco, subtus albedo, rectricibus lateralibus tribus apice albis.

14. CAYANUS. *Der dunkelpurpurfarbene cayennische Kuckuck.*

Müller, Naturyst. II. p. 212. n. 14. *der Cayennische.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 856. n. 14. *cayennischer Kuckuck.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 487. *der Kuckug von Cayenna.*

Briffon, ornitholog. II. p. 75. n. 8. Coucou de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 445. n. 41. *der cayennische braune Kuckuck.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 221. n. 45. Cuculus (Cayanus) cauda cuneiformi, corpore castaneo-purpurascente, subtus cinereo, rectricibus omnibus apice albis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 185. Cuculus cayanus.

β. *Der kleinere cayennische Kuckuck.* (5)

Onomat. hist. nat. III. p. 487. Cuculus cayennensis minor.

Briffon, ornitholog. II. p. 76. n. 9. Petit Coucou de Cayenne.

Latham, Syn. II. p. 542. n. 41. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 221. n. 45. β.

Latham, Vögel, I. 2. p. 445. n. 41. Var. A.

γ. *Der rothschnäblichte cayennische Kuckuck.*

Latham, Syn. II. p. 543. n. 41. B.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 221. n. 45. γ.
Cuculus subtus cinereo niger, capite cinereo, gula pectoreque rufis, rostro rufo.

Latham, Vögel, I. 2. p. 446. n. 41. Var. B.

38. TRANQUILLUS. *Der schwarze cayennische Kuckuck.*

Soll, nach *Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 206. n. 18. mit *Bucco calcaratus*, oder *Bucco cinereus* *Linn.* p. 409. n. 7. einerley seyn.

39. TENE-

(5) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

39. TENEBROSUS. *Der kleine schwarze surinamische Kuckuck.*

Lichtenberg, Magaz. f. d. Neueste u. f. w. II. 1. p. 116. *der kleine schwarze Kukuk aus Surinam.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 446. n. 43. *der geschäckte cayennische Kuckuck.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 221. n. 46. Cuculus (Tenebrosus) cauda cuneiformi, (*das ist er aber nach Pallas Abbildung nicht*) corpore nigro, dorso infimo, uropygio, abdomine, criffo femoribusque albis, fascia pectorali fulva. (*Auch dies finde ich an Pallas Abbild. nicht.*)

40. PYRRHOCEPHALUS. *Der rothköpfige zeylanische Kuckuck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 447. n. 44. *der rothköpfige Kuckuk.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 222. n. 47. Cuculus (Pyrrhocephalus) cauda cuneiformi longissima, corpore nigro, pectore abdomineque albis, pileo genisque coccineis.

Naturforsch. I. p. 269. n. 6. *der Kuckuck mit rothem Kopfe.*

Berlin. Samml. IX. p. 192. n. 6. *der rothköpfige Kukuk von Zeylon.*

Neueste Mannichfalt. I. p. 188. n. 6. *der rothköpfige Kukuk von Zeylon.*

15. CAERULEUS. *Der blaue Kuckuck von Madagascar.*

Müller, Naturyst. II. p. 213. n. 15. *der Blaue.*

Neuer Schauplatz der Natur, IV. p. 856. n. 18. *der blaue Kuckuck.*

Onomat. histor. nat. III. p. 493. *der blaue Kuckug von Madagascar.*

Briffon, ornithol. II. p. 85. n. 26. Coucou bleu de Madagascar.

Latham, Vögel, I. 2. p. 437. n. 29. *der blaue madagascarische Kuckuk.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 217. n. 33. Cuculus (Caeruleus) cauda rotundata, corpore caeruleo.

Gerin, ornith. I. p. 82. Tab. 78.

16. SINENSIS. *Der blaue chinesische Kuckuck.*

Müller, Naturfyft. II. p. 213. n. 16. *der Chinesische.*

Neuer Schaupl. d. Natur, IV. p. 856. n. 19. *chinesischer Kuckuck.*

Onomat. hist. nat. III. p. 497. *der blaue Kuckug aus China.*

Briffon, ornithol. II. p. 85. n. 27. Coucou bleu de la Chine.

Latham, Vögel, I. 2. p. 437. n. 28. *der blaue chinesische Kuckuk.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 217. n. 32. Cuculus (Sinensis) cauda cuneiformi longa, corpore caeruleo, subtus albo, rectricum apicibus macula alba.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 186. Cuculus Sinensis.

Gerin. ornith. I. p. 83. Tab. 80.

41. AFER. *Der afrikanische Kuckuck.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 494. *der große Kuckug von Madagascar.*

Briffon, ornitholog. II. p. 96. n. 28. grand Coucou de Madagascar.

Latham, Vögel, I. 2. p. 438. n. 30. *der afrikanische Kuckuk.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 217. n. 34. Cuculus (Afer) viridi - aeneus, subtus griseus, capite

pite colloque cinereis, vertice splendide nigro, cauda subtus nigra.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 186. Cuculus discolor. *Vourou-driou*.

β. *Briffon*, ornitholog. II. p. 86. n. 28. Femina.

Büsson, pl. enl. 588. Femelle du grand Coucou de Madagascar.

Latham, Vögel, I. 2. p. 438. n. 30. Var. A.

Latham, Syn. II. p. 532. n. 30. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 217. n. 34. β.

Cuculus corpore supra cum capite fusco rufoque striato, subtus rufescente, maculis nigricantibus, rectricibus fuscis, apice rufis.

42. INDICATOR. *Der Honigkuckuck.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 130. n. 6. *der Honigkuckuk, Honigzeiger.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 178. n. 2.

Cuculus (Indicator) cauda cuneiformi, fusco-et albido-maculata, alis fuscis maculis flavis, pedibus nigris; *der Honigkuckuck, Sengo, Mook.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 359. n. 3. *der Honigkuckuck.*

Batsch, Thiere, I. p. 320. *der Honigkuckuk vom Cap.*

Funke, Naturgesch. I. p. 329. *der Honigkuckuk.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 369. n. 297. *der Honigkuckuk.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 439. n. 31. *der Honigkuckuk.*

Latham, Syn. Suppl. p. 103. Honey-Cuckow.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 218. n. 35. Cuculus (Indicator) cauda cuneiformi, corpore ferrugineo-griseo, subtus albido, humeris macula

flava, rectricibus tribus exterioribus basi macula nigra.

Sparrmann, Reise n. d. Vorgeb. der g. Hoffn. p. 482 - 487. *der Bienen-verräther-kukuk.*

Le Vaillant, Reis. n. Afrika, I. p. 296. *Honigweiser.*

Allamand u. Klockner, Vorgeb. d. g. Hoffn. III. p. 123.

Sander, über die Gröfse u. Schönheit in der Nat. II. p. 73. *Honigweiser.*

Goeze, nützl. Allerley, II. p. 365. n. 6. *der Honigkukuk.*

Hannöv. Magaz. 1779. p. 1039. *Honigkukuk.*

Gent. Magaz. XLVII. p. 468. *Honey-Guide.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 186. C. Indicator.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 240. n. 4. *der Honigkuckuck.*

17. PERSA. *Der Touraco.*

Müller, Natursystem, II. p. 213. n. 17. *der Persianer.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 130. n. 5. *der persische oder mexikanische gehäubte Kukuk.*
Tab. 15.

Neuer Schaupl. d. Natur, IV. p. 856. n. 19. *Touraco.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 543. *der grüne Gukuk aus Guinea mit dem Federbusch.*

Halle, Vögel, p. 172. n. 113. *der guineische Kronvogel.*

Klein, av. p. 36. *Touraco.*

Klein, Vorbereit. p. 69. *Kronvogel.*

Klein, verbeff. Vögelhist. p. 37. *Kronvogel.*

Brisson, ornithol. II. p. 84. n. 24. *Coucou verd hupé de Guinée.*

Batsch,

Batsch, Thiere, I. p. 320. *der guineische Kronenvogel.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 13. *der Touraco.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 447. n. 46. *der Turako.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 222. n. 49. Cuculus (Perfa) cauda aequali, capite cristato, corpore viridi-caerulescente, remigibus fanguineis.

Scopoli, an. hist. I. n. 49. Cuculus Perfa.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 44. n. 49. *der Kronvogel.*

Lichtenbergs u. *Voigts* Mag. f. d. Neueste u. f. w. VII. 2. 120. *Tourako.*

Le Vaillant, Reise nach Afrika, II. p. 112. *Tourako.*

Pallas, nord. Beytr. III. p. 3. n. c. *Tourako.*

Bossmann, Guin. p. 271. fig. 12.

Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. III. n. 2. Cuculus (Perfa) cauda aequali, capite crista erecta, remigibus primoribus rubris.

Moehring, av. gen. p. 81. n. 106. Cuculo adfinis.

Gerin. ornith. I. p. 82. Tab. 73.

Hermann, tab. affin. anim. p. 186. Cuculus Perfa.

18. BRASILIENSIS. *Der rothe brasilianische Kuckuck.*

Müller, Natursyst. II. p. 214. n. 18. *der Brasilianische.*

Neuer Schaupl. d. Natur, IV. p. 857. n. 21. *brasilianischer Kuckuck.*

Onomat. histor. nat. III. p. 483. *der brasilianische rothgehaubte Kuckuck.*

Brisson, ornith. II. p. 84. n. 25. Coucou rouge hupé du Brésil.

Latham, Vögel, I. 2. p. 447. n. 45. *der rothe brasilianische Kuckuck.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 222. n. 48. Cuculus (Brafiliensis) cauda subaequali, capite cristato, corpore rubro, remigibus flavescens.

Moehring, av. gen. p. 80. n. 103. Columbae ad finis.

Hermann, tab. affin. anim. p. 185. Cuculus brafilienfis.

19. CRISTATUS. *Der gehäubte madagascarishe Kuckuck.*

Müller, Natursystem, II. p. 214. n. 19. *der Haubenguckguck.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 857. n. 22. *gehaubter Kuckuck.*

Onomat. hist. nat. III. p. 490. *der gehaubte Kuckug von Madagascar.*

Briffon, ornitholog. II. p. 85. n. 22. *Coucou hupé de Madagascar.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 430. n. 15. *der gehäubte madagascarishe Kuckuck.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 212. n. 16. Cuculus (Cristatus) cauda rotundata, capite cristato, corpore cinereo-virescente, abdomine rufo-albo, rectricibus lateralibus apice albis.

Gerin. ornithol. I. p. 83. Tab. 77.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 186. Cuculus Cristatus.

43. AEGYPTIUS. *Der ägyptische Kuckuck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 430. *der ägyptische Kuckuck.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 212. n. 17. Cuculus (Aegyptius) cauda cuneiformi, corpore viridifusco, subtus rufo-albo, capite, cervice caudaque viridi-chalybeis, alis rufis.

β. *Der glänzend schwarze Kuckuck mit fuchsrothen Flügeln.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 431. n. 16. Var. A.

Latham, Syn. II. p. 523. n. 16. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 213. n. 17. β. C. splendide niger, alis rufis.

γ. *Der Kuckuck mit kastanienbraunen Flügeln.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 431. n. 16. Var. B.

Latham, Syn. II. p. 523. n. 16. B.

Latham, Syn. Supplem. p. 100.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 213. n. 17. γ. C. viridi-nigricans, alis rubro-fuscis, cauda nigra, ungue postico-interiore recto subulato.

44. **RADIATUS.** *Der schwarzbraune Kuckuck, mit gelbem schwarz gestreiften Bauche.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 434. n. 21. *der panayische gestreifte Kuckuck.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 214. n. 22. Cuculus (Radiatus) fusco-nigricans, genis gulaque vinaceis, pectore abdomineque flavescens nigro fasciatis, rectricibus nigris albo fasciatis.

45. **FLAVUS.** *Der gelbbüchige Kuckuck von Panay.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 434. n. 22. *der gelbbüchige Kuckuck.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 215. n. 26. Cuculus (Flavus) cauda cuneiformi, corpore pallide fusco, subtus rufo-flavescente, pileo gulaque cinereis, rectricibus nigris albo-fasciatis.

46. **AURATUS.** *Der goldgrüne Kuckuck vom Cap.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 435. n. 23. *der Goldkuckuk.*

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 215. n. 27. Cuculus (Auratus) cauda cuneiformi, corpore supra viridi-aureo, subtus albo, capite striis quinque albis, rectricibus 2. extimis latere exteriori, omnibus apice albis.

47. LUCIDUS. *Der neuseeländische Kuckuck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 435. n. 24. *der glänzende Kuckuk.* Tab. 26.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 215. n. 28. Cuculus (Lucidus) fulgidus, cauda subaequali, corpore supra viridi-aureo, subtus albicante viridi-aureo fuscoque undulato.

20. COROMANDUS. *Der schwarze Kuckuck mit weißem Halsbande von Coromandel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 214. n. 20. *der Coromandelische.* Tab. 7. fig. 2.

Neuer Schauplatz der Natur, IV. p. 857. n. 23. *Koromandelscher.*

Onomat. hist. nat. III. p. 488. *der gehaubte Kuckug von Coromandel.*

Briffon, ornithol. II. p. 82. n. 21. *Coucou hupé de Coromandel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 436. n. 26. *der Kuckuck mit dem Halsbande.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 216. n. 30. Cuculus (Coromandus) cauda cuneiformi, capite cristato, corpore nigro, subtus torquaque collaris albo.

Gerin. ornith. I. p. 82. Tab. 74.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 186. Cuculus Coromandus.

21. CORNUTUS. *Der gehörnte Kuckuck.*

Müller, Naturf. II. p. 214. n. 21. *der Gehörnte.*

Neuer

Neuer Schaupl. der Nat. IV. p. 857. n. 24. *gehörnter Kuckuck.*

Onomat. histor. nat. III. p. 482. *der gehörnte Kuckug.*

Briffon, ornithol. II. p. 82. n. 20. Coucou cornu du Brésil.

Latham, Vögel, I. 2. p. 436. n. 27. *der gehörnte Kuckuk.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 216. n. 31. Cuculus (Cornutus) cauda cuneiformi, capite crista bifida, corpore fuliginoso, cauda apice alba.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 186. Cuculus cornutus.

Jonston, av. p. 210. Atinguacu camacu.

22. PARADISEUS. *Der siamische Kuckuck.*

Müller, Naturfyft. II. p. 215. n. 22. *der Siamische.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 857. n. 25. *der siamische Kuckuck.*

Onomat. hist. nat. III. p. 496. *der grüne gehaubte Kuckug von Siam.*

Briffon, ornithol. II. p. 83. n. 23. Coucou verd hupé de Siam.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 216. n. 29. Cuculus (Paradiseus) caudae rectricibus binis longissimis, apice dilatatis, capite cristato, corpore viridi.

Hermann, tab. affinit. anim. p. 186. Cuculus paradisaeus.

Gerin. ornith. I. p. 82. Tab. 75.

48. TOLU. *Der Tolu.*

Müller, Naturfyft. Suppl. p. 90. n. 25. *Toulou.*

Neuer Schaupl. d. Nat. IV. p. 856. n. 17. *Toulou.*

Onomat. histor. nat. III. p. 492. *der Kuckug von Madagascar.*

Briffon,

Briffon, ornitholog. II. p. 80. n. 16. *Coutou de Madagascar*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 432. n. 17. *der Tolu*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 213. n. 18. Cuculus (Tolu) cauda cuneiformi, corpore virescenti-atro, alis castaneis, capite, collo dorsoque anticè nigricantibus, rufo-striatis.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 26 Gattungen vermehrt. Und wenn, nach *Latham*, die 34ste p. 415. mit der 26ten p. 412 einerley ist, so bleiben der neu hinzugekommenen Gattungen noch 25. — Bey der ersten Gattung sind *drey*, bey der 2ten *zwey*, bey der 9ten *zwey*, bey der 13ten *zwey* Varietäten aus einander gesetzt, und bey der 14ten ist noch eine Varietät hinzugekommen.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

I. *Der Maroc.*

Bruce, Reif. n. d. Quellen des Nils, V. p. 181. Tab. 36. *der Maroc, Bienenkuckuk.*

Lobo, Abyssin. p. 52. *Moroc.*

An Cuculus Indicator?

C. *Neuere Gattungen.*

I. *Der indianische Kuckuck.*

Latham, Syn. Suppl. p. 99. Eastern black Cuckow.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 211. n. 11. Cuculus (Indicus) cauda rotundata, corpore nigro, alis rectricibusque ad apicem lineis transversis tribus nigris.

2. *Der*

2. *Der grauköpfige indianische Kuckuck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 448. n. 47. *der braunköpfige Kuckuck.*

Latham, Syn. Supplem. p. 102. Grey-headed Cuckow.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 214. n. 23. Cuculus (Poliocephalus) cauda subcuneiformi, corpore supra fusco-cinereo, subtus albo griseo fasciato, capite collicque pallide griseis, rectricibus albis, fasciis obscuris.

3. *Der kleine rothbraune schwarzbandirte indianische Kuckuck.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 449. n. 48. *der Sonneratskuckuck.*

Latham, Syn. Suppl. p. 102. n. 48. Sonnerat's Cuckow.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 215. n. 24. Cuculus (Sonneratii) nigro fasciatus, supra rufo-fuscus, subtus albus, rectricibus nigro maculatis.

Sonnerat, voy. Ind. II. p. 211. le petit Coucou des Indes.

4. *Der leberfarbene Kuckuck.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 215. n. 25. Cuculus (Hepaticus) cauda cuneiformi, corpore brunneo nigroque undulato, uropygio ferrugineo, rostro, alarum apicibus caudaque fasciis nigris, subtus albicans nigro undulatus, pedibus flavis.

Mus. Carl. fascic. III. Tab. 55. Cuculus hepaticus.

58. GESCHLECHT. YUNX. *Der Wendehals.*

Müller, Natursystem, II. p. 216. Gen. LVIII.

Leske, Naturgesch. p. 247. Gen. XXVII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 131. Gen. XVI.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 167.
Gen. IX.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 354. Gen. XIII.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 527.
Gen. XI.

Brisson, ornith. II. p. 42. Gen. XLVI.

Batsch, Thiere, I. p. 315. 318. Gen. LXIII.

Latham, allg. Uebersicht der Vögel, I. 2. p. 451.
Gen. XX.

Latham, Syst. ornith. I. p. 223. Gen. XXI.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 241.
Gen. XIX.

I. TORQUILLA. *Der gemeine Wendehals.* (6)

Müller, Natursystem, II. p. 216. n. 1. *Dreh-*
hals.

Leske, Naturgesch. p. 247. *der Wendehals.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 132. n. 1. *der Wen-*
dehals.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 167. n. 1.

Jynx (Torquilla) cauda explanata, fasciis fu-
scis quatuor; *der Drehhals, Wendehals, Nat-*
terwindel.

Bechstein,

- (6) Nistet zu Anfang des Julius. Das Nest besteht aus einer bloßen Unterlage von klarem Moos, Grashalmen, Haaren, und Wolle. Beyde Gatten brüten vierzehn Tage, aber jährlich nur einmal. Die Baumhöhle, worin sie einmal genistet haben, suchen sie alle Jahr wieder auf. Das Fleisch ist wohlschmeckend und im August und September sehr fett. Im Herbst fressen sie, in Ermanglung der Insekten, auch Hollunderbeeren. Zahm kann man sie mit Mehlwürmern und Nachtigallenfutter unterhalten.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 354. n. 1. *Wendehals*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 527. n. 1.
der Wendehals. p. 533. *Drehhals*, *Drehvogel*,
Otterwindel, *Natterwindel*, *Halsdreher*, *Hals-*
winder, *Natterhals*, *Grauspecht*.

Funke, Naturgesch. I. p. 328. *der Wendehals*.

Ebert, Naturl. I. p. 60. *der Wendehals*.

Halle, Vögel, p. 144. n. 85. *der Halsdreher*.

Meyer, Thiere, II. Tab. 39.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere,
 II. p. 63. n. 77. *der Drehhals*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 253. *der Drehhals*.

Neuer Schauplatz d. Natur, II. p. 398. *Drehhals*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 574. *der Halsdreher*.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 170. *der Drehhals*.

Handbuch d. deutsch. Thiergesch. p. 102. *Wen-*
dehals, *Natterzwang* u. s. w.

Klein, av. p. 28. n. 14. *Picus Torquilla*; *Jynx*.

Klein, Vorber. p. 54. n. 14. *Drehhals* oder *Wen-*
dehals.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 30. n. 14. *Drehhals*.

Klein, Stemmat. av. p. 5. Tab. 4. fig. 4. a. c. d.

Klein, Vögeleyer, p. 17. Tab. 4. fig. 5.

Briffon, ornithol. II. p. 43. n. 1. *Torcol*.

Gesner, Vögelb. p. 553. *Windhals*; mit 1 Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 318. *der Wendehals*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 451. *der gemeine Wen-*
dehals.

Latham, Syn. Suppl. p. 103. *Wryneck*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 223. n. 1. *Yunx*
 (*Torquilla*) *grisea*, *fusco nigricanteque varia*,
abdomine rufescente albo maculis nigricanti-
bus, reatricibus maculis, striis fasciisque nigris
undulatis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 36. n. 55. *der Drehhals*.

- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 308. n. 54.
Drehhals.
- Cetti*, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 84. *der Wendehals.*
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 75. n. 64.
Wendehals, Natterhals.
- Lepechin*, Tagebuch der russ. Reif. II. p. 5. *Wendehülse.*
- White*, Naturgesch. von England, p. 33. n. 2.
p. 56. *der Wendehals.*
- Pontoppidan*, Naturgesch. v. Dännemark, p. 167.
n. 1. *Wendehals, Dreyhals.*
- Kolbe*, Vorgeb. d. g. Hoffnung, Edit. in 4. p. 395.
n. 7. *die Lang-Zungen?*
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 45. n. 50.
der gemeine Wendehals.
- Linné*, auserl. Abhandl. II. p. 290. n. 66. *Drehhals, Natternhals.*
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 147. 276. *der Otter-oder Natterwindel.*
- Döbel*, Jägerpraktik, I. p. 60. *Wendehals.*
- Naumann*, Vogelfsteller, p. 138. n. 6. *der Grauspecht oder Wendehals.*
- Naturforsch. IX. p. 53. n. 53. *Drehehals.*
- Schriften der berlin. Gefellsch. naturf. Fr. VII.
p. 453. n. 30. *der Drehhals.*
- Anweisung Vögel zu fangen, u. s. w. p. 415.
Natterwindel.
- Bechstein*, Musterung schädli. Th. p. 117. *Wendehals.*
- Fablonsky*, allgem. Lex. p. 1380. *Wendehals.*
- Eberhard*, Thiergesch. p. 104. *der Wendehals.*
- Meidinger*, Vorles. I. p. 118. *der Wendehals.*
- Lemmery*. Materiallex. p. 589.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. II. p. 53. *Torquilla* s. *Jynx.*
Linné,

Linne', Syst. Nat. Edit. VI. p. 20. n. 1. Torquilla.

Linne', Syst. Natur. Edit. X. I. p. 112. n. 1. Jynx
(Torquilla.)

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 96. Jynx
Torquilla.

Kramer, Austr. p. 336. n. 1. Jynx; *Natterwindl*,
Wendhals.

Brünnich, ornithol. bor. p. 10. n. 37. Jynx Tor-
quilla.

Schwcnkfeld, aviar. Siles. p. 356. Torquilla; *ein*
Windhals, *Wendehals*, *Trayhals*, *Nater-*
wendel.

Moehring, av. gen. p. 34. n. 13. Jynx.

Schaefer, elem. ornith. Tab. 66.

Gerin, ornith. II. p. 52. Tab. 186.

Hermann, tab. affin. anim. p. 188. Jynx.

Lange, de ave Ιυγξ. Epist. medicinal. L. 2.
ep. 59. p. 762.

Plin. hist. nat. L. XI. c. 47. Jynx.

Aristot. hist. anim. L. II. c. 15. n. 95. Ιυγξ.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 241. n. 1.
der Wendehals.

β. *Der gestreifte Wendehals*.

Brisson, ornitholog. II. p. 44. A. Torcol rayé.

Latham, Vögel, I. 2. p. 454. Var. A.

Latham, Syn. II. p. 549.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 223. β. Yynx
supra ferruginea maculis transversis, subtus al-
bida, striis longitudinalibus flavis.

Jonston, av. p. 113. Jynxi congener.

γ. *Der weiße Wendehals*. *

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 532.
weiße Wendehälse.

Latham, Vögel, I. 2. p. 454. Var. B. *der weiße Wendehals.*

2. MINUTISSIMA. *Der cayennische Wendehals.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 491. n. 48. *der kleinste Specht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 243. n. 55. Picus (Minutus) griseo-rufus, subtus albidus fusco-undulatus, vertice rubro, occipite nigro, lateribus capitis albo-maculatis.

Briffon, ornitholog. II. p. 64. n. 32. petit Pic de Cayenne.

Lichtenberg, Magazin f. d. Neueste u. f. w. II. 1. p. 118. n. 2. *der allerkleinste Specht oder Wendehals aus Südamerika.*

Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 150. *ein kleiner Specht?*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit einer Gattung vermehrt, und bey der ersten sind zwey Varietäten aus einander gesetzt.

59. GESCHLECHT. PICUS. *Der Specht.*

Müller, Naturyst. II. p. 218. Gen. LIX.

Leske, Naturgesch. p. 248. Gen. XXVIII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 133. Gen. XVII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 166. Gen. VIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 347. Gen. X.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 498. Gen. IX.

Funke, Naturgesch. I. p. 300 ff.

Ebert,

Ebert, Naturl. II. p. 44 ff.

Halle, Vögel, p. 132 ff.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 254 ff.

Neuer Schaupl. der Natur, VIII. p. 326 ff.

Onomat. hist. nat. VI. p. 491 sqq.

Klein, av. p. 26. Gen. II.

Briffon, ornith. II. p. 44. Gen. XLVII.

Batsch, Thiere, I. p. 306. Gen. LVII.

Latham, allgem. Ueberf. der Vögel, I. 2. p. 454.
Gen. XXI.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 224. Gen. XXII.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 187.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 242.
Gen. XX.

I. MARTIUS. *Der Schwarzspecht.* (7)

Müller, Naturyst. II. p. 219. n. I. *der Fouselier.*

Leske, Naturgesch. p. 248. n. I. *der Schwarzspecht, die Luderkrähe.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 134. n. 2. *der große Schwarzspecht.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 166. n. I.

Picus (Martius) niger, vertice coccineo; *der Schwarzspecht, gemeine Specht, Hohlkrähe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 348. n. I. *der Schwarzspecht.*

li 3

Bech-

- (7) Flügelweite 29 Zoll. Gewicht 11 Unzen. Der allerchlaueste unter dem ganzen Geschlechte, der sehr schwer zu schießen ist. Liebt große, besonders gebirgige Waldungen, und zieht die Schwarzwälder den Laubwäldern vor. Nistet in Baumhöhlen, die er sich entweder selbst macht oder vorfindet, und legt seine Eyer auf das bloße Holzmehl, ohne alle Unterlage. Läßt sich zähmen, und frisst alsdann Wallnüsse, lebt aber nicht lange in der Gefangenschaft. Das Fleisch ist wohlschmeckend. Einige dieser Vögel haben eine rothe Platte.

- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 499. n. 1. *der Schwarzspecht*. p. 505. *der große Schwarzspecht*, *gemeiner Specht*, *tapfere Specht*, *Krähenspecht*, *Spechtkrähe*, *Holzkrähe*, *Holzkrähe*, *Hohlkrähe*, *Holzhuin*, *Füselier*.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 300. *der Schwarzspecht*.
- Ebert*, Naturl. II. p. 45. *der große schwarze Specht*.
- Halle*; *Vögel*, p. 133. n. 72. *der größte europäische schwarze Baumhacker*.
- Meyer*, *Thiere*, II. Tab. 34.
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 60. n. 68. *der Schwarzspecht*.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 261. A. *der Schwarzspecht*.
- Beckmann*, Naturhist. p. 40. *der Specht*, oder *Baumhacker*.
- Neuer Schauplatz der Natur*, VIII. p. 327. n. 1. *der Schwarzspecht*.
- Onomat. hist. nat.* VI. p. 499. *der große Schwarzspecht*, *Spechtkrähe*.
- Handbuch der Naturgesch.* II. p. 171. *der Specht*.
- Handb. der deutschen Thiergesch.* p. 101. *großer schwarzer gemeiner und Krähenspecht*.
- Klein*, av. p. 26. n. 1. *Picus niger*, *maximus nostras*.
- Klein*, *Vorbereit.* p. 50. n. 1. *Schwarzspecht*.
- Klein*, *verbess. Vögelhist.* p. 28. n. 1. *schwarzer großer Specht*.
- Gesner*, *Vögelb.* p. 477. *Krähspecht*; Fig. p. 479. *zieml. gut*.
- Briffon*, *ornith.* II. p. 47. n. 6. *Pic-noir*.
- Batsch*, *Thiere*, I. p. 307. *Schwarzspecht*.
- Latham*, *Vögel*, I. 2. p. 554. n. 1. *der Schwarzspecht*.

- Latham, Syn. Suppl. p. 104. Great black Woodpecker.
- Latham, Syst. ornitholog. I. p. 324. n. 1. Picus (Martius) niger, pileo coccineo.
- Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 37. n. 56. *der Schwarzspecht.*
- Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 309. n. 55. *der schwarze Specht.*
- Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 81. *der Specht.*
- Molina, Chili, p. 209. *der Schwarzspecht.*
- Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 76. n. 65. *Schwarzspecht.*
- Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 167. n. 1. *Hakkespett.*
- Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 184. *Schwarzspechte.*
- Pallas, Reise, II. p. 20. 30. *Schwarzspecht.*
- Pallas, Reif. Ausz. II. p. 14. *der Schwarzspecht.*
- Pallas, nord. Beytr. IV. p. 14. *der Schwarzspecht.*
- Fermin, Surinam, II. p. 149. *der Schwarzspecht.*
- Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 46. n. 51. *der Schwarzspecht, Hohlkrähe.*
- Zorn, Petinotheol. II. p. 269. *Schwarz-Specht, Hohl-Krähe.*
- Döbel, Jägerprakt. I. p. 59. *Schwarz-Specht.*
- Naumann, Vogellsteller, p. 137. *der Schwarzspecht.*
- Naturf. IX. p. 54. n. 54. *der Fouselier.*
- Anweisung Vögel zu fangen u. f. w. p. 113. *Hohlkrähe.*
- Fablonsky, allgem. Lex. p. 1098. *Schwarzspecht.*
- Bechstein, Musterung schäd. Th. p. 110. n. 14. *der Schwarzspecht.*

Eberhard, Thiergesch. p. 104. *der schwarze Specht.*

Meidinger, Vorles. I. p. 119. n. 1. *der Schwarzspecht.*

Loniceri, Kräuterbuch, p. 678. *Specht.*

Kraft, Ausrott. grauf. Thiere, I. p. 443. *Krähspecht.*

Neue gefellsch. Erzähl. I. p. 268. *Holz-Krähe.*

Hamburg, Magazin, IV. p. 414.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 53. *Picus niger.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 20. n. 1. *Picus niger.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 112. n. 1. *Picus (Martius) niger, pileo coccineo.*

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 97. *Picus (Martius) niger, pileo coccineo.*

Kramer, Austr. p. 335. n. 1. *Picus pedum digitis duobus anticis, posticis duobus, corpore nigro, vertice coccineo; Hohlkran, Schwarzspecht.*

Brünnich, ornith. bor. p. 11. n. 38. *Picus Martius.*

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 338. *Picus niger, seu formicarius; ein Holkrahe, Holz-Krahe, Krahspecht, Holtz-Hun.*

Valent. Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII, obs. 53. p. 335. (*anatomie.*)

Philos. Transact. XXIX, n. 350, p. 509. Tab. 1. (*anat.*)

Gerin. ornith. II. p. 47. Tab. 172.

Jonston, av. p. 110. *Picus maximus.*

Plin. hist. nat. Lib. 10, c. 18, 28, 33. L. II, c. 37. L. 31, c. 16. *Picus martius?*

Aristot. histor. anim. L. IX, c. 13, n. 147. *δρυοκολεπτης, το τριτου γενος.*

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 242. n. 1. *der Schwarzspecht.*

22. LIGNARIUS. *Der chilefische Specht.*

Molina, Naturgesch. von Chili, a. a. O. *der Zimmermann.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 494. n. 52. *der Holzhackerspecht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 224. n. 2. *Picus* (Lignarius) pileo coccineo, corpore albo caeruleoque vittato.

2. PRINCIPALIS. *Der Weißschnabel.*⁽⁸⁾

Müller, Naturfyst. II. p. 220. n. 2. *der Grenadier.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 135. n. 3. *der Hausenspecht.*

Halle, Vögel, p. 135. n. 73. *der größte schwarze amerikanische Baumhakker.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 61. n. 69. *der amerikanische Specht.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 254. n. 72. *der Weißschnabel.*

Neuer Schaupl. der Nat. VIII. p. 227. n. 2. *schwarzer Specht mit weißem Schnabel.* p. 329. n. 2. *Weißschnabel.*

Onomat. histor. nat. VI p. 506. *Picus principalis.* (Mit n. 4. verwechselt.)

Klein, av. p. 26. n. 2. *Picus niger*, rostro albo, priori maior.

Ii 5

Klein,

(8) Gewicht 20 Unzen. Brüte: in Mexico um die Regenzeit, daher die Benennung *Picus imbrifoetus* bey *Nieremb.* Bey den Spaniern heißen diese Vögel *Carpenteros* oder *Zimmerleute*, weil sie so viele Späne aus den Bäumen hacken, denn ein einziger hackt in einer Stunde wohl ein Maas Späne aus. Canada hat diese Vögel nicht. Aber die Indianer aus Canada achten die Schnäbel sehr hoch, und kaufen sie von den Wilden der südlichen Gegenden das Stück um 2 oder 3 Bockhäute, um die Kränze ihrer Sachems und Krieger daraus zu machen.

Klein, Vorbereit. p. 50. n. 2. *Schwarzspecht mit weißem Schnabel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 28. n. 2. *schwarzer Specht mit weißem Schnabel.*

Briffon, ornitholog. II. p. 49. n. 9. *Pic noir hupé de la Caroline.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 32. *der größte Specht mit dem weißen Schnabel.*

Batsch, Thiere, I. p. 307. *der Haubenspecht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 456. n. 2. *der weißschnäblichte Specht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 225. n. 3. *Picus (Principalis) niger, crista coccinea, linea utrinque collari remigibusque secundariis albis. (Mas.)*

Schöpf, Reise durch Nordamerika, II. p. 13. *Picus Principalis.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 113. n. 2. *Picus (Principalis) niger, crista coccinea, linea utrinque collari remigibusque secundariis albis.*

Forstön, av. p. 222. *Picus imbrifoetus. Quatomomi.*

Lafiteau, moeurs des Sauvages, II. p. 60.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 243. n. 2. *der Weißschnabel.*

β. *Picus niger, occipite cristato, linea utrinque collari, remigibusque secundariis albis. (Femina.) **

Latham, Vögel, I. 2. p. 457. *das Weibchen.*

Latham, Syn. Suppl. p. 105. n. 2.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 225. n. 3. β.

Discrepat pileo corpore concolore, minime rubro.

3. PILEATUS. *Der Haubenspecht.* (9)

Müller, Natursystem, II. p. 221. n. 3. *der Haubenspecht.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 62. n. 72. *der virginische Haubenspecht.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 255. n. 73. *der Haubenspecht.*

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 327. n. 3. *schwarzer Specht mit bleifarbenem Schnabel und feuerrothem Kopfe.* p. 329. n. 3. *gehaubter Specht.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 305. *der schwarze amerikanische Haubenspecht.*

Klein, av. p. 26. n. 3. *Picus niger, toto capite rubro, rostro plumbeo.*

Klein, Vorbereit. p. 50. n. 3. *Schwarzspecht mit feurigem Kopf.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 28. n. 3. *schwarzer Specht mit bleifarbigem Schnabel und feuerrothem Kopf.*

Briffon, ornithol. II. p. 50. n. 10. *Pic noir hupé de Virginie.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 34. *der große Specht mit dem rothen Kopfe.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 458. n. 3. *der virginische Haubenspecht.*

Latham, Syn. Suppl. p. 105.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 225. n. 4. *Picus (Pileatus) niger, crista rubra, temporibus alisque maculis albis.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 41. n. 11. *Picus niger, crista coccinea.*

Linné,

(9) Gewicht 9 Unzen. Die Indianer schmücken ihre Calumers mit den Kopfbüscheln dieser Vögel.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 113. n. 3. Picus (Pileatus) niger, capite cristato rubro, temporibus alisque albis maculis.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 243. n. 3. der *Haubenspecht*.

β. Picus niger, crista rubra, fronte lorisque flavicantibus, abdomine fasciis obscuris albis. *

Latham, Syn. Suppl. p. 105.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 206. n. 4. β.

4. LINEATUS. *Der Ipecu.* (10)

Müller, Naturfyst. II. p. 221. n. 4. der *gestreifte Specht*. Tab. 7. fig. 6.

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 329. n. 4. *bandirter Specht*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 564. *Ipecu*; der *große schwarze amerikanische Baumhacker*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 305. der *schwarze amerikanische Haubenspecht*.

Halle, Vögel, p. 135. n. 74. der *große schwarze amerikanische Baumhacker*.

Briffon, ornithol. II. p. 51. n. II. Pic noir hupé de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 459. n. 4. der *große gestreifte cayennische Specht*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 226. n. 5. Picus (Lineatus) niger, crista coccinea, linea a rostro utrinque collari ad medium dorsum alba, corpore subtus rufo-albido, fasciis nigris.

Fermin, Surin. II. p. 150. ein *anderer Buntspecht*.

Raj, Syn. p. 162. *Tlahquechultototl*?

23. RUBRI-

(10) Wird oft mit *Picus Principalis* verwechselt, weil *Linné* in der XIIten Edition den *Ipecu* des *Marcgr.* mit dazu rechnete.

23. RUBRICOLLIS. *Der rothhälfige Specht.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 460. n. 5. der rothhälfige Specht.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 226. n. 6. Picus (Rubricollis) fuscus, occipite cristato, corpore subtus testaceo-albo, capite colloque coccineis.

24. MELANOLEUCOS. *Der schwarz- und weiße Specht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 461. n. 6.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 226. n. 7. Picus (Melanoleucos) nigricans, pileo cristato flavescente, fronte superciliis nuchaque nigris, linea collari utrinque ad dorsum alba, corpore subtus albido, fasciis nigris.

5. HIRUNDINACEUS. *Der Schwalbenspecht.⁽¹⁾*

Müller, Naturfyst. II. p. 222. n. 5. der Schwalbenspecht.

Halle, Vögel, p. 136. n. 75. der kleinste schwarze amerikanische Baumhakker.

Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 328. n. 8. kleinster Schwarzspecht. p. 329. n. 5. Schwalbenspecht.

Onomat. histor. natur. VI. p. 497. der kleinste Schwarzspecht aus Amerika.

Klein, av. p. 27. n. 4. Picus niger minimus.

Klein, Vorbereit. p. 51. n. 4. kleinster Schwarzspecht.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 29. n. 8. kleinster Schwarzspecht.

Briffon, ornitholog. II. p. 48. n. 7. Pic noir de la nouvelle Anglettere.

Latham,

(1) Nach *Latham* gehört *Pennants yellow-legged Woodpecker*, woraus in unserm System p. 438. n. 49. eine signe Gattung gemacht worden, mit hieher.

Latham, Vögel, I. 2. p. 461. n. 7. *der Schwalbenspecht.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 227. n. 8. Picus (Hirundinaceus) niger, occipite cristato rubro, humeris albido-punctatis, abdomine inferiore albo.

Linné, Syft. Natur. Edit. X. I. p. 113. n. 4. Picus (Hirundinaceus) niger, occipite coccineo, humeris albido punctatis.

β. *Latham*, Syn. II. p. 559. n. 7. A.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 227. n. 8. β. Picus niger, macula verticis medioque pectore rubris, occipite flavo vario, superciliis uropygioque variis.

Latham, Vögel, I. 2. p. 461. n. 7. Var. A.

γ. *Latham*, Syn. II. p. 560. n. 7. B.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 227. n. 8. γ. Picus niger, macula verticis rubra, lateribus ad nucham albis, nucha ipsa aurea, pectore medio lateribusque coccineis, uropygio albo.

Latham, Vögel, I. 2. p. 462. n. 7. Var. B.

6. PASSERINUS. *Der Sperlingspecht.*

Müller, Naturfyft. II. p. 222. n. 6. *der Sperlingspecht.*

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 329. n. 6. *Sperlingspecht.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 505. *der kleine Specht von St. Domingo.*

Briffon, ornithol. II. p. 62. n. 29. petit Pic de S. Domingue.

Latham, Syn. Suppl. p. 110. Passerine Woodpecker.

Latham,

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 238. n. 40. Picus (Passerinus) olivaceo - flavicans, subtus fusco candicanteque fasciatus, capite supra rubro.

25. STRIATUS. *Der gestreifte Specht von St. Domingo.*

Müller, Naturfyft. Suppl. p. 91. n. 24. *der gestreifte Specht.*

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 329. n. 24. *gestreifter Specht.*

Briffon, ornithol. II. p. 59. n. 25. Pic rayé de S. Domingue.

Latham, Vögel, I. 2. p. 485. n. 36. *der gestreifte Specht von S. Domingo.*

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 238. n. 39. Picus (Striatus) niger olivaceo - striatus, subtus olivaceus, vertice, occipite uropygioque rubris, collo subtus pectoreque griseo - fuscis.

β. *Der Specht mit schwarzem Scheitel.*

Briffon, ornith. II. p. 60. n. 26. petit Pic rayé de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 486. n. 36. Var. A.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 238. n. 39. β. Picus corpore ut in priore, vertice nigro, occipite rubro.

Latham, Syn. II. p. 588. n. 36. A.

26. MELANOCHLOROS. *Der gelb. und schwarze Specht.*

Neuer Schaupl. der Nat. VIII. p. 329. n. 25. *gelber Specht.*

Briffon, ornithol. II. p. 51. n. 12. Pic varié hupé d'Amérique.

Latham, Vögel, I. 2. p. 486. n. 38. *der cayennische Haubenspecht.*

Latham.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 239. n. 41. *Picus* (Melanochloros) fulvo nigroque undato-maculatus, genis rubicundis, crista fulvo-aurea, rectricibus nigris.

Gerin. ornithol. II. p. 41. Tab. 174. *Picus niger cayennensis cristatus*.

β. *P. fulvo nigroque undato-maculatus*, vertice nigro, occipite cristato rubro, maxillae inferioris mystace purpurascente. *

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 239. n. 41. β.

Buffon, hist. nat. des ois. VII. p. 30. — Pl. enl. 719. le grand Pic rayé de Cayenne.

27. *FLAVESCENS. Der gelbgehaubte Specht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 487. n. 39. *der braslianische Haubenspecht.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 239. n. 42. *Picus* (Flavescens) niger, flavo-fasciatus, capite crista dependente, gula, genis cerviceque flavis.

28. *CAYENNENSIS. Der olivenfarbige schwarz gestreifte cayennische Specht.*

Briffon, ornitholog. II. p. 61. n. 27. Pic rayé de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 487. n. 40. *der kleine gestreifte cayennische Specht.*

Latham, Syn. Supplem. p. III.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 239. n. 43. *Picus* (Cayanensis) olivaceus nigro striatus, subtus flavicans, occipite rubro, vertice nigro, genis albidis.

29. *EXALBIDUS. Der gelbliche Specht von Cayenne.*

Müller, Natursystem, II. p. 228. c. *der weiße cayennische Specht.*

Briffon,

Briffon, ornithol. II. p. 63. n. 31. Pic blanc de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 488. n. 41. *der Gelbspecht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 240. n. 44. Picus (Flavicans) occipite cristato, remigibus fuscis, rectricibus nigris.

Fermin, Surin. II. p. 150. *der gelbe Specht.*

30. CINNAMOMEUS. *Der zimmtfarbige Specht.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 257. n. 75. *der rothfarbige Specht.* Tab. 13. unt. Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 489. n. 42. *der rothfarbene Specht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 240. n. 45. Picus (Cinnamomeus) ferrugineo-cinnamomeus, maculis sparsis flavicantibus, capitis crista dorsoque infimo flavis, cauda nigra.

31. MULTICOLOR. *Der vielfarbige Specht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 489. n. 43. *der vielfarbige Specht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 240. n. 46. Picus (Multicolor) cristatus rufus, capite, gula cerviceque supremo fulvis, infimo iugulo, pectore alarumque maculis albis.

7. ERYTHROCEPHALUS. *Der rothköpfige Specht.* (2)

Müller, Naturyst. II. p. 222. n. 7. *der Rothkopf.* Tab. 7. fig. 7.

Borowsky,

(a) Gewicht 2 Unzen. Wandert bey Herannäherung des Winters gegen Süden; und wenn sie zu der Zeit noch häufig in den Wäldern verweilen, so halten es die Einwohner von Pennsylvania u. a. für ein Zeichen einer milden Witterung.

- Borowsky*, Thierreich, II. p. 136. n. 4. *der rothköpfige Specht.*
- Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 328. n. 12. *rothköpfiger Virginianer.* p. 329. n. 7. *Rothkopf.*
- Onomat. hist. nat. VI. p. 496. *der Rothkopf.*
- Halle, Vögel, p. 143. n. 83. *der karolinische Hauspecht.*
- Gatterer*, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 61. n. 70. *der Rothkopf.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 257. n. 76. *der Rothkopf.*
- Klein*, av. p. 28. n. 12. *Picus capite colloque rubris.*
- Klein*, Vorbereit, p. 53. n. 12. *Rothkopf.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 30. n. 12. *rothköpfiger Virginianer.*
- Briffon*, ornitholog. II. p. 56. n. 19. *Pic à tête rouge de Virginie.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 307. *der rothköpfige Specht.*
- Seligmann*, Vögel, I. Tab. 40. *der Specht mit dem rothen Kopfe.*
- Latham*, Vögel, I. 2. p. 462. n. 8. *der rothköpfige Specht.*
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 227. n. 9. *Picus (Erythrocephalus) capite toto rubro, alis caudaque rubris, abdomine remigibusque secundariis albis.*
- Carver*, Reise d. Nordamerika, p. 389. ****
Picus erythrocephalus.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 113. n. 5. *Picus (Erythrocephalus) capite toto rubro, alis caudaque nigris, abdomine albo.*
- Gerin*. ornith. II. p. 50. Tab. 176.
- Donndorff*, Handb. der Thiergesch. p. 243. n. 4. *der Rothkopf.*

31. RUBER. *Der rothe Specht von Cayenne.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 464. n. 8. *der rothe cayennische Specht.*

Latham, Syn. Suppl. p. 106.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 228. n. 10. Picus (Ruber) niger, capite, collo et pectore coccineis, macula alarum longitudinali alba, abdomine medio flavescente-albo.

32. OBSCURUS. *Der dunkelfarbige nordamerikanische Specht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 464. n. 10. *der Specht mit weißem Steiße.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 228. n. 11. Picus (Obscurus) nigricans, subtus uropygioque albus, supra tectricibusque alarum minoribus albo variegatis, remigibus primoribus apice nigris.

33. FASCIATUS. *Der bandirte Specht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 465. n. 11. *der bandirte Specht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 229. n. 12. Picus (Fasciatus) fusco-nigricans, vertice, loris strigataque submaxillari coccineis, abdomine albo nigroque striato, rectricibus apice albis.

8. AURANTIUS. *Der pomeranzenfarbige Specht.*

Müller, Natursystem, II. p. 223. n. 8. *der pomeranzenfarbige Specht.*

Neuer Schaupl. d. Natur, VIII. p. 329. n. 8. *Orangenspecht.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 493. *der pomeranzenfarbige Specht.*

Briffon, ornitholog. II. p. 63. n. 30. *Pic du Cap de bonne esperance.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 483. n. 32. *der orange-farbige Specht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 237. n. 35. Picus (Aurantius) supra aurantius, nucha, uropygio tectricibusque nigris.

Gerin. ornith. II. p. 50. Tab. 175.

34. *SENEGALENSIS.* *Der senegalische Specht.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 91. n. 22. *der Gelbrücken.*

Neuer Schaupl. der Natur, VIII. p. 329. n. 22. *der Gelbrücken.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 484. n. 33. *der senegalische Specht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 237. n. 36. Picus (Senegalensis) fronte genisque fuscis, pileo rubro, dorso remigibusque fulvo-aureis, corpore subtus griseo fusco alboque undulato.

35. *CAPENSIS.* *Der grauköpfige Specht vom Cap.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 484. n. 34. *der capische Specht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 237. n. 37. Picus (Capensis) griseus, collo, pectore dorsoque fusco-olivaceis, cauda nigra, tectricibus uropygioque rubris.

β. P. pallide griseus, dorso et alis olivaceo-fuscis, pileo, uropygio abdomineque rubris. *

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 238. n. 37. β.

9. *AURATUS.* *Der Goldspecht.* (5)

Müller, Naturfyst. II. p. 223. n. 9. *der Goldflügel.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 134. n. 1. *der Goldspecht.* Tab. 17.

Gatto.

- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 61. n. 71. *der Goldspecht*.
- Pennant*, arch. Zoolog. II. p. 256. n. 74. *der Goldflügel*.
- Neuer Schaupl. d. Natur, VIII. p. 329. n. 9. *Goldspecht*.
- Oromat. histor. nat. III. p. 481. *der Ringel-Kuckug mit vergoldeten Flügeln*.
- Halle*, Vögel, p. 156. n. 91. *der bunte Kukuk mit vergoldeten Flügelkielen und schwarzem Brustringe*.
- Klein*, av. p. 30. n. 3. *Cuculus alis deauratis*.
- Klein*, Vorbereit. p. 58. n. 3. *Ringelkuckuck mit vergoldeten Flügeln*.
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 33. n. 3. *Ringelkuckuck mit vergoldeten Flügeln*.
- Briffon*, ornitholog. II. p. 61. n. 28. *Pic rayé de Canada*.
- Seligmann*, Vögel, I. Tab. 36. *der Specht mit vergöldeten Flügeln*.
- Batsch*, Thiere, I. p. 307. *der Goldspecht*.
- Latham*, Vögel, I. 2. p. 492. *der Goldspecht*.
- Latham*, Syn. Supplem. p. III. *Gold-winged Woodpecker*.
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 242. n. 52. *Picus (Auratus) griseo-nigroque transversim striatus, lateribus gulae pectoreque nigris, nucha rubra, uropygio albo*.
- Carver*, Reis. durch Nordamer. p. 389. *** *Picus auratus*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 112. n. 8. *Cuculus (Auratus) cauda forcipata, gula pectoreque nigris, nucha rubra*.
- Philos. Transact.* IXII. p. 387. *Picus auratus*.
- Hermann*, tab. affinit. anim. p. 187. *P. auratus*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 344. n. 5.
der Goldflügel.

36. **CASER.** *Der Atergoldflügel.*

Latham, Syn. II. p. 599. n. 49. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 493. n. 49. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 242. n. 53. Picus
(Caser) supra fuscus, subtus vinaceus, maculis
rotundis nigris, alis subtus scapisque remigum
et rectricum miniatis.

37. **OLIVACEUS.** *Der olivenfarbige Specht vom Cap.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 493. n. 50. *der roth-
brüstige Specht.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 242. n. 54. Picus
(Olivaceus) olivaceo-fuscus, uropygio fatura-
te, pectore pallide coccineo, corpore toto ma-
culis pallidis, crisso fascia fusca.

10. **CAROLINUS.** *Der carolinische Specht.*

Müller, Naturfyft. II. p. 224. n. 10. *der caroli-
nische Specht.*

Halle, Vögel, p. 143. n. 82. *der rothbäuchige
Baumhacker.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 258. n. 77. *der ca-
rolinische Specht.*

Neuer Schaupl. der Natur, VIII. p. 328. n. 11.
rothbrüstiger Specht. p. 329. n. 10. *carolini-
scher Specht.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 495. *der rothbäuchi-
ge Baumhacker oder bunter Specht aus Ja-
maica.*

Klein, av. p. 28. n. 11. Picus capite colloque rubris.

Klein, Vorber. p. 53. n. 11. *Rothbauch.*

Klein, verbeff. Vögelhist. p. 29. n. 11. *rothbrüsti-
ger Specht.*

Briffon,

Briffon, ornitholog. II. p. 58. n. 23. Pic varié de la Jamaïque.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 38. der Specht mit dem rothen Leib.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 34. der jamaicaische Specht.

Latham, Vögel, I. 2. p. 472. n. 17. der carolinische Specht.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 231. n. 18. Picus (Carolinus) pileo nuchaque rubris, dorso fasciis nigris, rectricibus mediis nigro-punctatis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 113. n. 6. Picus (Carolinus) pileo nuchaque rubris, dorso fasciis nigris, rectricibus mediis albis, nigro-punctatis.

Mem. de l'Acad. d. Sciences de Paris 1709. p. 85. Tab. 3.

β. *Latham*, Syn. II. p. 571. n. 17. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 472. n. 17. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 231. n. 18. β. Picus fronte genisque pallide fuscescentibus, abdomine fusco-flavescente, rectricibus 2. intermediis albo nigroque fasciatis.

γ. *Latham*, Syn. II. p. 571. n. 17. B.

Latham, Vögel, I. 2. p. 473. n. 17. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 231. n. 18. γ. P. pileo rubescente, gula genisque rubro variis, rectricibus duabus intermediis et extimis albo nigroque variis, reliquis nigris.

δ. Picus albo nigroque varius, pileo, nucha abdomineque rubris, fronte colloque subtus flavo-griseis, lateribus colli a rictu oris linea nigra. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 231. n. 18. δ.

Gerin. ornith. II. p. 48. Tab. 171. P. varius indicus.

11. *UNDATUS.* *Der rothbackige Specht.*

Müller, Naturfyst. II. p. 224. n. II. *der Rothbacken.*

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 329. n. II. *gelbrother Specht mit schwarzen Wellen.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 508. *der rothbackigte Specht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 490. n. 44. *der gujanische Specht.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 241. n. 47. *Picus (Undatus) testaceus nigro undulatus, temporibus sanguineis.*

38. *RUFU'S.* *Der braunrothe Specht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 490. n. 45. *der gelbrothe Specht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 241. n. 48. *Picus (Rufus) rufus nigro-undulatus, alis, cauda, corporeque fubtus saturatoribus.*

β. *Picus rufus nigro undulatus, pectore nigro, sub oculis macula magna coccinea. **

Latham, Syn. Suppl. p. III.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 241. n. 48. β.

39. *CHLOROCEPHALUS.* *Der gelbköpfige Specht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 491. n. 46. *der gelbköpfige Specht.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 241. n. 49. *Picus (Icterocephalus) subcristatus olivaceo-fuscus, fubtus albo-maculatus, capite colloque flavis, pileo rubro.*

40. *MINIATUS.* *Der rothe javanische gehäubte Specht, mit blauem Schnabel und Schwanz.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 491. n. 47. *der rothflügelige Specht.*

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 241. n. 50. Picus (Miniatus) obscure ruber, capite cristato, jugulo roseo, abdomine albo, remigibus nigris albo maculatis, rectricibus cyaneis.

Naturforsch. I. p. 266. n. 4. *der rothe Specht.*

Berlin. Samml. IX. p. 191. n. 4. *der rothe Specht.*

Neueste Mannichfalt. I. p. 188. n. 3. *der rothe Specht.*

41. PITIUS. *Der Pitius.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 234. n. 26. Picus (Pitius) fuscus, albo guttatus, cauda brevi.

Latham, Vögel, I. 2. p. 495. n. 53. *der Pitius.*

12. VIRIDIS. *Der Grünspecht.* (4)

Müller, Natursystem, II. p. 224. n. 12. *der Grünspecht.* Tab. 38. fig. 4.

Leske, Naturgesch. p. 248. n. 2. *der Grünspecht.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 136. n. 5. *der Grünspecht.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 167. n. 2. Picus (Viridis) viridis, vertice coccineo; *der Grünspecht, Grasphecht.*

Bechstein, Naturgesch. p. 349. n. 2. *der Grünspecht.*

Kk 5

Bech-

- (4) Flügelweite 20 Zoll. — Ein scheuer aber munterer Vogel, der im Winter bleibt, und sich den Sommer hindurch vorzüglich in grossen Eich- und Buchwäldern aufhält. Fliegt in Abätzen, und hat einen hüpfenden Gang. Nährt sich besonders von Ameisen, Raupen, und Puppen des Goldkäfers. Brütet jährlich nur einmal, und das Weibchen legt die Eyer auf das bloße faule Holz hin. Zur Paarungszeit schreyet das Männchen so stark, daß man es eine halbe Stunde weit hören kann. — Hat ein schmackhaftes Fleisch. Das Weibchen hat keine schwarze Backen und keine Platte; auch spiele die grünliche Farbe desselben mehr ins Graue,

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 505. n. 2.
der Grünspecht. p. 510. *der Zimmermann,*
Graspecht.

Funke, Naturgesch. I. p. 300. *der Grünspecht.*

Ebert, Naturl. II. p. 45. *der Grünspecht.*

Halle, Vögel, p. 136. n. 76. *der grüne Baum-*
hakker mit rother Platte. Fig. 6.

Meyer, Thiere, II. Tab. 35.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
 II. p. 62. n. 73. *der Grünspecht.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 262. B. *der Grün-*
specht.

Neuer Schaupl. d. Nat. III. p. 532. *Grünspecht.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 510. *der gemeine Grün-*
specht.

Handbuch der Naturgesch. II. p. 172. *der gemeine*
Grünspecht.

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 101. *der*
große Grünspecht.

Klein, av. p. 27. n. 5. *Picus viridis.*

Klein, Vorbereit. p. 51. n. 5. *Grünspecht oder*
Graspecht.

Klein, verb. Vögelhist. p. 29. n. 4. *Grünspecht.*

Klein, stemmat. av. p. 5. Tab. 4. fig. 1. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 17. Tab. 4. fig. 1.

Gesner, Vögelb. p. 481. *Grünspecht*; *Abbild. schl.*

Briffon, ornith. II. p. 44. n. 1. *Pic-verd.*

Batsch, Thiere, I. p. 307. *der Grünspecht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 478. n. 25. *der Grün-*
specht.

Latham, Syn. Suppl. p. 110. *Green Woodpecker.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 234. n. 27. *Picus*
(Viridis) viridis, vertice coccineo.

Beseke, Naturgesch. d. Vögel Kurl. p. 37. n. 57. 58.
der Grünspecht.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 311. n. 56.
der große Grünspecht.

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 81.
der Grünspecht. *

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 76. n. 66.
Grünspecht.

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 167.
 n. 2. *Grönspecht.*

Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 184.
Grünspechte.

Hasselquist, Reise nach Palästina, p. 342. n. 11.
Picus viridis.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 47. n. 52.
der Grünspecht, Grafespecht.

Zorn, Petinotheol. II. p. 270. *der Grün-Specht.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 59. n. 2. *Grün-Specht.*

Naumann, Vogelsteller, p. 137. n. 1. *der Grün-*
specht.

Naturf. IX. p. 55. n. 55. *der Grünspecht.*

Anweisung Vögel zu fangen u. f. w. p. 113. *Grün-*
specht.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1098. *Grünspecht.*

Geoffroy, mat. med. VII. p. 655. *der Grünspecht.*

Bechstein, Musterung schädl. Th. p. 3. n. 15. *der*
Grünspecht.

Loniceri, Kräuterbuch, p. 678. *Grünspecht.*

Kraft, Ausrott. grauf. Thiere, I. p. 444. *Grün-*
Specht.

Wirsing, Vögel, Tab. 57.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 53. *Picus viridis.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 20. n. 2. *Picus viridis.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 113. n. 7. *Picus*
 (*Viridis*) *viridis*, vertice *coccineo.*

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 98. *Picus*
 (*Viridis*) *viridis*, vertice *coccineo.*

- Kramer*, Austr. p. 335. n. 2. Picus pedum digitis duobus anticis; posticis duobus; viridis, vertice coccineo; *Grünspecht*.
- Brünnich*, ornitholog. bor. p. II. n. 39. Picus viridis.
- Schwenkfeld*, aviar. Siles. p. 338. Picus viridis; ein *Grün-Specht*, *Grase-Specht*.
- Moehring*, av. gen. p. 35. n. 14. Picus.
- Schäffer*, elem. ornith. Tab. 56.
- Gerin*, ornith. II. p. 45. Tab. 165.
- Philos. Transact. XXIX. n. 350. Tab. 1.
- Jonston*, av. p. III. Picus viridis.
- Hoffmann*: Eph. Nat. Cur. Cent. IX. et X. app. p. 452. Picus viridis.
- Donndorff*, Handb. der Thiergesch. p. 344. n. 6. *der Grünspecht*.
- β. *Klein*, av. p. 127. n. 3. Iaculator mitella rubra?
- Klein*, Vorbereit. p. 236. n. 3. *rothgekappter Harpunierer?*
- Klein*, verbesserte Vögelhist. p. 134. n. 3. *rothgekappter Harpunierer?*
- Onomat. histor. natur. VI. p. 511. *der mexicanische Grünspecht*.
- Briffon*, ornitholog. II. p. 46. n. 3. Picus viridis Mexicanus. *Pic verd du Mexique*.
- Latham*, Vögel, I. 2. p. 479. n. 25. Var. A.
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 234. n. 27. β. Picus viridis, capite superius et maculis infra aures saturate rubris, uropygio dilute flavo.
- Seba*, mus. I. p. 100. Tab. 64. fig. 3. *Ardea mexicana altera?*
- Fermin*, Beschreib. von Surinam, II. p. 148. *der Grünspecht*.
- Moehring*, av. gen. p. 79. n. 100. Cornix?

13. BENGALENSIS. *Der bengalische Specht.*

Müller, Natursystem, II. p. 225 n. 13. *der bengalische Specht.*

Halle, Vögel, p. 144. n. 84. *der farbige bengalische Baumhakker mit scharlachrothem liegendem Federbusche.*

Neuer Schaupl. der Nat. VIII. p. 328. n. 13. *bunter bengal. Specht.* p. 329. n. 13. *bengal. Specht.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 494. *der bengalische Baumhacker.*

Klein, av. p. 28. n. 13. *Picus varius benghalensis.*

Klein, Vorbereit. p. 53. n. 13. *gelbgrüner und schwarzbunter Specht.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 30. n. 13. *bunter Bengaleser.*

Briffon, ornitholog. II. p. 45. n. 2. *Pic verd de Bengale.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 480. n. 26. *der bengalische Specht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 235. n. 29. *Picus (Bengalensis) viridis, crista rubra, nucha nigra, fronte et iugulo albo nigroque vario, corpore subtus albo.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 113. n. 8. *Picus (Benghalensis) viridis, occipite rubro, nucha nigra, subtus anticeque albus, nigro maculatus.*

Gerin. ornithol. II. p. 50. Tab. 179.

β. *Der Kerella.*

Latham, Syn. II. p. 581. n. 26. B.

Latham, Vögel, I. 2. p. 480. n. 26. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 235. n. 29. β. *Picus viridis, capite maculis albis numerosis, dorso nigro medio coccineo.*

Naturf. XVII. p. 16. *ein zeylanischer Specht.*

γ. *Der*

γ. *Der philippinische Specht.* (5)

Latham, Syn. II. p. 581.

Latham, Vögel, I. 2. p. 481. n. 26. Var. B.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 236. n. 30. Picus (Philippinarum) fusco-viridis cristatus, subtus albo nigroque maculatus, uropygio rubro, rectricibus maculis albis.

42. GOENSIS. *Der grüne Specht von Goa.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 481. n. 27. *der Specht von Goa.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 235. n. 28. Picus (Goensis) viridis subcristatus, pileo coccineo, corpore subtus albido nigro undulato, temporibus vitta alba, lateribus colli striga nigra.

43. MANILLENSIS. *Der grüne Specht von Luçon.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 482. n. 28. *der manillische Specht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 236. n. 31. Picus (Manillensis) fordide viridis, vertice griseo-maculato, tectricibus caudae superioribus rubris, remigibus rectricibusque nigricantibus.

44. GOERTAN. *Der Goertan.*

Müller, Naturfyst. Supplem. p. 91. n. 23. *der Goertan.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 482. n. 29. *der Goertan.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 236. n. 32. Picus (Goertan) supra griseo-fuscus, subtus griseo-flavicans, vertice uropygioque coccineis.

45. CANUS.

(5) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

45. CANUS. *Der norwegische Specht.*

Halle, Vögel, p. 147. n. 88. *der grüne norwegische Baumhakker mit schwarzem Halsbündchen.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 262. C. *der Graukopf.*
Neuer Schaupl. d. Natur, VIII. p. 329. n. 15. *grauköpfiger Grünspecht.*

Klein, av. p. 28. n. 17. *Picus viridis*, supra uropygium lutescens, ad radicem rostri et ab inferiori mandibula ad latera capitis nigra linea curva, remigibus alarum nigro fuscis, albis punctis transversalibus, tectricibus flavicantibus.

Klein, Vorber. p. 54. n. 17. *Grünspecht mit einem gelben Steiß.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 30. n. 15. *grauköpfiger Grünspecht.*

Briffon, ornitholog. II. p. 46. n. 4. *Pic verd de Norwege.*

Seligmann, Vögel, III. Tab. 25. *grauköpfiger Grünspecht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 482. n. 30. *der grauköpfige Grünspecht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 236. n. 33. *Picus (Norwegicus) caeruleo-viridis*, capite, collo corporeque subtus cinereis, uropygio luteo, loribus mystacibusque nigris.

Gerin. ornithol. II. p. 50. Tab. 177.

46. PERSICUS. *Der persische Specht.*

Müller, Natur Syst. II. p. 228. b. *der gelbe persische Specht mit blauen Füßen.*

Briffon, ornitholog. II. p. 47. n. 5. *Pic jaune de Perse.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 483. n. 31. *der persische Specht.*

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 236. n. 34. Picus (Perficus) luteus, corpore supra subferrugineo, rectricibus luteo-ferrugineis, pedibus cyaneis.

Jonston, av. p. III. Picus luteus cyanopus.

14. SEMIROSTRIS. *Der halbschnäblichte Specht.* (6)
Müller, Naturfyft. II. p. 225. n. 14. *der Halbschnabel.*

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 329. n. 14. *Halbschnabel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 485. n. 35. *der halbschnäbliche Specht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 238. n. 38. Picus (Semirostris) fusco-cinereus, subtus albus, capite fusco flavescente maculato, maxilla superiore brevior.

Pallas, Naturgesch. merkww. Th. VI. p. 15. *der halbschnäbliche Specht.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 190. Picus semirostris.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 114. n. 9. Picus (Semirostris) maxilla superiore brevior.

15. PUBESCENS. *Der Daunenspecht.*

Müller, Naturfyft. II. p. 226. n. 15. *der virginische Specht.*

Halle, Vögel, p. 142. n. 80. *der haarige Baumhakker mit weißem haarigen Rückenstreife.*

Pennant, arct. Zool. p. 259. n. 81. *der Daunenspecht.*

Neuer Schaupl. der Natur, VIII. p. 329 n. 15. *rauhher Specht.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 507. *der kleinste Specht aus Virginien.*

Klein,

(6) *Pallas* hält ihn für einen veranftalteten Vogel einer ausländischen Art.

Klein, av. p. 27. n. 8. Picus varius minimus.

Klein, Vorbereit. p. 52. n. 8. *der kleinste Specht.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 29. n. 7. *kleinster Specht.*

Briffon, ornitholog. II. p. 55. n. 18. petit Pic varié de Virginie.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 42. *der kleine scheckige Specht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 474. n. 19. *der Daunenspecht.*

Latham, Syn. Supplem. p. 106. Little Woodpecker.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 332. n. 26. Picus (Pubescens) albo nigroque varius, subtus griseo - albus, rectrice extima alba, maculis quatuor nigris.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 244. n. 7. *der Daunenspecht.*

16. VILLOSUS. *Der haarige Specht. (?)*

Müller, Natursystem, II. p. 226. n. 16. *der zottige Specht.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 259. n. 80. *der haarige Specht.*

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 328. n. 9. *raucher Specht.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 509. *der haarige Baumhacker.*

Klein, av. p. 27. n. 9. Picus villosus medius.

Klein, Vorbereit. p. 52. n. 9. *rauche Specht.*

Klein, verb. Vögelh. p. 29. n. 9. *raucher Specht.*

Briffon, ornithol. II. p. 54. n. 17. Pic varié de Virginie.

Selig-

(7) Gewicht 2 Unzen.

II. Band I. Th.

LI

Seligmann, Vögel, I. Tab. 38. *der harige Specht.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 473. n. 18. *der haari-*
ge Specht.

Latham, Syn. Suppl. p. 108. Hairy Woodpecker.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 232. n. 19. Picus
 (Villofus) albo nigroque varius, subtus albus,
 dorso longitudinaliter subvillosus, rectricibus
 extimis toto albis.

Molina, Naturgesch. von Chili, p. 209. *der virgi-*
nianische Specht.

Schöpf, Reise durch Nordamerika, II. p. 12. Pi-
 cus villosus.

Philos. Transact. LXII. p. 388.

17. MAIOR. *Der große Buntspecht.* (8)

Müller, Natursystem, II. p. 227. n. 17. *der bunte*
Specht.

Leske, Naturgesch. p. 248. n. 3. *der Buntspecht.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 137. n. 6. *der Bunt-*
specht.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 167. n. 3.

Picus (Maior) albo nigroque varius. vertice
 rubro; *der große Bunt- oder Rothspecht.*

Bechstein,

- (8) Flügelweite 1 Fuß 6½ Z. Gewicht 23¼ Unzen. Kommt dem Grünspecht in Sitten und Betragen sehr gleich, hält sich aber mehr auf der Erde auf als dieser. Bewohnt die Wälder, besonders Laubhölzer. Liebt aber mehr Feldhölzer und Gärten, als tiefe Gebirge und Waldungen. Zieht in Deutschland nicht weg, und hält sich im Winter vorzüglich gern zu den Gärten. Frisst allerhand Insekten, auch Fichten- und Kiefernsaamen, Bucheckern, Eicheln, und Haselnüsse. Nistet in hohle Bäume, und legt auf eine unordentliche Unterlage von allerhand Geniste oder dem zermalmtten faulen Holze 5 bis 6 schmutzig weisse, mit einigen hellrothen Flecken bezeichnete Eyer. Das Fleisch ist wohlschmeckend, besonders in der Haselnußzeit.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 349. n. 3. *der große Buntspecht.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 511. n. 3. *der große Buntspecht.* p. 515. *Buntspecht, gespreukelter Specht, Elsterspecht, Baumhäckel, größerer Specht.*

Funke, Naturgesch. I. p. 301. *der Buntspecht.*

Ebert, Naturl. I. p. 46. *der bunte Specht.*

Halle, Vögel, p. 139. n. 77. *der größte schwarz- und weißbunte Baumhäcker.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 63. n. 74. *der große Buntspecht.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 258. n. 78. *der große Buntspecht.*

Neuer Schauplatz d. Nat. VIII. p. 328. n. 5. *großer Buntspecht.* p. 329. n. 17. *großer Specht.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 498. *der große Buntspecht.*

Handbuch der deutsch. Thiergesch. p. 101. *der Buntspecht, Rothspecht.*

Klein, av. p. 27. n. 6. *Picus discolor.*

Klein, Vorbereit. p. 51. n. 6. *großer Buntspecht.*

Klein, verbess. Vögelhistorie, p. 29. n. 5. *großer Buntspecht.*

Klein, Stemmat. av. p. 5. Tab. 4. fig. 3. a. c. d. e.

Klein, Vögeleyer, p. 17. Tab. 4. fig. 3.

Briffon, ornithol. II. p. 51. n. 13. *grand Pic varié.*

Batsch, Thiere, I. p. 307. *der große Buntspecht.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 465. n. 12. *der große Buntspecht.*

Latham, Syn. Supplem. p. 107. *Greater spotted Woodpecker.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 228. n. 13. *Picus (Maior) albo nigroque varius, crisso occipiteque rubro.*

- Beseke*, Vögel Kurl. p. 38. n. 59. 60. *der Buntspecht.*
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 311. n. 57. *bunter Specht.*
- Cetti*, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 81. *der schwarz und weiß gefleckte Specht.*
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 76. n. 68. *großer Buntspecht.*
- Fabricius*, Reis. n. Norweg. p. 183. *der Schwarzspecht.*
- Pontoppidan*, Naturgesch. v. Dännemark, p. 167. n. 3. *Buntspecht.*
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 47. n. 53. *der große Buntspecht.*
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 271. *der größere schwarz- und weißbunte Specht, Baumhäckel.*
- Döbel*, Jägerpraktik, I. p. 60. *der größere Rothoder Buntspecht.*
- Naumann*, Vogelsteller, p. 137. n. 3. *der große Buntspecht.*
- Naturforsch. IX. p. 55. n. 56. *bunter Specht.*
- Jablonsky*, allgemein. Lex. p. 1098. *der Buntspecht.*
- Bechstein*, Musterung schädli. Th. p. 112. n. 16. *der große Buntspecht.*
- Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII. p. 454. n. 21. *bunter Specht.*
- Eberhard*, Thiergesch. p. 104. *der Elster-Specht.*
- Meidinger*, Vorlesung. I. p. 119. n. 4. *der bunte Specht.*
- Kraft*, Ausrott. grauf. Th. I. p. 444. n. 12. *Aegelfter-Specht.*
- Günth*. Nest. u. Eyer, Tab. 61. *große Rothspecht.*
- Wisling*, Vögel, Tab. 58.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. II. p. 53. *Picus varius.*

Linne', Syst. Nat. Edit. VI. p. 20. n. 3. Picus varius maior.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 114. n. 10. Picus (Maior) albo nigroque varius, ano occipiteque rubro.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 99. Picus (Maior) albo nigroque varius, crisso occipiteque rubris.

Kramer, Austr. p. 335. n. 3. Picus pedum digitis duobus anticis: posticis duobus; albo nigroque varius, vertice nigro; *großes Baumhackl.*

Brünich, ornith. bor. p. 11. n. 40. Picus maior.

Gerin. ornith. II. p. 47. Tab. 167. 168.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 245. n. 8. *der Buntspecht.*

18. MEDIUS. *Der mittlere Buntspecht.*⁽⁹⁾

Müller, Natursystem, II. p. 227. n. 18. *der Weißspecht.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 350. n. 4. *der mittlere Buntspecht.*

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 516. n. 4. *der mittlere Buntspecht.* p. 518. *Elsterspecht, Weißspecht, kleinerer Specht.*

Ebert, Naturl. II. p. 46. *der Weißspecht, Aelsterspecht.*

Halle, Vögel, p. 140. n. 78. *der kleine schwarz- und weißbunte Baumhacker.*

Peunant, arct. Zoolog. p. 263. D. *der mittlere Buntspecht.*

Ll 3

Neuer

(9) Die Ornithologen sind noch nicht einig, ob diese Gattung von der vorhergehenden wirklich verschieden sey. *Lapeiroufe*, und mit ihm *Beseke*, *Bechstein* u. a. m. halten den *mittlern Buntspecht* für eine Varietät vom *großen Buntspecht*; und *Latham* ist geneigt, ihn für einen jungen Vogel dieser Gattung anzusehen.

- Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 328. n. 6.
kleiner Buntspecht. p. 329. n. 18. *Mittelspecht.*
- Onomat. hist. nat. VI. p. 501. *der mittlere Bunt-
 specht, Elsterspecht.*
- Handbuch der deutschen Thiergeschichte, p. 102.
kleiner Buntspecht.
- Gesner, Vögelb. p. 485. *Aegerstspecht.*
- Briffon, ornithol. II. p. 52. n. 14. *Pic varié.*
- Latham, Vögel, I. 2. p. 467. n. 13. *der mittlere
 Buntspecht.*
- Latham, Syn. Supplem. p. 107. Middle spotted
 Woodpecker.
- Latham, Syst. ornitholog. I. p. 229. n. 14. *Picus
 (Medius) albo nigroque varius, crisso pileo-
 que rubris.*
- Beseke, Vögel Kurlands, p. 38. n. 61. *der Weiß-
 specht.*
- Bock, Naturg. v. Preussen, IV. p. 312. *Weißspecht.*
- Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 76. n. 67.
Weißspecht.
- Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 167.
 n. 4. *Flagspette, haarigte Baumhacker.*
- Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 49. n. 54.
der mittlere Buntspecht.
- Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *der Elsterspecht.*
- Zorn, Petinotheol. p. 273. *eine merklich kleinere
 Gattung von dem schwarz- und weißbunten
 Specht.*
- Naturf. IX. p. 55. n. 57. *Weißspecht.*
- Lapeirouse: neue schwed. Abhandl. III. p. 104.
Picus medius.
- Bechstein, Musterung schädli. Thiere, p. 112. n. 16.
der mittlere Buntspecht.
- Eberhard, Thiergesch. p. 104. *der bunte kleine
 Specht.*

Wirfing, Vögel, Tab. 37. der mittlere, *Buntspecht*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 20. n. 4. *Picus varius minor*.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 114. n. 11. *Picus (Medius) albo nigroque varius, ano verticeque rubris*.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 12. n. 100. *Picus (Medius) albo nigroque varius, crisso pileoque rubris*.

Kramer, Austr. p. 336. n. 4. *Picus pedum digitis duobus anticis: posticis duobus; albo nigroque varius, vertice coccineo, pube rubra; kleines Baumhackl*.

Brünicb, ornith. bor. p. 11. n. 41. *Picus medius*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 339. *Picus varius maior; ein bundter Specht, gesprengleter Specht, Elster-Specht, Weis-Specht*.

Fonston, av. p. 111. *Picus maior*.

19. MINOR. *Der kleine Buntspecht.* (10)

Müller, Naturyst. II. p. 227. n. 19. *Grasspecht*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 138. n. 7. *der kleine Buntspecht*.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 167. n. 4. *Picus (Minor) albo nigroque varius, vertice rubro; der kleine Bunt- oder Rothspecht*.

Bechstein, Naturgesch. p. 350. n. 5. *der kleine Buntspecht*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 518. *der kleine Buntspecht*.

Ll 4

Ebert,

(10) Flügelweite 11 1/2 Zoll. Gewicht noch keine Unze. Nistet in Gärten und Wäldern in hohlen Bäumen. Legt vier grünlich weisse Eyer auf ein Nest von Moos und Grashalmen gebaut. Männchen und Weibchen brüten gemeinschaftlich vierzehn Tage.

- Ebert*, Naturl. II. p. 46. *der Graspsecht.*
Halle, Vögel, p. 141. n. 79. *der kleinste schwarz- und weißgefleckte Baumhacker.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 63. n. 75. *der kleine Buntspecht, Graspsecht.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 263. E. *der kleine Buntspecht.*
Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 328. n. 7. p. 329. n. 19. *kleinster Specht.*
Onomat. histor. nat. VI. p. 502. *der kleine Buntspecht, Graspsecht.*
Handbuch der deutschen Thiergeschichte, p. 102. *kleinster Specht, Harlekinspecht.*
Klein, av. p. 27. n. 7. *Picus discolor minor.*
Klein, Vorber. p. 51. n. 7. *kleiner Buntspecht.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 29. n. 6. *kleiner Buntspecht.*
Klein, stemm. av. p. 5. Tab. 4. fig. 2. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 17. Tab. 4. fig. 4.
Briffon, ornithol. II. p. 53. n. 15. *petit Pic varié.*
Batsch, Thiere, I. p. 307. *der kleine Buntspecht.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 468. n. 14. *der kleine Buntspecht.*
Latham, Syn. Supplem. p. 107. *Lesser spotted Woodpecker.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 229. n. 15. *Picus (Minor) albo nigroque varius, vertice rubro, crisso testaceo.*
Befeke, Vögel Kurl. p. 38. n. 62. 63. *der Graspsecht.*
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 312. n. 59. *Graspsecht, kleinster Specht, Harlekinspecht.*
Fischer, Livl. p. 77. n. 69. *Graspsecht, kleiner Baumsecht.*

- Pontoppidan*, Naturg. v. Dännemark, p. 167. n. 5.
Harlekinspecht.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 49. n. 55.
der kleine Buntspecht.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 273. *die kleinste Art von dem schwarz- und weißbunten Specht.*
- Naumann*, Vogelsteller, p. 137. n. 4. *der kleine Buntspecht.*
- Naturf. IX. p. 55. n. 58. *Grasspecht.*
- Bechstein*, Musterung schädll. Thiere, p. 113. n. 18.
der kleine Buntspecht.
- Eberhard*, Thiergesch. p. 105. *der Grasspecht.*
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 114. n. 12. Picus (Minor) albo nigroque varius, vertice rubro, ano albido.
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 101. Picus (Minor) albo nigroque varius, vertice rubro, crisso testaceo.
- Kramer*, Austr. p. 336. n. 5. Picus pedum digitis duobus anticis, posticis duobus; albo nigroque varius, vertice coccineo, pube testacea; *Baumhackerl.*
- Brünnich*, ornitholog. bor. p. 11. Picus minor.
- Schwenkfeld*, aviar. Siles. p. 340. Picus varius minor; *ein kleiner bunter Specht.*
- Fonston*, av. p. 111. Picus varius minor.
- Gerin*. ornith. II. p. 48. Tab. 170. fig. 1.
- Donndorff*, Handb. der Thiergesch. p. 245. n. 9.
der kleine Bunt- oder Rothspecht.
- β. Picus albo nigroque varius, vertice, nucha cerviceque nigro-griseis, corpore subtus flavescente nigro maculato. *
- Latham*, Vögel, I. 2. p. 470. n. 14. Var. A.
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 230. n. 15. β.

Sonnerat, voy. p. 118. Tab. 77. Petit pic d'Antigue.

Habitat in Insula *Panay*. An foeminae varietas?

- γ. *Picus* albo nigroque varius, occipite subcristato, macula verticis coccinea, fronte, genis corporeque subtus albis. *

Latham, Syn. Suppl. p. 108. n. 14. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 230. n. 15. β.

Habitat in *Zeylona*; magnitudine minori cedens.

47. TRICOLOR. *Der dreyfarbige Specht.*

Müller, Natursystem, II. p. 228. e. *der mexicanische bunte Specht?*

Klein, av. p. 62. n. 6. *Pica mexicana alia?*

Klein, Vorber. p. 117 n. 6. *mexicanische Aelster?*

Klein, av. p. 127, n. 2. *Iaculator cinereus?*

Klein, Vorber. p. 236. n. 2. *dunkelgrauer Harpunirer?*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 134. n. 2. *dunkelgrauer Harpunirer?*

Briffon, ornitholog. II. p. 57. n. 21. grand Pic varié du Mexique.

Briffon, ornitholog. II. p. 58. n. 22. petit Pic varié du Mexique.

Latham, Vögel, I. 2. p. 470. n. 15. *der mexicanische Buntspecht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 230 n. 16. *Picus* (Tricolor) niger, striis transversis albis, pectore abdomineque rubris.

Seba, thes. I. p. 101. Tab. 64. fig. 6. *P. mexicana.*

Moehring, av. gen. p. 79. n. 100 *Cornix?*

Gavin. ornith. II. p. 50. Tab. 178.

48. CANADENSIS. *Der canadische Specht.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 258. n. 79. *der canadische Buntspecht.*

Briffon, ornithol. II. p. 54. n. 16. Pic varié de Canada.

Latham, Vögel, I. 2. p. 471. n. 17. *der canadische Buntspecht.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 230. n. 17. Picus (Canadensis) albo nigroque varius, corpore subtus dorsoque medio albo, nucha fulva, re-ctricibus 2. intermediis nigris immaculatis, duabus extimis albis, basi nigris.

20. VARIUS. *Der gelbbäuchige Specht.*

Müller, Naturf. II. p. 227. n. 20. *scheckigter Specht.*

Halle, Vögel, p. 142. n. 81. *der kleine gelbbäuchige Baumhacker.*

Neuer Schaupl. der Natur. VIII. p. 328. n. 10. *gelbbrüstiger kleiner Buntspecht.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 509. *der kleine gelbbäuchige Buntspecht.*

Klein, av. p. 27. n. 10. Picus varius minor, ventre luteo.

Klein, Vorber. p. 52. n. 10. *gelbbrüstiger kleiner Buntspecht.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 29. n. 10. *gelbbrüstiger kleiner Buntspecht.*

Briffon, ornitholog. II. p. 59. n. 24. Pic varié de la Caroline.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 42. *der Specht mit dem gelben Leib.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 475. n. 20. *der schäckige Specht.*

Latham, Syn. Supplem. p. 109. Yellow bellied Woodpecker.

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 232. n. 21. Picus
(*Varius*) albo nigroque varius, vertice rubro,
criffo albo, fusco fasciato.

49. FLAVIPES. *Der gelbfüßige Specht.* (1)
Pennant, arct. Zool. II. p. 260. n. 83. *der Specht*
mit gelben Füßen.

50. BICOLOR. *Der zweyfarbige Specht.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 476. n. 21, *der zwey-*
farbige Specht.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 233. n. 22. Picus
(*Variegatus*) capite subcrifato, lateribus rubro
notato, corpore supra transversim, subtus lon-
gitudinaliter fusco alboque vario, genis albis.

51. CARDINALIS. *Der Cardinalspecht.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 476. n. 22. *der Car-*
dinalspecht.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 233. n. 23. Picus
(*Cardinalis*) albo nigroque varius, subtus al-
bus, maculis oblongis nigris, lateribus colli
vitta utrinque alba, vertice nuhaque rubris,

52. NUBICUS. *Der Specht aus Nubien.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 477. n. 23. *der nubische*
Specht.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 233. n. 24. Picus
(*Nubicus*) fusco albo rufoque undato-macula-
tus, vertice nigro albo punctato, occipite cri-
ftrato rubro, collo pectoreque albidis nigro-
guttatis.

53. MOLUCCENSIS. *Der molukkische Specht.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 477. n. 24. *der Braun-*
specht.

Latham,

(1) Ist, nach *Latham*, mit *P. Hirundinaceus* p. 426. n. 5. einerley.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 223. n. 25. *Picus* (Moluccensis) fusco nigricans albo undatus, subtus albidus fusco sagittatus, crisso albo, remigibus rectricibusque albo maculatis.

β. *Picus* fusco nigricans albo maculatus, subtus albus, capite albo, vertice maculaque infra oculos fuscis. *

Latham, Syft. ornithol. I. p. 224. n. 25. β.

Latham, Syn. Suppl. p. 103. Little brown Woodpecker.

Habitat in India; 5 pollices longus.

21. TRIDACTYLUS. *Der dreyzehige Specht.*(2)

Müller, Naturfyftem, II. p. 229. n. 21. *Dreyfingerige*.

Leske, Naturgefch. p. 249. n. 4. *der dreyzehige Specht*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 138. n. 8. *der dreizehige Specht*.

Bechstein, Naturgefch. I. p. 351. n. 6. *der dreyzehige Specht*.

Bechstein, Naturgefch. Deutschl. II. p. 521. n. 6. *der dreyzehige Specht*.

Halle, Vögel, p. 148. * *der dreizehige Baumhakker*.

Gatte

(2) Flügelweite 15 $\frac{3}{4}$ Zoll. Gewicht 2 Unzen. — Es wird aber die Größe dieser Gattung von den Ornithologen ganz verschieden angegeben. In unserm System wird sie auf 11 Zoll bestimmt. *Pennant* setzt sie auf 8 Zoll. *Beseke* beschreibt diesen Specht um ein Drittheil kleiner als den *Picus medius*. *Tengmalm* sagt: seine Größe falle zwischen die Größe des *Medius* und *Minor* u. s. w. In Rußland gehört er unter die seltenen Vögel. Das Weibchen hat eine glänzend weiße, silberhafte, das Männchen aber eine goldgelbe Platte.

- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 63. n. 76. *der dreyzehige Specht.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 261. n. 84. *der Specht mit drey Zehen.*
- Neuer Schaupl. d. Nat. VIII. p. 329. n. 17. *dreyzählicher Specht.*
- Onomat. histor. nat. VI. p. 507. *der dreyzeeigte Specht.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 30. n. 17. *Specht mit außerordentlichen Füßen; Dreyzee.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 308. *der dreyzehige Specht.*
- Seligmann*, Vögel, V. Tab. 9. *der Specht mit drey Zehen.*
- Latham*, Vögel, I. 2. p. 495. *der dreyzehige Specht.*
- Latham*, Syn. Suppl. p. 112. Three-toed Woodpecker.
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 243. n. 56. Picus (Tridactylus) albo nigroque varius, pedibus tridactylis.
- Beseke*, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 39. n. 64. *der dreyfingerige Specht.*
- Pallas*, Reif. Ausz. I. p. 87. *der dreyzehige Specht.*
- Pallas*, Naturgesch. merkwl. Thiere, VI. p. 13. ** *der dreyzehige Specht.*
- Schwed. Abh. I. p. 263. Picus pedibus tridactylis.
- Tengmalm*: neue schwed. Abh. IV. p. 46. Picus tridactylus.
- Georgi*, Reise d. Rufsl. I. p. 165.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 50. n. 56. *der dreyzähigte Specht.*
- Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde, VII. p. 454. n. 22. *der dreyfingerige Specht.*
- Bechstein*, Musterung schäd. Thiere, p. 114. n. 19. *der dreyzehige Specht.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 20. n. 5. Picus pedibus tridactylis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 114. n. 13. Picus (Tridactylus) albo nigroque varius, pedibus tridactylis.

Gerin. ornith. II. p. 50. Tab. 180.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 190. Picus tridactylus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 245. n. 10. der dreyzehige Specht.

β. *Briffon*, ornith. II. p. 56. n. 20. Pic varié de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 496. n. 54. Var. A. der (südliche) dreyzehige Specht.

Latham, Syn. II. p. 601. n. 51. A. Southern 3-toed Woodpecker.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 243. n. 56. β. Picus albo nigroque varius, subtus albus.

Bankroft, Naturgeschichte von Guiana, p. 98. der gujanische Specht.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 32 Gattungen vermehrt. Bey der 5ten Gattung sind drey, bey der 10ten drey, bey der 12ten zwey, bey der 13ten drey, und bey der 21sten zwey Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der Specht von Malacca.*

Latham, Syn. Suppl. p. 111. Malacca Woodpecker.

Latham, Vögel, I. 2. p. 494. n. 51. der Specht aus Malakka.

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 241. n. 51. *Picus* (Malaccensis) cristatus, pileo humerisque coccineis, gula iuguloque rufo-flavis, corpore subtus albo nigroque fasciato, cauda nigra.

60. GESCHLECHT. SITTA. *Die Spechtmeise.*
(*Blauspecht, Grauspecht.*)

Müller, Natur Syst. II. p. 261. Gen. LX.

Leske, Naturgesch. p. 249. Gen. XXIX.

Borowsky, Thierreich, II. p. 139. Gen. XVIII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 167.
Gen. X.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 351. Gen. XI.

Berthstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 522.
Gen. X.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 265.

Onomat. hist. nat. VII. p. 188.

Briffon, ornith. I. p. 474. Gen. XLII.

Batsch, Thiere, I. p. 315. Gen. LXIV.

Latham, allgem. Ueberf. der Vögel, I. 2. p. 530.
Gen. XXIV.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 261. Gen. XXV.

Büffon, Vögel, XVII. p. 192 ff.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 188. 204.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 245.
Gen. XXI.

1. EUROPAEA. *Die gemeine Spechtmeise.*(3)

Müller, Natur Syst. II. p. 232. n. 1. *europäische*
Blauspecht. Tab. 7. fig. 10.

Leske,

- (3) Gewicht des Männchens eine Unze; des Weibchens etwa sechs Quentchen. Letzteres ist auch am Ober- und Unterleibe etwas blässer, hat auch keine blaue Stirne wie das Männchen. — Bemerkenswerth ist es, daß dieser Vogel, wenn er auffirzt

Leske, Naturgesch. p. 249. n. 1. *der gemeine Grauspecht.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 139. n. 1. *der Grauspecht, die blaue Spechtmeise, Kleiber.* Tabula XVII.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 167. n. 1. *der Blauspecht.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 352. *die gemeine Spechtmeise.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 523. n. 1. *die gemeine Spechtmeise.* p. 526. *Blauspecht, Grauspecht, Mausspecht, Holzhacker, Nußhacker, Baum picker, Kleiber, blaue Spechtmeise, größte Meise, europäischer Sittvogel, Kleiner, Klüber, Tottler, Kottler, spechtartige Meise, Kleiberblauspecht, Barleß.*

Funke, Naturgesch. I. p. 301. *der Blauspecht.*

Halle, Vögel, p. 364. n. 357. *die blaue Spechtmeise, Nußhacker.*

Meyer, Thiere, II. Tab. 37. (mit dem Gerippe.)

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 64. n. 78 *der Blauspecht u. s. w.*

Neuer Schaupl. der Natur, I. p. 834. *Blauspecht.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 189. *der europäische Blauspecht oder Grauspecht.*

Handbuch der Naturgesch. II. p. 174. *die spechtartige Meise.*

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 102. *der Blauspecht.*

Klein, av. p. 87. n. 15. *Parus facie pici.*

Klein,

ansitzt oder sonst ruhet, den Kopf größtentheils abwärts gesenkt, oder wenigstens in gleicher Linie mit dem Körper, und nicht erhoben wie andere Vögel trägt. Man findet ihn oft in Gesellschaft der Kohl- und Blaumeise.

- Klein*, Vorbereit. p. 162. n. 15. *spechtartige Meise*, *Blauspecht*.
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 89. n. 15. *spechtartige Meise*.
- Klein*, stemmat. av. p. 16. Tab. 17. fig. 6. a. b.
- Klein*, Vögeleyer, p. 28. Tab. 4. fig. 6.
- Gesner*, Vögelb. p. 482. *Chlän*.
- Briffon*, ornith. I. p. 474. n. i. *Torchepot*.
- Büffon*, Vögel, XVII. p. 192. *der Blauspecht oder die Spechtmeise*; mit 1 Fig.
- Batsch*, Thiere, I. p. 319. *der gemeine europäische Grauspecht*.
- Latham*, Vögel, I. 2. p. 530. *die gemeine Spechtmeise*.
- Latham*, Syn. Suppl. p. 117. *Nuthatch*.
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 261. n. 1. *Sitta* (Europaea) cinerea, subtus rufescens, rectricibus nigris, lateralibus quatuor infra apicem albis.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 39. n. 65. *der europäische Blauspecht*.
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 313. n. 61. *Blauspecht*, *spechtfarbige Meise*.
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 77. n. 70. *Blauspecht*.
- Lepechin*, Tagebuch der russ. Reif. II. p. 5. *Blauspechte*.
- Pontoppidan*, Naturg. von Dännemark, p. 167. n. 1. *Spettmeise*.
- Pontoppidan*, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 136. *Egde?*
- Pontoppidan*, Norwegen, II. p. 168. *Natvake?*
- Fabric*. Reif. n. Norweg. p. 335. *Sitta europaea*.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 60. *der Blauspecht*.
- Naumann*, Vogelsteller, p. 137. *der Blauspecht*.

- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 51. n. 57. *der Kleber-Blauspecht.*
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 43. 273. *Blauspecht, Kleiber.*
- Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Freunde, VII. p. 455. n. 23. *der europäische Blauspecht.*
- Naturf. IX. p. 56. n. 60. *europäischer Blauspecht.*
- Naturforsch. XXV. p. 18. *Blauspecht.*
- Linné*, auserles. Abhandl. II. p. 290. n. 67. *der Blau-Specht.*
- Anweisung Vögel zu fangen u. f. w. p. 114. *Blau-specht.*
- Angenehme Landluft, p. 104. *Blauspecht.*
- Börner*, schles. ökon. Nachr. 1781. p. 82. n. 28. *Blauspecht.*
- Günther*, Nester u. Eyer, Tab. 64. *Blau-Specht.*
- Wirsing*, Vögel, Tab. 7. *Klauber.*
- Bechstein*, Musterung schäd. Thiere, p. 114. n. 20. *die gemeine Spechtmeise.*
- Meidinger*, Vorles. I. p. 119. *der gemeine Grauspecht.*
- Eberhard*, Thiergesch. p. 86. *Nußhacker, Spechtmeise.*
- Linné*, Syst. Nat. Edit. II. p. 53. *Picus cinereus.*
- Linné*, Syst. Nat. Ed. VI. p. 30. n. 1. *Sitta, Picus cinereus.*
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 115. *Sitta (Europaea) rectricibus nigris, lateralibus quatuor infra apicem albis.*
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 102. *Sitta (Europaea) rectricibus nigris, lateralibus quatuor infra apicem albis.*
- Kramer*, Austr. p. 362. n. 1. *Sitta rectricibus fuscis: quatuor in margine apiceque albis, quinta apice cana; Klener.*

Brünnich, ornitholog. bor. p. II. n. 42. Sitta Euro-
paea.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 340. Picus subcaer-
ruleus; ein *Blauspecht*, *Meyspecht*, *Baumhecker*,
große Baumkletter.

Moehring, av. gen. p. 35. n. 15. Sitta.

Rzaczyński, auct. hist. nat. Polon. p. 413.

Barrere, spec. nov. Cl. III. Gen. 13. sp. 4. Picus
Pyrenaicus, cinereus pusillus.

Belon, ois. p. 304. Torche pot, Gimpereau.

Fonston, av. p. III. Picus cinereus seu Sitta.

Philos. Transact. xxviii. p. 170.

Schaefer, elem. ornith. Tab. 62.

Gerin, ornith. II. p. 54. Tab. 193.

Aristotel, histor. animal. Lib. IX. c. 22. n. 173.

ΣΙΤΤΗ.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 246. n. 1.
der gemeine Grauspecht.

β. SITTA MINOR. *Die kleine Spechtmeise*.

Briffon, ornitholog. I. p. 475. A. petit Tor-
chepot.

Büffon, Vögel, XVII. p. 211. *die kleine Specht-
meise*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 532. *die kleine gemeine
Spechtmeise*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 262. n. 1. β.
Sitta minor.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 204. Sitta
parva.

γ. SITTA

(4) Ist, nach *Bechstein*, nichts anders als die obige Spechtmeise
nur aus einem kleinen Ey entsprungen, oder durch einen
andern Zufall im Wuchs gehindert. *Briffon* sagt: er kenne
den Vogel gar nicht.

γ. SITTA CAROLINENSIS. Die schwarzköpfige karolinische Spechtmeise (5)

Müller, Naturf. II. p. 232. ad n. 1. der kleine Schwarzkopf.

Halle, Vögel, p. 365. n. 358. die Spechtmeise aus Karolina mit schwarzem Kopfe.

Briffon, ornitholog. I. p. 476. n. 4. Torchepot de la Caroline.

Büffon, Vögel, XVII. p. 220. die schwarzköpfige Spechtmeise; mit 1 Fig.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 266. n. 87. der Schwarzkopf.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 44. der Baumhäcker mit dem schwarzen Kopfe.

Latham, Vögel, I. 2. p. 532. n. 2. die schwarzköpfige Spechtmeise.

Latham, Syn. Suppl. p. 117. Black-headed Nuthatch.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 262. n. 3. Sitta (Carolinensis) cinerea, subtus candicans, abdomine imo rufescente, capite et collo superiore nigris, rectricibus lateralibus albo nigroque variis.

Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 115. n. 1. β. Sitta capite nigro.

δ. SITTA CAROLINENSIS MINOR. Die kleine braunköpfige carolinische Spechtmeise. (6)

Müller, Naturf. II. p. 232. ad n. 1. der Braunkopf.

M m 3

Halle,

(5) Nach Briffon, Pennant und Latham eine eigene Gattung. Catesby giebt das Gewicht dieses Vogels auf 13 Pfenniggewichte und 5 Grane, seine Länge aber auf $5\frac{1}{4}$ Zoll an. Männchen und Weibchen sehen sich sehr gleich. Findet sich auch in Jamaica.

(6) Nach Briffon, Pennant und Latham eine eigne Gattung. Die Länge wird von letzterm in der Synops. auf $4\frac{1}{3}$ Zoll;

Halle, Vögel, p. 365. n. 359. *die Spechtmeise mit braunem Kopfe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 266. n. 88. *der kleine Grauspecht.*

Briffon, ornitholog. I. p. 477. n. 5. petit Torchepot. de la Caroline.

Büffon, Vögel, XVII. p. 223. *die kleine braunköpfige Specht-Meise*; m. I Fig.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 44. *der Baumhacker mit dem braunen Kopfe.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 533. n. 3. *die kleine Spechtmeise.*

Latham, Syn. Suppl. p. 118. Least Nuthatch.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 263. n. 5. Sitta (Puffilla) cinerea, subtus fordide alba, capite fusco, macula occipitis fordide alba, rectricibus lateralibus nigris

Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 115. n. 1. β . Sitta capite fusco.

2. *Sitta subtus alba, capite colloque fuliginoso, dorso nigro.* (7)

Beseke, Vögel Kurl. p. 272. n. 156.

Büffon, Vögel, XVII. p. 235.

3. CANADENSIS. *Die canadische Spechtmeise.* (8)

Müller, Naturf. II. p. 233. n. 2. *canad. Blauspecht.*

Pennant,

im Suppl. auf $3\frac{1}{2}$ Zoll; und im Syst. ornith. auf $4\frac{1}{2}$ Zoll angegeben. S. die 9. Note.

(7) Diese Spielart ist im System ganz wegzustreichen. Sie ist durch einen Irrthum und Verwechslung mit dem Wasserstaar (Sturnus Cinclus) entstanden, welchen Beseke für eine Sitta zu halten verleitet worden. Er hat seine vorige Behauptung in der angeführten Schrift widerrufen.

(8) Länge nach Büffon und Latham 4 Zoll 10 Linien. Beobachten vermuthet, in der Note zur Uebersetzung des Latham'schen

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 265. n. 86. der canadische Grauspecht.

Onomat. histor. nat. VII. p. 188. der Blauspecht aus Canada.

Briffon, ornitholog. I. p. 475. n. 2. Torchepot de Canada.

Büffon, Vögel, XVII. p. 213. die canadische Spechtmeise.

Latham, Vögel, I. 2. p. 534. n. 4. die canadische Spechtmeise.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 262. n. 2. Sitta (Canadensis) cinerea, subtus dilute rufa, fascia superciliari candida, pone oculos nigricante, rectricibus lateralibus quatuor extimis, apice intus albis.

Gerin. ornithol. II. p. 54. Tab. 193.

3. JAMAICENSIS. Die Spechtmeise von Jamaica. (9)

Müller, Naturfyft. II. p. 233. n. 3. jamaicaische Blauspecht.

Borowsky, Thierreich, II. p. 140. n. 2. der jamaicaische Grauspecht.

M m 4

Onomat.

schen Werks p. 534. das die canadische Spechtmeise, wohl von *Latham* und *Pennant* mit der schwarzköpfigen carolinischen Spechtmeise (p. 540. n. 1. γ des Systems) verwechselt seyn möge, und das einer die canadische Spechtmeise unter dem Namen schwarzköpfige, der andere aber die schwarzköpfige unter dem Namen der canadischen beschreiben möge. Im Syst. ornithol. I. c. zweifelt *Latham*, ob die canadische wohl wirklich eine besondere Gattung sey.

(9) Die Bemerkung, das der Vogel sich in Gebüsch und Heiden aufhalte, und den Namen *Loggerhead* (Dummkopf) daher erhalten habe, weil er sich so nahe kommen lasse, das man ihn mit dem Stocke todtschlagen könne, macht *Latham* bey dieser, und der kleinen brannköpfigen carolinischen Spechtmeise.

Onomat. hist. nat. VII. p. 190. *der Blauspecht aus Jamaika.*

Briffon, ornithol. I. p. 476. n. 3. Torchepot de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, XVII. p. 216. *die Spechtmeise mit schwarzer Haube*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 535. n. 5. *die Spechtmeise aus Jamaika.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 262. n. 4. *Sitta* (Jamaicensis) cinerea, subtus alba, vertice nigro, rectricibus lateralibus nigricantibus, apice lineis transversis albis notatis.

Barrere, sp. nov. Cl. III. Gen. 21. p. 47. *C. Merops americanus*, cinereus, capite nigro.

Barrere, Fr. equinox. p. 136. *Merops maior*, capite nigro.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 246. n. 2. *der jamaikaische Grauspecht.*

β. *Die kleinere Spechtmeise von Jamaica.* ⁽¹⁰⁾

Briffon, ornitholog. I. p. 476. n. 3. A. petit Torchepot de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, XVII. p. 219. *die kleine Spechtmeise mit schwarzer Haube.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 335. n. 5. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 263. n. 4. A.

4. MAIOR. *Die große Spechtmeise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 225. *die große krummschnabligte Spechtmeise.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 535. n. 6. *die große Spechtmeise.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 263. n. 6. *Sitta* (Maior) grisea, subtus albescens, gula alba, remigibus rectricibusque fuscis, margine fulvis.

Hermann,

(10) Nach *Büffon* ein junger Vogel.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 204. Sitta curvirostris.

5. **NAEVIA.** *Die gefleckte Spechtmeise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 227. die gesprenkelte Spechtmeise; mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, IX. Tab. 36.

Latham, Vögel, I. 2. p. 536. n. 7. die gefleckte Spechtmeise.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 263. n. 7. Sitta (Naevia) plumbea, albo-maculata, subtus caeruleo-cinerea, lineis longitudinalibus albis, gula alba.

6. **SURINAMENSIS.** *Die surinamische Spechtmeise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 227. die surinamische Spechtmeise.

Latham, Vögel, I. 2. p. 536. n. 8. die surinamische Spechtmeise.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 263. n. 8. Sitta (Surinamensis) castaneo-rufa, subtus rufescente-alba, alis nigris, tectricibus albo-maculatis, cauda nigra, apice alba.

7. **CAPFRA.** *Die capsche Spechtmeise.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 231. die Spechtmeise vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

Latham, Vögel, I. 2. p. 537. n. 10. die capsche Spechtmeise.

Latham, Syn. Suppl. p. 118. Cape Nuthatch.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 264. n. 9. Sitta (Caffra) supra flavo nigroque varia, subtus flava, pedibus nigris.

8. *SINENSIS.* *Die chinesische Spechtmeise.* (1)

Büffon, Vögel, XVII. p. 230. *die chinesische Spechtmeise.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 536. n. 9. *die chinesische Spechtmeise.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 74. n. 22. β. *Lanius capite cristato nigro, corpore fusco-ferugineo, subtus albo, prope oculos macula rubra, gula nigra, uropygio flavo, rectricibus apice albis.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 5 Gattungen vermehrt; die 4te bis 8te sind neu; bey der 1sten ist die Var. β. hinzugekommen, und bey der 3ten sind gleichfalls 2 Spielarten aus einander gesetzt.

B. *Neuere Gattungen.*1. *Die langschnäblige Spechtmeise in Batavia.*

Latham, Syn. Supplem. p. 118. Long-billed Nut-hatch.

Latham, Vögel, I. 2. p. 537. n. 11. *die lang-schnäblige Spechtmeise.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 264. n. 10. Sitta (Longirostris) caerulefcens, subtus pallide rufescens, remigibus primoribus apice fuscis, lorris nigris.

2. *Die Grünlings - Spechtmeise vom Cap.*

Büffon, Vögel, XVII. p. 233. *der Grünlings-Blauspecht.*

Sparr-

(1) Im Syst. ornith. hat *Latham* diesen Vogel als eine Spielart von *Lanius iocofus* aufgeführt.

Sparrmann, mus. Carlf. fasc. II. Tab. 33. Sitta
Chloris.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 264. n. II. Sitta
(Chloris) corpore supra viridi, subtus candido,
cauda atra, ultimo apice flavicante.

61. GESCHLECHT. TODUS. *Der Plattschna-
bel.* (*Bastardeisvogel.*)

Müller, Naturyst. II. p. 234. Gen. LXI.

Leske, Naturgesch. p. 249. Gen. XXX.

Borowsky, Thierreich, II. p. 140. Gen. XIX.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 168.
Gen. XI.

Onomat. hist. nat. VII. p. 539.

Briffon, ornith. II. p. 192. Gen. LIX.

Batsch, Thiere, I. p. 308. n. 4.

Latham, allgem. Ueberf. der Vögel, I. 2. p. 538.
Gen. XXV.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 265. Gen. XXVI.

Pallas, Naturgesch. merkwl. Th. VI. p. 18.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 193.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 247.
Gen. XXII.

I. VIRIDIS. *Der grüne Plattschnabel.*

Müller, Natursystem, II. p. 234. n. I. *der Grüne.*
Tab. 8. fig. 1.

Borowsky, Thierreich, II. p. 141. n. I. *der grüne*
Bastard-Eisvogel, der Grünsperling. Tab. 14.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 168. n. I.
Todus (Viridis) pectore rubro.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 172.
der grüne Bastardeisvogel.

Onomat. hist. nat. VII. p. 541. *der grüne Bastard-
eisvogel.*

Handb.

- Handb. d. Naturgesch. II. p. 297. *der Todier.*
Klein, av. p. 79. n. 6. *Sylvia gula phoenicea.*
Klein, Vorbereit. p. 148. n. 16. *Scharlatkehlein.*
Klein, verbesserte Vögelhist. p. 80. n. 20. *Scharlatkehlein.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 109. n. 7. *grüner Honigsauger.*
Briffon, ornithol. II. p. 192. n. 1. *Todier.*
Seligmann, Vögel, VII. Tab. 16. *der grüne Sperling, oder das grüne Colibritchen.*
Pallas, Naturgesch. merkwl. Thiere, VI. p. 19. *der grünliche Plattschnabel.*
Eberhard, Thiergesch. p. 92. *der Todus.*
Latham, Syn. II. p. 657. n. 1. *Green Tody.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 538. n. 1. *der grüne Plattschnabel.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 264. n. 1. *Todus (Viridis) viridis, fubtus roseo-flavescens, pectore rubro.*
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 116. n. 4. *Alcedo (Todus) brachyura viridis, gula sanguinea, abdomine albo.*
Hermann, tab. affinit. animal. p. 193. *Todus viridis.*
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 247. n. 1. *der grüne Bastardeisvogel.*

2. CINEREUS. *Der Tic-tic.*

- Müller*, Naturfyft. II. p. 235. n. 2. *der Aschgraue.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 141. n. 2. *der aschgraue Bastard-Eisvogel.*
Onomat. histor. nat. VII. p. 540. der graue Bastardeisvogel.
Briffon, ornitholog. II. p. 193. n. 3. *Todier cendré.*

Pallas,

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 19. *der oben graue und unten hellgelbe Plattschnabel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 539. n. 3. *der aschgraue Plattschnabel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 265. n. 2. Todus (Cinereus) cinereus, subtus luteus, rectricibus binis intermediis nigricantibus, lateralibus fuscis, apice albis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 193. Todus cinereus.

3. FUSCUS. *Der braune Plattschnabel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 539. n. 3. *der braune Plattschnabel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 266. n. 3. Todus (Fuscus) ferrugineo-fuscus, subtus olivaceus albo-maculatus, alis fascia nigricante, cauda ferruginea.

4. CAERULEUS. *Der blaue Plattschnabel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 540. n. 4. *der blaue Plattschnabel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 266. n. 4. Todus (Caeruleus) cyaneus, subtus fulvus, gula alba, sub oculis macula purpurea.

5. VARIUS. *Der bunte Plattschnabel.*

Briffon, ornithol. II. p. 193. n. 2. Todier varié.

Latham, Vögel, I. 2. p. 540. n. 5. *der bunte Plattschnabel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 266. n. 5. Todus (Varius) caeruleo nigro viridique varius, capite colloque caeruleo-nigris, tectricibus alarum viridibus.

Jonston, av. p. 157. Aliud *Ispidae* genus, quod ex India adfertur.

6. **LEUCOCEPHALUS.** *Der weißköpfige Platt-*
schnabel.

Borowsky, Thierreich, II. p. 145. n. 3. *der*
weißköpfige Plattschnabel.

Pallas, Naturgesch. merkww. Th. VI. p. 18. *der*
weißköpfige Plattschnabel. Tab. 3. fig. 2.

Latham, Vögel, I. 2. p. 540. n. 6. *der weißköpfi-*
ge Plattschnabel. Tab. 31. fig. 2.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 266. n. 6. *Todus*
(*Leucocephalus*) *nigricans*, capite, gula col-
loque superiore albis.

7. **BRACHYURUS.** *Der kurzschwänzige Platt-*
schnabel.

Pallas, Naturgesch. merkww. Thiere, VI. p. 22.
die siebente Art.

Latham, Vögel, I. 2. p. 541. n. 7. *der kurz-*
geschwänzige Plattschnabel.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 266. n. 7. *Todus*
(*Brachyurus*) *niger*, sincipite, genis corporeque
subtus albis, cauda abbreviata.

8. **PLUMBEUS.** *Der bleifarbene Platt-*
schnabel.

Pallas, Naturgesch. merkww. Th. VI. p. 19. *eine*
dritte Art.

Latham, Vögel, I. 2. p. 541. n. 8. *der bley-*
farbene Plattschnabel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 267. n. 8. *Todus*
(*Plumbeus*) *plumbeo-nigricans*, subtus niveus,
vertice, remigibus rectricibusque nigricantibus.

9. **OBSCURUS.** *Der dunkelbraune Platt-*
schnabel.⁽²⁾

Pennant, arct. Zool. II. p. 266. n. 89. *der dun-*
kelbraune Bastardeisvogel.

Latham,

(2) Größe, nach *Pallas*, einer Nachtigall; nach *Pennant* eines
Feldsperlings; nach *Latham*, einer Winternachtigall. (*Motacilla*
modularis.)

Latham, Vögel, I. 2. p. 541. n. 9. *der dunkel-
farbige Plattschnabel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 267. n. 9. *Todus*
(Obscurus) olivaceo-fuscus, subtus albo fla-
vescens, gula pallida.

Pallas, spicil. zool. VI. p. 17. Species quarta.

Pallas, Naturgesch. merkww. Th. VI. p. 20. *eine
vierte größere Gattung.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 247. n. 2.
der dunkelbraune Bastardeisvogel.

10. REGIUS. *Der Königsplattschnabel.* (3)

Latham, Vögel, I. 2. p. 542. n. 10. *der schöne
Plattschnabel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 267. n. 10. *Todus*
(Regius) fusco-nigricans cristatus, pectore al-
bido nigricante transversim striato, gula super-
ciliisque albis, abdomine, uropygio caudaque
rufis.

11. PARADISEUS. *Der paradiesartige Platt-
schnabel.* (4)

Müller, Natursystem, II. p. 595. n. 1. *der Katon-
dieb.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 175. n. 1. *der Katon-
dieb.* Tab. 70.

Halle,

(3) *Latham* rechnet hierher auch als Spielart den *Todus Cristatus*
p. 446. n. 16.

(4) Bey dieser Gattung, und den dazu gerechneten Varietäten,
ist bey den Systematikern ein gewaltiger Mischmasch. Man
kann darüber *Pallas* Naturgesch. merkww. Thiere a. a. O.
p. 20. not. **; und *Buffon* am angef. O. p. 101. nachlesen.
Sonst bemerke ich noch, das in unserm System diese Gat-
tung, mit allen ihren Varietäten, aus Versehen nochmals
p. 929. unter dem Geschlecht *Muscicapa* n. 1. aufgeführt
worden.

- Halle*, Vögel, p. 266. n. 215. *der weiß- und schwarzbunte Paradiesheher.*
- Onomat. histor. natur. V. p. 79. *der weiß- und schwarzbunte Paradiesheher.*
- Klein*, av. p. 62. n. 9. Pica ex albo et nigro varia, duabus caudae penuis simplicibus praelongis.
- Klein*, Vorber. p. 121. *der orientalische des Sebä.*
- Briffon*, ornitholog. I. p. 167. n. 6. Pic de l'Isle Papoe.
- Briffon*, ornithol. I. p. 181. n. 7. Troupiale hupé de Madras.
- Briffon*, ornithol. I. p. 272. n. 29. Gobe-mouche blanc hupé du Cap de bonne Esperance.
- Büffon*, Vögel, VII. p. 212. *der Weygehoe; mit 1 Figur.*
- Büffon*, Vögel, XIV. p. 96. *der stahlköpfigte kap-pigte Fliegerfänger.*
- Büffon*, Vögel, XIV. p. 97. *der weiße capsche Fliegenfänger.*
- Seligmann*, Vögel, V. Tab. 8. *der elsterähnliche Paradiesvogel.*
- Pallas*, Naturgesch. merkw. Thiere, VI. p. 20. 21. *die sechste Gattung von Plattschnäbeln.*
- Samml. zur Physik u. Naturgesch. III. p. 114. *der gehäubte Fliegenschnäpper mit stahlfärbigem Kopfe.*
- Latham*, Syn. Supplem. p. 172. Paradise Fly-catcher.
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 480. n. 54. Mucicapa (Paradisi) capite cristato nigro, corpore albo, cauda cuneata, rectricibus intermediis longissimis.
- Linné*, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 107. n. 11. Corvus (Paradisi) albo nigroque varius, cauda cuneiformi, remigibus (*wohl ein Schreibfehler für*

für *rectricibus*) intermediis longissimis,
capite nigro cristato.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 193. *Muscicapa*
Paradisi.

Moehring, av. gen. p. 32. n. 8. *Pyrrhocorax*.

Gerin. ornith. II. p. 42. Tab. 159.

β. Briffon, ornithol. I. p. 273. n. 31. Gobe-
mouche hupé du Cap de bonne Esperance.

Büffon, Vögel, XIV. p. 97. *der gekappte capische*
Fliegenfänger.

Latham, Syn. III. p. 346. n. 44. A.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 480. n. 54. β.
Muscicapa castanea, subtus alba, collo inferiore
pectoreque griseis, capite nigro-virescente.

γ. Latham, Syn. III. p. 347. n. 44. B.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 480. n. 54. γ. *Mu-*
scicapa castanea, subtus alba, corpore subtus
albo, pectore caerulefcente.

Büffon, pl. enl. 234. fig. 1. Gobe - mouche hu-
pé du Cap de B. E.?

δ. Briffon, ornithol. I. p. 273. n. 30. Gobe-
mouche hupé du Brésil.

Büffon, Vögel, XIV. p. 97. *der gekappte brafi-*
lianische Fliegenfänger. p. 99. *Acamacu.*

Klein, av. p. 70. n. 31. *Turdus cristatus.*

Klein, Vorbereit. p. 132. n. 31. *Blümenfchwänzel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 69. n. 31. *Blümen-*
fchwanz.

Halle, Vögel, p. 300. n. 263. *die Seidenschwanz-*
drossel mit vergoldeten Flügeln und dem Fe-
derbusche.

Moehring, av. gen. p. 33. n. 11. *Monedula.*

Latham, Syn. III. p. 347. n. 44. C.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 481. n. 44. ♂
Muscicapa brasiliensis cristata.

12. **FERRUGINEUS.** *Der rostbraune Platt-*
schnabel.

Latham, Vögel, I. 2. p. 542. n. 12. *der rostro-*
the Plattschnabel.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 267. n. 11. To-
 dus (Ferrugineus) ferrugineo-nigricans, sub-
 tus ferrugineus, genis albo nigroque macula-
 tis, remigibus semifascia ferruginea.

13. **PLATYRHYNCHOS.** *Der breitschnäblige*
Plattschnabel.

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 22. *die*
achte Gattung. Tab. 3. C. (der Schnabel.)

Latham, Vögel, I. 2. p. 543. n. 13. *der breit-*
schnäblige Plattschnabel.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 268. n. 13. Todus
 (Rostratus) rostro latissimo, corpore luteo-fu-
 sco, subtus luteo, gula maculaque verticis albis.

14. **NOVUS.** *Der Plattschnabel mit weißem Kinn.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 543. n. 12. *der Platt-*
schnabel mit weißem Kinn.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 268. n. 12. Todus
 (Gularis) fuscus, subtus albidus, pectore fu-
 sco variegato, gula alba.

15. **MACRORHYNCHOS.** *Der großschnäbli-*
ge Plattschnabel.

Latham, Vögel, I. 2. p. 544. n. 14. *der groß-*
schnäblige Plattschnabel. Tab. 32. fig. 1.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 268. n. 14. Todus
 (Nasutus) rostro latissimo, corpore nigro, gu-
 la, uropygio, abdomine crissoque coccineis.

16. CRISTATUS. *Der gehaubte Plattschnabel.*⁽⁵⁾
Naturforsch. a. a. O. *der Todvogel mit dem Federbusche.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 544. n. 15. *der gehäubte Plattschnabel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 267. n. 10. β.
Todus crista coccinea, corpore fusco, albo maculato.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 14 Gattungen vermehrt, unter welchen die 11te aus dem 113ten Geschlecht hier aufgenommen worden.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der gelbbäuchige Plattschnabel aus Neuholland.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 268. n. 15. Todus (Flavigaster) fusco-cinereus, subtus luteus, rostro pallido, pedibus obscuris.

62. GESCHLECHT. ALCEDO. *Der Eisvogel.*

Müller, Natursystem, II. p. 236. Gen. LXII.

Leske, Naturgesch. p. 249. Gen. XXXI.

Borowsky, Thierreich, II. p. 142. Gen. XX.

Biumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 168.

Gen. XII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 352. Gen. XII.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 533.

Gen. XII.

Halle, Vögel, p. 163. Gen. V.

Pennant, arct. Zool. II. p. 264.

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 544.

N n 2

Onomat.

(5) Nach *Latham* eine Spielart von *Todus Rufinus*.

Onomat. hist. nat. IV. p. 125.

Klein, av. p. 31. Gen. IV.

Briffon, ornitholog. II. p. 176. Gen. LVIII.

Ispida.

Batjch, Thiere, I. p. 306. Gen. LVIII.

Latham, allg. Ueberlicht der Vögel, I. 2. p. 500.

Gen. XXIII.

Latham, Syst. ornith. I. p. 244. Gen. XXIII. *Gal-*

bula. p. 245. Gen. XXIV. *Alcedo*.

Hermann, tab. affin. anim. p. 190. 191.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 247.

Gen. XXIII.

I. CRISTATA. *Der Vintzi*.

Müller, Naturfyst. II. p. 237. *der osindische Eis-*
vogel.

Borowsky, Thierreich, II. p. 145. n. 4. *der phi-*
lippinische Eisvogel.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 353. n. 2. *der Eis-*
vogel mit dem Federbusch.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. H. p. 539. n. 2.
der Eisvogel mit dem Federbusch.

Halle, Vögel, p. 168. n. 105. *der gelbschnäblige*
amboinische Eisvogel mit dem Federbusche.

Neuer Schaupl. der Natur. II. p. 547. n. 2. *gehaub-*
ter Eisvogel.

Neuer Schaupl. d. Natur, II. p. 548. n. 5. *Gelb-*
schnabel.

Onomat. histor. nat. IV. p. 131. *der Gelbschnabel*.

Klein, av. p. 35. n. 5. *Ispida rostro luteo*.

Klein, Vorber. p. 67. n. 5. *Gelbschnabel*.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 37. n. 5. *Gelb-*
schnabel.

Briffon, ornith. I. p. 180. n. 6. *Martin-pêcheur*
hupé des Philippines.

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 518. n. 22. *der Eisvogel mit dem Federbusche.*

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 255. n. 26. Alcedo (Cristata) brach. subcristata, caerulea, subtus rufa nigro-undulata, tectricibus alarum violaceis, caeruleo-maculatis.

Naturf. XIII. p. 182. Alcedo cristata.

Naturf. XIV. p. 157.

β. Halle, Vögel, p. 163. n. 103. *der schöne orientalische Eisvogel mit blauem Federbusche.* (6)

Klein, av. p. 34. n. 3. Ispida cristata.

Klein, Vorber. p. 66. n. 3. *der Königfischer mit dem Kamm.*

Klein, verbeß. Vögelhist. p. 36. n. 3. *gehaubter Eisvogel.*

Briffon, ornithol. I. p. 186. n. 17. Martin-pêcheur hupé des Indes.

Latham, Vögel, I. 2. p. 519. n. 22. Var. A.

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 255. n. 26. β.

Philos. Transact. XXIII. p. 1394. 14. Avis auguralis (Salaczac)?

16. ORIENTALIS. *Der orientalische Eisvogel.*

Briffon, ornithol. I. p. 178. n. 4. Martin-pêcheur des Indes.

Latham, Vögel, I. 2. p. 520. n. 23. *der orientalische Eisvogel.*

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 255. n. 27. Alcedo (Orientalis) viridis, subtus rufa, superciliis albis, vertice, gula, fascia per oculos remigibusque caeruleis, sub oculis macula rufa.

N n 3

2. INDA.

(6) Nach Briffon u. a. eine eigne Gattung. Länge, nach Latham, 5 1/2 Zoll.

2. **INDA.** *Der guianische Eisvogel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 237. n. 2. *der westindische Eisvogel.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 548. n. 4. *indianischer kleiner Eisvogel.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 135. *der indianische Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 526. n. 32. *der guianische Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 259. n. 37. Alcedo (Inda) brach. virens, subtus fulva, fascia pectorali nebulosa.

17. **SURINAMENSIS.** *Der surinamische Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 526. n. 33. *der surinamische Eisvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 559. n. 38. Alcedo (Surinamensis) brach. caerulea, subtus rufo-alba, pectore rufo caeruleo undato, vertice caeruleo-nigro, maculis transversis viridibus.

Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 161. *der Eisvogel.*

3. **ISPIDA.** *Der gemeine Eisvogel.* (7)

Müller, Naturfystem, II. p. 237. n. 3. *der europäische Eisvogel.*

Leske,

- (7) Ein einsamer ungefelliger Vogel, der schlechterdings keinen seines Gleichen in der Nähe seines Aufenthalts leidet. Sitzt immer auf niedrigen Zweigen, und hat die bewegliche Vorderzehe bald vorn, bald zurückgeschlagen. Nährt sich, wenn Flüsse und Teiche offen sind, besonders von Fischen, und liebt vorzüglich Schmerlen, denen er auf einem Pfahl oder Stock u. dgl. auflauert, eine zeitlang flatternd über dem Wasser im Gleichgewicht schwebt, sich dann plötzlich auf sie herabstürzt, und sich mit seiner erhaschten Beute wieder auf seinen alten Platz setzt. Im Winter muß er oft mit

- Leske*, Naturgesch. p. 250. n. 1. *der gemeine Eisvogel.*
- Borowsky*, Thierreich, II. p. 143. *der gemeine Eisvogel.*
- Blumenbach*, Handb. d. Naturgesch. p. 168. n. 1. Alcedo (Ispida) supra cyanea, fascia temporali flava, cauda brevi; *der Eisvogel.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 353. n. 1. *der gemeine Eisvogel.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 535. n. 1. *der gemeine Eisvogel.* p. 539. *der europäische Eisvogel, Königsfischer.*
- Funke*, Naturgesch. I. p. 247. *der Eisvogel.*
- Ebert*, Naturl. II. p. 50. *der gemeine Eisvogel.*
- Halle*, Vögel, p. 163. n. 101. *der gemeine Eisvogel. (Fischer Martin.)*
- Meyer*, Thiere, I. Tab. 6. (mit dem Gerippe.)
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 64. *der Eisvogel.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 264. A. *der europäische Eisvogel.*

N n 4

Neuer

mit bloßen Puppen von Wasserinsekten vorlieb nehmen, die er unter dem Eise hervorholt, wenn sich die Fische im Schlamm verborgen haben. Nistet an hervorspringenden Winkeln der Ufer, in Löchern, unter den Wurzeln der Bäume und Sträucher, auch in Felsenritzen. Das Weibchen legt 6 bis 8 weiße Eyer, brütet 14 Tage, und wird unterdessen von dem Männchen mit Fischen versorgt. Man hat Beyspiele, daß Eisvogel in den Zimmern sich aufser den Fischen mit der Zeit auch an andere Kost, als Brodt, Semmeln und Milch, Regenwürmer u. dergl. gewöhnt haben. Wenn man im Winter welche findet, die umgekommen sind, so ist dieses nicht vor Kälte, sondern ovr Hunger geschehen, wenn Schneegeßtüber und starker Frost auch die Oeffnungen an unbefestigten Stellen der Gewässer, wodurch sie bis dahin noch zum Theil ihre Nahrung fanden, verstopft haben. Das Fleisch ist essbar.

- Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 546. n. 1. *europäischer Eisvogel.*
- Onomat. histor. nat. IV. p. 135. *der gemeine Eisvogel.*
- Handb. der Naturgesch. II. p. 294 *der Eisvogel.*
- Handbuch der deutschen Thiergeschichte, p. 103. *der Eisvogel.*
- Klein, av. p. 33. n. 1. *Ispida nostras.*
- Klein, Vorber. p. 64. n. 1. *Königsfischer, gemeinlich Eisvogel genannt.*
- Klein, verbess. Vögelhist. p. 35. n. 1. *europäischer Eisvogel.*
- Klein, stemm. av. p. 6. Tab. 5. fig. 1. a. b.
- Klein, Vögeleyer, p. 17. Tab. 4. C.
- Gesner, Vögelb. p. 57. *Eisvogel, Eysengart; mit 1 guten Figur.*
- Briffon, ornith. II. p. 176. n. 1. *Martin-pêcheur.*
- Batsch, Thiere, I. p. 300. *der gemeine Eisvogel.*
- Latham, Vögel, I. 2. p. 513. n. 16. *der gemeine Eisvogel.*
- Latham, Syn. Suppl. p. 115. *Common Kingfisher.*
- Latham, Syst. ornithol. I. p. 252. n. 20. *Alcedo (Ispida) brach. subcristata caerulea, subtus rufa, loris fulvis, vertice nigro undulato, macula aurium gulaque albis.*
- Beseke, Vögel Kurl. p. 40. n. 66. *der europäische Eisvogel.*
- Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 58. *der Eisvogel.*
- Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 313. n. 62. *Eisvogel.*
- Cetti, Naturg. v. Sardin. II. p. 98. *der Eisvogel.*
- Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 77. n. 71. *europäischer Eisvogel.*

Lepetchin,

Lepechin, Tagebuch d. russisch, Reif. I. p. 262.

Eisvögel.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 58. n. 64.

der Königsfischer.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *der Eisvogel*.

Pallas, Naturgesch. merkwl. Th. VI. p. 15. *der*

Eisvogel.

Naturf. IX. p. 56. n. 61. *europäischer Eisvogel*.

Neue schwed. Abh. III. p. 104. *Alcedo hispida*.

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII.

p. 455. n. 25. *der europäische Eisvogel*.

Günth, Nest. u. Eyer, Tab. 56. *Eisvogel*.

Wirsing, Vögel, Tab. 3.

Frisch, Vögel, Tab. 223.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 74. *Eis-Vogel*.

Naumann, Vogelsteller, p. 192. *Eisvogel*.

Geoffroy, mat. med. VI. p. 295. *der gemeine Eis-*

vogel, *Fischer Martin*.

Goeze, nützl. Allerley, II. p. 162. n. 13. *der Eis-*

vogel.

Anweisung Vögel zu fangen, u. s. w. p. 167.

der Eisvogel.

Bechstein, Musterung schädli. Th. p. 115. n. 21.

der gemeine Eisvogel.

Loniceri, Kräuterb. p. 685. *Eisvogel*; mit einer

zieml. Fig.

Zorn, Petinotheol. II. p. 439. *der Eiß-Vogel*.

Merklein, Thierreich, p. 252. *Eiß-Vogel*.

Kraft, Ausrott, grauf. Th. I. p. 210. *Eiß-Vogel*.

Ziegra, diss. de Halcyone. Witt. 1677. 4. pl. 3.

Wanochius, dissert. de Halcyone. Aboae 1682. 4.

cum fig. rariss.

Chevalier, lettres sur les maladies de St. Domin-

gue, sur le Remora, et les Halcyons. Paris

1752. 12.

Scaliger, de Halcyone; de subtilitat. ex. 133.
p. 457.

Frisch, observationes, quae descriptioni Ispidae
f. Halcyonis, in diversorum auctorum libris,
addi possunt. Miscell. Berolinens. Cont. III.
p. 40.

Brückmann, de Halcyone. Epist. itiner. Cent. II.
Epist. 4.

Wittenb. Wochenbl. XIII. p. 174. *Eisvogel*.

Geyer, de nido halcyonis. Ephem. Nat. Cur.
Dec. II. an. 8. obs. 136. p. 296. c. fig.

André und Bechstein, Spatzierg. I. p. 149. *der
gemeine Eisvogel*.

Eberhard, Thiergesch. p. 91. *der Eisvogel*.

Jablonsky, allgemein. Lex. p. 293. *Eisvogel*.

Allgem. Haushaltungsl. I. p. 409. *Eisvogel*.

Krinitz, ök. Encykl. Art. *Eisvogel*.

Meidinger, Vorles. I. p. 120. *der gemeine Eis-
vogel*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 115. n. 1. Alcedo
(Ispida) brachyura, supra caerulea, subtus
fulva.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 105. Alcedo
(Ispida) brachyura, supra cyanea, subtus ful-
va, loris rufis.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 193. Alcedo fluviatilis;
Eysvogel, *Eysengartl*, *Wasser-Hünlein*, *See-
schwalme*.

Schäffer, elem. ornith. Tab. 141.

Salerne, ornithol. p. 123.

Jonston, av. p. 157. Ispida.

Aristot. histor. animal. L. IX. c. 20. n. 172. Ἄλ-
κυων.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 248. *der
europäische Eisvogel*.

β. *ISPIDA SENEGALENSIS*. *Der Baboucard* (8)

Briffon, ornith. II. p. 180. n. 7. Martin-pêcheur du Senegal.

Latham, Syn. II. p. 618. n. 16. Var. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 515. n. 16. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 253. n. 20. β.

Alcedo caeruleo-viridis, fusco varia, subtus maculaeque pone et ante oculos fulva, gula flavescente.

Adanson, Reif. n. Senegall, p. 212. *Eisvögel*.

4. *ERITHACA*. *Der rothköpfige Eisvogel*.

Müller, Naturfyst. II. p. 239. n. 4. *der bengalische Eisvogel*.

Halle, Vögel, p. 170. n. 109. *der kleine bengalische Eisvogel mit der Lievrej*.

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 549. n. 8. *Purpurkopf*.

Onomat. histor. nat. IV. p. 133. *der kleine bengalische Eisvogel*.

Briffon, ornitholog. II. p. 185. n. 15. Martin-pêcheur à collier de Bengale.

Latham, Vögel, I. 2. p. 516. *der rothköpfige Eisvogel*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 253. n. 21. Alcedo (*Erithaca*) brachyura, dorso caeruleo, abdomine luteo, capite uropygioque purpureis, gula nuchaque albis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 115. n. 2. Alcedo (*Erithaca*) brachyura, dorso caeruleo, abdomine luteo, capite uropygioque purpureo, gula nuchaque albis.

β. *Latham*.

(8) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

- β. *Latham*, Syn. II, p. 629. n. 17. Var. A.
Latham, Vögel, I. 2. p. 516. n. 17. Var. A.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 253. n. 21. β. Alcedo caerulea, subtus flavescens, gula alba, capite cerviceque rubris, pone oculos linea purpurea, albo terminata.

18. PURPUREA. *Der purpurfarbene Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 517. n. 18. *der purpurfarbene Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 253. n. 22. Alcedo (Purpurea) purpureo-caerulea, subtus rufo-alba, capite, uropygio caudaque rufo-aureis, pone oculos striga purpurascens.

5. MADAGASCARIENSIS. *Der madagascarische Eisvogel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 299. n. 5. *der madagascarische Eisvogel.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 548. n. 9. *Eisvogel von Madagascar.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 141. *der Eis-Vogel von Madagaskar.*

Brisson, ornitholog. II. p. 187. n. 18. *Martin-pêcheur de Madagascar.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 517. n. 19. *der madagascarische Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 254. n. 23. Alcedo (Madagascariensis) subbrachyura, rufa, gula alba, remigibus nigricantibus.

19. CAERULEOCEPHALA. *Der blauköpfige Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 517. n. 20. *der blauköpfige Eisvogel.*

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 254. n. 24. Alcedo (Caeruleocephala) caerulea, subtus rufa, vertice caeruleo-viridi undato, gula alba, remigibus nigricantibus.

β. A. caerulea, subtus rufa, vertice viridi-caeruleo, fasciis nigris, gula lateribusque pectoris, macula albis. *

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 254. n. 24. β.

γ. A. caerulea, capite colloque rufo-flavis, vertice caeruleo nigroque-fasciato, abdomine albo. *

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 254. n. 24. β.

Latham, Syn. Supplem. p. 115. 20. Blue-headed Kingfisher.

20. BENGALENSIS. *Der indische Eisvogel.*

Halle, Vögel, p. 167. n. 102. *der kleinste bengalische Eisvogel.*

Klein, av. p. 34. n. 2. *Ispida Bengalensis.*

Klein, Vorbereit. p. 65. n. 2. *der kleinste Königsfischer.*

Klein, verb. Vögelh. p. 36. n. 2. *indianische kleine Eisvögel.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 21. *indianischer kleiner Eisvogel; obere Figur.*

Briffon, ornitholog. II. p. 177. n. 2. *Martin-pêcheur de Bengale.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 518. n. 21. *der indische Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 254. n. 25. Alcedo (Bengalensis) caeruleo-viridis, subtus rufa, capite caeruleo-friato, gula alba, per oculos vitta rufa.

β. *Der kleinere indische Eisvogel.* (9)

Seligmann, Vögel, I. Tab. 21. untere Figur.

Klein, an den angeführten Orten.

Briffon, ornithol. II. p. 178. n. 3. Petit Martin-pêcheur de Bengale.

Latham, Vögel, I. 2. p. 518. n. 21. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 255. n. 25. β.

6. SUPERCILIOSA. *Der amerikan. Eisvogel.* (10)

Müller, Natursystem, II. p. 239. n. 6. *der grüne americanische Eisvogel.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 549. n. 3. *kleiner grüner oranienfarbener Eisvogel.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 144. *der grüne amerikanische Eis-Vogel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 164. *kleiner grün- und oranienfarbener Eisvogel.*

Briffon, ornith. II. p. 181. n. 9. Martin-pêcheur verd d'Amérique.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 35. *der kleine grüne und orangefarbe Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 527. n. 34. *der amerikanische Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 259. n. 39. Alcedo (Superciliofa) submacr. viridis, subtus alba, fascia viridi, superciliis fulvis.

β. A. submacr. viridis, subtus fulva, fascia pectorali viridi, superciliis fulvis. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 259. n. 39. β.

Büffon, ois. VII. p. 218. Martin-pêcheur verd et orange.

Büffon, pl. enl. 756. Martin-pêcheur petit verd. Fig. 2. *das Männchen.* Fig. 3. *das Weibchen.*

21. LEU-

(9) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

(10) Länge, nach *Latham*, 5 Zoll; das Vaterland Cayenne.

21. LEUCORHYNCHA. *Der weißschnäblige Eisvogel.*

Halle, Vögel, p. 168. n. 103. *der weißschnäblige amerikanische Eisvogel.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 548. n. 3. *Weißschnabel.*

Klein, av. p. 35. n. 4. *Ipida rostro albo.*

Klein, Vorber. p. 66. n. 14 *Weißschnabel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 36. n. 4. *Weißschnabel.*

Briffon, ornithol. II. p. 186. n. 16. *Martin-pêcheur bleu d'Amerique.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 528. n. 35. *der weißschnäblige Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 260. n. 40. Alcedo (*Leucorhyncha*) caeruleo viridis subtus flavescens, capite et cervice castaneo-purpureis, rostro albo.

22. BRASILIENSIS. *Der Gip-gip.*

Briffon, ornithol. II. p. 187. n. 19. *Martin-pêcheur du Brésil.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 526. n. 31. *der brasilianische Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 259. n. 36. Alcedo (*Brasilienensis*) rufescens, castaneo, fusco alboque varia, subtus alba, fascia oculari fulva.

23. AMERICANA. *Der weiß und grüne Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 525. n. 30. *der geschäckte Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 258. n. 35. Alcedo (*Americana*) obscure viridis, subtus alba viridi maculata, striga sub oculis alba, fascia pectorali rufa.

24. BICOLOR. *Der zweyfarbige Eisvogel.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 525. n. 29. *der zweyfarbige Eisvogel.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 258. n. 34. Alcedo (Bicolor) viridis, fascia pectorali albo nigroque variegata, corpore subtus torque colli strigaeque nares inter et oculum rufis.
25. MACULATA. *Der gefleckte Eisvogel.*
Briffon, ornitholog. II. p. 191. n. 25. Martin-pêcheur tacheté du Brésil.
Latham, Vögel, I. 2. p. 525. n. 28. *der gefleckte Eisvogel.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 258. n. 33. Alcedo (Maculata) fusca, flavescenti-maculata, subtus alba, fusco-punctata, gula flava.
Jonston, av. p. 211. Matuitui.
7. ALCYON. *Der gehaubte Eisvogel.* (1)
Müller, Natursystem, II. p. 240. n. 7. *Haubeneisvogel.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 142. n. 1. *der Haubeneisvogel.*
Halle, Vögel, p. 169. n. 106. *der krausköpfige Eisvogel.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 65. n. 81. *der Haubeneisvogel.*
Pennant, arch. Zool. II. p. 264. n. 85. *der Eisvogel mit dem Halsbande.*
 Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 548. n. 6. *Rauchkopf.*
 Onomat. histor. nat. IV. p. 131. *der Rauchkopf.*
Klein, av. p. 35. n. 6. Ispida capite amplo plumoso.

Klein,

(1) Länge, nach *Latham*, 10½ Zoll; nach *Pennant* 13 Zoll.
 Gewicht 3½ Unze.

Klein, Vorbereit. p. 67. n. 6. *Rauchkopf*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 37. n. 6. *Rauchkopf*.

Briffon, ornitholog. II. p. 188. n. 21. *Martin-pêcheur hupé de la Caroline*.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 38. *der Eisvogel*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 522. n. 27. *der gehaubte Eisvogel*.

Latham, Syn. Suppl. p. 116. *Belted Kingfisher*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 257. n. 32. *Alcedo (Alcyon) macr. cristata, caeruleascens, abdomine albo, pectore fascia ferruginea, macula alba ante et pone oculos*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 115. n. 3. *Alcedo (Alcyon) brachyura nigra, abdomine albo, pectore ferrugineo*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 248. n. 2. *der Hauben-Eisvogel*.

β. Der louisianische Eisvogel.

Latham, Vögel, I. 2. p. 523. n. 27. *Var. A*.

Latham, Syn. II. p. 637. n. 27. *A*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 257. n. 32. *β*.

γ. Der gehaubte Eisvogel von St. Domingo. (2)

Borowsky, Thierreich, l. c. Tab. 20.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 37. ad n. 6.

Briffon, ornithol. II. p. 188. n. 22. *Martin-pêcheur hupé de St. Domingue*.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 10. *der americanische Eisvogel*.

Latham, Syn. II. p. 639. n. 27. *B*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 524. n. 27. *Var. B*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 257. n. 32. *γ*.

δ. Der

(2) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

- δ. *Der gehaubte brasilianische Eisvogel.* (3)
Briffon, ornitholog. II. p. 187. n. 20. Martin-pêcheur hupé du Brésil.
Latham, Syn. II. p. 639. n. 27. C.
Latham, Vögel, I. 2. p. 524. n. 27. Var. C.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 258. n. 32. γ.
Jonston, av. p. 190. Jaguacati Guacu.
Mochring, av. gen. p. 85. n. 113. Jaguacati Guacu.

Diesem könnte noch beygefügt werden:

- ε. *Alcedo cristata caerulefcens*, vertice, genis, temporibus fordide caerulefcens, abdomine albo ferrugineo tincto, lateribus cinereis albo undulatis, remigibus primoribus nigris, dorso, humeris, uropygio et tectricibus alarum fordide caeruleis, primoribus apice albo-punctatis, pedibus incarnatis, rostro corneo subtus fordide albo, macula ante et sub oculis alba, iridibus castaneis. (4)

8. **TORQUATA.** *Der aschgraue Eisvogel.*

Müller, Naturfyft. II. p. 241. n. 8. *der Krageneisvogel.*

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 549. n. 18. *Eisvogel mit der Krause.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 146. *der mexikanische Eisvogel.*

Briffon, ornithol. II. p. 189. n. 23. Martin-pêcheur hupé du Mexique.

Latham, Vögel, I. 2. p. 521. n. 26. *der aschgraue Eisvogel.*

Latham,

(3) Nach *Briffon* eine eigene Gattung.

(4) Ich habe diese Kennzeichen nach der Beschreibung entworfen, die *Bechstein* in der Uebersetzung des *Latham'schen* Werks p. 523. not **, von einem aus Amerika erhaltenen Exemplar dieses Vogels gemacht hat.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 256. n. 30. Alcedo (Torquata) macr. subristata, cano-caerulefcens, torque albo, alis caudaque albo-maculatis.

Eberhard, Thiergesch. p. 92. *der Eisvogel mit dem Halsbande.*

Jonston, av. p. 184. Achalalactli.

26. CAYENNENSIS. *Der cayennische Eisvogel.*

Briffon, ornith. II. p. 182. n. 10. Martin-pêcheur de Cayenne.

Latham, Vögel, I. 2. p. 521. n. 25. *der cayennische Eisvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 256. n. 29. Alcedo (Cayanensis) caerulea subtus alba, fascia infra occiput nigra, uropygio viridi-caeruleo.

27. ATRICAPILLA. *Der schwarzköpfige chinesische Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 512. n. 15. *der chinesische Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 251. n. 18. Alcedo (Atricapilla) violaceo-caerulea, capite, cervice, humeris remigibusque apice nigris, collo inferiore et torque albo, abdomine rufo.

β. *Der schwarzköpfige Eisvogel, von der Insel Luçon.*

Sonnerat, Reif. n. Neuguin. p. 26. *die erste Art.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 512. n. 15. Var. A.

Latham, Syn. II. p. 625. n. 15. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 251. n. 18. β. Alcedo capite, cervice, tectricibus alarum dorsoque supremo fuscis, subtus loris et torque albis, scapis pennarum fuscis, dorso imo, remigibus caudaque caeruleis.

- γ. A. subcristata nigra ferrugineo varia, collo subtus et pectore albis, abdomine ferrugineo, remigibus rectricibusque caeruleo-viridibus. *

Latham, Syn. II. p. 626. n. 15. Var. B.

Latham, Vögel, I. 2. p. 513. n. 15. Var. B.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 252. n. 18. γ.

- δ. A. saturate caerulea, subtus alba, tectricibus alarum remigibusque nigricantibus, collari albo. *

Latham, Syn. Supplem. p. 115. Var. C.

Latham, Vögel, I. 2. p. 513. n. 15. Var. C.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 252. n. 18. δ.

28. TUTA. *Der sichere Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 511. n. 14. *der sichere Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 251. n. 17. Alcedo (Tuta) macr. viridi-violacea, subtus alba, collari viridi-nigro, superciliis albis.

29. VENERATA. *Der verehrte Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 511. n. 13. *der verehrte Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 251. n. 16. Alcedo (Venerata) fusca viridi varia, subtus pallida, fascia superciliari viridi-albida.

30. SACRA. *Der heilige Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 509. n. 12. *der heilige Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 250. n. 15. Alcedo (Sacra) caeruleo-viridis subtus alba, superciliis strigaeque sub oculis ferrugineis, remigibus caudaque nigricantibus.

- β. *Latham*, Syn. II. p. 621. n. 12. Var. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 509. n. 12. Var. A.

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 250. n. 15. *β*.
Alc. caeruleo-viridis, superciliis albis, nucha
nigra, pennis colli et pectoris margine cine-
reis, genibus extus nigris.

γ. *Latham*, Vögel, I. 2. p. 509. n. 12. Var. B.
Tab. 30.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 250. n. 15. *γ*.
Alc. caeruleo-viridis, uropygio caeruleo, cor-
pore subtus et torque colli pallide ferrugineis,
superciliis strigaeque sub oculis ferrugineis, gu-
la alba.

δ. *Latham*, Syn. II. p. 622. n. 12. Var. C.

Latham, Vögel, I. 2. p. 509. n. 12. Var. C.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 251. n. 15. *δ*. Alce-
do caeruleo-viridis, capite nigro, vertice cae-
ruleo, superciliis, cervice abdomineque testa-
ceis, gula et torque albis.

ε. *Latham*, Vögel, I. 2. p. 510. n. 12. Var. D.

Latham, Syn. II. p. 623. n. 12. Var. D.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 250. n. 14. Alce-
do (Collaris) viridi caerulea, corpore subtus
collarique albis. (*eigne Gattung.*)

Sonnerat, Reif. nach Neuguinea, p. 26. *die dritte*
Art; mit 1 Fig.

ζ. A. Caeruleo-viridis, vertice dorsoque nigricanti-
bus, remigibus rectricibusque nigris caeruleo
marginatis. *

Latham, Syn. Suppl. p. 114.

Latham, Vögel, I. 2. p. 510. n. 12. Var. E. (*Poo-
poo, Whouroo roa* in Neuseeland, *Koato-o-oo*
auf Otaheite, und den freundschaftl. Inseln.)

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 551. n. 15. *ε*.

31. **CHLOROCEPHALA.** *Der grünköpfige Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 508. n. 11. *der grünköpfige Eisvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 250. n. 13. Alcedo (Chlorocephala) caeruleo-viridis, subtus colloque albo, capite viridi, torque nigro.

32. **CAERULEA.** *Der Eisvogel mit weißem Halsbande.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 508. n. 10. *der Eisvogel mit dem Halsbande.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 249. n. 12. Alcedo (Caerulea) caerulea, subtus maculaeque sub oculis rufa, tectricibus alarum uropygioque viridibus, superciliis et torque collari albis.

Briffon, ornith. II. p. 179. n. 5. Martin-pêcheur à collier des Indes.

33. **FUSCA.** *Der braune Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 501. n. 1. *der braune Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 245. n. 1. Alcedo (Gigantea) macroura subcristata, corpore olivaceo-fusco, subtus albido nigricante fasciato, cauda ferrugineo nigroque fasciata, apice alba,

9. **CAPENSIS.** *Der capische Eisvogel.*

Müller, Natursyst. II. p. 241. n. 9. *der capische Eisvogel.*

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 550. n. 19. *Eisvogel vom Cap.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 131. *der Königsfischer vom Vorgeb. der guten Hoffnung.*

Briffon,

Briffon, ornitholog. II. p. 181. n. 8. Martin-pêcheur du Cap de b. E.

Latham, Vögel, I. 2. p. 502. n. 2. *der capische Eisvogel*.

Latham, Syn. Supplem. p. 114. Cape Kingfisher.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 246. n. 2. Alcedo (Capensis) macroura cinereo-caerulea, subtus fulva, pectore testaceo, rostro rub. o.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 192. Alcedo capensis.

34. MAXIMA. *Der große afrikanische Eisvogel*.

Borowsky, Thierreich, II. p. 144. n. 3. *der größte Königsfischer*.

Pallas, Naturgesch. merkwl. Th. VI. p. 17. *der allergrößte Königsfischer*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 502. n. 3. *der große afrikanische Eisvogel*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 246. n. 3. Alcedo (Maxima) macr. cristata alba maculosa, corpore supra plumbeo, subtus ferrugineo, iugulo nigro, striga collari gulaque albis.

β. *Latham*, Syn. II. p. 612. n. 3. Var. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 503. n. 3. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 246. n. 3. β. Alcedo griseo-nigricans, alba transversim undulata, corpore subtus albo, pectore crissoque rufis.

10. SENEGALENSIS. *Der senegalische Eisvogel*.⁽⁵⁾

Müller, Naturf. II. p. 242. n. 10. *der senegalische*.

O o 4

Neuer

(5) *Latham* rechnet hierher auch *Forsk.* Alcedo Semicaerulea (Fn. orient. p. 6. n. 5. der in unserm System gleichfalls mit bemerkt, aber p. 457. n. 41. nochmals als eine eigne Gattung aufgeführt ist.

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 550. n. 20. *senegalischer*.

Onomat. histor. nat. IV. p. 143. *der Eisvogel aus Senegal*.

Briffon, ornithol. II. p. 182. n. 11. grand Martin-pêcheur du Senegal.

Latham, Vögel, I. 2. p. 507. n. 9. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 249. n. 10. Alcedo (Senegalenfis) macr. cyanea, subtus alba, capite cano, tectricibus alarum nigris.

β. *Latham*, Vögel, I. 2. p. 506. n. 9. *der Krabben-Eisvogel*. (6)

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 249. n. 11. Alcedo (Cancrophaga) macroura caeruleo-viridis, subtus flavescenti-fulva, fascia per oculos, tectricibus alarum remigibusque apice nigris.

γ. *Latham*, Vögel, I. 2. p. 507. n. 9. Var. B.

Latham, Syn. II. p. 619. n. 9. Var. B.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 249 n. 10. β. Alcedo submacroura, capite colloque albis, corpore subtus ferrugineo, alis nigris, fascia caerulea, cauda caerulea.

δ. *Latham*, Vögel, I. 2. p. 508. n. 9. Var. C.

Latham, Syn. II. p. 619. n. 9. Var. C.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 249. n. 10. γ. Alcedo capite colloque caerulefcenti-albis, corpore supra caeruleo, subtus rufo, alis nigris medio caeruleis.

35. LEUCOCEPHALA. *Der weißköpfige Eisvogel*.

Müller, Naturf. Suppl. p. 94. n. 19. *der Weißkopf*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 506. n. 8. *der weißköpfige Eisvogel*.

Latham,

(6) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 248. n. 8. Alcedo (Leucocephala) viridi-caerulea, capite, collo corporeque subtus albo-flavescentibus, gula alba, vertice nigro striato.

36. FLAVICANS. *Der gelbliche Eisvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 528. *** *der gelbliche Eisvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 248. n. 9. Alcedo (Flavicans) subtus flavicans, capite dorsoque viridibus, rostro rubro, cauda caerulea.

Allgem. Reif. XI. p. 480. *Ten-ra-julon.*

II. SMYRNENSIS. *Der Eisvogel von Smyrna.*

Müller, Natursystem, II. p. 242. n. II. *Smyrnaische.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 145. n. 5. *der Fischer Martin von Smyrne.*

Halle, Vögel, p. 169. n. 108. *der Fischer Martin von Smirne.* Fig. 7.

Onomat. histor. nat. IV. p. 143. *der Fischer Martin von Smirne.*

Briffon, ornithol. II. p. 184. n. 13. *Martin-pêcheur de Smyrne.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 58. n. 65. *der Eisvogel aus Smyrne.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 505. n. 7. *der Eisvogel von Smyrna.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 247. n. 7. Alcedo (Smyrnensis) macr. ferruginea, alis, cauda dorsoque viridibus, gula fasciaque pectorali alba.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 116. n. 5. Alcedo (Smyrnensis) macroua ferruginea, alis, cauda dorsoque viridibus.

β. *Der große Eisvogel von Gambia.*⁽⁷⁾

Halle, Vögel, p. 169. n. 107. *der große afrikanische Eisvogel.*

Klein, av p. 35. n. 7. Ispida, cauda longa.

Klein, Vorbereit. p. 68 n. 7. *der große Königsfischer.*

Klein, verb. Vögelh. p. 37. n. 7. *langgeschwänzter Eisvogel.*

Briffon, ornitholog. II. p. 183. n. 12. *Martin-pêcheur bleu de Madagascar.*

Latham, Syn. II. p. 616. n. 7. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 505. n. 7. Var. A. *der große Eisvogel von Gambia.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 248. n. 7. β. *Alcedo macr. castanea, gula flavescens albida, alis caudaque caeruleo nigroque variegatis.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 15. *der große Eisvogel vom Fluß Gambia.*

γ. *Der große bengalische Eisvogel.*⁽⁸⁾

Halle, Vögel, p. 170. n. 110. *der große bengalische Eisvogel.*

Briffon, ornitholog. II. p. 184. n. 14. *grand Martin-pêcheur de Bengale.*

Latham, Syn. II. p. 616. n. 7. Var. B.

Latham, Vögel, I. 2. p. 506. n. 7. Var. B. *der große bengalische Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 248. n. 7. γ. *Alc. macr. supra caeruleo-viridis, subtus alba, capite, cervice abdomineque infimo castaneis.*

37. NOVAE GUINEAE. *Der Eisvogel von Neuguinea.*

Sonnerat, Reif. nach Neugin. p. 61. *der zweyte Eisvogel.*

Latham,

(7) Nach Briffon eine eigne Gattung.

(8) Nach Briffon eine eigne Gattung.

Latham, Vögel, I. 2. p. 504. n. 6. *der neuguineische Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 247. n. 6. Alcedo (Novae Guineae) nigra, supra maculis rotundatis, subtus longitudinalibus albis lateribus duobus maioribus, superiori pyriformi.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 192. Alcedo novae Guineae.

38. AEGYPTIA. *Der ägyptische Eisvogel.*

Hasselquist, Reise nach Palästina, p. 300. n. 23. Alcedo Aegyptia.

Latham, Vögel, I. 2. p. 504. n. 5. *der ägyptische Eisvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 247. n. 5. Alcedo (Aegyptia) macr. fusca, maculis ferrugineis, gula subferruginea, abdomine femoribusque albidis, maculis cinereis, cauda cinerascende.

41. SEMICAERULEA. *Der hellblaue Eisvogel.* (9)

Latham, Vögel, I. 2, p. 507. not. * *der hellblaue Eisvogel.*

12. RUDIS. *Der bunte Eisvogel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 243. n. 12. *bunter Eisvogel.*

Halle, Vögel, p. 171. n. III. *der persische schwarz und weißbunte Eisvogel.*

Neuer Schaupl. d. Nat. II. p. 549. n. 12. *Schwarzschnabel, Persianer.*

Quoniat, histor. nat. IV. p. 143. *der persianische Königs-Fischer.*

Klein, av. p. 36. n. 8. *Ispida ex albo et nigro varia.*

Klein

(9) S. vorher die fünfte Anmerkung bey Alcedo Senegalensis n. 10. Nach *Forskåls* Beschreibung sollte man freylich wohl den Vogel für eine eigne Gattung halten.

Klein, Vorber. p. 68. n. 8. *Perstaner mit einem langen Schwanze.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 37. n. 8. *Schwarzschnabel.*

Briffon, ornitholog. II. p. 190. n. 24. *Martin-pêcheur blanc et noir.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 503. *der bunte Eisvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 247. n. 4. *Alcedo (Rudis) macroura nigra albido varia, subtus alba.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 17. *der schwarze Eisvogel.*

Pallas, Naturgesch. merkw. Thiere, VI. p. 14. *der orientalische weißbunte Königsfischer.*

Hasselquist, Palästina, p. 299. n. 22. *Alcedo-rudis.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 116. n. 6. *Alcedo (Rudis) macroura fusca albido varia.*

13. D E A. *Der Eisvogel von Ternate.*

Müller, Naturfyst. II. p. 243. n. 13. *die Göttin,*

Borowsky, Thierreich, II. p. 146. n. 6. *der ternatisehe Eisvogel.*

Halle, Vögel, p. 266. n. 214. *der Paradiesheher.*
Fig. 14.

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 549. n. 14. *Schwalbenschwanz.* (Mit dem folgenden verwechselt.)

Onomat. hist. nat. IV. p. 133. *der Ternatan-Heher, der Paradies-Heher, die Ternatan-Göttin.*

Briffon, ornithol. I. p. 191. n. 26. *Martin-pêcheur de Ternate.*

Klein, av. p. 62. n. 8. *Pica Ternatana.*

Klein, Vorber. p. 118. n. 8. *Ternatanheher.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 61. n. 8. *Ternatanheher.*

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 520. n. 24. *der Eisvogel von Ternate.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 256. n. 28. Alcedo (Dea) rectricibus duabus longissimis medio attenuatis, corpore nigro-caerulefcente, alis virefcentibus.

Linneé, Syll. Nat. Edit. X. I. p. 116. n. 7. Alcedo (Dea) rectricibus duabus longissimis, corpore nigro-caerulefcente, alis virefcentibus.

Moehring, av. gen. p. 32. n. 8. Pyrrhocorax.

14. PARADISEA. *Der Paradies-Eisvogel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 244. n. 14. *der Paradies-Eisvogel.* Tab. 27. fig. 5.

Halle, Vögel, p. 171. n. 112. *der Schwalbenschwänzige Eisvogel.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 549. n. 15. *schöner Eisvogel.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 142. *der Schwalbenschwanz.*

Klein, av. p. 36. n. 9. Ispida Surinamensis, cauda longissima, duabus pennis excurrentibus furcata.

Klein, Vorber. p. 68. n. 9. *Schwalbenschwanz.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 37. *Schwalbenschwanz.*

Briffon, ornithol. II. p. 66. n. 2. Jacamar à longue queue.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 19. *der Eisvogel mit dem Schwalbenschwanz.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 499. n. 3. *der Paradies-Jakamar.*

Latham, Syn. Suppl. p. 113. *Paradise Jacamar.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 245. n. 3. Galbula (Paradisea) rectricibus duabus interinediis longif.

longissimis, corpore viridi-aureo, iugulo alisque subtus albis.

Pallas, Naturgesch. merkwl. Th. VI. p. 13. not.*
die dritte Art von Goldvögeln.

Bankroft, Naturgesch. v. Guiana, p. 98. *der surinamische Eisvogel.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 191. 192. Alcedo Paradisea.

Gerin, ornith. II. p. 52. Tab. 185.

39. GRANDIS. *Der kupferigt-goldglänzende Eisvogel.* (10)

Latham, Vögel, I. 2. p. 498. n. 2. *der große Jakamar.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 245. n. 3. Galbula (Grandis) cupreo-aurea, subtus tota ferruginea, capite artubusque viridi-aureis, cauda cuneiformi, corpore longiore.

Pallas, Naturgesch. merkwl. Thiere, VI. p. 12. not * *Eine noch nicht beschriebene Art von Goldvögeln.*

15. GALBULA. *Der Keilschwanz.*

Müller, Natursystem, II. p. 244. n. 15. *Keilschwanz.*

Halle, Vögel, p. 146. n. 86. *der brasilische Baumhacker.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 549. n. 16. *eine Art mit keilförmigem Schwanze.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 134. *der brasilische Baumhacker.*

Klein, av. p. 28. n. 15. *Picus Brasiliensis.*

Klein,

(10) *Pallas* ist der einzige, der dieses Vogels a. a. O. beyläufig gedenkt, und von dem die Systematiker die Beschreibungen entlehnt haben; von seinem Vaterlande und Naturgeschichte überhaupt sagt *Pallas* gar nichts;

Klein, Vorbereit. p. 54. n. 15. *der brasilianische Specht*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 30. n. 16. *brasilianischer Specht*.

Briffon, ornithol. II. p. 65. n. 1. *Jacamar*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 497. n. 1. *der grüne Jakamar*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 244. n. 1. *Galbula* (Viridis) cauda cuneiformi, corpore viridi-aureo, subtus rufo, gula alba.

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 13. not. * *die zweyte Gattung von Goldvögeln*.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 191. *Alcedo Galbula*.

Jonston, av. p. 197. *Jacamaciri*.

Moehring, av. gen. p. 82. n. 107. *Galbula*.

Gerin. ornith. II. p. 52. Tab. 184.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 249. n. 3. *der Keilschwanz*.

β. *Latham*, Vögel, I. 2. p. 498. n. 1. Var. A. *der langgeschwänzte grüne Jakamar*. Tab. 29.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 244. n. 1. β. *Galbula cauda longiore*.

40. TRIDACTYLA. *Der dreyzehige Eisvogel*.

Müller, Naturfyst. Supplem. p. 93. n. 16. *der Dreyfingerige*.

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 12. *der dreyzehige Königsfischer*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 529. n. 37. *der dreyzehige Eisvogel*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 260. n. 41. *Alcedo* (Tridactyla) brachyura, supra caudaque rufa, subtus flava, pedibus tridactylis.

β. Alcedo brach. pallide violaceo-rubescens, subtus alba, alis caeruleo-atris, remigibus margine caeruleis. *

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 260. n. 41. β.

Sonnerat, Reise n. Neuguinea, p. 26. die zweyte Art.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 26 Gattungen vermehrt, die 16te bis 41te sind neu. Bey der 1sten ist noch *eine*, bey der 3ten *eine*, bey der 4ten *eine*, bey der 7ten *eine* (δ), bey der 10ten noch *drey*, bey der 11ten *eine* (γ), und bey der 15ten noch *eine* Varietät hinzugekommen.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Der sinesische Eisvogel.*

Naturf. VII p. 39. oben.

2. *Ein Eisvogel auf Spitzbergen von der Größe einer Taube.*

Allgem. Reif. XVII. p. 281.

3. *Alcedo collaris. Der heilige Eisvogel.*

White Reif. nach Neu-Süd-Wallis; in dem Magazin merkwl. Reisebeschreib. V. p. 127.

Vielleicht eine Spielart von *Alcedo Sacra*, n. 30. — cf. Latham, Vögel, I. 2. p. 510. und 511.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der weißschnäblige Eisvogel aus Südamerika.*

Latham, Syn. Supplem. p. 113. White-billed Jacamar.

Latham,

Latham, Vögel. I. 2. p. 500. n. 4. *der weißschnäb-
lige Jacamar.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 245. n. 4. *Galbula*
(*Albirostris*) cauda integra, corpore viridi-au-
reo subtus ferrugineo, gula macula trigona al-
ba, antice testacea, rostro albo.

2. *Der Eisvogel von der Küste Coromandel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 252 n. 19. Alcedo
(*Coromanda*) pallide violaceo-rosea, subtus
rufescens, uropygio taenia longitudinali caeru-
leo alba, gula alba.

Sommer. voy. Ind. II. p. 212. Tab. 118. *Martin-pê-
cheur violet de la côte de Coromandel.*

3. *Der Amazoneneisvogel, in Cayenne.*

Latham, Syn. Suppl. p. 116. *Amazonian Kings-
fisher.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 528. n. 36. *der Amazo-
nen-Eisvogel.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 257. n. 31. Alcedo
(*Amazona*) viridi-nitens, subtus lunulaque col-
li alba, lateribus viridi variegatis, remigibus
rectricibusque albo-maculatis.

63. GESCHLECHT. MEROPS. *Der Bienen-
fresser.*

Müller, Natursystem, II. p. 442. Gen. LXIII.

Leske, Naturgesch. p. 250. Gen. XXXII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 146. Gen. XXI.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 168.
Gen. XIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 370. Gen. XIX.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 541.
Gen. XIII.

Halle, Vögel, p. 512. Gen. III. (verlarvte Eisvögel, Eremitvögel.)

Neuer Schauplatz der Natur, IV. p. 245.

Onomat. hist. nat. V. p. 174.

Klein, av. p. 110. Trib. II. B.

Briffon, ornitholog. II. p. 194. Gen. LX. Apiafter.

Batsch, Thiere, I. p. 310. Gen. LIX.

Latham, allg. Uebersicht der Vögel, I. 2. p. 545. Gen. XXVI.

Latham, Syst. ornith. I. p. 269. Gen. XXVII.

Hermann, tab. affin. anim. p. 193.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 249. Gen. XXIV.

I. APIASTER. *Der gemeine Bienenfresser.* (1)

Müller, Naturfyft. II. p. 244. n. I. *der Immenwolf.*

Leske,

- (1) Ist zwar eigentlich im südlichen Europa und Asien zu Hause, kommt aber doch zuweilen nach Deutschland. *Bechstein* hat den 9. Jun. 1791. zwey Alte mit zwey Jungen in seiner Gegend gesehen. Vielleicht streifen diese Vögel, wenn sie ihre Brut in südlichern Ländern gemacht haben, mit ihren Jungen umher, und verfliegen sich in andere Länder. *Latham* sagt: sie wären nirgends häufiger als in den südlichen Breiten Rußlands, besonders am Don, der Wolga, und dem Jaik; und *Lepchin* versichert: sie wären in den Gegenden um die Wolga so häufig, daß man ihrer in einem Tage zu Hunderten fangen könne. In der Gegend von Woronesch, sagt *Latham*, kömmen sie etwa den 24 April in großen Flügen an, und bauen ihr Nest in die lehmigen Ufer, die sie schieb, bis zur Tiefe eines halben *Zolles* (sollte dies nicht ein Druckfehler seyn?) durchbohren, und die Hügel sind an manchen Stellen so voll von Nestern, daß sie wie Honigwaben aussehen. Um den September ziehen sie in andere Gegenden, und man sieht sie alsdenn zu Taufenden nach Süden fliegen.

- Leske*, Naturgesch. p. 250. n. 1. *der gemeine Bienenfresser.*
- Borowsky*, Thierreich, II. p. 147. n. 2. *der gemeine Bienenfresser.*
- Blumenbach*, Handb. d. Naturgesch. p. 168. n. 1. Merops (Apiaster) dorso ferrugineo, abdomine caudaque viridi-caerulescente, gula lutea, fascia temporali nigra; *der Immenwolf, Bienenfresser.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 370. *der gemeine Bienenfresser.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 541. n. 1. *der gemeinr Bienenfresser.* p. 544. *Immenwolf, Bienenfänger, Schwanzzeisvogel, Bienenfraß, Heuwogel, Heumäher, einsamer Bracher, Immenfraß, Bienenwolf, gemeiner Bienenvogel.* Tab. 19.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 302. *der Bienenfresser.*
- Ebert*, Naturl. II. p. 61. *der Bienenfresser.*
- Halle*, Vögel, p. 512. n. 591. *der Schwanzzeisvogel.*
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 65. n. 82. *der Immenwolf.*
- Onomat. histor. nat.* V. p. 174. *der Bienenfänger, Schwanzzeisvogel.*

Pp 2

Handb.

fliegen. — *Willughby* erzählt aus *Belon*, daß die Knaben auf Candia diesen Vogel dergestalt fangen, daß sie eine Nadel in Form einer Angel biegen, solche mit dem Knopfe an das Ende eines Fadens binden, an der Spitze eine Cicade befestigen, und das andere Ende des Fadens in der Hand halten. Die so befestigte Cicade fliegt demohnrächter in der Luft, und wenn sie der Vogel gewahr wird, fliegt er mit aller Gewalt auf sie herab, fängt sie, und verschlingt sie sammt der Nadel, wodurch er gefangen wird — In Astrachan macht, nach *Pallas*, der Bientresser gemeinlich mit Ausgang des Aprils den Beschluß von allen Zugvögeln. — Das Fleisch soll sehr schmackhaft seyn.

Handb. der Naturgesch. II. p. 297. *der Immenwolf.*

Klein, av. p. 110. n. 10. Merops simpliciter.

Klein, Vorber. p. 203. n. 10. *Imbenwolf.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 113. n. 1. *Immenwolf, Heuvogel, Heumäher, einsamer Bracher.*

Klein, stemmat. av. p. 24. Tab. 25. fig. 1. a, b.

Briffon, ornith. II. p. 194. n. 1. Guépier.

Batsch, Thiere, I. p. 311. *der gemeine Bienenfresser.*

Gesner, Vögelb. p. 341. *Imbenwolff oder Imbenfraß.* Fig. p. 342.

Latham, Vögel, I. 2. p. 546. n. 1. *der gemeine Bienenfresser.*

Latham, Syn. Suppl. p. 119. Common Bee-eater.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 269. n. 1. Merops (Apiaster) dorso ferrugineo, abdomine caudaque viridi - caerulefcente, rectricibus duabus longioribus, gula lutea.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 56. n. 63. *der Bienentraß.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 316. n. 63. *der Immenwolf.*

Cetti, Naturg. von Sardin. II. p. 92. *der Bienenfresser.* Tab. II.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 15. *der Bienenvogel.*

Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 164. *der Bienenspecht?*

Hasselquist, Reise n. Paläst. p. 302. Merops galilaicus.

Naturforsch. IX. p. 57. n. 62. *der Immenwolf.*

Eberhard, Thiergesch. p. 92. *der Bienenfänger.*

Meidinger, Vorles. I. p. 120. *der gemeine Bienenfresser.*

Wirsing, Vögel, Tab. 27. *Bienentraas.*

Lenmery,

Leimmery, Materiallex. p. 727.

Dec. Russ. I. p. 107. IV. p. 340.

Linne', Syst. Natur. Edit. VI. p. 21. n. 1. *Ispida*
Merops.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 117. n. 1. Merops
(*Apiaster*) dorso ferrugineo, abdomine cauda-
que viridi-caerulescente, rectricibus duabus
longioribus.

Kramer, Austr. p. 337. n. 1. *Meerschwalbe*.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 193.

Jonston, av. p. 113. Merops.

Moehring, av. gen. p. 38. n. 21. Merops.

Aristot. histor. animal. L. VI. c. 11. *Megops*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 249. n. 1.
der Immenwolf.

β. *Latham*, Syst. ornithol. I. p. 269. n. 1. β. Me-
rops *Schaegh*gha.

„Cum priore exacte quadrat, at rostrum ca-
„rinatum non est, sed convexum, nec digiti
„infimo articulo coadunati.“ *Forsk.*

2. VIRIDIS. *Der grüne Bienenfresser.*

Müller, Naturfyft. II. p. 246. n. 2. *grüner Bienen-*
fresser. Tab. 8. fig. 4.

Borowsky, Thierreich, II. p. 146. n. 1. *der grü-*
ne Bienenfresser. Tab. 21.

Onomat. hist. nat. V. p. 177. *der Bienenfraß aus*
Bengalen.

Halle, Vögel, p. 514. n. 595. *die Bienenschwalbe*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 113. n. 5. *Bienenfraß*
mit feinem Schwalbenschwanz.

Briffon, ornithol. II. p. 198. n. 8. *Guépier à col-*
lier de Madagascar.

Batsch, Thiere, I. p. 311. *der grüne Bienen-*
fresser.

Latham, Vögel, I. 2. p. 548. n. 2. *der grün Bienenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 269. n. 2. Merops (Viridis) virens, fascia pectorali nigra, gula caudaque caeruleis, rectricibus duabus intermediis elongatis.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 78. *der indianische Bienenfraß.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 117. n. 2. Merops (Viridis) dorso ferrugineo, abdomine alisque viridibus, gula caudaque caeruleis.

β. *Der bengalische Bienenfresser.* (2)

Briffon, ornitholog. II. p. 199. n. 9. *Guépier à collier de Bengale.*

Latham, Syn. II. p. 671. n. 2. Var. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 549. n. 2. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 270. n. 2. β.

γ. *Der ägyptische Bienenfresser.*

Latham, Syn. II. p. 671. n. 2. Var. B.

Latham, Vögel, I. 2. p. 549. n. 2. Var. B.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 270. n. 2. γ. Merops totus viridis, gula flava, linea ad latera capitis nigra, remigibus apice fuscis. (3)

δ. *Der kleinere philippinische Bienenfresser.* (4)

Briffon, ornithol. II. p. 200. n. 10. petit Guépier des Philippines.

Latham, Syn. II. p. 672. n. 2. Var. C.

Latham, Vögel, I. 2. p. 549. n. 2. Var. C.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 270. n. 2. β.

ε. *Der*

(2) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

(3) Eben so beschreibt *Forskäl* a. a. O. den Vogel. — Die Jungen werden im Junius in Aegypten verkauft.

(4) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

2. *Der indianische Bienenfresser.* *

Latham, Syn. Suppl. p. 120. Indian Bee-eater.

Latham, Vögel, I. 2. p. 449. n. 2. Var. D.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 271. n. 3. β.

3. CONGENER. *Der gelbköpfige Bienenfresser.*

Müller, Natursystem, II. p. 247. n. 3. Gelbkopf.

Borowsky, Thierreich, II. p. 148. n. 3. der gelbköpfige Immenwolf.

Halle, Vögel, p. 513. n. 593. die Seeschwalbe.

Onomat. histor. natur. IV. p. 176. die Seeschwalbe.

Klein, av. p. 110. n. 12. Merops alter.

Klein, Vorbereit. p. 204. n. 12. Seeschwalm.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 113. n. 3. Seeschwalm.

Gesner, Vögelbuch, p. 343. Seeschwalb; mit 1 Figur.

Briffon, ornithol. II. p. 195. n. 2. Guépier à tête jaune.

Batsch, Thiere, I. p. 311. der gelbköpfige Immenwolf.

Latham, Vögel, I. 2. p. 550. n. 3. der gelbköpfige Bienenfresser.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 270. n. 3. Merops (Congener) flavescens, uropygio virefcence, remigibus apice rubris, rectricibus basi luteis.

Jonston, av. p. 134. Merops alius.

4. SUPERCILIOSUS. *Der madagascarische Bienenfresser.*

Müller, Natursyst. II. p. 247. n. 4. Madagascarische.

Onomat. histor. nat. V. p. 176. *der Bienenfraß aus Madagascar.*

Briffon, ornith. II. p. 197. n. 7. Guépier de Madagascar.

Latham, Vögel, I. 2. p. 550. n. 4. *der mada-gascarische Bienenfresser.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 271. n. 4. Merops (Superciliosus) viridis, linea frontis supra infraque oculos alba, gula flavicante, rectricibus duabus elongatis.

β. Buffon, ois. VI. p. 496. Autre guepier de Madagascar. *

Latham, Vögel, II. p. 551. *eine andere Art.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 271. β. M. rostro graciliore, cauda apice aequali, vittis capitis, uropygio caudaque caeruleo-viridibus.

γ. Pallas, Reis. Ausz. II. p. 8. *eine schöne Art von ganz grünen Immenvögeln.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 551.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 271. n. 4. γ.

5. PHILIPPINUS. *Der philippinische Bienenfresser.*

Müller, Natursystem, II. p. 247. n. 5. *Philippinische.*

Onomat. histor. nat. V. p. 176. *der philippinische Bienenfänger.*

Briffon, ornithol. II. p. 201. n. 12. grand Guepier des Philippines.

Latham, Vögel, I. 2. p. 551. n. 5. *der philippinische Bienenfresser.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 271. n. 5. Merops (Philippinus) viridis, subtus flavescens, uropygio caeruleo, cauda aequali.

6. CINEREUS. *Der aschgraue Bienenfresser.*

Müller, Naturfyst. II. p. 248. n. 6. *Aschgraue.*

Halle, Vögel, p. 513. n. 592. *der graue geschwänz-
te Eisvogel mit zwey längern rothen Schwanz-
federn.*

Onomat. histor. natur. V. p. 175. *der graue Bie-
nenfraß.*

Klein, av. p. 110. n. 11. *Merops cinereus, Avicu-
la de Quauhcuilui dicta.*

Klein, Vorbereit. p. 204. n. 11. *grauer Bienen-
fraß.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 113. n. 2. *grauer Bie-
nenfraß.*

Briffon, ornitholog. II. p. 196. n. 5. *Guepier du
Mexique.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 551. n. 6. *der aschgraue
Bienenfresser.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 272. n. 6. *Me-
rops (Cinereus) rubro flavoque variegatus,
subtus flavo-rubescens, capite grifescente, re-
ctricibus duabus longissimis rubris.*

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 117. n. 3. *Merops
(Cinereus) rubro flavoque variegatus, subtus
flavo-rubescens, rectricibus duabus longissimis
rubris.*

Moehring, av. gen. p. 37. n. 18. *Curruca.*

7. CASER. *Der äthiopische Bienenfresser. (5)*

Müller, Naturfyst. II. p. 248. n. 7. *Mohrischer.
Tab. 8. fig. 5.*

P p 5

Onomat.

(5) Latham hat die Synonymen von *Merops Caser* und *Upupa
Promerops* zusammen gezogen, und läßt den erstern einge-
hen. Nach Pallas gehört auch dahin die *Certhia Casra*, wie
ich unten weiter bemerken werde.

Onomat. histor. nat. V. p. 175. *der äthiopische Bienenfänger.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 117. n. 4. Merops (Cafer) griseus, ani regione flava, cauda longissima.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 151. 194. Merops Cafer.

8. FLAVICANS. *Der gelbe Bienenfresser.*

Klein, av. p. 63. n. 2. Manucodiata II. Aldrov.

Klein, Vorber. p. 120. n. 2. *weißköpfiger Paradiesheher mit goldgelben Flecken und grüngelbem Schnäbel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 63. n. 2.

Briffon, ornithol. II. p. 196. n. 3. Guepier jaune.

Latham, Vögel, I. 2. p. 552. n. 7. *der gelbe Bienenfresser.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 272. n. 7. Merops (Flavicans) flavus, subtus albidus, capite albo flavo aureoque vario, pectore rubro, alis, uropygio caudaque rufis.

Forster, av. p. 170. Manucodiata altera species.

9. BRASILIENSIS. *Der brasilianische Bienenfresser.*

Halle, Vögel, p. 513. n. 594. *der kurzschwänzige Bienenfänger.*

Klein, av. p. 110. n. 13. Merops Brasilensis.

Klein, Vorber. p. 204. n. 13. *Rubinenglanz aus Brasilien.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 113. n. 4. *brasilianischer Immenwolf.*

Briffon, ornithol. II. p. 196. n. 4. Guepier du Brésil.

Latham, Vögel, I. 2. p. 552. n. 8. *der brasilianische Bienenfresser.*

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 272. n. 9. Merops (Brasilienfis) fusco nigroque varius, capite, gula, tectricibus alarum minoribus corporeque subtus rubris, remigibus caudaque caeruleis.

Moehring, av. gen. p. 81. n. 105. Ardeae adfinis.

10. BADIUS. *Der kastanienbraune Bienenfresser.*

Brissou, ornitholog. II. p. 197. n. 6. Guepier de l'Isle de France.

Latham, Vögel, I. 2. p. 553. n. 9. *der kastanienbraune Bienenfresser.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 273. n. 10. Merops (Castaneus) viridi-caerulescens, vertice, cervice pennisque scapularibus castaneis, taenia suboculari ad nucham fusca.

β. *Latham*, Syn. II. p. 678. n. 2. Var. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 553. n. 9. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 273. n. 10. β.

11. CHRYSOCEPHALUS. *Der goldköpfige Bienenfresser.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 553. n. 10. *der goldköpfige Bienenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 273. n. 11. Merops (Chrysocephalus) viridi-aureus, gula lutea, sincipite, superciliis corporeque subtus viridicaeruleis, vertice cerviceque aureo-rubris.

12. ANGOLENSIS. *Der angolische Bienenfresser.*

Brissou, ornithol. II. p. 200. n. 11. Guepier d'Angola.

Latham, Vögel, I. 2. p. 554. n. 11. *der angolische Bienenfresser.*

Latham,

- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 273. n. 12. Merops (Angolensis) viridi-nitens, subtus viridi caeruleus, gula lutea, iugulo castaneo, per oculos fascia cinerea nigro maculata.
13. **ERYTHROCEPHALUS.** *Der rothköpfige Bienenfresser.*
Brisson, ornitholog. II. p. 201. n. 13. Guepier à tête rouge des Indes.
Latham, Vögel, I. 2. p. 554. n. 12. *der rothköpfige Bienenfresser.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 274. n. 13. Merops (Erythrocephalus) viridis, subtus rubeolutescens, capite rubro, gula lutea, per oculos vitta nigra.
14. **NUBICUS.** *Der blauköpfige Bienenfresser.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 555. n. 13. *der blauköpfige Bienenfresser.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 274. n. 14. Merops (Caeruleocephalus) ruber, capite, gula uropygioque caeruleo-viridibus, cauda subforcipata.
15. **ERYTHROPTERUS.** *Der rothflügelige Bienenfresser.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 555. n. 14. *der rothschwügelige Bienenfresser.* Tab. 32. fig. 2.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 274. n. 15. Merops (Erythropterus) fusco-viridis, subtus albidus, remigibus rectricibusque rubris, apice nigris, gula lutea.
16. **CAYENNENSIS.** *Der cayennische Bienenfresser.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 556. n. 15. *der cayennische Bienenfresser.*

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 274. n. 16. *Merops* (Cayanensis) viridis, alis caudaque rufis, remigibus basi albis.

17. SURINAMENSIS. *Der surinamische Bienenfresser.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 556. n. 16. *der surinamische Bienenfresser.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 275. n. 17. *Merops* (Surinamensis) varius, nucha rubescente, collo viridi-luteo, remigibus virescentibus, nigro caeruleoque variegatis.

Fermin, Besch. v. Surinam, II. p. 164. *der Bienenspecht.*

18. NOVAE SEELANDIAE. *Der neuseeländische Bienenfresser.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 556. n. 17. *der Neuseeländische Bienenfresser.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 275. n. 18. *Merops* (Cinnatus) viridi-atro-nitens, lateribus iuguli utrinque cinnamo fasciisque alarum albis.

19. NIGER. *Der schwarze Bienenfresser.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 557. n. 18. *der schwarze Bienenfresser.*

Latham, Syn. Supplem. p. 120. Yellow-tufted Bee-eater.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 275. n. 19. *Merops* (Fasciculatus) nigro-nitens, crisso fasciculoque axillari flavis, cauda maxime cuneiformi, rectrice extima tota, proxima latere exteriori, alba.

β. M. nigro-nitens, crisso fasciculoque axillari flavis, cauda cuneiformi, rectricibus apice albis.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 275. n. 19. β.

γ. M.

- γ. *M. nigro-nitens*, crisso flavo, cauda cuneiformi, hypochondriis rufis. *
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 275. n. 19. γ.
20. **RUFUS.** *Der gelbrothe Bienenfresser.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 558. n. 19. *der gelbrothe Bienenfresser.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 276. n. 22. *Merops* (*Rufus*) *rufus*, subtus rufo-flavicans, remigibus fuscis extus rufis.
21. **MOLUCCENSIS.** *Der moluckische Bienenfresser.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 558. n. 20. *der moluckische Bienenfresser.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 276. n. 23. *Merops* (*Moluccensis*) *griseus*, genis nigris, orbitis nudis.

A. *Veränderungen gegen die XIIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 14 Gattungen vermehrt. Bey der 1sten sind zwey, bey der 2ten vier, und bey der 4ten zwey Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der Bienenfresser von Coromandel.*
Sonnerat, voy. Ind. II. p. 213. Guepier jaune de la Côte de Coromandel. Tab. 119.
Latham, Syn. Suppl. p. 120. Coromandel Bee-eater.
Latham, Vögel, I. 2. p. 558. n. 21. *der coromandelsche Bienenfresser.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 272. n. 8. *Merops* (*Coromandus*) *flavescens*, lateribus colli, remigibus rectricibusque flavis, tectricibus alarum, dorso

dorso uropygioque caerulescenti-undulatis, per oculos striga nigra.

2. *Der belappte Bienenfresser.*

White, voyage to new South-Wal. p. 144. 240. Watted Bee-eater.

White, Reise n. Neu-Süd-Wales; in dem Magazin merkwl. Reisebeschr. p. 129. *der belappte Bienenfresser.*

Phillips, Botany-Bay, p. 164. New-Holland Bee-eater.

Latham, Vögel, I. 2. p. 559. n. 22. *der belappte Bienenfresser.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 276. n. 20. *Merops* (Carunculatus) fuscus, abdomine flavo, palaribus carunculatis, cauda cuneiformi, apice alba.

3. *Der gehörnte Bienenfresser.*

White, voy. p. 190. Knob-fronted Bee-eater; mit 1 Fig.

White, Reise, a. a. O. p. 129. *der beulenstirnige Bienenfresser.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 560. n. 23. *der gehörnte Bienenfresser.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 276. n. 21. *Merops* (Corniculatus) fuscus, capite nudiusculo, corpore subtus rectricibusque apice albidis, corniculo frontali obtuso.

64. GESCHLECHT. UPUPA. *Der Wiedehopf.*

Müller, Naturyst. II. p. 249. Gen. LXIV.

Leske, Naturgesch. p. 250. Gen. XXXIII.

Borowsky, Thierreich, II. p. 151. Gen. XXV.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 169. Gen. XIV.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 370. Gen. XX.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 544.
Gen. XIV.

Halle, Vögel, p. 514. Gen. IV.

Neuer Schauplatz der Natur, IX. p. 766.

Onomat. hist. nat. VII. p. 645.

Klein, av. p. 110. C.

Briffon, ornith. I. p. 284. Gen. XXVII. p. 286.
Gen. XXVIII. Promerops.

Batsch, Thiere, I. p. 310. Gen. LX.

Latham, allgem. Ueberf. der Vögel, I. 2. p. 560.
Gen. XXVII.

Latham Syst. ornithol. I. p. 277. Gen. XXVIII.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 193.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 250.
Gen. XXV.

I. EPOPS. *Der gemeine Wiedehopf.* (6)

Müller, Natursystem, II. p. 249. n. 1. *der gemeine Wiedehopf.* Tab. 8. fig. 6.

Leske,

- (6) Flügelweite 19 Zoll. Gewicht 3 Unzen. Ein munterer aber scheuer Vogel, der sehr hurtig Luft, und sanft, ohne alles Geräusch fliegt. Kommt spät im April, oder zu Anfang des Mayes, mit oder kurz vor dem Kuckuck an. Lebt des Sommers in Wäldern, die an Viehtriften und Wiesen grenzen, auch in waldigen Gegenden um die Dörfer herum, in den Weidenbäumen. Im August, wenn die Wiesen gemähet sind, zieht er einzeln, oder in Gesellschaft von 4 bis 8, auf die Ebenen, und verläßt uns alsdenn unvermerkt. Unter den Insekten und Gewürmen liebt er vorzüglich Regenwürmer und Maulwurfsgrillen. Das Weibchen brütet *allein*, 14 Tage. Gezähmt läßt er sich wohl 3 Jahre erhalten, und frisst in der Gefangenschaft auch rohes Fleisch, so gar Käse. Die Jungen werden mehrentheils mit Regenwürmern ernährt. Der Wiedehopf stirbt von Natur; der große Gestank aber, den das Nest von sich giebt, kömmt vorzüglich

Leske, Naturgesch. p. 251. n. 1. *der europäische Wiedehopf.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 152. n. 1. *der Wiedehopf.* Tab. 21.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 169. n. 1. Upupa (Epop) crista variegata; *der Wiedehopf, Kothhahn, Dreckkrämer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 370. *der gemeine Wiedehopf.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 544. n. 1. *der gemeine Wiedehopf.* p. 549 *Wiedehoppe, Kuckuksköster, Kothhahn, Dreckhahn, Stinkhahn, Baumschnepfe, Hervogel, Gänsehirt.*

Funke, Naturgesch. I. p. 331. *der Wiedehopf.*

Ebert, Naturl. II. p. 62. *der Wiedehopf.*

Halle, Vögel, p. 514. n. 596. *der gemeine Wiedehopf.* Fig. 42.

Meyer, Thiere, II. Tab. 9.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 66. n. 83. *der Wiedehopf.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 267. A. *der gemeine Wiedehopf.*

Beckmann, Naturhist. p. 42. n. 8. *der Wiedehopf.*

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 767. n. 1. *der gemeine Wiedehopf.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 646. *der gemeine Wiedehopf.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 214. *der Wiedehopf.*

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 103. *der Wiedehopf.*

Klein,

vorzüglich von den Excrementen der Jungen her, die sie, da sie in einer Höhle sitzen, nicht aus dem Neste werfen können, und die also neben ihnen liegen bleiben. Das Fleisch soll in Italien gegessen werden.

- Klein*, av. p. 110. n. 14. Upupa, simpliciter.
- Klein*, Vorber. p. 204. n. 14. *Wiedhoff* oder *Wiedehopf*.
- Klein*, verb. Vögelh. p. 113. n. 1. *gemeiner Wiedehopf*.
- Klein*, stemm. av. p. 24. Tab. 25. fig. 2. a. b. fig. 3. a. b.
- Klein*, Vögeleyer, p. 31. Tab. 11.
- Gesner*, Vögelb. p. 548. *Widhopff*. Fig. p. 549. gut.
- Briffon*, ornitholog. I. p. 284. n. 1. Hupe ou Puput.
- Batsch*, Thiere, I. p. 312. *der gemeine Wiedehopf*.
- Latham*, Vögel, I. 2. p. 561. n. 1. *der gemeine Wiedehopf*.
- Latham*, Syn. II. p. 687. n. 1. Hoopoe.
- Latham*, Syn. Supplem. p. 122. Hoopoe.
- Latham*, Syst. ornitholog. I. p. 277. n. 1. Upupa (Epop) nigricante et rufo - albo variegata, subtus rufescens, crista rufescente apice nigra, cauda nigra, fascia alba.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 40. n. 67. *der gemeine Wiedehopf*.
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 78. n. 72. *gemeiner Wiedehopf*.
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 316. n. 64. *der Wiedehopf*.
- Cetti*, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 100. *der Wiedehopf*.
- Pallas*, Reise, Ausz. I. p. 99. *die gemeinen Wiedehopfen*.
- White*, Naturgesch. von England, p. 14. *der Wiedehopf*.
- Lepechin*, Tagebuch d. russisch. Reis. I. p. 245. *Wiedehöpfe*.

- Pallas*, nord. Beytr. IV. p. 24. *Wiedehopf*.
Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 167. n. 1.
Herfugl.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 65. n. 52.
Wiedehopf.
Linne, auserles. Abh. II. p. 290. n. 68. *der Wiedehopf*.
 Naturf IX. p. 58. n. 64. *der gemeine Wiedehopf*.
 Naturforsch. XXV. p. 17. *Wiedehopf*.
Naumann, Vogelsteller, p. 136. *der Wiedehoppe*.
Kolbe, Vögeb. d. g. Hoffnung, Edit. in 4. p. 395.
Wiedehopf.
Eberhard, Thiergesch. p. 77. *der Wiedehopf*.
Zorn, Petinotheol. II. p. 147. 367. 492. *der Wiedehopf*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 61. *der Wiedehopf*.
Meidinger, Vorles. I. p. 121. *der europäische Wiedehopf*.
Jablonsky, allgemein. Lex. p. 1388. *Wiedehopf*.
Geoffroy, mat. med. VII. p. 758. *der Wiedehopf*.
Merklein, Thierreich, p. 412. *Wiedehopff*.
Loniceri, Kräuterbuch, p. 680. *Wiedehopf*.
Zückert, Speis. a. d. Thierr. p. 98. *Wiedehopf*.
Goeze, nützl. Allerley, II. p. 163. n. 14. *der Wiedehopf*.
Goeze, Natur, Menschenl. u. Vorf. VI. p. 345.
Wiedehopf.
 Anweisung Vögel zu fangen, u. s. w. p. 572.
Wiedehopf.
Wirsing, Vögel, Tab. 15. *Wiedehopf*.
Linne, Syst. Nat. Edit. II. p. 53. *Upupa*.
Linne, Syst. Nat. Edit. VI. p. 21. n. 1. *Upupa*
Epops.
Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 117. n. 1. *Upupa*
 (*Epops*) *cristata variegata*.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 103. Upupa (Epops) cristata variegata.

Brünnich, ornith. bor. p. 11. n. 43. Upupa Epops.

Schäffer, elem. ornith. Tab. 70.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 168. Upupa; ein Wiede-Hopfe, Kot-Hahn.

Forston, av. p. 118. Upupa.

Moehring, av. gen. p. 39. n. 22. Upupa.

Aristotel. histor. animal. Lib. IX. c. 10. n. 46. c. 22. n. 174. Ἐποψ.

Plin. hist. nat. L. X. c. 29. L. XXX. c. 6. Upupa.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 250. n. 1. der gemeine Wiedehopf.

4. CAPENSIS. *Der madagascarische Wiedehopf.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 564. n. 2. der madagaskarische Wiedehopf.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 277. n. 2. Upupa (Capensis) fusco-nebulosa, crista, corpore sub-tus maculaque alarum albis.

2. PROMEROPS. *Der capsche Wiedehopf.*(?)

Müller, Natursystem, II. p. 251. n. 2. Cap-scher. Tab. 8. fig. 7.

Neuer Schauplatz der Natur, IX. p. 768. der caapsche Wiedehopf.

Onomat. histor. nat. VII. p. 649. der Paradies-wiedehopf vom Vorgeb. der guten Hoffnung.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 216. n. 1. der Promerops vom Vorgeb. d. g. H.

Briffon, ornith. I. p. 286. n. 1. Promerops.

Latham, Vögel, I. 2. p. 566. n. 5. der capsche Wiedehopf.

Latham,

(?) Nach Latham gehört der *Merops Caser* Linn. und die im System p. 462. n. 7. dazu gerechneten Synonymen mit hierher.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 278. n. 5. Upupa (Promerops) fusca, subtus alba, pectore rufescente, uropygio viridi-olivaceo, crisso luteo, rectricibus sex intermediis longissimis.

Eberhard, Thiergesch. p. 77. der Promerops.

5. MEXICANA. *Der mexikanische Wiedehopf.*

Klein, av. p. 107. n. 4. Avis Ani, Mexicana, cauda longissima.

Klein, Vorbereit. p. 198. n. 4. Ani, mit einem sehr langen Schwanze aus Mexico.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 110. n. 6. langgeschwänzte Klette.

Briffon, ornithol. I. p. 286. n. 2. Promerops du Mexique.

Latham, Vögel, I. 2. p. 565. n. 4. der mexicanische Wiedehopf.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 278. n. 4. Upupa (Mexicana) grisea, viridi-caeruleo purpureoque variegata, abdomine flavescente, rectricibus quatuor intermediis longissimis.

Moehring, av. gen. p. 37. n. 18. Curruca.

3. PARADISEA. *Der Paradieswiedehopf.*

Müller, Naturfyst. II. p. 251. n. 3. Paradiesfischer.

Borowsky, Thierreich, II. p. 152. n. 2. der paradiesfische Wiedehopf.

Halle, Vögel, p. 516. n. 597. der braune Schwanzwiedehopf.

Neuer Schauplatz der Natur, IX. p. 767. n. 2. Schwarzkamm.

Onomat. histor. nat. VII. p. 648. der Paradieswiedehopf.

Klein, av. p. 110. n. 15. Upupa Manucodiata.

Klein, Vorbereit. p. 204. n. 15. Schwarzkamm.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 114. n. 2. *Schwarzkamm*.

Briffon, ornitholog. I. p. 287. n. 3. *Promerops hupé des Indes*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 565. n. 3. *der Paradies-Wiedehopf*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 278. n. 3. *Upupa (Paradisea) cristata spadicea, subtus cinerascens, capite colloque nigris, rectricibus duabus intermediis longissimis*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 118. n. 2. *Upupa (Paradisea) rectricibus duabus longissimis*.

Moehring, av. gen. p. 37. n. 18. *Curruca*.

6. **FUSCA.** *Der braune Wiedehopf.*

Sonnerat, Reif. n. Neuguin. p. 59. *der braune Promerops*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 567. n. 6. *der braune Wiedehopf*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 279. n. 6. *Upupa (Papuiensis) fusca, subtus albo nigroque fasciata, capite colloque atris, rectricibus duabus intermediis longissimis*.

7. **MAGNA.** *Der große Wiedehopf.*

Sonnerat, Reif. nach Neuguin. p. 59. *der große Promerops*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 568. n. 7. *der struppige Wiedehopf*. Tab. 33.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 279. n. 7. *Upupa (Superba) atro-violacea, vertice, cervice abdomineque superiore viridi nitentibus, pennis scapularibus lateralibusque caudae falciformibus, cauda longissima*.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 194. *Promerops fastuosus*.

8. **AURANTIA.** *Der orangefarbene Wiedehopf.*
Briffon, ornithol. I. p. 287. n. 4. *Promerops de Barbades.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 569. n. 6. *der orangefarbene Wiedehopf.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 279. n. 8. *Upupa (Aurantia) flavo-aurantia, capite colloque aureis, remigibus primoribus aurantio-rubro contaminatis.*
Moehring, av. gen. p. 37. n. 3. *Rhyndace.*
- β. *Der gelbe Wiedehopf.*
Briffon, ornith. I. p. 288. n. 5. *Promerops jaune du Mexique.*
Latham, Syn. II. p. 697. n. 8. A.
Latham, Vögel, I. 2. p. 569. n. 8. *Var. A. der gelbe Wiedehopf.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 279. n. 8. A. *Upupa lutea, capite, collo alisque cinereo nigroque variegatis.*

- A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*
 Das Geschlecht ist mit 5 Gattungen vermehrt.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Der rothschnäblige Wiedehopf.*
Latham, Syn. Supplem. p. 124. Tab. 20. *Red-billed Promerops.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 570. n. 9. *der rothschnäblige Wiedehopf.* Tab. 34.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 280. n. 9. *Upupa (Erythrorhynchos) viridi-atra, abdomine atro, cauda cuneiformi, remigibus 6. primoribus rectricibusque lateralibus albo-maculatis.*

2. *Der blaue Wiedehopf.*

Latham, Syn. Supplem. p. 124. Blue Promerops.

Latham, Vögel, I. 2. p. 570. n. 10. *der blaue Wiedehopf.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 280. n. 10. Upupa (Indica) indico-caerulea, cauda cuneiformi, rostro nigro, pedibus plumbeis.

65. GESCHLECHT. CERTHIA. *Der Baum-*
läufer.

Müller, Naturfyst. II. p. 253. Gen. LXIV.

Leske, Naturgesch. p. 251. Gen. XXXIV.

Borowsky, Thierreich, II. p. 153. Gen. XXIII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 169.
Gen. XV.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 272. Gen. XXI.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 550.
Gen. XV.

Neuer Schauplatz der Natur, I. p. 619.

Pennant, arct. Zool. II. p. 268.

Briffon, ornith. II. p. 2. Gen. XLIII.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 5 ff.

Batsch, Thiere, I. p. 310. Gen. LXI.

Latham, allgem. Ueberf. der Vögel, I. 2. p. 571.
Gen. XXVIII.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 280. Gen. XXIX.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 205.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 250.
Gen. XXVI.

I. FAMILIARIS. *Der gemeine Baumläufer.*⁽⁸⁾

Müller, Naturfystem, II. p. 254. n. 1. *Baumklette.*

Leske,

(8) Nistet, nach Art der Spechte, in hohlen Bäumen, Baumritzen, Klüften an den Wurzeln, und in Tannenwäldern
gern.

Leske, Naturgesch. p. 251. n. 1. *der gemeine Baumläufer.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 154. n. 2. *die Baumklette, krummschnablichte Baumkleber.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 169. n. 1. *Certhia (Familiaris) grisea, subtus alba, remigibus fuscis, rectricibus decem; Baumklette, Grüper, Grauspecht.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 372. n. 1. *der gemeine Baumläufer.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 550. n. 1. *der gemeine Baumläufer. p. 554. Baumläufer, europäischer Baumläufer, Baumläuferlein, Baumreiter, gemeiner Klettervogel, krummschnäbliger Baumkleber, Grüper, Grünspecht, Rindenkleber, Kleinspecht, Schindelkriecher, (Baumhäckel.) kleiner Baumhacker, Baumklette, Brunnenläufer, Hierengryl, der gemeine graue Baumsteiger; in Thüringen: Baumrutscher.*

Ebert, Naturl. II. p. 63. *die gemeine europäische Baumklette.*

Halle, Vögel, p. 500. n. 555. *der gemeine graue Baumsteiger.*

Q 9 5

Meyer,

gern zwischen den Ritzen, wo zwey Bäume zusammen gewachsen sind, und macht nur eine schlechte Unterlage von Moos, kleinen Reifern, Federn und Haaren. Die Eyer sind aschgrau, mit dunkeln Strichen und Punkten bezeichnet. Brütet 14 Tage, des Jahrs gewöhnlich zweymal, und zum ersten Mal schon im März. Wandert nicht, verläßt aber im October und November die Waldungen, begiebt sich in die ebenen Gegenden, und zieht bis in den März in den Gärten, und besonders an den Wassern herum, an welchen Weidenbäume stehen, deren Rinde und Moose eine Menge Nahrungsmittel für ihn enthalten. Das Fleisch ist wohl-schmeckend.

Meyer Thiere, II. Tab. 38. *Grauspecht*.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 67. n. 87. *der Grüper* u. f. w.

Pennant, arct. Zool. II. p. 268. n. 90. *der euro-
päische Baumläufer*.

Neuer Schaupl. d. Nat. I. p. 619. *Baumklette*.

Onomat. histor. nat. II. p. 786. *der Brunnläufer*.

Handb. d. deutsch. Thierg. p. 103 *Baumläufer*.

Klein, av. p. 106. n. 1. *Falcinellus arboreus
nostras*.

Klein, Vorber. p. 197. n. 1. *Hierengryll, Baum-
klette, Baumheekel, Baumhecker, Baumklet-
terlein*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 109. n. 1. *europäi-
sche Baumklette*.

Klein, Vögeleyer, p. 17. Tab. 4. fig. 1.

Gesner, Vögelb. p. 445. *Rinnenkleber od. Baum-
kletterlein*; mit 1 Fig.

Briffon, ornith. II. p. 2. n. 1. *Grimpereau*.

Büffon, Vögel, XVIII. p. II. *der gemeine Baum-
läufer*; m. 1 Fig.

Martini, Naturlex. VI. p. 418. *Baumläufer*; mit
1 Figur.

Batsch, Thiere, I. p. 313. *die Baumklette*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 752. n. 1. *der gemeine
Baumläufer*.

Latham, Syn. Suppl. p. 126. *Creeper*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 280. n. 1. *Certhia
(Familiaris) grisea, subtus alba, remigibus
fuscis decem, macula alba*.

Beseke, Vögel Kurl. p. 40. n. 68. *die Baumklette*.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 53. n. 59.
das Baumläuferlein.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 317. n. 65.
Baumklette.

Fischer,

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 78. n. 73.
gemeiner Baumläufer.

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 167.
n. 1. *Træepikker.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 30. 43. 147. 275. *das
Baum-Läuferlein, oder Schindel-Kriecher.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 61. *Baumreuter.*

Naturf. IX. p. 59. n. 65. *Baumklette.*

Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde,
VII. p. 455. n. 26. *Baumklette.*

Linné, auserles. Abh. II. p. 283. n. 35. *der geselli-
ge Baumläufer.*

Anweisung Vögel zu fangen u. s. w. p. 115. *Baum-
läuferlein.*

Forstlex. III. p. 424. *Grauspecht.*

Krünitz, ökon. Encyklop. Art. *Baumklette.*

Meidinger, Vorles. I. p. 121. n. 1. *der gemeine
Baumläufer.*

Eberhard, Thiergesch. p. 87. *der Baumsteiger,
oder Brunnläufer.*

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 53. Reptatrix.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 21. n. 2. Certhia.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 118. n. 1. Certhia
(Familiaris) supra grisea, subtus alba, remi-
gibus fuscis decem macula alba.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 104. Cer-
thia (Familiaris) grisea, subtus alba, remigibus
fuscis decem, macula alba, rectricibus decem,

Kramer, Austr. p. 337. n. 2. Ispida cauda rigida,

Brünnich, ornitholog. bor. p. 12. Certhia.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 347. Scandalaca arbo-
rum; ein Baumkletterlin, Baum-Heckel, Rin-
denkleber.

Rzaczynsk. auct. hist. nat. Polon. p. 419.

Schaeffer, elem. ornith. Tab. 25.

Jonston, av. p. 112. Certhia.

Moehring, av. gen. p. 36. n. 17. Certhia.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 205. Certhia familiaris.

Philos. Transact. xxvi. p. 124.

Gerin. ornith. II. p. 55. Tab. 195. fig. 1.

Aristot. histor. animal. L. IX. c. 19. n. 184. Κεγ-
σιος.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 251. n. 1.
die Baumklette.

β. Der große Baumläufer.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 554. der
große Baumläufer.

Briffon, ornith. II. p. 3. A. grand Grimpereau.

Büffon, Vögel, XVIII. Tab. 21. der große Baum-
läufer.

Latham, Vögel, I. 2. p. 753. n. 1. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 281. n. 1. β.

Gerin. ornithol. II. p. 56. Tab. 196. Cerzia vul-
gare maggiore.

26. VIRIDIS. Der grüne Baumläufer. (9)

Büffon, Vögel, XVIII. p. 149. der grüne Baum-
läufer.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 54. n. 60.
die grüne Baumklette.

Latham, Vögel, I. 2. p. 754. n. 2. der grüne
Baumläufer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 281. n. 2. Certhia
(Viridis) virefcens, subtus flavo-varia, lateri-
bus colli vitta caerulea, gula macula rufa.

27. PACI-

(9) Nach *Scopoli* vielleicht nur dem Geschlecht nach von *Cer-
thia Caerulea* p. 474. n. 8. verschieden.

27. PACIFICA. *Der Baumläufer von den Freundschaftsinseln.*

Büffon, Vögel, XVIII. *der Baumläufer von den Freundschaftsinseln.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 754. n. 3. *der große krummschnäblige Baumläufer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 126. Great hook-billed Creeper.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 281. n. 3. Certhia (Pacifica) rostro longissimo incurvato, corpore atro, humeris, uropygio, crisso femoribusque flavis.

Cook, last voy. III. p. 119. Hoohoo.

28. OBSCURA. *Der olivenfarbene Baumläufer von den Sandwich-Inseln.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 151. *der dunkelfarbige Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 575. n. 4. *der grüne krummschnäblige Baumläufer.* Tab. 35. fig. 1.

Latham, Syn. Suppl. p. 126. Hook-billed green Creeper.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 281. n. 4. Certhia (Obscura) fusco-virens, rostro longissimo incurvato, mandibula inferiore brevior, loribus fuscis.

29. COCCINEA. *Der karmoisinrothe Baumläufer.*

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 170. n. 3.

Certhia (Coccinea) rectricibus remigibusque nigris, reliquo corpore coccineo.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 133. *der karmoisinrothe Baumläufer von der Insel O-Waihi; mit 1 Fig.*

Martini, Naturlex. VI. p. 459. *rother Baumläufer von der Insel O-Waihi.*

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 575. n. 5. *der rothe krummschnäblige Baumläufer.*

Latham, Syn. Supplem. p. 127. Hook-billed red Creeper.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 282. n. 5. Certhia (Vestitaria) rostro longiore incurvo, corpore coccineo, alis caudaque nigris, tectricibus alarum macula alba.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 251. n. 2. *der karmoisinrothe Baumläufer.*

30. FALCATA. *Der fichelschnäblige Baumläufer* (10)
Buffon, Vögel, XVIII. p. 152. *der fichelschnäblige Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 576. n. 6. *der fichelschnäblige Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 282. n. 6. Certhia (Falcata) rostro longissimo incurvato, corpore viridi, subtus caudaque violaceis, tectricibus alarum maioribus, remigibus abdomineque pallide fuscis.

31. SOVIMANGA. *Der violette Baumläufer.*

Briffon, ornithol. II. p. 11. n. 18. Grimpereau violet de Madagascar.

Buffon, Vögel, XVIII. p. 39. *der Souimanga;* mit 1 Fig.

Martini, Naturlex. VI. p. 467. *Soui-Manga.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 577. n. 7. *der violette Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 282. n. 7. Certhia (Madagascariensis) olivaceo-viridis nitens, pectore fusco caeruleo castaneoque fasciato, abdomine flavescente, humeris macula fulva.

32. MA-

(10) Steht im brittischen Museum; woher er kommt, ist unbekannt.

32. **MANILLENsis.** *Der manillische Baumläufer.* (1)
Büffon, Vögel, XVIII. p. 153. *der manillische Baumläufer.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 577. n. 7. Var. A. *der manillische Baumläufer.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 283. n. 7. β.
33. **BURBONICA.** *Der burbonsche Baumläufer.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 76. *der bourbonsche Souimanga*; mit 1 Fig.
Martini, Naturlex. VI. p. 436. *der bourbonsche Baumläufer.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 601. n. 41. *der bourbonsche Baumläufer.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 296. n. 52. *Certhia* (Borbonica) *viridi-fusca*, *subtus grisea*, *lateribus rufis*, *uropygio flavo.*
34. **SANNIO.** *Der neuseeländische Baumläufer.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 154. *der spottende Baumläufer.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 600. n. 39. *der neuseeländische Baumläufer.*
Latham, Syn. Suppl. p. 129. *Mocking Creeper.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 296. n. 48. *Certhia* (Sannio) *viridi-olivacea*, *subtus flavescens*, *genis macula alba*, *cauda subforcipata.*
35. **AURANTIA.** *Der orangenkehlige Baumläufer.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 155. *der Baumläufer mit der pomeranzenfarbigen Kehle.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 599. n. 38. *der orangenkehlige Baumläufer.*
Latham,

(1) Nach *Latham* eine Varietät von *Certhia Souimanga*, n. 31.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 295. n. 47. Certhia (Aurantia) viridis, collo inferiore fulvo, pectore abdomineque pallide flavis, remigibus rectricibusque nigricantibus.

36. FLAVIPES. *Der gelbfüßige Baumläufer.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 156. *der gelbbeinige Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 599. n. 37. *der blaubrüstige Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 295. n. 46. Certhia (Cyanogastra) viridis, subtus caerulea, lateribus colli vitta longitudinali flavescente, remigibus rectricibusque nigris.

37. OCHROCHLORA. *Der gelbgrüne Baumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 157. *der gelbgrüne Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 599. n. 36. *der gelbgrüne Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 295. n. 45. Certhia (Surinamensis) viridis, genis, gula abdomineque flavis, pectore lateribusque viridi-flavescentibus, caeruleo notatis.

38. CARDINALIS. *Der Cardinalsbaumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 158. *der Cardinalsbaumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 598. n. 35. *der Cardinalsbaumläufer.* Tab. 35. fig. 2.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 290. n. 29. Certhia (Cardinalis) nigra, capite, collo, pectore vittaque dorsi longitudinali rubris.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 251. n. 3. *der Cardinalsbaumläufer.*

39. CARUNCULATA. *Der belappte Baumläufer.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 159. *der Baumläufer*
mit Lappen an der Kehle.

Latham, Vögel, I. 2. p. 598. n. 34. *der belapp-*
te Baumläufer.

Latham, Syn. Suppl. p. 129. *Wattled Creeper.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 295. n. 44. *Cer-*
thia (Carunculata) olivaceo fusca, subtus flave-
scente cinerea, gula fulva, ad basin maxillae
inferioris caruncula carnosa flava.

Forster: Götting. Magazin 1780. VI St. p. 349.
ein Baumläufer aus Tongatabu, mit fleischich-
ten Bärten oder Lappen.

Naturforsch. XVII. p. 15. *Certhia carunculata.*

β. *Certhia olivacea-fusca, subtus flavescens, remi-*
*gibus rectricibusque margine flavis. **

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 294. n. 44. β.

40. FUSCA. *Der braune Baumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 160. *der braune Baum-*
läufer.

Latham, Vögel, I. 2. p. 597. n. 33. *der braune*
Baumläufer.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 294. n. 41. *Cer-*
thia (Fusca) collo lateribus albido vario, iu-
gulo pectoreque albo fasciatis.

2. MURARIA. *Der MauerSpecht. (2)*

Müller, Naturyst. II. p. 254. n. 2. *MauerSpecht.*

Leske, Naturgesch. p. 251. n. 2. *der kleine Baum-*
läufer, MauerSpecht.

Borowsky,

(2) *Suavem vocem edit*, sagt *Schwenkfeld*; und *Scopoli* behauptet,
 er habe gar keine Stimme. *Büffon*, *Latham* u. a. übergehen
 diesen Umstand ganz.

- Borowsky*, Thierreich, II. p. 153. n. 1. *die Mauer-
klette, Mauerspecht, Todtenvogel.* Tab. 23.
- Blumenbach*, Handb. der Naturgesch. p. 170. n. 2.
Certhia (Muraria) cinerea, macula alarum
fulva; *der Mauerspecht.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 273. n. 2. *der Mauer-
specht.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 555. n. 2.
der Mauerspecht. p. 557. *Mauerläufer, Tod-
tenvogel, kleiner Baumläufer, Mauerklette,
Mauerklettervogel, Kletterspecht, Murspecht.*
Tab. 20.
- Funke*, Naturgeschichte, I. p. 301. *der Mauer-
specht.*
- Ebert*, Naturl. H. p. 64. *der Mauerspecht.*
- Meyer*, Thiere, II. Tab. 38. fig. 1.
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 68. n. 85. *der Mauerspecht.*
- Handbuch der deutschen Thiergeschichte, p. 104.
Mauerspecht.
- Martini*, Naturlex. VI. p. 421. *Mauerläufer.*
- Gesner*, Vögelbuch, p. 483. *Murspecht; m i F.*
- Briffon*, ornithol. II. p. 3. n. 2. *Grimpereau de
Muraille.*
- Büffon*, Vögel, XVIII. p. 23. *der Mauerläufer
oder Mauerspecht.*
- Latham*, Vögel, I. 2. p. 596. n. 32. *der Mauer-
specht.*
- Latham*, Syn. Suppl. p. 129. *Wall Creeper.*
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 294. n. 40. Cer-
thia (Muraria) cinera, tectricibus alarum re-
migibusque exterius roseis.
- Seligmann*, Vögel, IX. Tab. 3. *der Mauer-
specht.* (sehr unähnlich.)
- Batsch*, Thiere, I. p. 313. *die Mauerklette.*

Götz, Naturg. einiger Vögel, p. 80. *der Mauer-
specht.* Tab. 5.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 52. n. 58.
der Mauer-specht.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 318. n. 66.
Mauer-specht?

Naturf. IX. p. 60. n. 66. *Mauer-specht?*

Gmelin, Reif n. Rußland, III. p. 100. *lang-
schwänzige Bachstelze, oder persischer Lang-
schnabel.* Tab. 19. fig. 2?

Meidinger, Vorles. I. p. 121. n. 2. *der kleine
Baumläufer.*

Eberhard, Thiergesch. p. 87. *der Mauer-specht.*

Schlef. ökon. Nachr. 1781. p. 83. n. 93.

Storr, Alpenreise, I. p. 73. *Mauer-specht.*

Kramer, Austr. p. 336. n. 6. *Picus pedum digitis
tribus anticis: postico uno, albo rubro nigro-
que varius; Mauer-specht, Todten-Vogl.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 540. *Picus muralis; ein
Mauer - Specht, Mur - Specht, Kletten - Specht.*

Charleton, av. 93. *Picus murarius.*

Rzaczynsk. auct. histor. nat. Polon. p. 414. *Picus
murarius.*

Jonston, av. p. III. *Picus murarius.*

Barrere, sp. nov. Class. III. Gen. 22. sp. 3. p. 47.

*Merops pyrenaicus cinereus, alarum costis
coccineis, reptatrix.*

Gerin. ornithol. II. p. 56. Tab. 197.

Salerne, ois. p. 113. *Pic d'Auvergne.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 251. n. 4.
der Mauer-specht.

3. PUSILLA. *Der kleine Baumläufer.* (3)

Müller, Naturf. II. p. 255. n. 3. *kleiner Indianischer.*

Kr 2

Klein,

(3) Nach Buffon u. Latham eine Varietät von *C. Sperata* n. 13.

Klein, av. p. 108. n. 14. *Falcinellus fuscus*, ventre albicante.

Klein, Vorber. p. 200. n. 14. *braune Baumklette*, mit weißem Unterleibe.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. III. n. 17. *braune Klette*.

Briffon, ornithol. II. p. 7. n. 9. Grimpereau des Indes.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 45. *der kleine braun und weiße Baumläufer des Edwards*.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 51. *das kleine braun und weiße Baumläuferlein*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 578. n. 8. Var. A. *der kleine Baumläufer*.

Latham, Syn. II. p. 707. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 283. n. 8. β. *Certhia grisea*, subtus alba, superciliis candidis, rectricibus fuscis, extimis apice albis.

Martini, Naturlex. VI. p. 448. *kleiner indianischer Baumläufer*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 118. n. 2. *Certhia* (*Puffilla*) *supra grisea subtus alba*, rectricibus fuscis, extimis apice albis.

4. **CAPENSIS.** *Der capsche Baumläufer.* (4)

Müller, Naturf. II. p. 255. n. 4. *capscher grauer*.

Briffon, ornithol. II. p. 6. n. 7. Grimpereau du Cap de bonne esperance.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 55. *Briffons capscher Baumläufer*; m. 1 Fig.

Martini, Naturlex. VI. p. 446. *der capsche graue Baumläufer*.

Latham,

(4) Nach *Büffon* das Weibchen von *Certhia Chalybea*, n. 10. *Briffon* vermuthet selbst, daß dieser Vogel wohl das Weibchen von irgend einer andern Gattung seyn möge.

Latham, Syn. II. p. 711. n. 11. Cape Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 581. n. 11. *der capische Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 284. n. 12. *Certhia (Capensis) grisea, rectricibus nigricantibus, extima exterius albo fimbriata.*

β. MELANURA. *Der schwarzschwänzige Baumläufer. (5)*

Büffon, Vögel, XVIII. *der schwarzschwänzige Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 608. n. 62. *der schwarzschwänzige Baumläufer.*

Latham, Syn. Supplem. p. 134. Black-tailed Creeper.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 300. n. 67. *Certhia (Melanura) capite dorsoque violaceis, pectore abdomineque virescentibus, alis fuscis, cauda nigra subbifida, tibiis digitisque atris.*

5. OLIVACEA. *Der madagascarische Baumläufer. (6)*

Müller, Naturyst. II. p. 255. n. 5. *Madagascarische.*

Briffon, ornitholog. II. p. 8. n. 11. *Grimpereau olive de Madagascar.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 60. *der madagaskarische Baumläufer des Briffon.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 583. n. 14. *der madagaskarische Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 285. n. 14. *Certhia (Olivacea) olivacea, subtus grisea, orbitis albicantibus, rectricibus extimis apice albis.*

Rr 3

6. CUR-

(5) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

(6) Nach *Büffon* eine Abart von *Certhia Zeylonica*, p. 482. n. 23.

6. CURRUCARIA. *Der graue Baumläufer.* (7)
Müller, Naturfyft. II. p. 256. n. 6. *Ceylonifcher*.
Borowsky, Thierreich, II. p. 154. n. 3. *die zeylonifche Baumklette*.
Briffon, ornitholog. II. p. 5. n. 5. *Grimpereau gris des Philippines*.
Büffon, Vögel, XVIII. p. 61. *der graue philippinifche Baumläufer des Briffon*; mit 1 Fig.
Martini, Naturlex. VI. p. 472. *zeilonifcher Baumläufer*.
Latham, Vögel, I. 2. p. 583. n. 15. *der graue Baumläufer*.
Latham, Syft. ornithol. I. p. 285. n. 15. *Certhia (Currucaria) olivacea* subtus grifescens, rectricibus aequalibus, iugulo vitta longitudinali violaceo.
7. JUGULARIS. *Der kleine graue Baumläufer.* (8)
Müller, Naturfyft. II. p. 256. n. 7. *Blaukehlchen*.
Briffon, ornithol. II. p. 5. n. 6. *petit Grimpereau des Philippines*.
Büffon, Vögel, XVIII. p. 62. *der kleine philippinifche Baumläufer des Briffon*; mit 1 Fig.
Martini, Naturlex. VI. p. 432. *Blaukehlchen*.
Fifcher, Naturgefch. von Livland, p. 78. n. 74. *Blaukehlchen?*
Latham, Syn. II. p. 714 n. 15. A.
Latham, Vögel, I. 2. p. 584. n. 15. Var. A. *der kleine graue Baumläufer*.
Latham, Syft. ornithol. I. p. 286. n. 15. β . *Certhia subgrifea*, subtus lutea, gula violacea, rectricibus duabus extimis apice flavis.
Gerin. ornithol. II. p. 58. n. 199. fig. 1.

8. CAE-

(7) Nach *Büffon* eine Abart von ebendemselben.

(8) Nach *Büffon* eine Abart von obiger Abart. Nach *Latham* eine Varietät von *Certhia Currucaria*.

8. CAERULEA. *Der blaue Baumläufer.* (9)
 Müller, Naturfyst. II. p. 256. n. 8. *blauer Surinamischer.* Tab. 8. fig. 8.
 Borowsky, Thierreich, II. p. 155. n. 4. *die blaue Baumklette.*
 Halle, Vögel, p. 503. n. 563. *der Papilionvogel.*
 Klein, av. p. 107. n. 6. *Falcinellus papilio, avis Hoitzillin vocata.*
 Klein, Vorbereit. p. 199. n. 6. *Schmetterling.*
 Klein, verbess. Vögelhist. p. 110. n. 9. *Schmetterling.*
 Klein, av. p. 108. n. 13. *Falcinellus gula alisque nigris.*
 Klein, Vorbereit. p. 200. n. 13. *Schwarzkehlchen.*
 Klein, verbess. Vögelhist. p. 111. n. 16. *Schwarzkehlchen.*
 Brisson, ornithol. II. p. 8. n. 12. *Grimpereau bleu de Cayenne.*
 Buffon, Vögel, XVIII. p. 104. *Abart des schwarz und blauen Guitguit; mit 1 Fig.*
 Martini, Naturlex. VI. p. 427. *Schwarzkehlchen.*
 Latham, Vögel, I. 2. p. 591. n. 27. *der blaue Baumläufer.*
 Latham, Syn. Supplem. p. 128. *Blue Creeper.*
 Latham, Syst. ornithol. I. p. 292. n. 35. *Certhia (Caerulea) caerulea, fascia oculari, gula, remigibus rectricibusque nigris.*
 Seligmann, Vögel, I. Tab. 41. *das blaue Baumläuferlein.*
 Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 55. n. 61. *die himmelblaue Baumklette.*
 Bankroft, Naturgeschichte von Guiana, p. 99. *der guianische Baumläufer.*

R f 4

Linné,

(9) Nach Buffon eine Varietät von *Certhia Cyanea* p. 483. n. 24. Scopoli rechnet auch die *Certhia viridis* p. 469. n. 26. hieher.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 118. n. 3. Certhia (Caerulea) caerulea, remigibus rectricibusque nigris.

Sparrmann, mus. Carlson. fasc. 4. Tab. 82.

Gerin. ornith. II. p. 56. Tab. 196. fig. 2.

41. BRASILIANA. *Der schwarz und violette Baumläufer.*

Briffon, ornith. I. p. 18. n. 30. Grimpereau violet du Brésil.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 124. *der schwarz und violette Guitguit*; mit 1 Fig.

Martini, Naturlex. VI. p. 435. *brasilianischer violetter Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 595. n. 31. *der schwarz und violette Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 293. n. 39. Certhia (Brasiliana) nigra, vertice viridi-aureo, iugulo, rectricibus alarum minoribus uropygioque violaceis, pectore castaneo.

42. VARIEGATA. *Der bunte Baumläufer.*

Klein, av. p. 79. n. 17. Sylvia versicolor.

Klein, Vorbereit. p. 149. n. 17. *Buntwenzel.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 80. n. 21. *Buntwenzel.*

Briffon, ornitholog. II. p. 19. n. 32. Grimpereau varié d'Amerique.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 122. *der bunte Guitguit*; mit 1 Fig.

Martini, Naturlex. VI. p. 424. *amerikanischer bunter Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 595. n. 30. *der bunte Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 293. n. 38. Certhia (Variegata) caeruleo-nigro, flavo-alboque varia,

varia, subtus fulvo-flaves cens, vertice rubro-nitente, nucha caerulea.

Gerin. ornith. II. p. 60. n. 32.

9. CAYANA. *Der cayennische Baumläufer.*

Müller, Natursystem, II. p. 257. n. 9. *Cayennischer.*

Briffon, ornitholog. II. p. 11. n. 17. *Grimpereau verd de Cayenne.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 119. *der grüne gefleckte Guitguit.*

Martini, Naturlex. VI. p. 437. *cayennischer Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 594. n. 29. *der cayennische Baumläufer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 128. *Cayenne Creeper.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 293. n. 37. *Certhia (Cayana) viridis, nitida, subtus albo striata, rectricibus viridibus, lateralibus interius nigricantibus.*

Gerin. ornith. II. p. 60. n. 27.

10. CHALYBEA. *Der Baumläufer mit dem Halsbande.*

Müller, Natursystem, II. p. 257. n. 10. *stahlfärbig bandirter.*

Briffon, ornitholog. II. p. 13. n. 20. *Grimpereau à collier du Cap de B. E.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 50. *der purpurfarbige indianische Souimanga; mit 1 Fig.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 52. *der Souimanga mit dem Halskragen; mit 1 Fig.*

Martini, Naturlex. VI. p. 457. *purpurfarbiger indianischer Baumläufer.*

Martini, Naturlex. VI. p. 468. *stahlfärbiger bandirter Baumläufer.*

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 55. *der purpurfarbene indianische Baumhacker.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 580. n. 10. *der Baumläufer mit dem Halsbände.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 284. n. 11. *Certhia (Chalybea) viridinitens, pectore rubro, fascia antica chalybea.*

II. AFRA. *Der afrikanische Baumläufer.*

Müller, Natursystem, II. p. 257. n. 1. *bunter.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 72. *der grüne, Souimanga mit rother Kehle; mit 1 Fig.*

Martini, Naturlex. VI. p. 435. *der bunte Baumläufer.*

Seligmann, Vögel, IX. Tab. 37. fig. 1.

Latham, Vögel, I. 2. p. 586. n. 18. *der afrikanische Baumläufer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 127. *African Creeper.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 286. n. 18. *Certhia (Afra) viridis, abdomine albo, pectore rubro, uropygio caeruleo.*

β. *Büffon*, Vögel, XVIII. p. 73. β.

Latham, Syn. II. p. 717. n. 18. Var. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 586. n. 18. Var. A. p. 580. not. ****.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 287. n. 18. β.

Sparrmann, mus. Carlson. fasc. III. Tab. 38. *Certhia Scarlatina?*

Born, Physic. p. 76. Tab. 3.

γ. *Büffon*, Vögel, XVIII. p. 73. γ.

Latham, Syn. II. p. 718. n. 18. Var. B.

Latham, Vögel, I. 2. p. 586. n. 18. Var. B.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 287. n. 18. γ.

12. SPIZA. *Der schwarzköpfige Baumläufer.*

Müller, Naturfyft. II. p. 257. n. 12. *Blaukopf.*

Klein, av. p. 79. n. 18. *Sylvia, avicula americana altera.*

Klein, Vorber. p. 149. n. 18. *Weißschnabel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 80. n. 22. *Weißschnabel.*

Briffon, ornithol. II. p. 10. n. 16. *Grimpereau verd à tête noire d'Amérique.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 108. *der grün und blaue Guitguit mit schwarzem Kopfe; mit 1 Figur.*

Martini, Naturlex. VI. p. 441. *Weißschnabel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 592. n. 20. *der schwarzköpfige Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 292. n. 36. *Certhia (Spiza) viridis, subtus caerulea, capite gulaque nigris.*

Gerin. ornith. II. p. 60. n. 26.

Mochring, av. gen. p. 36. n. 16. *Colius.*

β. *Der Baumläufer mit schwarzer Mütze. (10)*

Klein, av. p. 80. n. 22. *Sylvia viridis, capite nigro.*

Klein, Vorber. p. 150. n. 22. *grüner Wenzel mit schwarzem Kopfe.*

Klein, verb. Vögelh. p. 81. n. 26. *grüner Wenzel mit schwarzem Kopfe.*

Briffon, ornithol. II. p. 10. n. 15. *Grimpereau verd à tête noire du Brésil.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 110. *der grüne Guitguit mit schwarzem Kopfe; mit 1 Fig.*

Seligmann, Vögel, I. Tab. 49. *der grüne Fliegen-schnäpper mit dem schwarzen Kopfe.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 593. n. 28. *Var. A. der Baumläufer mit schwarzer Mütze.*

Latham,

(10) Nach Briffon eine eigne Gattung.

Latham, Syn. II. p. 727. n. 28. A. Black-capped Creeper.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 292. n. 36. β . *Certhia viridis*, capite supra nucaque nigris.

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 110. *der grüne schwarzkuppichte Fliegenschmäpper des Edwards*.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 188. n. 27. *Motacilla* (*Spiza*) *viridis*, remigibus primoribus nigricantibus.

Gerin. ornithol. II. p. 60. n. 25.

γ . *Der blauköpfige Baumläufer*. (1)

Klein, av. p. 80. n. 23. *Sylvia viridis*, capite cyaneo.

Klein, Vorber. p. 150. n. 23. *grüner Wenzel mit blauem Kopfe*.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 81. n. 25. *grüner Wenzel mit blauem Kopfe*.

Briffon, ornitholog. II. p. 9. n. 14. *Grimpereau verd du Brésil*.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 115. *der grün und blaue Guitguit mit weißer Kehle*; m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, I. Tab. 49. *der blauköpfige grüne Fliegenschmäpper*.

Latham, Syn. II. p. 727. n. 28. B. Blue-headed Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 593. n. 28. Var. B. *der blauköpfige Baumläufer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 292. n. 36. γ . *Certhia viridis*, gula alba, vertice tectricibusque alarum caeruleis.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 188. n. 27. β . *Motacilla viridis*, capite caeruleo.

Gerin. ornith. II. p. 60. n. 24.

δ . *Der*

(1) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

δ. *Der ganz grüne Baumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 117. *der ganz grüne Guitguit*; mit 1 Fig.

Martini, Naturlex. VI. p. 439. *ganz grüner Baumläufer.*

Seligmann, Vögel, IX. Tab. 38. fig. 2. *der ganz grüne Baumläufer.*

Latham, Syn. II. p. 728. n. 28. C. All-green Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 495. n. 28. Var. C. *der ganz grüne Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 293. n. 36. γ. *Certhia corpore toto viridi, subtus dilutiore.*

13. SPERATA. *Der purpurfarbige Baumläufer.*

Müller, Natursystem, II. p. 257. n. 13. *Purpurfarbige.*

Briffon, ornitholog. II. p. 16. n. 27. *Grimpereau pourpré des Philippines.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 42. *der purpurbraune Souimanga mit rother Brust*; in. 1 Fig.

Halle, Vögel, p. 501. n. 557. *der rothe Gesangkolibri?*

Klein, av. p. 107. n. 2. *Falcinellus, colore passeris Hispanici?*

Klein, Vorbereit. p. 198. n. 2. *Purpurköpfchen?*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 110. n. 2. *Purpurköpfchen, Nochtototl?*

Martini, Naturlex. VI. p. 455. *purpurfarbiger Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 578. n. 8. *der purpurfarbige Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 283. n. 8. *Certhia (Purpurea) subtus coccinea, capite, gula uropygioque violaceis.*

Gerin,

Gerin. ornithol. II. p. 58. Tab. 200. fig. 2. das Männchen. fig. 1. das Weibchen.

Seba, thes. I. p. 69. Tab. 42. Avis Nochtototl?

Moehring, av. gen. p. 79. n. 102. Troglodytae adfinis?

β. *Der Baumläufer mit violetter Kehle.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 47. *der Baumläufer mit viol. tter Kehle und rother Brust.*

Martini, Naturlex. VI p. 450.

Latham, Syn. II. p. 708. n. 8. B.

Latham, Vögel, I. 2. p. 579. n. 8. Var. B.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 283. n. 8. γ.

Certhia castaneo-rubra, capite virescente, gula violacea, pectore rubro, uropygio caudaque chalybeis.

Sonnerat, Reise n. Neuguinea, p. 25. *die dritte Art Baumläufer*; mit 1 Fig.

14. *SENEGALENSIS.* *Der senegalische Baumläufer.*

Müller, Naturyst. II. p. 258. n. 14. *senegalischer.*

Briffon, ornith. II. p. 18. n. 29. Grimpereau violet du Sénégal.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 48. *der violette Souimanga mit rother Brust*; mit 1 Fig.

Martini, Naturlexicon, VI. p. 466. *senegalischer Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 579. n. 9. *der senegalische Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 284. n. 10. *Certhia (Senegalensis) nigro-violacea*, vertice gulaque viridi-aureis, pectore coccineo, alis caudaque fuscis.

Gerin. ornith. II. p. 58. Tab. 199. fig. 2.

43. PURPUREA. *Der virginische Baumläufer.*
Halle, Vögel, p. 508. n. 582. *der purpurfarbene Gefangkolibri.*
Klein, av. p. 108. n. 9. *Falcinellus phoeniceus.*
Klein, Vorbereit. p. 199. n. 9. *Purpurklette, Purpurvogel aus Virginien.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 110. n. 12. *virginische Klette.*
Briffon, ornitholog. II. p. 16. n. 26. *Grimpereau pourpré de Virginie.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 95. *der Purpurvogel mit dem Baumläuferschnabel.*
Martini, Naturf. VI. p. 457. *Purpurklette, Atototl.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 590. n. 25. *der virginische Baumläufer.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 291. n. 33. *Certhia (Purpurea) corpore toto purpureo.*
Gerin, ornith. II. p. 59. Tab. 202. fig. 1.
Moehring, av. gen. p. 79. n. 102. *Troglodytae adfinis.*
15. GUTTURALIS. *Der brasilianische Baumläufer.*
Müller, Naturf. II. p. 258. *Grünkehlchen.*
Briffon, ornitholog. II. p. 17. n. 28. *Grimpereau noirâtre du Brésil.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 93. *der braune Vogel mit dem Baumläuferschnabel.*
Martini, Naturlexicon, VI. p. 442. *grünkehlicher Baumläufer.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 590. n. 20. *der brasilianische Baumläufer.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 291. n. 32. *Certhia (Gutturalis) nigricans, sincipite et gutture viridinitente, pectore purpureo.*
Gerin, ornith. II. p. 59. Tab. 202. fig. 1.

16. PINUS. *Der Tannenbaumläufer.*

Müller, Naturfyft. II. p. 258. n. 16. *Blauflügel.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 385. n. 235. *der Fichtensänger.*

Briffon, ornitholog. I. p. 471. n. 15. *Mélange d' Amerique.*

Büffon, Vögel, XVI. p. 114. *der Tannenkriecher; mit 1 Fig.*

Martini, Naturlex. VI. p. 428. *Blauflügel, Tannenbaumhäcker.*

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 67. *der Tannenbaumhäcker.*

Latham, Syft. ornithol. II. p. 537. n. III. *Sylvia (Pinus) olivacea, subtus flava, loris nigris, alis caeruleis, fasciis duabus albis.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 205. *Certhia Pinus.*

17. CRUENTATA. *Der bengalische Baumläufer. (2)*

Müller, Naturfyft. II. p. 259. n. 17. *Rothkopf.*

Klein, av. p. 108. n. 19. *Falcinellus Bengalensis.*

Klein, Vorbereit. p. 201. n. 19. *die bengalische Klette.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. III. n. 22. *schwarz, weiß und rothe Klette.*

Briffon, ornithol. II. p. 18. n. 31. *Grimpereau de Bengale.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 74. *der roth, schwarz und weiße Souimanga; m. 1 Fig.*

Martini, Naturlexicon, VI. p. 463. *rothköpfiger Baumläufer.*

Selig-

(2) *Pennant* rechnet diesen Vogel zu den Motacillen; *Briffon* zu den Meisen; *Latham* unter seine Sylvien. Ueberhaupt herrscht in der Beschreibung desselben sehr viel Verwirrung, worüber man *Martini* Naturlexicon a. a. O. umständlicher nachlesen kann.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 57. *die kleine schwarze, weiß und rothe indianische Baumklette.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 600. n. 40. *der bengalische Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 296. n. 51. *Certhia* (Cruentata) nigro - caeruleascens, subtus alba, vertice, cervice, dorso uropygioque rubris.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 119. n. 4. *Certhia* (Cruentata) nigro caeruleascens, subtus alba, vertice, cervice, dorso uropygioque rubris.

Gerin, ornith. II. p. 57. Tab. 198. fig. 1.

18. FLAVEOLA. *Der Zuckervogel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 259. n. 18. *Zuckervogel.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 268. n. 91. *der westindische Baumläufer.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 111. n. 23. *Schwarz und gelbbunte Baumklette.*

Briffon, ornithol. II. p. 19. n. 33. *Grimpereau ou Sucrier de la Jamaïque.*

Buffon, Vögel, XVIII. p. 126. *der Zuckerfresser*; mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 17. *das schwarz und gelbe Baumläuferlein.*

Martini, Naturlex. VI. p. 474. *Zuckervogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 601. n. 42. *der Zuckervogel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 297. n. 53. *Certhia* (Flaveola) nigra, subtus uropygioque lutea, superciliis exalbidis, rectricibus lateralibus apice albis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 119. n. 5. *Certhia* (Flaveola) nigra, uropygio pectoreque luteo, superciliis, macula alarum rectricumque apicibus albis.

Gerin. ornithol. II. p. 57. Tab. 234. (*)

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 252. n. 5.
der westindische Baumläufer.

β. *Der martinikische Baumläufer.* (3)

Klein, av. p. 74. n. 10. *Luscinia* seu *Philomela*
e fusco et luteo varia.

Klein, Vorber. p. 140. n. 10. *schwarz und gelb-*
bunte Nachtigall.

Klein, verbeff. Vögelhist. p. 75. n. 10. *schwarz-*
bunte Nachtigal.

Briffon, ornitholog. II. p. 4. n. 3. *Grimpereau*
della Martinique, ou le Sucrier.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 126. 129. *der mar-*
tinikische Zuckerfresser; m. 1 Fig.

Seligmann, Vögel, IX. Tab. 52. *Baumkletterer*
mit gelbem Bauche.

Latham, Syn. II. p. 737. n. 42. A. *Yellow-bellied*
Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 602. n. 42. Var. A. *der*
martinikische Baumläufer.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 297. n. 53. β. *Cer-*
thia fusco-cinerea, subtus uropygioque lutea,
crisso superciliisque albis, rectricibus apice
albis.

Gerin. ornith. II. p. 61. n. 37.

γ. *Der bahamische Baumläufer.* (4)

Borowsky, Thierreich, II. p. 155. n. 5. *der Zu-*
ckervogel.

Klein, av. p. 74. n. 9. *Luscinia pectore flavo;*
Parus bahamensis.

Klein, Vorbereit. p. 140. n. 9. *Gelbbriüstel von*
Bahama.

Klein,

(3) Nach *Briffon* eine eigene Gattung.

(4) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

Klein, verbeff. Vögelhif. p. 75. n. 9. *Gelbbrüffel*.
Briffon, ornithol. II. p. 6. n. 8. Grimpereau de
 Bahama.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 130. *der bahamifche
 Baumläufer*; mit 1 Fig.

Martini, Naturlexicon, VI. p. 477. *bahamifcher
 Baumläufer*.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 18. *die bahamifche
 Meife*.

Latham, Syn. II. p. 737. n. 42. B. Bahama-
 Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 603. n. 42. Var. B. *der
 bahamifche Baumläufer*.

Latham, Syft. ornithol. I. p. 297. n. 53. γ . Cer-
 thia fusca, subtus lutea, gula pallida, abdo-
 mine infimo criffoque fufcefcentibus, superci-
 liis albis.

Gerin. ornith. II. p. 59. n. 20.

3. *Der Baumläufer von der Infel S. Bartholo-
 maei*. *

Latham, Vögel, I. 2. p. 611. n. 72. *der Schwe-
 felgelbe Baumläufer*.

Latham, Syft. ornithol. I. p. 297. n. 53. γ . Cer-
 thia fupra plumbeo-fufca, subtus flava, super-
 ciliis flavescenti-viridibus, uropygio fubvire-
 fcenti, criffo albido, roftro, pedibus, alis,
 caudaque fufcis.

Muf. Carlf. Fasc. III. Tab. 57. *Certhia bartho-
 lemica*.

44. SANGUINEA. *Der blutrothe Baumläufer*.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 161. *der blutrothe
 Baumläufer*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 603. n. 43. *der karmo-
 finrothe Baumläufer*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 290. n. 30. *Certhia* (Sanguinea) saturate coccinea, abdomine obscuro, crisso albo, remigibus secundariis castaneo-marginatis, primoribus rectricibusque nigris.

45. *VIRENS*. *Der grünliche Baumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 162. *der grünliche Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 603. n. 44. *der olivengrüne Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 290. n. 31. *Certhia* (*Virens*) olivaceo-viridis, loris nigricantibus, remigibus caudaque flavo marginatis.

46. *RUBRA*. *Der scharlachrothe Baumläufer.*⁽⁵⁾

Büffon, Vögel, XVIII. p. 165. *der rothe Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 604. n. 45. *der scharlachrothe Baumläufer.*

47. *CINNAMOMEA*. *Der zimmtfarbene Baumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 164. *der zimmtfarbige Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 604. n. 46. *der zimmtfarbige Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 298. n. 56. *Certhia* (*Cinnamomea*) cinnamomea, subtus alba.

48. *MACASSARIENSIS*. *Der macassarische Baumläufer.*

Klein, av. p. 107. n. 7. *Falcinellus rex florum*, Kakopit Tfioei.

Klein, Vorbereit. p. 199. n. 7. *Blumenkönig.*

Klein,

(5) *Latham* rechnet ihn mit zu *Certhia Cardinalis*. Syst. ornith. p. 290. n. 29.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 110. n. 10. *Blumenkönig*.

Halle, Vögel, p. 503. n. 564. *der Blumenprinz*.

Briffon, ornitholog. II. p. 23. n. 6. *Colibri des Indes*.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 165. *der macassarische Baumläufer*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 604. n. 47. *der macassarische Baumläufer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 300. n. 72. *Certhia (Macassariensis) viridi-aurata, subtus nigricante-fusca*.

49. INDICA. *Der indische Baumläufer*.

Klein, av. p. 108. n. 12. *Falcinellus Cyaneus*.

Klein, Vorbereit. p. 200. n. 12. *Weißkehlchen*.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 111. n. 15. *Weißkehlchen*.

Halle, Vögel, p. 504. n. 568. *der hellblaue Kolibri specht, mit weißer Kehle*.

Briffon, ornitholog. II. p. 25. n. 10. *Colibri bleu des Indes*.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 166. *der indische Baumläufer*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 605. n. 40. *der indische Baumläufer*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 301. n. 73. *Certhia (Indica) caeruleo-nitens, collo inferiore albescente*.

50. AMBOINENSIS. *Der amboinische Baumläufer*.⁽⁶⁾

Briffon, ornithol. II. p. 26. n. 12. *Colibri d'Amboine*.

Ss 3

Büffon,

(6) *Klein* rechnet ihn zu seinem Blumenkönig *Certhia Macassariensis*.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 167. *der amboinische Baumläufer*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 605. n. 49. *der amboinische Baumläufer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 301. n. 74. Certhia (Amboinensis) cinereo-grisea, subtus viridis, capite colloque flavis, viridi-marginatis, pectore rubro, alis nigris.

51. MEXICANA. *Der rothe mexikanische Baumläufer*.

Klein, av. p. 107. n. 1. Avicula Hoitzillin.

Klein, Vorbereit. p. 198. n. 1. *das Vöglein Hoitzillin*.

Klein, verbeß. Vögelhist. p. 110. n. 3. *mexikanische Baumklette*.

Halle, Vögel, p. 502. n. 558. *der rothe Gesangkolibri mit grüner Kehle*.

Briffon, ornitholog. II. p. 15. n. 24. Grimpereau rouge du Mexique.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 88. *der rothe Vogel mit dem Baumläuferschnabel*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 589. n. 23. *der rothe Baumläufer*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 289. n. 27. Certhia (Coccinea) rubra, pileo dilutiore, gula iuguloque viridibus, remigibus apice caerulefcentibus.

Moehring, av. gen. p. 79. n. 102. Troglodytae adfinis.

3. *Der rothe, schwarz gehäubte mexikanische Baumläufer*.

Klein, av. p. 80. n. 20. Sylvia rubra, rostro longiori.

Klein, Vorbereit. p. 149. n. 20. *rother Wenzel mit schwarzer Haube*.

Klein,

Klein, verb. Vögelhist. p. 80. n. 23. *rother Wenzel mit schwarzer Haube.*

Briffon, ornitholog. II. p. 16. n. 25. *Grimpereau rouge à tête noire du Mexique.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. . . *der rothe Vogel mit schwarzem Kopfe.*

Martini, Naturlex. VI. p. 462. *rother Baumläufer mit schwarzer Haube.*

Latham, Syn. II. p. 722. n. 23. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 589. n. 23. Var. A. *der rothe schwarzgehäubte Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 289. n. 27. β.
Certhia pallide rubra, remigibus rectricibusque saturatoribus, capite nigro, tectricibus alarum flavo-aureis.

52. CINEREA. *Der aschgraue Baumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 168. *der aschgraue Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 589. n. 22. *der aschgraue Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 289. n. 25. Certhia (Cinerea) viridi-nitens, capite, collo, dorso supremo pectoreque fusco cinereis, striga lateribus gulae abdomineque flavescens.

19. PULCHELLA. *Der schöne Baumläufer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 259. n. 19. *Langschwanz.*

Klein, av. p. 80. n. 19. *Sylvia versicolor.*

Klein, Vorber. p. 149. n. 19. *Kurzschwanz.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 79. n. 15. *amboinischer Steimpatscher.*

Briffon, ornitholog. II. p. 14. n. 21. *Grimpereau à longue queue du Sénégal.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 83. *der langschwänzige goldgrüne schillernde Souimanga; m. 1 F.*

Martini, Naturlex. VI. p. 450. *Langschwanz.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 587. n. 20. *der schöne Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 288. n. 23. *Certhia* (*Palchella*) *rectricibus duabus intermediis longissimis, corpore viridi nitente, pectore rubro,*
Gerin. ornith. II. p. 59. Tab. 201 fig. 2.

20. **FAMOSA.** *Der langschwänzige Baumläufer.*

Müller, Natursystem, II. p. 259. n. 20. *capscher Colibri.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 155. n. 6. *der capsche Colibri, Zuckervogel.*

Briffon, ornitholog. II. p. 14. n. 22. *Grimpereau à longue queue du Cap de b. E.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 85. *der große grüne Souimanga mit langem Schwanz;* mit 1 Fig.

Batsch, Thiere, I. p. 312. *der Zuckervogel.*

Martini, Naturlexicon, VI. p. 447. *capscher langgeschwänzter Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 588. n. 21. *der langgeschwänzte Baumläufer.*

Latham, Syn. Suppl. p. 128. *Famous Creeper.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 288. n. 24. *Certhia* (*Famosa*) *rectricibus duabus intermediis longissimis, corpore viridi nitente, axillis luteis, loris nigris.*

Gerin. ornith. II. p. 58. Tab. 201. fig. 1.

21. **PHILIPPINA.** *Der philippinische Baumläufer.* (7)

Müller, Naturf. II. p. 260. n. 21. *philippinischer, Briffon,*

(7) Nach *Büffon* das Weibchen, oder eine Spielart von *Certhia calybea*. Nach *Latham* vielleicht das Weibchen von *Certhia Sperata*; und *Sonnerat* ist geneigt ihn für das Weibchen von *Certhia Zeylenica* zu halten.

Briffon, ornithol. II. p. 4. n. 4. Grimpereau des Philippines.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 55. *der philippinische Baumläufer.*

Martini, Naturlexicon, VI. p. 455. *philippinischer Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 581. n. 12. *der philippinische Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol, I. p. 283. n. 9. Certhia (Philippina) rectricibus 2. intermediis longissimis, corpore subgriseo virescente, subtus albo. flavescente.

Sonnerat, Reif. nach Neuguin. p. 25. *die zweyte Art Baumläufer; m. 1 Fig.*

22. VIOLACEA. *Der violetfarbige Baumläufer.*

Müller, Natursystem, II. p. 260. n. 22. *violetfärbiger.*

Müller, Natursystem, Suppl. p. 97. n. 27. *der violette Baumläufer.*

Briffon, ornithol. II. p. 15. n. 23. petit Grimpe-
reau à longue queue du Cap de b. E.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 79. *der langschwänzige Souimanga mit violetter Kehle; mit 1 Fig.*

Martini, Naturlex. VI. p. 471. *violetter Baum-
läufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 587. n. 19. *der violet-
köpfige Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 288. n. 21. Certhia (Violacea) rectricibus duabus intermediis longissimis, corpore violaceo-nitente, pectore abdomineque luteis.

23. ZEYLONICA. *Der zeilanische Baumläufer.*

Müller, Natursystem, II. p. 260. n. 23. *Rost-
färbiger.*

Müller, Naturfyft. Suppl. p. 99. n. 31. *der Dreyfarbige.*

Briffon, ornitholog. II. p. 7. n. 10. *Grimpereau olive des Philippines.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 58. *der olivenfarbige Souimanga mit purpurfarbiger Kehle; mit 1 Figur.*

Martini, Naturlex. VI. p. 458. *rostfarbiger Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 582. n. 13. *der zeylanische Baumläufer.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 285. n. 15. *Certhia (Zeylonica) pileo viridi, dorso ferrugineo, abdomine flavo, gula uropygioque azureis.*

Sommerat, Reif. n. Neuguin. p. 25. *die erste Art Baumläufer; mit 1 Fig.*

β. Latham, Syn. II. p. 713. n. 13. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 583. n. 13. Var. A.

Latham, Syft. ornithol. I. p. 285. n. 13. β. *Certhia fusca, pileo testricibusque alarum viridibus, uropygio purpureo, pectore infimo abdomineque albis.*

24. CYANEA. *Der schwarz und blaue Baumläufer.*

Müller, Naturfyft. II. p. 260. n. 24. *schwarzblauer.*

Klein, av. p. 108. n. 11. *Falcinellus de Guitguit, ex insula Cuba.*

Klein, Vorbereit. p. 200. n. 11. *Kurzschwanz, Langhals von der Insel Cuba.*

Klein, verb. Vögelh. p. 110. n. 14. *Langhals und Kurzschwanz.*

Halle, Vögel, p. 504. n. 567. *der schwarzblaue Kolibrispecht mit versilberter Stirn.*

Briffon, ornith. II. p. 9. n. 13. *Grimpereau bleu du Brésil.*

Büffon,

Büffon, Vögel, XVIII. p. 98. *der schwarz und blaue Guitguit*; mit 1 Fig.

Martini, Naturlexicon, VI. p. 464. *schwarzblauer Baumläufer*.

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 54. *der schwarze und blaue Baumhücker*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 591. n. 26. *der schwarz und blaue Baumläufer*.

Latham, Syn. Supplem. p. 128. black and blue Creeper.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 291. n. 34. *Certhia (Cyanea) caerulea*, fascia oculo, humeris, alis caudaque nigris, pedibus rubris.

Jonston, av. p. 206. Guiracoereba.

Moehring, av. gen. p. 36. n. 16. Colius.

β. *C. obscure viridis*, lateribus remigum interioribus tectricibusque alarum inferioribus sulphureis. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 29. n. 34. β.

25. **LOTTENIA.** *Der Lootensvogel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 261. n. 25. *von Lootens Vogel*.

Müller, Naturfystem, Suppl. p. 99. n. 32. *der Violetfleck*.

Briffon, ornitholog. II. p. 12. n. 19. *Grimpereau verd de Madagascar*.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 65. *der Souimanga: Angala-Dian*.

Martini, Naturl. VI. p. 451. *Lotensvogel*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 584. n. 16. *der Lotens-Baumläufer*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 286. n. 16. *Certhia (Lotenia) caerulea*, fascia pectorali rubro-aurea, loris atris.

Gerin. ornithol. II. p. 160. n. 29.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 252. n. 6.
der Lootensvogel.

53. OMNICOLOR. *Der goldgrüne Baumläufer.*⁽⁸⁾
Klein, Vorbereit. p. 199. n. 8. *ceylanische Baumklette.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 110. n. 11. *ceylanische Baumklette.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 70. *der Souimanga mit allen Farben*; mit 1 Fig.

Martini, Naturlexicon, VI. p. 473. *zeilonischer Baumläufer von allen Farben.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 585. n. 17. *der goldgrüne Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 286. n. 17. *Certhia (Omnicolor) viridi - aurata, variis coloribus nitens.*

54. CAFFRA. *Der caffersche Baumläufer.*⁽⁹⁾

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 97. n. 26. *der capsche braune Baumläufer.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 139. 169. *der capsche braune Baumläufer.*

Martini, Naturlex. VI. p. 445. *capscher brauner Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 610. n. 67. *der braune capsche Baumläufer.*

Pallas, Naturgesch. merkwl. Th. VI. p. 21. *der kaffrische Baumhäckel.*

Hermann, tab. affin. anim. p. 195. *Certhia Caffra.*
A. Ver-

(8) *Briffon* hat die hierher gehörigen Synonymen aus *Klein* und *Seba* zu der vorhergehenden Gattung gezogen.

(9) Ist nach *Pallas* mit *Merops Caffer*. u. *Upupa Promerops Linn.* völlig einerley, und sind alle bey diesen beyden Gattungen aufgeführte Synonymen *hierher* zu rechnen.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit 29 Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung sind zwey, bey der 4ten zwey, bey der 11ten drey, bey der 12ten vier, bey der 13ten zwey, bey der 23ten zwey Varietäten aus einander gesetzt, und bey der 18ten ist die Varietät β hinzugekommen.

B. Neuere Gattungen.

1. Der polirte Baumläufer.

Mus. Carl. fasc. III. Tab. 59. *Certhia polita*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 612. n. 73. *der polirte Baumläufer*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 287. n. 19. *Certhia (Polita) nigricans, pectore, capite corporeque supra virescenti parumque purpureo-metallico, macula subaxillari flava.*

2. Der asiatische Baumläufer.

Latham, Vögel, I. 2. p. 609. n. 63. *der asiatische Baumläufer*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 288. n. 22. *Certhia (Asiatica) saturate caerulea, alis fuscis, rostro pedibusque atris.*

3. Der schnupftabacksfarbige Baumläufer.

Latham, Syn. Supplem. p. 129. Snuff-coloured Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 605. n. 50. *der schnupftabacksfarbige Baumläufer*.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 289. n. 26. *Certhia (Tabacina) rectricibus duabus intermediis longissimis, corpore supra, capite colloque tabacino, subtus viridi, rectricibus viridi nigricantibus.*

4. Der

4. *Der rothrückige Baumläufer.*

Latham, Syn. Supplem. p. 132. *Red-backed Creeper.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 607. n. 55. *der rothrückige Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 290. n. 28. *Certhia* (*Erythronotos*) *coccinea*, subtus rufo-alba, lateribus colli fascia nigra, tectricibus alarum atro-viridibus, remigibus caudaque nigris.

Sonnerat, voy. Ind. p. 209. Tab. 117. fig. 1. Grim-pereau à dos rouge de la Chine.

5. *Der rußbraune Baumläufer.*

Mus. Carl. Fasc. III. Tab. 56. *Certhia ignobilis.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 611. n. 71. *der rußbraune Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 294. n. 42. *Certhia* (*Ignobilis*) supra fuliginoso-nigra, subtus cinerea, lineolis ellipticis albidis.

6. *Der gewellte Baumläufer.*

Mus. Carl. Fasc. II. Tab. 34. *Certhia undulata.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 143. *der gewellte Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 610. n. 68. *der gewellte Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 295. n. 43. *Certhia* (*Undulata*) supra cinereo-fuliginosa, subtus alba, nigro transversim undulata.

7. *Der neuholländische Baumläufer.*

White, voy. p. 186. 297. New Holland Creeper. (Männchen und Weibchen abgebildet.)

White, Reif. n. Neu-Süd-Wallis; in dem Magazin merkw. Reisebeschr. V. p. 129. *die neuholländische Baumklette.* (*Certhia varia*)

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 609. n. 64. *der neuholländische Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 296. n. 49. *Certhia* (Novae Hollandiae) nigra, subtus albo striata, superciliis maculaque aurium albis, remigibus rectricibusque flavo marginatis.

8. *Der grauliche Baumläufer aus Neukaledonien.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 609. n. 65. *der grauliche Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 296. n. 50. *Certhia* (Incana) subfusca, collo remigibusque canescentibus.

9. *Der fremde Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 609. n. 66. *der fremde Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 297. n. 54. *Certhia* (Peregrina) olivacea, subtus flava, fascia alarum bifida pallida, cauda subforficata, rectricibus 2 exterioribus apice intus albis.

10. *Der Baumläufer mit Kniebändern aus Surinam.*

Mus. Carls. Fasc. II. Tab. 36. *Certhia armillata.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 146. *der Baumläufer mit Kniebändern.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 611. n. 70. *der Baumläufer mit Kniebändern.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 298. n. 55. *Certhia* (Armillata) viridis, alis complicatis, supra nigris subtus luteis, humeris, femorum armillis maculisque aliquot uropygii sapphirinis.

11. *Der graubäuchige Baumläufer aus Afrika.*

Latham, Syn. Supplem. p. 298. Ash-bellied Creeper.

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 606. n. 51. *der graubäuchige Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 298. n. 57. Certhia (Verticalis) viridi-olivacea, subtus cinerascens, vertice viridi, remigibus caudaque fuscis.

12. *Der indigblaue Baumläufer, aus Indien.*

Latham, Syn. Suppl. p. 130. Indigo Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 606. n. 52. *der indigblaue Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 298. n. 58. Certhia (Parietum) cyanea subtus rufa, superciliis gulaque albis, sub oculis ad nucham linea nigra.

Sonnerat, voy. Ind. II. p. 208. Roffignol de murailles des Indes.

13. *Der Baumläufer mit blauem Steiß, vom Vorgebirg der guten Hoffnung.*

Latham, Syn. Supplem. p. 131. Blue-rumped Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 606. *der Baumläufer mit blauem Steiß.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 298. n. 59. Certhia (Viridis) viridis, uropygio caeruleo, gula rubra, remigibus caudaque rufo-aureis.

Sonnerat, voy. Ind. II. p. 208. Tab. 116. fig. 2. Grimpereau verd du Cap de b. E.

14. *Der gelbbäuchige Baumläufer, aus Indien.*

Mus. Carl. Fasc. II. Tab. 35. Certhia lepida.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 144. *der nette Baumläufer.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 610. n. 69. *der nette Baumläufer.*

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 606. n. 54. *der gelb-
bäuchige Baumläufer.*

Latham, Syn. Supplem. p. 131. Yellow-bellied
Creeper.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 298. n. 60. Cer-
thia (Lepida) violaceo-nitens subtus flava, sin-
cipite viridi, lateribus colli striga longitudina-
li virescente alteraque violacea, gula rubro-
fusca.

Sonnerat, voy. Ind. II. p. 209. Tab. 116. fig. 1.
Grimpereau de Malacca.

β. C. violaceo-purpurea, subtus flava, genis fusco-
virescentibus, gula iuguloque rubentibus.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 299. n. 60. β.

15. *Der gelbrückige Baumläufer aus China.*

Latham, Syn. Supplem. p. 132. n. 56. Orange-
backed Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 607. n. 56. *der gelb-
rückige Baumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 299. n. 61. Cer-
thia (Cantillans) caerulefcente grisea, dorso
supremo macula corporeque subtus flavo.

Sonnerat, voy. Ind. II. p. 210. Tab. 117. fig. 2.
Grimpereau siffleur de la Chine.

16. *Der gebüschelte Baumläufer aus Bengalen.*

Latham, Syn. Supplem. p. 132. n. 57. Tufted
Creeper.

Latham, Vögel, I. 2. p. 607. n. 57. *der ge-
büschelte Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 299. n. 62. Cer-
thia (Cirrhata) olivacea, abdomine caudaque
nigris, lateribus pectoris cirrho flavo.

17. *Der rothschnäblige Baumläufer aus Indien.*
Latham, Syn. Suppl. p. 133. n. 58. Red-billed Creeper.
Latham, Vögel, I. 2. p. 607. n. 58. *der rothschnäblige Baumläufer.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 299. n. 63. Certhia (Erythrorynchos) olivacea, corpore subtus albo, alis caudaque nigricantibus, rostro rubro.
18. *Der gelbflügelige Baumläufer aus Bengalen.*
Latham, Syn. Suppl. p. 133. n. 59. Yellow-winged Creeper.
Latham, Vögel, I. 2. p. 608. n. 59. *der gelbflügelige Baumläufer.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 299. n. 64. Certhia (Chrysoptera) nigricante aureoque varia, tectricibus alarum flavis, remigibus caudaque nigris.
19. *Der langschnäblige Baumläufer in Bengalen.*
Latham, Syn. Suppl. p. 133. n. 60. Long-billed Creeper.
Latham, Vögel, I. 2. p. 608. n. 60. *der langschnäblige Baumläufer.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 299. n. 65. Certhia (Longirostris) olivaceo-nigricans, vertice nuchaque pallide viridibus, iugulo pectoreque albis, abdomine flavescente.
20. *Der streifschwänzige chinesische Baumläufer.*
Latham, Syn. Suppl. p. 133. n. 61. Barred-tail Creeper.
Latham, Vögel, I. 2. p. 608. n. 61. *der streifschwänzige Baumläufer.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 300. n. 66. Certhia (Grisea) cinereo-grisea, subtus rufescens, cauda

cauda cuneiformi, rectricibus duabus intermediis fuscis, lateralibus griseis, omnibus ad apicem fascia nigra.

Sonnerat, voy. Ind. II. p. 210. Tab. 117. fig. 3.
Grimpereau gris de la Chine.

21. *Der eberne Baumläufer in Westindien.*

Mus. Carlf. Fasc. IV. Tab. 78. Certhia aenea.

Latham, Vögel, I. 2. p. 612. n. 74. *der eberne Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 300. n. 68. Certhia (Aenea) ex viridi orichalcea, alis fuliginosis, cauda atro-nitente, rostro pedibusque nigris.

22. *Der blaukehlige Baumläufer auf Martinique.*

Mus. Carlf. Fasc. IV. Tab. 79. Certhia Gularis.

Latham, Vögel, I. 2. p. 612. n. 75. *der blaukehlige Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 300. n. 69. Certhia (Gularis) corpore cinereo-olivacea, subtus lutea, gula, iugulo pectorisque parte superiore ferruceo-caeruleis.

23. *Der Bastardbaumläufer in Amerika.*

Mus. Carlf. Fasc. IV. Tab. 80. Certhia trochilea.

Latham, Vögel, I. 2. p. 613. n. 77. *der Bastardbaumläufer.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 300. n. 70. Certhia (Trochilea) supra fusco-olivacea, subtus ex flavescenti sordide alba, cauda nigra, alis fuliginosis.

24. *Der grünflügelige surinamische Baumläufer.*

Mus. Carlf. Fasc. IV. Tab. 81. Certhia prasino-
ptera.

Latham, Vögel, I. 2. p. 613. n. 76. *der grünflügelige Baumläufer.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 300. n. 71. *Certhia* (Prasinoptera) nigra, collo anterius purpureo, alis et cauda chryso-prasinis.

66. GESCHLECHT. TROCHILUS. *Der Kolibri. (Honigsauger, Blumenspecht, Ananasvogel.)*

Müller, Naturfyft. II. p. 262. Gen. LXVI.

Leske, Naturgesch. p. 252. Gen. XXXV.

Borowsky, Thierreich, II. p. 156. Gen. XXIV.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 170. Gen. XVI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 375. Gen. XXIII.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 170. Gen. XXIII.

Funke, Naturgesch. I. p. 336.

Ebert, Naturl. II. p. 64.

Halle, Vögel, p. 496. Gen. IV.

Pennant, arct. Zool. II. p. 269.

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 189.

Onomat. hist. nat. II. p. 54. III. p. 133. VII. p. 581.

Klein, av. p. 104. Gen. XIV. Mellifuga.

Briffon, ornith. II. p. 20. Gen. XLIV. Polytmus. p. 29. Gen. XLV. Mellifuga.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 170 ff.

Batsch, Thiere, I. p. 310. Gen. LXII.

Latham, allgem. Ueberf. der Vögel, I. 2. p. 614. Gen. XXIX.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 301. Gen. XXX.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 206.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 252. Gen. XXVII.

* *Mit krummen Schnäbeln.*

1. PARADISEUS. *Der Paradieskolibri.*

Müller, Naturf. II. p. 263. n. 1. *Paradies-Colibri.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 158. n. 2. *der Paradies-Kolibri.*

Klein, av. p. 107. n. 5. *Falcinellus cristatus.*

Klein, Vorb. p. 198. n. 5. *gehaubte Baumklette.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 110. n. 8. *gehaubte Baumklette.*

Briffon, ornitholog. II. p. 28. n. 16. *Colibri rouge hupé à longue queue du Mexique.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 257. *der gehaubte Kolibri; mit 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 615. n. 1. *der Paradies-Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 301. n. 1. *Trochilus (Paradiseus) curvirostris ruber, alis caeruleis, capite cristato, rectricibus intermediis longissimis.*

Batsch, Thiere, I. p. 315. *der Paradieskolibri.*

Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 119. n. 1. *Trochilus (Paradiseus) curvirostris ruber, alis caeruleis, capite cristato, rectricibus duabus longissimis.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 253. n. 1. *der Paradieskolibri.*

23. GALERITUS. *Der goldfleckige Haubenkolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 283. *der gehaubte Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 628. n. 30. *der goldfleckige Haubenkolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 304. n. 10. *Trochilus (Galeritus) curvir. viridi-aureus, remigibus rectricibusque fuscis, crista purpurea.*

24. EXILIS. *Der kleine Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 284. *der schwarze Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 627. n. 29. *der kleine Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 310. n. 32. Trochilus (Exilis) curvir. viridi-fuscus rubro nitens, capite crista viridi-nitente apice aurato, remigibus caudaque nigris.

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 100. *der schwarze Kolibri.*

2. PELLA. *Der Topaskolibri.*

Müller, Naturfyst. II. p. 264. n. 2. *Surinamischer.*
Onomat. hist. nat. II. p. 57. *das langgeschwänzte rothe Colibritchen.*

Klein. av. p. 108. n. 15. Falcinellus gutture viridi.

Klein, Vorbereit. p. 200. n. 15. *grünkehliges Klette.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. III. n. 18 *grünkehliges Klette.*

Briffon, ornithol. II. p. 27. n. 15. Colibri rouge à longue queue de Surinam.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 242. *der Topaskolibri;*
mit 1 Figur.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 63. *das langgeschwänzte rothe Colibritchen.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 615. n. 2. *der Topaskolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 302. n. 2. Trochilus (Pella) curvirostris ruber, rectricibus intermediis longissimis, corpore rubro, capite fusco, gula aurata uropygioque viridi.

Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 178. *der große Kolibri.*

Linne,

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 119. n. 3. Trochilus (Pella) curvirostris, rectricibus intermediis longissimis, corpore rubro, gula aurata uropygioque viridi.

3. SUPERCILIOSUS. *Der cayennische Kolibri.*

Müller, Naturfyst. II. p. 364. n. 3. *Cajennischer.*

Briffon, ornithol. II. p. 26. n. 13. Colibri à longue queue de Cayenne.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 247. *der weißfüdigte Kolibri*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 616. n. 3. *der cayennische Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 302. n. 3. Trochilus (Superciliosus) curvirostris, fuscus, nitens, rectricibus intermediis longis, abdomine subincarnato superciliis albis.

25. CYANURUS. *Der blaueschwänzige Kolibri.*

Halle, Vögel, p. 502. n. 561. *der grüne Kolibri-specht mit zwey langen Federn im Schwänze.* Fig. 39.

Klein, av. p. 107. n. 4. Falcinellus novae Hispaniae, cauda bipenni longa.

Klein, Vorbereit. p. 198. n. 4. *blaulichte Baumklette mit zwey langen Schwanzfedern aus Neuspanien.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 110. n. 7. *blauliche Baumklette.*

Briffon, ornithol. II. p. 27. n. 14. Colibri à longue queue du Mexique.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 251. *der Blauschwanz*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 617. *der blaueschwänzige Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 303. n. 5. Trochilus (Cyanurus) curvir. viridis, subtus cinereo-griseus, capite anteriore, collo inferiore rectricibusque duabus intermediis longissimis caeruleis.

Moehring, av. gen. p. 37. n. 18. Curruca.

4. POLYTMUS. *Der schwarzköpfige Kolibri.*

Müller, Naturfyst. II. p. 205. n. 4. Langschwanz.

Klein, av. p. 108. n. 17. Falcinellus cauda 7. unciarum.

Klein, Vorbereit. p. 201. n. 17. Schwarzplattige grüne Klette.

Klein, verb. Vögelhist. p. III. n. 20. Schwarzplattige grüne Klette.

Halle, Vögel, p. 506. n. 573. der grün Kolibri-specht mit schwarzer Platte, und langer Schwanzschleppe.

Onomat histor. nat. II. p. 54. das langgeschwänzte Colibritchen, mit schwarzer Platte.

Briffon, ornithol. II. p. 40. n. 19. Oiseau-mouche à tête noire et queue fourchue de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 234. der Fliegenvogel mit langem schwarzen Schwanze; m. 1 F.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 67. das langgeschwänzte Colibritchen mit schwarzer Platte.

Latham, Vögel, I. 2. p. 616. n. 4. der schwarzköpfige Kolibri.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 302. n. 4. Trochilus (Polytmus) curvir. virefcens, rectricibus lateralibus longissimis, pileo rectricibusque fuscis.

Bankroft, Naturgeschichte von Guiana, p. 101. der langschwänzige schwarzkuppige Colibri.

Linné,

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 120. n. 4. Trochilus (Polytmus) curvirostris, rectricibus lateralibus longissimis, corpore virescente, pileo rectricibusque fuscis.

Gentl. Magazin, XX. Tab. p. 121.

β. Tr. virescens, subtus albus, vertice fusco, rectricibus aequalibus, apice late albis. (Femina?) *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 303. n. 4. β.

3. FORFICATUS. *Der große gabelschwänzige Kolibri.*

Müller, Natursystem, II. p. 265. n. 5. Gabelschwanz.

Borowsky, Thierreich, II. p. 157. n. 1. der gabelschwänzige Kolibri. Tab. 24.

Klein, av. p. 108. n. 16. Falcinellus vertice caudaque cyaneis.

Klein, Vorbereit. p. 200. n. 16. blaukappige grüne Klette.

Klein, verbess. Vögelhist. p. III. n. 19. blaukappige grüne Klette.

Onomat. histor. nat. II. p. 63. das grüne Colibritchen mit langem Schwanz.

Briffon, ornithol. II. p. 39. n. 18. Oiseau-mouche à queue fourchue de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 232. der langschwänzige Fliegenvogel, oder das grün und blaue Gold; mit 1 Fig.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 65. das grüne Colibritchen mit langem Shhwanz.

Latham, Vögel, I. 2. p. 617. n. 6. der große gabelschwänzige Kolibri.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 303. n. 7. Trochilus (Forficatus) curvirostris viridis, rectricibus

cibus lateralibus longissimis, pileo rectricibusque caeruleis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 120. n. 5. Trochilus (Forficatus) curvirostris, rectricibus lateralibus longissimis, corpore viridi, pileo rectricibusque caeruleis.

26. **FURCATUS.** *Der kleine gabelschwänzige Kolibri.*
Briffon, ornithol. II. p. 40. n. 20. Oiseau-mouche violet à queue fourchue de la Jamaïque.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 230. *der violette Fliegenvogel mit dem Gabelschwänze.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 618. n. 7. *der kleine gabelschwänzige Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 304. n. 8. Trochilus (Furcatus) curvir. caeruleo-violaceus, vertice, colla uropygioque viridi-aureis, remigibus rectricibusque nigris, cauda bifurca.

27. **MACROURUS.** *Der cayennische gabelschwänzige Kolibri.*

Briffon, ornitholog. II. p. 39. n. 17. Oiseau-mouche à queue fourchue de Cayenne.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 227. *der Fliegenvogel mit dem langen Schwänze, von der Farbe eines angelaufenen Stahls.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 618. n. 8. *der cayennische gabelschwänzige Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 304. n. 9. Trochilus (Forcipatus) curvir. viridi-aureus, capite colloque violaceis, abdomine macula alba, cauda chalybea bifurca.

28. **PURPURATUS.** *Der purpurköpfige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 286. *der purpurköpfige Kolibri.*

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 627. n. 27. *der purpurköpfige Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 309. n. 29. Trochilus (Torquatus) curvirostris viridis, vertice purpureo, collo inferiore annulo caeruleo, cauda bifurca purpurea.

29. AURATUS. *Der granatkehlige Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 619. n. 9. *der granatkehlige Kolibri.* Tab. 36. fig. 1.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 305. n. II. Trochilus (Granatinus) curvir. viridis, subtus nigricans, gula iuguloque granatinis.

β. *Büffon*, Vögel, XVIII. p. 246. *der Granat.*

Latham, Syn. II. p. 753. n. 9. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 619. n. 9. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 305. n. II. β.

6. LEUCURUS. *Der weißschwänzige Kolibri.*

Müller, Naturfyft. II. p. 266. n. 6. *Weißschwanz.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 168. *weißschwänzige Baumklette.*

Briffon, ornithol. II. p. 22. n. 5. *Colibri de Surinam.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 269. *die rothe Halsbinde.*

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 46. *das Colibritchen mit weißem Schwanze.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 622. n. 17. *der weißschwänzige Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 307. n. 19. Trochilus (Leucurus) curvir. viridi-aureus, rectricibus aequalibus albis, collari rubro.

30. GRAMINEUS. *Der schwarzbrüstige Kolibri.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 267. *der grüne Halskragen.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 622. n. 16. *der schwarzbrüstige Kolibri.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 306. n. 18. Trochilus (Pectoralis) curvir. viridis nitens, collo inferiore viridi, pectore nigro, abdomine albo, cauda chalybeo purpurascente.
31. VIOLACEUS. *Der violette Kolibri.*
Briffon, ornithol. II. p. 25. n. II. Colibri violet de Cayenne.
Büffon, Vögel, XVIII. p. 265. *der violette Kolibri.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 622. n. 15. *der violette Kolibri.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 306. n. 17. Trochilus (Violaceus) curvir. atro-violaceus, gutture pectoreque violaceo-nitentibus, alis caudaque viridi-aureis, rectricibus atro contaminatis.
32. MACULATUS. *Der grünkehlige Kolibri.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 261. *der Kolibri mit dem grünen Halskragen; mit 1 Fig.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 621. n. 14. *der grünkehlige Kolibri.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 306. n. 16. Trochilus (Gularis) curvir. viridi-aureus, collo subtus smaragdino, lateribus rufo, abdomine albo, pectoris macula nigra.
33. PUNCTULATUS. *Der gefleckte Kolibri.*
Briffon, ornitholog. II. p. 21. n. 2. Colibri piqueté.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 249. *der Zitzil, oder getupfte Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 621. n. 13. *der gefleckte Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 306. n. 15. Trochilus (Punctulatus) curvir. viridi-aureus, rectricibus alarum colloque inferiore albo-maculatis, rectricibus fusco-virescentibus, apice albis.

34. ALBUS. *Der violetschwänzige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 259. *der Kolibri mit dem violetten Schwanze; m. 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 620. n. 11. *der violetschwänzige Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 305. n. 13. Trochilus (Nitidus) curvir. viridi-auratus, subtus albus, gula media fusco-viridi, cauda violacea, rectricibus tribus exterioribus apice albis.

7. JUGULARIS. *Der rothbrüstige Kolibri.*

Müller, Natursystem, II. p. 266. n. 7. *Rothhals.*
Tab. 8. fig. 10.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 263. *der Kolibri mit der karminfarbenen Kehle; m. 1 F.*

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 56. fig. 1. *der Kolibri mit rother Brust;*

Latham, Vögel, I. 2. p. 620. n. 10. *der rothbrüstige Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 305. n. 12. Trochilus (Jugularis) curvir. caeruleescens, rectricibus aequalibus, genis colloque subtus sanguineis.

35. AURANTIUS. *Der orangenköpfige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 287. *der pomeranzenfarbige Honigsauger.*

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 627. n. 28. *der orangenköpfige Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 310. n. 30. Trochilus (Aurantius) curvir. fuscus, capite aurantio, gutture pectoreque flavis, alis purpureis, cauda ferruginea.

36. FLAVIFRONS. *Der gelbstirnige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 288. *der gelbstirnige Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 627. n. 26. *der gelbstirnige Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 309. n. 28. Trochilus (Flavifrons) curvir. viridis, sincipite flavo, remigibus rectricibusque nigris.

8. THAUMANTIAS. *Der Wunderkolibri.*

Müller, Naturfyst. II. p. 266. n. 8. *Foli.*

Halle, Vögel, p. 508. n. 580. *der goldgrüne Kolibrispecht, Spitze des Schwanzes weiß.*

Klein, av. p. 106. n. 3. Mellifuga Ronkje dicta.

Klein, Vorbereit. p. 196. n. 3. *der Honigsauger Ronkje.*

Klein, verbeß. Vögelhist. p. 108. n. 3. *Ronkje.*

Briffon, ornitholog. II. p. 20. n. 1. Colibri.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 280. *der kleine Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 626. n. 25. *der Wunder-Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 309. n. 27. Trochilus (Thaumantias) curvir. viridis nitens, rectricibus aequalibus albo fimbriatis, extima exterius alba.

Linne, Syst. Nat. Edit. VI. p. 29. n. 2. Trochilus viridescens.

Fonston, av. p. 193. Guainumbi sexta species.

Mochring, av. gen. p. 39. Troglodytes.

9. **DOMINICUS.** *Der Kolibri von St. Domingo.*
Müller, Naturfyst. II. p. 267. n. 9. *Domingischer.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 276. *der perlfarbene*
und grüne Kolibri; mit 1 Fig.
Briffon, ornitholog. II. p. 22. n. 4. *Colibri de S.*
Domingue.
Latham, Vögel, I. 2. p. 626. n. 24. *der Kolibri*
von St. Domingo.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 309. n. 26. *Trochi-*
lus (Dominicus) curvir. viridis nitens, subtus
subcinereus, rectricibus medio ferrugineis, api-
ce albis.
37. **VENUSTISSIMUS.** *Der blaue Kolibri.*
Halle, Vögel, p. 502. n. 599. *der blaue Kolibri.*
specht.
Klein, av. p. 107. n. 2. *avicula cyaneo colore venu-*
stissima.
Klein, Vorbereit. p. 198. n. 2. *blaue Baumklette.*
Klein, verbeff. Vögelh. p. 110. n. 4. *blaue Baum-*
klette.
Briffon, ornith. II. p. 24. n. 9. *Colibri bleu du*
Mexique.
Büffon, Vögel, XVIII. p. 274. *der blaue Koli-*
bri; mit 1 Fig.
Latham, Vögel, I. 2. p. 626. n. 33. *der blaue*
Kolibri.
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 309. n. 25. *Tro-*
chilus (Cyaneus) curvir. coccineo - sericeus,
dorso caeruleo, alis nigris.
Moehring, av. gen. p. 79. n. 102. *Troglodytae*
adfinis.
38. **MARGARITACEUS.** *Der grauhälfige Kolibri.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 273. *das weiße Brust-*
stück.

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 625. n. 22. *der grauhälfige Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 308 n. 24. Trochilus (Margaritaceus) curvir. viridis nitens, subtus margaritaceo-canus, cauda basi chalybea, medio purpureo-fusca, ad apicem fascia fusca apice alba.

39. HIRSUTUS. *Der rothbäuchige Kolibri.*

Halle, Vögel, p. 508. n. 597. *der schwarze Kolibrispecht.*

Briffon, ornitholog. II. p. 21. n. 3. Colibri du Brésil.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 278. *der Kolibri mit gelbröthlichem Bauch.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 625. n. 21. *der rothbäuchige Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 308. n. 23. Trochilus (Brasilienfis) curvir. viridi aureus, subtus albo-rufescens, cauda nigricante-viridi apice albo, tibiis pennatis.

Jonston, av. p. 193. Guainumbi quarta species.

β. Latham, Syn. II. p. 761. n. 21. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 625. n. 21. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 308. n. 23. β. Tr. viridi-aureus, subtus rufus, sub oculis vitta flavescens-alba, postice dilatata, rectricibus nigricantibus apice albis, lateralibus dimidiato-rufis.

40. MULTICOLOR. *Der vielfarbige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 289. *der vielfarbige Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 624. n. 20. *der vielfarbige Kolibri.*

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 308. n. 22. Trochilus (Multicolor) curvir. fuscus, abdomine rubro, vertice, gula, pectore dorsoque medio viridibus, vitta per oculos ad nucham caerulea, postice nigro marginata.

41. CINEREUS. *Der grauschnäblige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 290. *der aschgraue Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 624. n. 19. *der grauschnäblige Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 308. n. 21. Trochilus (Cinereus) curvir. viridis, nitens, subtus cinereus, rectricibus lateralibus nigris, tribus extimis chalybeis, apice albo.

10. MANGO. *Der mexikanische Kolibri.*

Müller, Natursystem, II. p. 267. n. 10. *der Riese.*
Tab. 8. fig. 13.

Halle, Vögel, p. 507. n. 576. *der grüne Kolibrispecht mit schwarzem Bauche und gelben Schultern.*

Briffon, ornitholog. II. p. 24. n. 8. *Colibri de la Jamaïque.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 271. *das schwarze Bruststück; mit 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 623. n. 18. *der mexikanische Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 307. n. 20. Trochilus (Mango) curvir. viridis nitens, subtus ater, rectricibus subaequalibus ferrugineis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 121. n. 16. Trochilus (Mango) rectricibus subaequalibus ferrugineis, corpore testaceo, abdomine atro.

Fonston, av. p. 193. *Guainumbi quinta species.*

β. *Latham*, Syn. II. p. 759. n. 18. A.
Latham, Vögel, I. 2. p. 623. n. 18. Var. A.
Latham, Syft. ornithol. I. p. 307. n. 20. β. *Tr.*
curvirostris, viridis nitens, collo inferiore
 purpureo-nitente, medio atro, abdomine ni-
 gricante, criffo lateribus atro, reſtricibus late-
 ralibus purpureis, apice nigro marginatis.

γ. *Tr. curvirostris* fusco-viridis, collo inferiore vi-
 ridi, pectore abdomineque violaceis, criffo al-
 bo, reſtricibus lateralibus purpureis, apice ni-
 gro marginatis. *

Latham, Syn. Suppl. p. 135. n. 18. B.

Latham, Vögel, I. 2. p. 624. n. 18. Var. B.

Latham, Syft. ornithol. I. p. 307. n. 20. γ.

II. HOLOSERICUS. *Der ſchwarzbäuchige Ko-*
libri.

Müller, Naturfyft. II. p. 267. n. 11. *Sammet-*
vogel. Tab. 8. fig. 11.

Borowsky, Thierreich, II. p. 158. n. 3. *der Sam-*
metvogel.

Halle, Vögel, p. 502. n. 560. *der Regenbogen-*
specht.

Onomat. histor. nat. II. p. 62. *das grüne Colibrit-*
chen mit ſchwarzem Bauch.

Klein, av. p. 107. n. 3. avis Auricoma, nec vel
 Apellea manu imitabilis.

Klein, Vorber. p. 198. n. 3. *unbeſchreibliche Baum-*
klette.

Klein, verbeſſ. Vögelhiſt. p. 110. n. 5. *unbeſchreib-*
liche Baumklette.

Klein, av. p. 108. n. 18. *Falcinellus* ventre ni-
 gricante, cauda brevi aequabili.

Klein, Vorbereit. p. 201. n. 18. *Klette mit ſchwar-*
zem Unterleibe; u. ſ. w.

Klein,

Klein, verbess. Vögelhist. p. III. n. 21. *Schwarzbrüßlein.*

Briffon, ornitholog. II. p. 23. n. 7. *Colibri du Mexique.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 254. *der grün und schwarze Kolibri.*

Seligmann, Vögel, II. Tab. 71. *das grüne Colibritchen mit schwarzem Bauch.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 620. n. 12. *der schwarzbäuchige Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 305. n. 14. *Trochilus (Holofericeus) curvir. viridis, rectricibus aequalibus supra nigris, fascia pectorali caerulea, abdomine nigro.*

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 102. *der schwarzbäuchichte amerikan. Colibri.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 120. n. 9. *Trochilus (Holofericeus) curvirostris, rectricibus aequalibus supra nigris, corpore supra viridi, pectore caeruleo, abdomine nigro.*

Moehring, av. gen. p. 79. n. 102. *Troglodytae adfinis.*

42. **GULARIS.** *Der blaukehligte Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 291. *der blaukehligte Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 628. n. 31. *der blaukehligte Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 310. n. 31. *Trochilus (Gularis) curvir. flavescens, gula uropygionque caeruleis, abdomine albo, alis caudaque nigris.*

43. **FULVUS.** *Der brandgelbe Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 292. *der brandgelbe Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 628. *der brandgelbe Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 287. n. 20. *Certhia (Fulva) fulva*, remigibus rectricibusque atris, subtus fuscescentibus.

44. VARIUS. *Der bunte Kolibri.*⁽¹⁰⁾

Büffon, Vögel, XVIII. p. 293. *der bunte Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 628. n. 33. *der bunte Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 287. n. 18. ♂. *Certhia viridi-aurea*, subtus fusco-albicans, fascia pectorali duplici ex viridi cyanea et sanguinea.

** *Mit geraden Schnäbeln.*

66. CAPENSIS. *Der capische Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 294. *der Kolibri vom Vorgeb. der guten Hoffnung.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 629. n. 34. *der capische Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 303. n. 6. *Trochilus (Capensis) curvirostris (?) viridis*, rectricibus intermediis longis, tectricibus alarum caeruleis.

12. COLUBRIS. *Der gemeine Kolibri.*

Müller, Naturfyst. II. p. 268. n. 12. *Goldkehle.*

Leske, Naturgesch. p. 253. *der gemeine Kolibri.*
Tab. 6. fig. 4.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 376. n. 1. *der gemeine Kolibri.*

Ebert, Naturl. II. p. 65. Tab. 25.

Halle, Vögel, p. 500. n. 554. *der grüne Kolibri mit scharlachrother Kehle.* Fig. 38.

Pennant,

(10) Nach *Latham* eine Varietät von *Certhia Africa*, p. 476. n. 11.

Pennant, arct. Zool. II. p. 269. n. 92. die Roth-
kehle.

Onomat. hist. nat. II. p. 59. das rothbrüstige Co-
libritchen.

Klein, av. p. 106, n. 5. Mellifuga pectore rubro.

Klein, Vorbereit. p. 196. n. 5. rothbrüstiger Ho-
nigsauger.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 108. n. 5. Roth-
brüstlein.

Klein, av. p. 105. n. 1. Mellifuga, Colibris.

Klein, Vorbereit. p. 195. n. 1. Kolibritchen aus
Carolina.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 107. n. 1. carolinisches
Colibritchen.

Briffon, ornithol. II. p. 36. n. 13. Oiseau-mou-
che à gorge rouge de la Caroline.

Büffon, Vögel, XVIII p. 185. der Rubin; n. 1 F.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 75. das rothbrüsti-
ge Kolibritchen.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 30. das Colibritchen,
Summvöglein.

Gesner, Vögelb. p. 477. Spatz, so *Muscatus* ge-
nannt wird.

Latham, Vögel, I. 2. p. 632. n. 40. der gemeine
Colibri.

Latham, Syst. ornith. I. p. 312. n. 38. Trochilus
(Colubris) rectirostris, viridi-aureus, rectri-
cibus nigris, lateralibus tribus ferrugineis, api-
ce albis, gula flammea. (Mas.)

Linné, auserles. Abh. II. p. 279. n. 4. Colibri.

Berlin. Samml. IV. p. 274. der Kolibri.

Valentin. mus. museor. II. p. 154. Colibri.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 120. n. 6. Tro-
chilus (Colubris) rectricibus nigris, lateralibus
tribus apice albis, gula rubra.

Charlevoix, hist. de la nouv. France, III. p. 158.
Le Clercq, nouv. relat. de la Gaspésie, p. 486.
 Nirido.

Philos. Transact. XVII. p. 760. 815.

Gentl. Magaz. XX. Tab. p. 175.

Hist. de St. Domingue. Par. 1730. I. p. 31.

β. **TOMINEO.** *Müller*, *Naturfyft.* II. p. 268. ad
 n. 12.

Latham, *Syst. ornith.* I. p. 312. n. 38. β. Tr. rectricibus subaequalibus, basi ferrugineis, apice albis, corpore supra fusco, subtus albido. (Femina.)

Linneé, *Syst. Nat. Edit.* X. I. p. 121. n. 11. Trochilus (Tomineo) rectricibus subaequalibus basi ferrugineis, apice albis, corpore supra fusco, subtus albo,

45. **FIMBRIATUS.** *Der bunthälfige Kolibri.*

Buffon, *Vögel*, XVIII. p. 219. n. 16. *der Fliegenvogel mit der gefleckten Kehle.*

Briffon, *ornitholog.* II. p. 33. n. 7. Oiseau-mouche à gorge tachetée de Cayenne.

Latham, *Vögel*, I. 2. p. 634. n. 41. *der bunthälfige Kolibri.*

Latham, *Syst. ornith.* I. p. 312. n. 39. Trochilus (Fimbriatus) rectir. viridi-aureus, pennis gulae iugulique albo fimbriatis, ventre cinereo, rectricibus nigro-chalybeis, lateralibus apice griseis.

β. *Latham*, *Vögel*, I. 2. p. 634. n. 41. Var. A.

Latham, *Syst. ornithol.* I. p. 313. n. 41. β. Tr. rectirostris viridi-aureus, subtus albus, pennis pectoris griseo-marginatis, rectricibus totis virescente nigris.

46. RUBINEUS. *Der Rubin-Kolibri.*

Briffon, ornithol. II. p. 37. n. 14. Oiseau-mouche à gorge rouge du Brésil.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 220. *der Smaragd-rubin.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 631. n. 39. *der Rubin-Kolibri.*

Latham, Syst. ornith. I. p. 312. n. 37. Trochilus (Rubineus) rectir. viridi-aureus gutture rubino nitente, rectricibus rufis, exterius apiceque fusco-viridi-aureo fimbriatis.

47. AURITUS. *Der Ohrenkolibri.*

Briffon, ornithol. II. p. 38. n. 15. grand Oiseau-mouche de Cayenne.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 221. *der Fliegenvogel mit Ohren*; m. 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 631. n. 38. *der Ohrenkolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 311. n. 36. Trochilus (Auritus) rectir. viridi-auratus, subtus albus, taenia infra oculos nigra, macula aurium fasciculari violacea, rectricibus quatuor intermediis nigro-caeruleis, lateralibus albis.

β. *Latham*, Syn. II. p. 768. n. 33. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 631. n. 38. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 311. n. 36. β. Tr. rectirostris viridis, subtus albus, infra oculos fascia purpurea, postice dilatata, alteraque ad latera colli viridi-caerulea.

13. OURISSIA. *Der blaubrüstige Kolibri.*

Müller, Naturfyst. II. p. 268. n. 13. *Blaubauch.*

Onomat. histor. nat. II. p. 62. *das grünblaue Colibritchen.*

Klein, av. p. 106. n. 6. Mellifuga alis fuscis.

Klein, Vorbereit. p. 196. n. 6. Honigsauger mit braunen Flügeln.

Klein, verb. Vögelhist. p. 109. n. 6. Braunflügel.

Briffon, ornithol. II. p. 34. n. 10. Oiseau-mouche à poitrine bleue de Surinam.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 213. der Amethystsuaragd; m. 1 F.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 69. das grüne und blaue Colibritchen.

Latham, Vögel, I. 2. p. 630. n. 37. der blaubrüstige Kolibri.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 311. n. 35. Trochilus (Ourissia) rectir. viridi auratus, rectricibus subaequalibus fusco-aureis, remigibus nigris, abdomine caeruleo.

β. *Latham*, Syn. II. p. 767. n. 32. A.

Latham, Vögel, I. 2. p. 630. n. 37. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 311. n. 35. β.

Tr. rectirostris viridis, subtus caeruleus, gula aurantia, remigibus rectricibusque fuscis.

14. MOSCHITUS. Der Juwelenkolibri.

Müller, Natursystem, II. p. 269. n. 14. Rothschwanz.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 171. n. 2.

Trochilus (Mosquitus) viridescens, vertice purpureo-aurato, gutture aureo-rutilo; der Juwelen-Colibrit.

Halle, Vögel, p. 500. n. 553. der schwarze kleinste Kolibri.

Halle, Vögel, p. 499. n. 551. der Regenbogenvogel.

[*Klein*, av. p. 105. n. 2. Mellifuga, Thaumantias americana.

Klein,

Klein, Vorbereit. p. 195. n. 2. *Kurassauer aus Amerika.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 108. n. 2. *Curassauer.*] Mit mehreren andern verwechselt.

Briffon, ornithol. II. p. 30. n. 3. Oiseau-mouche, à gorge topaze du Brésil.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 195. *der Topasrubin.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 638. n. 51. *der rubinköpfige Kolibri.* Tab. 25. fig. 2.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 316. n. 49. Trochilus (Moschitus) rectir. viridi-aureus, rectricibus aequalibus ferrugineis, extimis apice fuscis, remigibus nigris.

Bankroft, Naturgeschichte von Guiana, p. 102. *der Colibri mit eisenfarbigem Schwanz.*

Fermin, Besch. v. Surinam, II. p. 179. *die dritte Art Kolibri.*

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 120. n. 8. Trochilus (Moschitus) rectricibus aequalibus ferrugineis, extimis apice fuscis, corpore nigro-aureo, remigibus nigris.

Fonston, av. p. 193. Guainumbi octava species.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 253. n. 2. *der Juwelenkolibri.*

15. MELLISUGUS. *Der goldgrüne cayennische Kolibri.*

Müller, Naturyst. II. p. 269. n. 15. *Honigsauger.* Tab. 28. fig. 7.

Halle, Vögel, p. 499. n. 552. *der ganz grüne Kolibri mit braunen Flügeln.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 68. n. 87. *der Honigsauger.*

Briffon, ornitholog. II. p. 32. n. 6. Oiseau-mouche de Cayenne.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 216. *das vergoldete Grün*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 634. n. 42. *der goldgrüne cayennische Kolibri*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 313. n. 40. *Trochilus* (Mellifugus) rectir. viridi-aureus, rectricibus aequalibus chalybeo-caeruleis, remigibus atro-caerulescentibus, tibiis pennatis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I p. 121. n. 10. *Trochilus* (Mellifugus) rectricibus aequalibus caeruleis, corpore viridi-aureo, remigibus atro-caerulescentibus.

Jonston, av. p. 193. *Guainumbi nona species*.

16. PEGASUS. *Der rauchfüßige Kolibri*.

Müller, Naturfyst. II. p. 269. n. 16. *der Federfuß*.

Briffon, ornithol. II. p. 34. n. 9. *Oiseau-mouche à ventre gris de Cayenne*.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 209. (*Als das Weibchen von Trochilus Leucogaster*.)

Latham, Vögel, I. 2. p. 638. n. 49. *der rauchfüßige Kolibri*.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 315. n. 47. *Trochilus* (Pegasus) rectir. rectricibus basi virescentibus, corpore virescente aureo, subtus subgriseo, tibiis pennatis.

49. LEUCOGASTER. *Der goldkehlige Kolibri*.

Halle, Vögel, p. 498. n. 548. *der grüne Kolibri*.

Briffon, ornithol. II. p. 33. n. 8. *Oiseau-mouche à ventre blanc de Cayenne*.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 208. *die vergoldete Halskrause*.

Latham, Vögel, I. 2. p. 637. n. 48. *der goldkehlige Kolibri*.

Latham,

Latham, Syst. ornithol. I. p. 315. n. 46. Trochilus (Leucogaster) rectir. viridi auratus, subtus albus, gula inaurata.

Jonston, av. p. 191. Guainumbi prima species. Mus. Wormian. p. 298. avicula minima; mit *Marcgr.* Fig.

Sloane, Jam. p. 308. n. 39. larger Humming-bird? Tab. 264. fig. 2. schl.

49. STRIATUS. *Der gestreifte Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 295. der gestreifte Kolibri.

Latham, Vögel, I. 2. p. 636. n. 47. der gestreifte Kolibri.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 314. n. 45. Trochilus (Hypophaeus) rectir. fusco-aureus, subtus albidus, vertice fusco, medio gulae striga longitudinali viridi-aurea.

β. Tr. rectir. fusco-aureus, pileo fusco, medio gulae striga longitudinali fusca, rectricibus lateralibus apice albo marginatis. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 214. n. 45. β.

γ. Tr. rectir. fusco-aureus, pileo fusco-virescente, superciliis rufis, striga gulari obscura, uropygio crissoque rufescentibus. *

Latham, Syst. ornithol. I. p. 314. n. 45. β.

50. OBSCURUS. *Der dunkelköpfige Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 296. der dunkelfarbige Kolibri.

Latham, Vögel, I. 2. p. 636. n. 46. der dunkelköpfige Kolibri.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 314. n. 44. Trochilus (Obscurus) rectir. cyaneus, pileo nigricante, gula, iugulo dorsoque medio viridibus.

51. BICOLOR. *Der Saphir- und Smaragd-Kolibri.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 211. *der Smaragd-saphir.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 636. n. 45. *der Saphir- und Smaragd-Kolibri.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 314. n. 43. Trochilus (Bicolor) rectir. faturate viridi-auratus, capite colloque inferiore sapphirinis.
52. SAPHIRINUS. *Der Saphir-Kolibri.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 210. *der Saphir.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 635. n. 44. *der Saphir-Kolibri.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 313 n. 42. Trochilus (Sapphirinus) rectir. viridi auratus, subtus albus, collo inferiore violaceo-sapphirino, gula caudaque rufis.
- β. *Latham*, Syn. II. p. 775. n. 39. A.
Latham, Vögel, I. 2. p. 636. n. 45. Var. A.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 314. n. 42. β. Trochilus rectir. pectore sapphirino, abdomine albo, cauda caeruleo-atro nitente.
17. NIGER. *Der schwarze Kolibri.* (1)
Müller, Naturfyst. II. p. 269. n. 17. *der Schwarze.*
Briffon, ornitholog. II. p. 32. n. 5. Oiseau-mouche de S. Domingue.
Büffon, Vögel, XVIII. p. 217.
Latham, Vögel, I. 2. p. 635. n. 43. *der schwarze Kolibri.*
Latham, Syst. ornithol. I. p. 313. n. 41. Trochilus (Niger) rectir. rectricibus subaequalibus, corpore

(1) Nach *Büffon* das Weibchen von *Trochilus Mellifugus*. p. 294. n. 15.

corpore nigro subtus aurato, criffo albo, tibiis pennatis.

Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 121. n. 13. Trochilus (Niger) rectricibus subaequalibus, corpore nigro subtus aurato, ano albo.

53. CYANOCEPHALUS. *Der blauköpfige Kolibri.*
Buffon, Vögel, XVIII. p. 297. *der blauköpfige Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 646. n. 67. *der blauköpfige Kolibri.*

Latham, Syft. ornithol. I. p. 319 n. 63. Trochilus (Cyanocephalus) rectric. viridi aureus. capite, remigibus rectricibusque caeruleis, abdomine rubro.

54. AMETHYSTINUS. *Der Amethyst-Kolibri.*
Buffon, Vögel, XVIII. p. 189. *der Amethyst.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 645. n. 64. *der Amethyst-Kolibri.*

Latham, Syft. ornitholog. I. p. 319. n. 62. Trochilus (Amethystinus) rectric. viridi aureus, subtus griseo fuscöque varius, gula colloque inferiore amethystinis, cauda forcipata.

55. VIRIDISSIMUS. *Der goldgrüne Kolibri.*⁽²⁾
Buffon, Vögel, XVIII. p. 191. *der goldgrüne Fliegenvogel.*

Seligmann, Vögel, IX. Tab. 50. fig. 3. *der ganz grüne Colibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 644. n. 63. *der goldgrüne Kolibri.*

Latham,

(2) In der XIIten Edition hat Linné Edwards *All-green Humming-bird* mit zu seinem *Trochilus Mellisugus* gerechnet. Latham nimmt ihn als eine Spielart von *Troch. viridissimus* an. Syft. ornithol. loc. cit. *Trochilus rectric. viridi-aureus, subtus caerulefcans.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 619. n. 61. Trochilus (Viridissimus) rectir. viridis vividissimus inauratus, abdomine albo, cauda chalybea.

56. GLAUCOPIS. *Der blaustirnige Kolibri.*⁽³⁾

Halle, Vögel, p. 498. n. 549. *der ganz grüne Kolibri mit kürzerm Schnabel.*

Briffon, ornithol. II. p. 38. n. 16. Oiseau-mouche à queue fourchue du Brésil.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 132. n. 3.

Latham, Vögel, I. 2. p. 644. n. 62. *der blaustirnige Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 318. n. 60. Trochilus (Frontalis) rectir. viridi-auratus, fronte violaceo-caerulea, femoribus fuscis, crisso albo, reatricibus chalybeis.

Jonston, av. p. 191. Guainumbi secunda species.

57. RUFUS. *Der Kragenkolibri.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 272. n. 93. *der Kragenkolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 298. *der Kragenkolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 643. n. 61. *der Kragen-Kolibri.* Tab. 37.

Latham, Syst. ornithol. I. p. 318. n. 59. Trochilus (Collaris) rectir. rufo-testaceus, subtus rufescente-albus, vertice viridi-aureo, gula flammeo-rubra, lateribus pennis elongatis.

58. ORNATUS. *Der geputzte Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 193. *das Halsbüschchen; mit 1 Fig.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 643. n. 60. *der geputzte Kolibri.*

Latham,

(3) Nach *Büffon* eine Spielart von *Trochilus viridissimus*, n. 55.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 318. n. 58. Trochilus (Ornatus) rectir. viridi-aureus, subtus fusco-aureus, crista rufa, abdomine infimo vittaque transversa uropygii albis, infra aures utrinque pennis 6. f. 7. elongatis rufis, apice macula viridi.

59. PUNICEUS. *Der braune Haubenkolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 300. *der braune Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 642. n. 49. *der braune Haubenkolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 318. n. 57. Trochilus (Pileatus) rectir. pallide-fuscus, remigibus rectricibusque saturatoribus, crista caerulea splendidissima.

18. CRISTATUS. *Der cayennische Haubenkolibri.*

Müller, Naturyst. II. p. 270. n. 18. *Haubenkolibri.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 158. n. 4. *der Haubenkolibri.*

Onomat. histor. nat. II. p. 58. *das Haubenkolibrichen, der blauhaubichte Honigsauger.*

Klein, av. p. 106. n. 4. *Mellisuga cristata.*

Klein, Vorbereit. p. 196. n. 4. *blauhaubiger Honigsauger.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 108. n. 4. *blauhaubiger Honigsauger.*

Briffon, ornithol. II. p. 35. n. 12. *Oiseau-mouche hupé.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 202. *der gehaubte Fliegenvogel.*

Seligmann, Vögel, II. Tab. 73. *das Haubenkolibrichen.*

Latham,

Latham, Vögel, I. 2. p. 642. n. 58. *der cajen-
nische Haubenkolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 317. n. 56. Tro-
chilus (Cristatus) rectir. viridis, abdomine fu-
sco-cinereo, crista caerulescente, tibiis pen-
natis.

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 102. *der
grüne gradschnablichte Kolibri?*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 121. n. 17. Trochi-
lus (Cristatus) rectirostris viridis, alis fuscis,
abdomine cinereo, crista caerulescente.

Du Tertre, hist. des Antill. II. p. 262. petit
Colibri.

Feuillé, journ. d'obl. p. 413. Colibri.

60. LONGICAUDUS. *Der Raketten-Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 204. *der Raketten-Flie-
genvogel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 642. n. 57. *der Raket-
ten-Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 317. n. 55. Tro-
chilus (Platurus) rectir. viridi-aureus, gula
smaragdina, rectricibus rachi expansa rufo-
alba, intermediis duabus setaceis elongatis api-
ce expansis.

61. CARBUNCULUS. *Der Carfunkel-Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 215. *der Carfunkel.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 641. n. 56. *der Car-
funkel-Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 317. n. 54. Tro-
chilus (Carbunculus) rectirostris sericeo-ni-
ger, vertice colloque superius obscure rubris,
collo inferiore pectoreque flammeo-rubris,
rectricibus rufo-aureis.

62. **CYANOMELAS.** *Der schwarz- und blaue Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 301. *der schwarz- und blaue Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 641. n. 55. *der schwarz- und blaue Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 317. n. 53. Trochilus (Bankrofti) rectir. nigro et caeruleo-varius, gutture pectoreque rubro-aureis.

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 100. *der schwarz und blaue Kolibri.*

63. **GUJANENSIS.** *Der guianische Kolibri.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 302. *der kleine grün- und karmosinfarbene Kolibri.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 641. n. 54. *der gujanische Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 317. n. 52. Trochilus (Guianensis) rectir. pallide viridis cristatus, pileo pectoreque rubro-aureis, alis caudaque viridi rubro purpureoque variegatis.

Bankroft, Naturgeschichte von Guiana, p. 101. *der kleine grüne und karmosinfarbene Kolibri.*

64. **TOBACI.** *Der Kolibri von Tabago.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 303. *der Kolibri von Tabago.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 640. *der Kolibri von Tabago.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 316. n. 51. Trochilus (Tobagensis) rectir. viridi-auratus, abdominis inferioris fascia femoribusque albis, remigibus rectricibusque caeruleo-atris.

19. **ELATUS.** *Der guianische Haubenkolibri.*

Müller, Naturfyst. II. p. 270. n. 19. *Rothkappe.*

Briffon, ornithol. II. p. 30. n. 2. Oiseau - mouche à gorge topaze d'Amérique.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 200. *der amerikaniſche Honigſauger mit der Topaskehle.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 640. n. 52. *der guianiſche Haubenkolibri.*

Latham, Syſt. ornitholog. I. p. 316. n. 50. Trochilus (Elatus) rectir. virescente-aureus, rectricibus aequalibus ferrugineis, apice nigris, pileo rubro cristato.

Seba, theſ. I. p. 108. Tab. 78. fig. 7. 8. Florifuga aut Mellifera.

20. MELLIVORUS. *Der weißbäuchige Kolibri.*

Müller, Naturſyſt. II. p. 270. n. 2. *der Kragenkolibri.*

Borowſky, Thierreich, II. p. 159. n. 5. *der Kragenkolibri.*

Halle, Vögel, p. 506. n. 574. *die Kolibridiane, grün, ein weißer Halbmond am Nacken.*

Onomat. hiſtor. nat. II. p. 61. das weißbauchichte Kolibritchen.

Briffon, ornitholog. II. p. 35. n. 11. Oiseau - mouche à collier de Surinam.

Büffon, Vögel, XVIII. p. 223. *der Fliegenvogel mit dem Halsbande, oder die Jacobinerin; mit 1 Fig.*

Seligmann, Vögel, II. Tab. 69. fig. 1. *das Kolibritchen mit weißem Bauch.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 629. n. 36. *der weißbäuchige Kolibri.*

Latham, Syſt. ornithol. I. p. 310. n. 34. Trochilus (Mellivorus) rectir. rectricibus 2. intermediis nigris, lateralibus albis, capite caeruleo, dorſo viridi, abdomine albo.

Linne'

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 121. n. 14. Trochilus (Mellivorus) rectirostris, rectricibus nigris, lateralibus albis, capite caeruleo, dorso viridi, abdomine albo.

65. **CAMPYLOPTERUS.** *Der breitschäftige Kolibri.*
Büffon, Vögel, XVIII. p. 225. *der Fliegenvogel mit breiten Schäften*; mit 1 Fig.

Latham, Vögel, I. 2. p. 629. *der breitschäftige Kolibri.*

Latham, Syst. ornithol. I. p. 310. n. 33. Trochilus (Latipennis) rectir. viridis, subtus griseus, remigibus tribus seu quatuor primoribus scapo maxime dilatato incurvo, rectricibus lateralibus fusco-nitentibus, apice albis.

21. **RUBER.** *Der kleine braune Kolibri.*

Müller, Naturf. II. p. 271. n. 21. *rother Kolibri.*

Onomat. histor. nat. II. p. 60. *das kleine braune Kolibritchen.*

Briffon, ornitholog. II. p. 31. *Oiseau-mouche de Surinam.*

Büffon, Vögel, XVIII. p. 206. *der purpurfarbene Fliegenvogel.*

Seligmann, Vögel, II. Tab. 63. *das kleine braune Colibritchen.*

Latham, Vögel, I. 2. p. 638. n. 50. *der kleine braune Kolibri.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 315. n. 48. Trochilus (Ruber) rectir. rectricibus lateralibus violaceis, corpore testaceo fusco maculato.

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 101. *der kleine braune Colibri.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 121. n. 15. Trochilus (Ruber) rectir. lateribus violaceis, corpore testaceo fusco submaculato.

22. MINIMUS. *Der kleinste Kolibri.*
Müller, Natursystem, II. p. 271. n. 22. *Fliegenkolibri.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 159. n. 6. *der Fliegenkolibri.*
Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 171. n. 1. Trochilus (Minimus) rectir. corpore viridinitente, subtus albido, rectricibus lateralibus margine exteriori albis.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 377. n. 2. *der kleinste Kolibri.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 171. *der kleinste Kolibri.*
Halle, Vögel, p. 508. n. 581. *der rothgraue Kolibrispecht.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 69. n. 88. *der Fliegenkolibri.*
Klein, av. p. 105. ad n. 2. } mit *Tr. Mo-*
Klein, Vorbereit. p. 195. ad n. 2. } *schitus* ver-
Klein, verb. Vögelhist. p. 108. ad n. 2. } wechselt.
Klein, stemmat. av. p. 23. Tab. 24. fig. 1. 2.
Briffon, ornitholog. II. p. 29. n. 1. Oiseau-mouche.
Büffon, Vögel, XVIII. p. 182. *der kleinste Fliegenvogel.*
Seligmann, Vögel, IV. Tab. 103. *der kleinste Kolibri.*
Latham, Vögel, I. 2. p. 645. n. 65. *der kleinste Kolibri.*
Latham, Syst. ornitholog. I. p. 320. n. 65. Trochilus (Minimus) rectir. corpore viridi subtus albido, rectricibus lateralibus margine exteriori albis.
Molina, Naturgesch. von Chili, p. 218. *der kleinste Kolibri.*

Schlözer, Erdbeschreib. von Amerika, p. 239.
der Brummvogel.

Hamburg. Magazin, IV. p. 406.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 121. n. 18. Trochilus (Minimus) rectricibus lateralibus margine exteriori albis, corpore fusco nitente, subtus albidus.

Fonston, av. p. 194. Guainumbi septima species.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 254. n. 3.
der Fliegenkolibri.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 33 Gattungen vermehrt. Bey der 10ten und 13ten sind zwey Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Neuere Gattungen.*

I. *Der Kolibri mit dem Halsfleck.*

Latham, Syn. Supplem. p. 136. Patch-necked Humming-bird.

Latham, Vögel, I. 2. p. 646. n. 66. der Leversche Kolibri.

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 320. n. 64. Trochilus (Maculatus) rectricibus fuscis, subtus albis, lateribus colli maculis obscuris, utrinque medio macula coccinea.



DRITTE ORDNUNG.

ANSERES. (*Wasservögel. Schwimmvögel.*)

67. GESCHLECHT. ANAS; *Die Ente.*
Müller, Naturfyft. II. p. 275. Gen. LXVII.
Leske, Naturgesch. p. 286. Gen. LXXII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 4. Gen. XXX.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 225.
 Gen. LXXVI.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 379. Gen. XXIV.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 558.
 Gen. XVI.
Ebert, Naturl. II. p. 67.
Halle, Vögel, p. 541. Gen. I.
Pennant, arct. Zool. II. p. 502.
 Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 598. III. p. 268.
 Onomat. hist. nat. I. p. 403.
Klein, av. p. 128. Gen. I. Anser. p. 131. Gen. II.
 Anas.
Briffon, ornitholog. II. p. 430. Gen. CVI. Anser.
 p. 413. Gen. CVII. Anas.
Batsch, Thiere, I. p. 367. Gen. LXXXIX.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 833. Gen. XCVII.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 156 ff.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 254.
 Gen. XXVIII.

* *Mit einem an der Wurzel höckerigen Schnabel.*

- I. CYGNUS. *Der Singschwan.* (4)
Müller, Natursystem, II. p. 275. n. 1. *der Schwan.*
 p. 276. a. *der wilde Schwan.*

Leske,

- (4) Flügelweite 7 Fufs. Gewicht 13 bis 16 Pfund. Nährt sich von Insekten, Wasserpflanzen, Fröschen u. s. w. Legt 4 bis 6 oliven-

Leske, Naturgeschichte, p. 286. n. 1. der Schwan.

Borowsky, Thierreich, III. p. 14. n. 10. der Schwan.

X x 4

Blumen-

olivengrünweisse Eyer in ein grosses Schilf- und Reifignest, woran das Weibchen 14 Tage bauet, und Dunen darein rapfr. Pallas bemerkt, das der Schwan sowohl die Farbe seines Schnabels als seines Leibes verändere, nachdem er jung oder alt ist, denn anstatt das ersterer bey den alten pomeranzengelb und letzterer schneeweiss ist, so ist jener bey den jungen bläulich schwarz, und dieser aschfarben. Beseke sagt, er sey nur im ersten Jahre auf dem Rücken und an den Flügeln grau, wenn er aber ein Jahr alt, sey er durchaus blendend weiss. Er nistet in Kurland in so grosser Menge, das viele Hunderte auf einmal einen grossen See oder Sumpf einnehmen, besonders in der Gegend von Liebau auf dem Papensee, und um Durben, wo sie nach Johannis jung und alt wegen der Federn erschlagen werden. Sie werden auch gegessen, aber das Fleisch ist hart, und muss erst, nach abgezogener Haut, in Essig einige Wochen lang liegen. Die allermehresten Naturhistoriker vermischen in ihren Beschreibungen diese und die folgende Gattung mit einander, und sehen beyde nur als Spielarten an. Der wesentliche Unterschied aber zwischen beyden beruht in folgendem; 1) In der Grösse; denn *Cygnus* ist weit kleiner als *Olor*. 2) In der Wachshaut, die bey *Cygnus* gelb, bey *Olor* schwarz ist. 3) In dem Tragen des Halses; *Cygnus* trägt den Hals ganz aufrecht, *Olor* schwimmt mit gebogenem Halfe. 4) In der Anzahl der Rippen; *Cygnus* hat zwölf Rippen an jeder Seite, *Olor* hingegen nur elf. 5) Im Bau der Luftröhre, welche bey *Cygnus* gerade herab in die Brusthöhlung fällt, wieder zurück geht wie eine Trompete, durch einen Knorpel verengert wird, und dann eine zweyte Beugung macht, um in die Lunge zu kommen; wodurch dieser Singschwan im Stande ist, einen lauten durchdringenden Ton von sich zu geben, welches der andere nicht kann, weil bey diesem die Luftröhre nur gerade in die Lungen, und nicht durch den Brustknochen geht. — Viele der vorher angeführten Stellen gehen auf beyde Gattungen.

- Blumenbach*, Handb. d. Naturgesch. p. 225. n. 1.
 Anas (Cygnus) rostro semicylindrico atro, cera flava, corpore albo; *der Schwan, Elbsch.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 381. *der Singschwan oder wilde Schwan.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 581. n. 1. *der Singschwan.*
- Funke*, Naturgesch. I. p. 212. *der Schwan.*
- Ebert*, Naturl. II. p. 68. *der Schwan.* *ibid.* *der wilde Schwan.*
- Halle*, Vögel, p. 542. *der wilde Schwan.*
- Meyer*, Thiere, I. p. 31. Tab. 45.
- Gatterer*, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 72. n. 90. *der Schwan.*
- Neuer Schaupl. der Natur, VII. p. 817. *Schwan.*
 II. p. 269. *der wilde Schwan.*
- Onomat. hist. nat. I. p. 420. *der Schwan.*
- Handb. der Naturgesch. II. p. 84. *der Schwan.*
- Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 104. *der wilde Schwan.*
- Pennant*, arch. Zool. II. p. 502. n. 387. *der Singschwan, wilde Schwan.*
- Beckmann*, Naturhist. p. 43. a. *der Schwan.*
- Klein*, av. p. 128. n. 1. Anser Cygnus.
- Klein*, Vorbereit. p. 237. n. 1. *Schwangans.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 135. n. 1. *Schwangans.*
- Klein*, stemm. av. p. 31. fig. 33.
- Seligmann*, Vögel, V. Tab. 44. *der wilde Schwan.*
- Briffon*, ornithol. II. p. 439. n. 12. Cygne sauvage.
- Latham*, Syn. Suppl. p. 272. Whistling Swan.
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 833. n. 1. Anas (Cygnus) rostro semicylindrico atro, cera flava, corpore albo.

- Gesner*, Vögelb. p. 462. *Schwan. Elb, Oelb, Elbs.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 378. *der Schwan.*
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 41. n. 69. *der Schwan.*
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 320. n. 67. *der Schwan.*
- Cetti*, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 328. *der Schwan.*
- Fischer*, Naturgesch. v. Livland, p. 79. *Schwan.*
- Olaffen*, Reise durch Island, I. p. 34. 118. 292. *Schwäne.*
- Lepechin*, Tagebuch d. russisch, Reif. II. p. 5. *Schwanen.*
- Rytchkow*, orenb. Topogr. p. 244. *Schwäne.*
- White*, Naturgesch. von England, p. 61. n. 9. *wilder Schwan.*
- Taube*, Slavon. und Syrmien, I. p. 23. *wilde Schwäne.*
- Leem*, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 138. *** *Schwäne.*
- Schlötzer*, Erdbeschr. von Amerika, p. 151. 282. *Schwäne.*
- Uno v. Troil*, Reise n. Island, p. 115. *Schwane.*
- Pontoppidan*, Naturg. v. Dännemark, p. 167. n. 1. *Schwan, Schnabelschwan.*
- Pontoppidan*, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 188. *Svane.*
- Horrebow*, Nachr. von Isl. §. 44. *die Schwäne.*
- Steller*, Kamtschatka, p. 190. *Schwanen.*
- Krascheninnikow*, Kamtschatka, p. 195. *Schwanen.*
- Pallas*, Reise, Ausz. II. p. 7. *Schwane,*
- Pallas*, nord. Beytr. IV. p. 8. *der Schwan.* III. p. 10. *der wilde Schwan.*
- Pallas*, Naturgesch. merkwürd. Th. VI. p. 34. *Schwäne.*

- S. G. Gmelin*, Reif. d. Rufsl. III. p. 249.
Linné, Reif. d. Schweden, I. p. 304. 305.
Stopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 60. n. 66.
der Schwan.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 69. *der Schwan.*
 Naturf. XII. p. 131. n. 67. *der Schwan.*
- Linné*, auserles. Abhandl. II. p. 291. n. 70. *der Schwan.*
- Naumann*, Vogelsteller, p. 185. *der Schwan.*
 Schwed. Abh. XLI. p. 23. *der Schwan.*
- Schneider*, zool. Abhandl. p. 141. *der Schwan.*
- Lichtenberg*, Magazin f. d. Neueste u. s. w. II. 3.
 p. 196. *wilde Schwäne.*
- Stralsund Magaz. I. p. 158. *Schwan.*
- Neueste Mannichfalt. I. p. 171. *Schwan.*
- Gioffroy*, mat. med. VII. p. 439. *der Schwan.*
 Berlin. Samml. VIII. p. 583.
- Beckmann*, Landwirthschaft, p. 476.
- Zorn*, Petinotheol. I. p. 232. II. p. 12. 403. *der wilde Schwan.*
- Merklein*, Thierreich, p. 357. *Schwan.*
- Jablonsky*, allgemein. Lex. p. 1034. *Schwan.*
- Oekonom. Zool. p. 69, n. 9. *der Schwan.*
- Ludovici*, Kaufmannslex. IV. p. 1688.
- Meidinger*, Vorles. I. p. 123. n. 1. *der Schwan.*
- Eberhard*, Thiergesch. p. 119. *der Schwan.*
- André* und *Bechstein*, Spatzierg. I. p. 363. IV.
 p. 269.
- Goetze*, nützl. Allerl. II. p. 188. n. 17. *der Schwan.*
 p. 190. *vom Schwanengefang.*
- Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde,
 I. p. 372. (vom Schwanengefang.)
- Beckmann*, physikal. ökon. Bibl. I p. 319. 419.
 VI. p. 181. 260. XV. p. 510.
- Loniceri*, Kräuterbuch, p. 664. *der Schwan.*

Wedel, miscell. acad. nat. curios. Dec. I. An. II. obs. 12. p. 30.

Valentin, amph. zootom. II. p. 50.

Scaliger, de subtil. ex. 232. p. 728. Cygnus.

Glatthorn, diss. de Cygno. Witt. 1670. 4. pl. 2.

Tourner, dissert. de avibus Apollinis: *Cygnus* et *Corvus*. Ups. 1725. 8. pl. 1½.

Nessel, diss. de av. Apoll. *Cygnus* et *Corvus*. Ups. 1728. 8.

Bartholinus, de Cygno nigro; in ei. orat. var. argum. Hafn. 1668. 8. orat. 52. p. 371.

Bartholin. diss. de Cygni anatom. eiusque cantu. Hafn. 1650. 4.

Bartholin. Cygni anatome. Hist. anat. Cent. II. hist. 79. p. 311.

Jo. Dan. Maior, progr. de Cygni anatome. Kil. 1666. 4.

Wedel, Cygni sterni anatome. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. obs. 12. p. 30. c. fig.

Lachmund, de Cygni lingua ossæ, ibid. Dec. I. an. 4. et 5. obs. 179. p. 225. c. f.

Lespichler, de notabili Cygni in ovo conservatio-
ne. ibid. Cent. I. et II. obs. 59. p. 132.

Titius: Wittenberg. Wochenbl. VI. p. 361. (vom Nutzen der Schwäne.)

Camerarius, an Cygnus cantet, imprimis tum, cum morti est vicinus? Syll. Memorab. Cent. VII. part. 62. p. 470.

Lelandi Cygnea cantatio, cum Commentario. Lond. 1658. 8.

Feller, diss. de Cygnorum cantu. Lips. 1660. et 1672. 4. pl. 2.

Winter, de cantu Cygneo. 1698. 4.

Edzardi diss. de Cygno ante mortem non canente. Witt. 1722. 4. pl. 2.

Neu Hamburg. Magaz. St. 106. p. 371. vom Schwannengefang.

Detharding, progr. in obitum Crausii, praemisso discursu de fabuloso Olorum Cantu. Rost. 1723. 4.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 54. Cygnus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 22. n. 2. Cygnus.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 122. n. 1. Anas (Cygnus) rostro semicylindrico atro, cera flava, corpore albo.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 106. Anas (Cygnus) rostro semicylindrico atro, cera flava, corpore albo.

Müller, zool. dan. prodr. addend. p. 277. Svanne-Sang.

Kramer, Austr. p. 338. n. 2. Anas rostro semicylindrico, cera flava, corpore albo.

Brünnich, ornitholog. bor. p. 12. n. 44. Anas Cygnus.

Charleton, onomast. zoic. p. 97. n. 10. Cygnus.

Mus. Worm. p. 299. Cygnus, Olor.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 310. Olor; ein Schwan, Oelb, Oelbs.

Philos. Transact. Ivi. Tab. 10. p. 215. fig. 1. 2.

Hermann, tab. affin. anim. p. 156. Cygnus.

Plin. hist. nat. L. 30. c. 8. Cygnus.

Senec. Hippol. I. 3. 302. Cygnus.

Martial. epigr. XIII. 77. Cygnus.

Ciceron. Tuscul. qu. I. 30. Cygni.

Virgil. Ecclog. IX. 36. Olores.

Aristotel. histor. animal. Lib. IX, c. 10. n. 162. Κυανοί.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 254. n. 1. der Schwan.

47. OLOR. *Der stumme Schwan.*(5)

Müller, Naturf. II. p. 276. b. *der zahme Schwan.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 16. *der zahme Schwan.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 379. n. 1. *der stumme Schwan.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 595. n. 1. *der stumme Schwan.*

Funke, Naturg. I. p. 213. *die stummen Schwäne.*

Ebert, Naturl. II. p. 68. *der zahme Schwan.*

Halle, Vögel, p. 541. n. 644. *der Schwan.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 505. n. 388. *der stumme Schwan.*

Gesner, Vögelb. p. 462. Fig. p. 463.

Schwed.

(5) Länge über 5 Fuß. Flügelweite über 8 Fuß. Gewichte 25 bis 30 Pfund. Soll 30 bis 100 Jahr alt werden. Liebt vorzüglich klares und helles Wasser. Die ungezähmten ziehen gewöhnlich im October weg und finden sich zu Ende des März auf eben demselben Teiche oder Flusse wieder ein, wo sie sich das vorige Jahr aufhielten. Nährt sich von Wasserlinsen, allerhand Sämereyen der Wasserkräuter, besonders von großen Wasserkäfern. Fische aber rührt er nicht an. Das Weibchen baut im April aus Holz, Binsen, Rohr, Stengeln, Schilf, u. dgl. m. ein schlechtes Nest, füttert es mit Brustfedern aus, und legt 6 bis 8 graugrünlich weiße große Eyer. Die ausgekrochenen Jungen sehen anfänglich grünlich dunkelgrau aus, bis ins zweyte Jahr sehen sie mehr aschgraubraun aus; haben im ersten Jahre schwarze, im zweyten bleifarbene, im dritten gelbe, und in der Folge erst zinnoberrothe Schnäbel und Füße Die Federn sind weit kostbarer als Gänsefedern. Aus Lithauen, Polen und Preussen kommen jährlich viele Centner zur Messe nach Frankfurt an der Oder. Auf der Spree und Havel um Berlin, Spandau und Potsdam werden die gezähmten Schwäne im Sommer, vorzüglich im May zusammengetrieben und gerupft. Auch die Haut bereitet man mit den Pflaumfedern zu einem Pelzwerke, und braucht sie unter andern zu feinen Puderquasten.

Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. *der so genannte Cygnus Mansuetus.*

Briffon, ornitholog. I. p. 438. n. II. Cygne.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 10. *der so genannte zahme Schwan,*

Seligmann, Vögel, V. Tab. XLV. (der Kopf.)

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 834. n. 2. Anas (Olor) rostro rubro, basi tuberculo carnosio nigro, corpore albo.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 122. n. 1. β . Cygnus mansuetus.

Linné, Syst. Natur. Edit. XII. I. p. 194. n. 1. β . Cygnus mansuetus.

Kramer, Austr. p. 338. n. 2. β . C. mansuetus.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 310. Olor.

Fonston, av. p. 136. Cygnus.

Chesfeld. Osteog. cap. 5. ad fin. (Scelet.)

Aelian. hist. anim. L. 10. c. 36. L. 17. c. 24. L. 15. c. 61.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 255. n. 2. *der stumme Schwan.*

48. NIGRICOLLIS. *Der schwarzhälfige Schwan.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 834. n. 3. Anas (Nigricollis) rostro rubro, corpore albo, capite colloque nigris.

49. MELANOCEPHALA. *Der chilesische Schwan.*

Molin. l. c. Anas Melancorypha.

Ist nach *Latham* a. a. O. mit dem vorhergehenden einerley.

50. HYBRIDA. *Der Cage.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 835. n. 6. Anas (Hybrida) rostro semicylindrico, cera rubra, cauda acutiufcula.

2. CYGNOIDES. Die Schwanengans.

Müller, Natursystem, II. p. 278. n. 2. Schwanengans.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 225. n. 2. Anas (Cygnoides) rostro semicylindrico: cera gibbosa, palpebris tumidis; die spanische oder schinesische Gans.

Halle, Vögel, p. 546. n. 646. die Schwanengans.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 76. n. 91. Schwanengans, türkische Gans.

Pennant, arch. Zool. II. p. 531. B. die Schwanengans.

Klein, av. p. 129. n. 4. Anser hispanicus.

Klein, Vorbereit. p. 238. n. 4. spanische oder vielmehr guineische Gans.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 136. n. 4. spanische Gans.

Neuer Schauplatz der Natur, III. p. 269. n. 4. spanische Gans.

Onomat. histor. nat. I. p. 420. die türkische, sibirische Gans.

Briffon, ornith. I. p. 435. n. 7. Oie de Guinée.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 686. die Schwanengans.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 837. n. 16. Anas (Cygnoides) rostro semicylindrico, cera gibbosa, palpebris tumidis.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 61. n. 67. die spanische Gans, türkische Gans.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 321. n. 68. Schwanengans.

Naturf. XII. p. 131. n. 68. Schwanengans.

Schwed. Abhandl. XLI. p. 24. Anas Cygnoides.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 3. Anser cygneus.

Linné,

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 122. n. 2. Anas
(Cygnoides) rostro semicylindrico, basi gibbo.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 158. Anas cy-
gnoides.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 255. n. 3.
die Schwanengans.

β. **ORIENTALIS.** *Die orientalische Schwanen-
gans.*

Müller, Natursystem, II. p. 279. b. *die ostindische
Schwanengans.*

Klein, av. p. 129. n. 5. Anser rufficus.

Klein, Vorbereit. p. 239. n. 5. *russische Gans.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 136. n. 5. *russische
Gans.*

Briffon, ornithol. II. p. 435. n. 6. Oie de Mos-
covie.

Latham, Syn. III. p. 447. n. 12. A.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 838. n. 16. γ.
A. rostro luteo, cera magna nigra, occipite
atro, sacco gulari.

Pallas, Reise, I. p. 169. *die Schwanengans.*

Pallas, Reif. Ausz. III. Anh. p. II. n. 32. Anser
Cygnoides, Spontaneus; Mongolis *Chongor-
galu.*

Götz, Naturgesch. einiger Vögel, p. 89. *die Schwa-
nengans.*

Naturf. XIII. p. 194. Anas cygnoides.

Naturf. XV. p. 160. *Schwanengänse.*

Beckmann, Bibl. III. p. 179. *die Schwanengans.*

Philos. Transact. Ivii. p. 347. n. 17.

Decouv. Ruff. I. p. 466.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 122. n. 2. β. Anser
rostro semicylindrico atro, basi gibbo, minor.

Linné, it. Westgoth. p. 145. Anser Chinensis.

3. GAMBENSIS. *Der gambische Schwan.*

Müller, Natursystem, II. p. 279. n. 3. *gambischer Schwan.*

Neuer Schauplatz der Natur, III. p. 269. n. 7. *gambische Gans, gewaffnete Gans.*

Klein, av. p. 129. n. 7. *Anser Chilensis.*

Klein, Vorber. p. 239. n. 7. *die Gans von Chili.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 136. n. 7. *gambischer Gans.*

Briffon, ornitholog. II. p. 436. n. 8. *Oie de Gambie.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 839. n. 19. *Anas (Gambensis) rostro basi gibbo, corpore nigro subtus albo, dorso purpurascente, rostro pedibusque rubris.*

Halle, Vögel, p. 547. n. 649. *die Sporengans.*

Berlin. Samml. IV. p. 287. *der Cahütahü oder Sporengans.*

51. COSCOROBA. *Die Coscoroba.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 835. n. 7. *Anas (Coscoroba) rostro extremo dilatato rotundato, corpore albo.*

52. MELANOTOS. *Die Gans mit schwarzem Rücken.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 839. n. 18. *Anas (Melanotos) rostro basi gibbo compresso, corpore albo, capite colloque nigro maculatis, dorso, alis caudaque nigris.*

Latham, Syn. III. 2. p. 449. n. 13. *Black-backed Goose.*

Latham, Syn. Supplem. p. 272.

Naturforsch. I. p. 275. n. II. *die Gans mit schwarzem Rücken.*

Berlin. Samml. IX. p. 194. *der Schwarzücken.*

Neueste Mannichfalt. I. p. 190. n. II. *der Schwarzwücken.*

53. GRANDIS. *Die Riesengans.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 530. A. *die Riesengans.*

Latham, Syn. III. 2. p. 446. n. II. great Goose.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 837. n. 15. Anas (Grandis) corpore nigricante, subtus albo, rostro nigro, pedibus coccineis.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 256. n. 4. *die Riesengans.*

54. HYPERBOREA. *Die Schneegans.*⁽⁶⁾

Müller, Natursystem, Suppl. p. 101. n. 39. b. *die nordische Gans.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 14. n. 9. *die Schneegans.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 510. n. 395. *die Schneegans.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 578. n. 7. *die Schneegans.* p. 581. *Hagelgans.*

Halle, Vögel, p. 550. n. 653. *die Schneegans.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 130. n. 115. *die Schneegans, Schlecker-gans.*

Klein, av. p. 130. n. II. Aufer grandinis, nivis, hybernus.

Klein, Vorbereit. p. 241. n. II. *Schneegans, Hagelgans.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 137. n. 12. *Schneegans.*

Briffon, ornithol. II. p. 438. n. 10. Oie de neige.

Batsch,

(6) Flügelweite $3\frac{1}{2}$ Fuß Gewicht zwischen 5 und 6 Pfunden. Die Jungen sind blau und erhalten ihre eigne Farbe erst nach einem Jahre In der Hudsonsbay werden jährlich Tausende von den Indianern für die Colonien geschossen.

Bätsch, Thiere, I. p. 376. *Schneegans*.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 837. n. 14. *Anas* (Hyperborea) corpore niveo, fronte flavescente, remigibus decem primoribus nigris, rostro pedibusque rubris.

Pallas, Naturgesch. merkwl. Thiere, VI. p. 30. *die Schneegans*.

Schwed. Abh. XLI. p. 24. *Anas Hyperborea*:

Krünitz, Encyklop. XVI. p. 103. *die Schneegans*.

Sander, über die GröÙe u. Schönheit in der Nat. I. p. 263.

Hermann, tab. aff. anim. p. 159. *Anas hyperborea*:

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 256. n. 5. *die Schneegans*.

55. PICTA. *Die gemahlte Gans*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 836. n. 12. *Anas* (Picta) cinereo-nigricans, nigro transversim lineata, capite, collo, abdomine medio, tectricibus fasciaque alarum albis.

56. MAGELLANICA. *Die magellanische Gans*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 836. n. 11. *Anas* (Magellanica) ferrugineo-fusca, corpore anteriore subtusque transversim variegato, tectricibus fasciaque alarum albis.

57. ANTARCTICA. *Die Gans von den Falklandsinseln*:

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 835. n. 8. *Anas* (Antarctica) corpore toto albo, rostro nigro, pedibus flavis. (*Mas*.)

β. A. (*magellanica*) corpore variegato, abdomine, crisso, uropygio femoribusque albis, speculo alarum viridi. (*femina*.) *

Mus. Carlson. fasc. II. Tab. 37.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 835. n. 8. β.

58. VARIEGATA. *Die bunte neuseeländische Gans.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 836. n. 10. *Anas* (Variegata) corpore variegato, capite, collo, rectricibusque alarum albis, speculo alarum viridi, rostro pedibusque nigris.

59. LEUCOPTERA. *Die gestreifte Gans.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 835. n. 9. *Anas* (Leucoptera) corpore albo, supra nigro transversim lineato, speculo alarum viridi, rostro pedibusque nigris.

60. CINEREA. *Die kurzflügelige Gans.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 660. n. 15. *die aschgraue Ente?*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 834. n. 5. *Anas* (Brachyptera) rostro fulvo, corpore cinereo, alis abbreviatis, cristo fasciaque alarum albis.

4. TADORNA. *Die Brandgans.* (7)

Müller, Naturfyst. II. p. 279. n. 4. *Brandgans.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 16. n. 11. *die Lochgans, Brandgans, Fuchsgans.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 570. n. 3. *die Brandente.*

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 694. *die Krachtente.*

Halle, Vögel, p. 548. n. 651. *die Fuchsgans.*

Gatte-

- (9) *Brandgans* — weil sich der Vogel da aufhält, wo das Wasser an die Klippen und hohen Ufer stößt, und schäumt, welches die Schiffer *Brandungen* nennen; *Fuchsgans* — wegen der Höhlen, die sie bewohnt; daher auch *Wüblgans*. Flügelweite $3\frac{1}{2}$ Fufs. Gewicht des Männchens 2 Pfund 10 Unzen. Bleibt in England das ganze Jahr. In Russland wird sie bisweilen gezähmt auf dem Hofe gehalten. An Gestalt und Farbe nähert sie sich mehr einer Ente als einer Gans.

- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 77. n. 92. *die Brandgans*.
Neuer Schaupl. d. Natur, III. p. 220. *Fuchsgans*.
p. 270. n. 8. *Brandgans*.
Onomat. histor. nat. VII. p. 407. *die Fuchsgans*,
Brandgans.
Handb. der Naturgesch. II. p. 371. *die Fuchsgans*.
Klein, av. p. 130. n. 9. *Vulpanfer*.
Klein, Vorbereit. p. 240. n. 9. *Fuchsgans*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 137. n. 9. *Fuchsgans*.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 532. D. *die Wühl-*
gans, *Brandgans*.
Briffon, ornitholog. II. p. 453. n. 9. *Tadorne*.
Batsch, Thiere, II. p. 379. *die Lochgans*.
Gesner, Vögelb. p. 133. *Vulpanfer*.
Latham, Syn. Supplem. p. 275. *Shieldrake*.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 854. n. 56. *Anas*
(*Tadorna*) rostro fimo, fronte compressa, ca-
pite nigro-virescente, corpore albo variegato.
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 321. n. 69.
Brandgans, *Fuchs-Erdgans*.
Lepechin, Tagebuch der russ. Reif. I. p. 189. *die*
gesprenkelten Enten.
Pennant, Reif. d. Schottl. I. p. 41. *Brandgänse*.
Linne', Reif. d. Oel. und Gothl. p. 321. *Brand-*
gans.
Georgi, Reif. d. Rusl. II. p. 482. *die Bergente*.
Pallas, Reif. Ausz. II. p. 271. *Bergenten*. III.
p. 373. *Bergente*.
Pallas, nord. Beyträge, III. p. 12. *die Bergente*.
IV. p. 22. *Anas Tadorna*.
Pallas, Naturgesch. merkwl. Thiere, VI. p. 42. *die*
Bergente. it. p. 27. *Bergente*.
Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 167.
n. 2. *Fagergaas*.

- Pontoppidan*, Naturhistorie von Norwegen., II. p. 141. *Fager-Giäs*, *Ring-Giäs*, *Ur-Giäs*.
Krünitz, Encykl. XVI. p. 96. *die Fuchsgans*.
 Naturf. XII. p. 132. n. 69. *Brandgans*, *Ringelgans*.
 Schwed. Abhandl. XL. p. 23. *Anas Tadorna*.
Lichtenberg, Magaz. f. d. Neueste u. f. w. II. 1. p. 107. *die Bergente*.
Sander, Gröfse u. Schönheit in der Nat. I. p. 249. *die Brandgans*, *Erdgans*.
 Allerneueste Mannichfalt. II. p. 175. *die Bergente*.
Wallbaum, Beschreib. der *Bergente* weiblichen Geschlechts.
Beckmann, Bibl. I. p. 339. *die Bergente*.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 22. n. 7. *Tadorna*.
Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 122. n. 3. *Anas* (*Tadorna*) *rostrum sicut, frontem compressam, corpore albo variegato*.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 107. *Anas* (*Tadorna*) *rostrum sicut, frontem compressam, capite nigro virescente, corpore albo-variegato*.
Brünicke, ornitholog. bor. p. 12. n. 45. 46. 47. *Anas Tadorna*.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 208. *Anas longirostris quarta?*
Charleton, onomast. zoic. p. 98. n. 2. *Vulpanfer*, *Chenalopex*.
Jonston, av. p. 141. *Vulpanfer* feu *Chenalopex*.
Jonston, av. p. 146. la *Tadorne*.
Hermann, tab. affin. anim. p. 158. 160. *Anas Tadorna*.
Plin. hist. nat. L. 10. c. 22. *Chenalopeces*.
Aristotel. histor. animal. Lib. VI. cap. 2. n. 28. *Χενάλοπης*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 256. n. 6.
die Brandgans.

5. SPECTABILIS. Die grauköpfige Ente.

Müller, Natursystem, II. p. 280. n. 5. bunte
Ente.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 515. n. 399. die Kö-
nigsgans.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 143. n. 35. grau-
köpfige Ente aus der Hudsonsbay.

Neuer Schaupl. der Natur, II. p. 604. n. 32. grau-
köpfige Ente.

Briffon, ornitholog. II. p. 458. n. 15. Canard de
la Baye de Hudson.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 845. n. 36. Anas
(Spectabilis) rostro basi gibbo compresso, ca-
rina pennacea nigra, capite canescente.

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 34. der
Buntkopf.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 49. die Ente mit
dem grauen Kopfe.

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken,
p. 144. **.

Schwed. Abh. XLI. p. 24. Anas Spectabilis.

Stralfund. Magazin, I. p. 149. die grünköpfige
Gans.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 123. n. 4. Anas
(Spectabilis) rostro basi gibbo compresso; ca-
rina pennacea nigra, capite canescente.

Linné, Syst. Nat. Edit. XII. I. p. 195. n. 4. Anas
(Spectabilis) rostro basi gibbo compresso, ca-
rina pennacea nigra, capite canescente.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 108. Anas
(Spectabilis) rostro basi gibbo compresso, ca-
rina pennacea nigra, capite canescente.

Fabric. fn. groenl. p. 63. n. 39. Anas (Spectabilis) rostro basi gibbo compresso, carina pennacea nigra, capite canescente.

Mus. Carl. fascic. II. Tab. 39. das Männchen.
Tab. 40. das Weibchen.

6. FUSCA. Die Sammetente.

Müller, Naturst. II. p. 281. n. 6. *wilde braune Ente.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 17. n. 12. *die nordische braune oder schwarze Ente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 568. n. 2. *die Sammetente.* p. 570. *wilde braune Ente, Moderente, braune Seeente, Turpane.*

Halle, Vögel, p. 557. n. 667. *die Moderente.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 77. n. 93. *die braune Ente.*

Neuer Schaupl. d. Natur, II. p. 601. n. 5. *braune Ente.*

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 602. n. 11. *schwarze Ente.*

Neuer Schaupl. d. Natur, II. p. 601. n. 9. *Moorente, Fliegenente.*

Onomat. hist. nat. I. p. 412. *die schwarze Ente.*

Klein, av. p. 133. n. 12. Anas nigra.

Klein, Vorbereit. p. 246. n. 12. *schwarze Ente.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 140. n. 12. *schwarze Ente, mit schwarzem, rothem und gelbem Schnabel.*

Briffon, ornithol. II. p. 472. n. 29. *grande Macreuse.*

Latham, Syn. Suppl. p. 274. *Velvet Duck.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 848. n. 44. Anas (Fusca) nigricans, palpebra inferiore speculoque alarum albis.

Pennant,

- Pennant*, arct. Zool. II. p. 516. n. 400. *die Sammetente.*
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 322. n. 71. *wilde braune Ente.*
- Lepechin*, Tagebuch d. russisch. Reis. III. p. 14. *kohlschwarze große Makreuser-Enten.*
- Fischer*, Zuf. zur Naturgesch. v. Livland, p. 45. n. 493. *schwärzliche Ente, Mohrente.*
- Linné*, auserles. Abhandl. II. p. 292. n. 77. *die braune Ente.*
- Naturf. XII. p. 132. n. 71. *wilde braune Ente.*
- Naturf. XXV. p. 10. n. 14. *Anas fusca.*
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 62. n. 68. *wilde braune Ente.*
- Stralsund. Magazin, I. p. 165. *Turpane, oder braune See-Ente.*
- Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. *Anas Carbo.*
- Neue schwed. Abhandl. VI. p. 189. *die braune Ente.*
- Krönitz*, Encykl. XI. p. 60. *die braune Seeänte.*
- Pontoppidan*, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 143. *Hav-Aaare.*
- Schriften der drontheim. Gesellschaft, I. p. 222. *See-Orre, schwarzbraune wilde Ente.*
- Linné*, Syst. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 14. *Anas nigra.*
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 123. n. 5. *Anas (Fusca) nigricans, macula pone oculos lineaque alarum albis.*
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 13. n. 109. *Anas (Fusca) nigricans, palpebra inferiore speculoque alarum albis.*
- Hermann*, tab. affinit. animal. p. 158. *Anas Fusca.*

7. NIGRA. Die schwarze Ente. (8)

Müller, Naturf. II. p. 281. n. 7. schwarze Ente.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 573. n. 4. die Trauerente.

Halle, Vögel, p. 559. n. 670. die schwarze Seeente mit dem schwarzen Schnabelgeschwülste.

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 602. n. 11. schwarze Ente.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 517. n. 402. die Trauerente.

Briffon, ornithol. II. p. 471. n. 28. Macreuse.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 848. n. 43. Anas (Nigra) rostro basi gibbo, corpore toto nigro.

Beseke, Vögel Kurl. p. 41. n. 70. die schwarze Ente.

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 81. n. 89. schwarze Ente, Mohrente.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 323. n. 72. schwarze Ente; (mit *Anas fusca* verwechselt.)

Linné, Reif. d. Oel. und Gothl. p. 232. 290.

Naturf. XII. p. 133. n. 72. schwarze Ente; (mit *Anas fusca* verwechselt.)

Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. Anas nigra.

Stralfund. Magaz. I. p. 149. die schwarze See Ente.

Beckmann, Bibl. I. p. 5. Anas nigra.

Voyage en Sibirie p. l'Abbé Chappé de Auteroche. I. Tab. 10. Macreuse.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 123. n. 6. Anas (Nigra) tota nigra, basi rostri gibba.

Philos. Transact. XV. n. 175. p. 1160. 4. Whilk.

61. RE-

(8) Länge, nach Pennant 24 Zoll; Flügelweite 34 Zoll; Gewicht 2 Pfund und 2 Unzen. — Nach Beseke hingegen beträgt die Länge 2 Fuß 6½ Zoll, die Flügelweite 3 Fuß 7 Zoll, und das Gewicht 5¾ Pfund. Welche Verschiedenheit! Sollte hier wohl einerley Gattung gemeynt seyn?

61. REGIA. *Die Königsente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 847. n. 39. Anas (Regia) caruncula compressa frontali, corpore caeruleo, subtus fusco, collari albo.

62. NILOTICA. *Die Nil-Ente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 846. n. 38. Anas (Nilotica) albida, maculis canis, pectoris lateribus et abdomine cano lineatis, callo rostri marginali et caruncula purpureo-sanguineis.

Hasselquist, Reise nach Paläst. p. 919. n. 36. Anas nilotica.

63. BERINGII. *Die Beringsgans.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 509. n. 393. die Beringsgans.

Steller, Besch. von Kamtschatka, p. 188. eine Art wunderfeltfamer Gänse.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 843. n. 29. Anas (Beringii) rostro gibbo, corpore albo, alis nigris, regione aurium virescenti-alba.

64. ALBIFRONS. *Die Bläßengans. (9)*

Pennant, arct. Zool. II. p. 509. n. 394. die Bläßengans.

Bechstein,

- (9) Flügelweite, nach *Pennant*, 4 F. 6 Z.; Gewichte 5½ Pfund. In der XII. Edit. p. 197. rechnete *Linné Brissons Anser Septentrionalis Sylvestris* zu seinem *Anas Erythropus* n. 11. Man muß sich überhaupt sorgfältig hüten, die zu *A. Albifrons*, *Erythropus*, *Casarca* und *Bernicla* gehörigen Synonymen nicht zu verwechseln. Vorzüglich schwer ist es die zu *A. Albifrons* und *Erythropus* gehörigen Synonymen richtig zu ordnen. Folgende Schwierigkeiten, und (mir wenigstens scheinbare) Verwechslungen bin ich nicht im Stande zu heben.
- 1) *Linné* hat in der XII. Edition offenbar *A. Albifrons* und *Erythropus* unsers Systems für einerley angenommen; denn er citirt bey seinem *Erythropus Brissons Anser Septentrionalis Sylvestris*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 576. n. 6.
die Bläßengans.

Borowsky, Thierreich, III. p. 10. b. die canadi-
sche Gans.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 138. n. 16. Lachgans.

Halle, Vögel, p. 550. n. 655. die Lachgans.

Briffon, ornith. II. p. 433. n. 3. Oie sauvage du Nord.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 842. n. 27. Anas
(Albifrons) cinerea, fronte alba.

Brünicb, ornithol. bor. p. 13. n. 53. Anas (An-
ser ferus) margine frontis albo, abdomine ci-
nereo immaculato.

Philos.

Sylvestris, und führt auch *Fn. Suec.* n. 116 an. Eben diese
Fn. Suec. finde ich nun im Syst. zweymal, nämlich bey *A.*
Albifrons, n. 64, und bey *A. Erythropus*, n. 11. p. 512. an-
geführt. 2) *Linné* charakterisirt seine *Anas Erythropus: ci-*
nerea, fronte alba; dies finde ich auch in der XIII. Ed.
Latham hingegen nimmt eben diesen Charakter bey *Anas*
Albifrons an, übrigens citirt er eben die Synonymen, die in
der XIII. Edition unsers Syst. bey *Anas Albifrons* angeführt
sind. 3) *Linnés Anas Erythropus*, *fn. Suec.* II. p. 41. n. 116.
ist offenbar einerley mit *fn. suec.* I. n. 92. Letztere citirt
Kramer (*Austr.* p. 339. n. 6.), welche Stelle in unserm Sy-
stem zu *Anas Albifrons* gezogen worden Ist aber *Linnés*
Anas Erythropus (*Edit.* XII. p. 197. n. 11.) einerley mit *Anas*
Erythropus *Ed.* X. I. p. 123. n. 8. und *Fn. Suec.* II. n. 116.
einerley mit *Fn. Suec.* I. n. 92. welches der Natur der Sa-
che nach gar nicht anders seyn kann, und gehört *Clus. An-*
ser Helsingicus, exot. 368 mit dahin, so müssen auch die
Synonymen: a) *Kramer l. c. Anas cinerea, fronte alba*; b) *Mäl-*
ler, zool. dan. prodr. p. 14. n. 113. *Anas (Erythropus) cine-*
rea, fronte alba, verglichen mit den dänischen Synonymen in
Brünicb. ornithol. bor. p. 14. n. 56. nicht zu *Anas Albifrons*
unsers Systems p. 509. n. 64. sondern zu *Anas Erythropus*
p. 512. n. 11. daselbst gezogen werden, obgleich *Gmelin*
und *Latham* sie zu der ersten rechnen Ich überlasse dies
den Ornithologen zur Prüfung. Cf. *Blumenbach Handbuch*
der Naturgesch. p. 226. not. *.

Phil. Transact. Ixii. p. 414. n. 3. Laughing Goose.
Seligmann, Vögel, V. Tab. 48. *die lachende Gans.*

β. A. fronte tota alba, abdomine nigro maculato. *
Brünnich, ornith. bor. p. 13. n. 54.

* * *Mit glattem Schnabel, an der Wurzel ohne Höcker.*

8. MARILA. *Die Bergente.* (10)

Müller, Naturfyft. II. p. 281. n. 8. *Bergente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 640. n. 8. *die Bergente.* p. 642. *Moderente, Schaufelente, unterirrdische Ente, Morente, Schummel, Aschenente; (Warten, die Männchen bey den Jägern.)* Tab. 23.

Pennant, arct. Zool. II. p. 526. n. 416. *die Schaufelente.*

Briffon, ornithol. II. p. 470. n. 26. A. petit Morillon rayé.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 853. n. 54. Anas (Marila) nigra, humeris cinereo undulatis, abdomine speculoque alari albis. (*Mns.*)

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 72. n. 83. *die unterirrdische Ente.*

Steinberg, Zirchn. p. 138. Tab. 22.

Schwed. Abhandl. XLI. p. 24. Anas Marila.

Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 167. n. 3. Anas Marila. Tab. 13.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. III. Anas (Marila) nigra, humeris cinereo - undulatis, abdomine speculoque alari albis.

A. fusco

(10) Flügelweite 20 Zoll. Gewicht des Männchen 1½ Pfund, des Weibchen 2 Unzen mehr *Pennant*. — Nach *Briffon* eine Varietät von *Anas Fuligula*.

A. fusco - ferruginea, speculo alarum, abdomine capitisque annulo ad rostri basin albis. (*Femina*.) *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 853.

Mus. Carlf. fasc. II. Tab. 38. Anas fraenata.

Ray's Letters p. 61. Duck with a circle of white feathers about the bill.

β. A. capite colloque purpureo - viridibus, dorso humerisque cinereo - undulatis, abdomine speculoque alarum albis. *

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 854. n. 54. β.

Büffon, pl. enl. n. 1002. Millouinan.

9. ANSER. *Die gemeine Gans.* (1)

α. *Ferus.* *Die wilde Gans.*

Müller, Naturf. II. p. 282. n. 9. β. *die wilde Gans mit graubraunen Federn.*

Leske,

(1) Flügelweite 5 Fufs. Gewicht bisweilen 10 Pfund. *Pennant*.
Ziehen als Zugvögel im Frühjahr in Europa nach den lappländischen Morästen, den östlichen und südlichen Theilen von Island, und bleiben den Sommer über daselbst. Auch in Asien und Amerika halten sie sich zu dieser Jahreszeit in den nördlichsten Gegenden auf. So bald in der nördlichen Erde der erste anhaltende Schnee einfällt ziehen sie sich nach einer gelindern Zone: Sie überwintern in Deutschland, Frankreich, Ungarn; Griechenland, Klein-Asien, dem östlichen Russland, Javan, sogar im nördlichen Afrika, und ziehen sich im März, nachdem der Schnee früh oder spät schmilzt, und warme Witterung einfällt, in ihr eigentliches Vaterland zurück. Sie wandern heerdenweise; formiren dabey zwey Reihen; die sich vorn in der Spitze eines Dreyecks anfangen; und so als Schenkel desselben auspreitzen. Diejenige Gans; welche die Spitze formirt, ist allezeit gröfser als die übrigen; hat eine gröbere Stimme, und ist vielleicht jedesmal eine alte Gans. Die wilde Gans legt im Frühjahr in Sümpfen und grossen Brüchen 9 bis 12 weisse Eyer; die an beyden Seiten fast gleich

Leske, Naturgeschichte p. 287. n. 2. *die Gans*. *

Borowsky, Thierreich, III. p. 9. a. *die wilde Gans*.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 226 n. 3.
Anas (Anser) rostro semicylindrico, corpore supra cinereo, subtus pallidior, collo striato. *

Bechstein, Naturgesch. I. p. 382. *die wilde Gans*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 586. a. *die wilde Gans*.

Funke, Naturgesch. I. p. 206. *die Gans*. *

Ebert, Naturl. II. p. 68. *die eigentlichen Gänse*. *

Halle, Vögel, p. 543. *die wilde Gans*.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 79. n. 94. *die wilde Gans*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 507. n. 391. *die wilde Gans*.

Beckmann, Naturhist. p. 43. b. *die Gans*. *

Neuer Schaupl. der Natur, III. p. 268. *Gans*. *

Onomat. hist. nat. I. p. 421. *die Gans*. *

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 105. *die Gans*. *

Klein. av. p. 129. n. 3. Anser ferus.

Klein, Vorbereit. p. 238. n. 3. *wilde Gans*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 136. n. 3. *wilde Gans*.

Klein, stemm. av. p. 31. Tab. 34. fig. 1. a-c.

Klein, Vögeleyer, p. 34. Tab. 19. fig. 2.

Briffon, ornitholog. II. p. 432. n. 2. Oye sauvage.

Batsch,

gleich stumpf sind. Begattet sich mit der zahmen, ob gleich nicht so leicht als man gemeinlich vorgiebt. Wird leicht zahm, und in einigen Gegenden Russlands auf den Höfen gehalten. *Fischer* und *Beseke* gedenken einer großen und einer kleinen wilden Gans, worüber sich aber nichts bestimmen läßt. Die mit einem * bezeichneten Synonymen gehen auf die wilde und zahme Gans.

- Batsch*, Thiere, I. p. 367. *die gemeine Gans.* *
- Gesner*, Vögelb. p. 117. *heimische Gans*; * mit
1 guten Fig.
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 841. n. 26. Anas
(Anser) rostro semicylindrico, corpore supra
cinereo, subtus pallidiore, collo striato.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 43. n. 71. *die gemeine wil-
de Gans.*
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 329. n. 74.
die wilde Gans mit graubraunen Federn.
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 80. n. 76.
wilde Gans.
- Cetti*, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 333. *die
wilden Gänse.*
- Taube*, Slavon. und Syrmien, I. p. 22. *wilde
Gänse.*
- Olaffen*, Reise durch Island, I. p. 119. *wilde
Gänse.*
- Lepechin*, Tageb. d. ruff. Reif. II. p. 5. *Gänse.*
- S. G. Gmelin*, Reif. durch Rußl. I. p. 68. *wilde
Gänse.*
- Pallas*, Reise, II. p. 325. 326. III. p. 91. 92. 93.
616. *wilde Gänse.*
- Pallas*, Reif. Ausz. II. p. 7. *Gänse.* III. p. 475.
wilde Gänse.
- Steller*, Kamtschatka, p. 190. *Gänse.* p. 187.
große graue Gänse.
- Leem*, Nachricht von den Lappl. p. 138. 139. *die
wilden Gänse.*
- Krascheninnikow*, Kamtschatka, p. 195. *große graue
Gänse.*
- Carver*, Reif. durch Nordamer. p. 383. *Gänse.*
- White*, Naturgesch. von England, p. 62. n. 10.
wilde Gänse.
- Georgi*, Rußl. p. 482. *wilde Gänse.*

Rytchkow,

Rytzchkow, orenb. Topogr. p. 243. *wilde Gänse*.
Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 167.
 n. 4. a. *wilde Gans*.

Pontoppidan, Norwegen, II. p. 139. *Gaas*. *
 Naturf. XII. p. 134. n. 74. *die wilde Gans*.

Schwed. Abh. XXXVIII. p. 294. *wilde Gans*.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 69. *wilde Gans*.

Naumann, Vogelsteller, p. 185. *die wilde Gans*.

Linné, auserl. Abh. II. p. 291. n. 71. *die Gans*.

Oekonom. Zool. p. 70 n. 10. *die Gans*. *

Zorn, Petinotheol. I. p. 404. *die wilde Gans*.

Sander, Gröfse und Schönheit in der Natur, I.
 p. 250. *wilde Gänse*.

Jablonsky, allgemein. Lex. p. 665. *Gans*.

Anweisung Vögel zu fangen, u. s. w. p. 220.
die wilde Gans.

Bechstein, Musterung schädl. Thiere, p. 118. n. 1.
die wilde Gans.

André und *Bechstein*, Spatzierg. II. p. 268. *die wilde Gans*,

Merklein, Thierreich, p. 260. *Gansß*. *

Krönitz, Encykl. XVI. p. 84. *die wilde Gans*.

Stralsund. Magazin, I. p. 148. *die grauen Gänse*.

Linné, Syst. Nat. Edit. II. p. 54. *Anser*. *

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 4. *Anser vulgaris*. *

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 123. n. 7. *Anas*
 (*Anser*) rostro semicylindrico, corpore supra
 cinereo, subtus pallidiore, collo striato. *

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 112. *Anas*
 (*Anser*) rostro semicylindrico, corpore supra
 cinereo, subtus pallidiore, collo striato. *

Kramer, Austr. p. 338. n. 4. *Anas* rostro semi-
 cylindrico, corpore supra cinereo, subtus al-
 bido, reetricibus margine albis. *

Heerkens, av. Fris. p. 87. Anser. *

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 212. Anser ferus; *eine wilde Gans*, *grawe Gans*.

Charleton, onomast. zoic. p. 98. n. 11. Anser ferus.

Jonston, av. p. 140. Anser ferus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 159. Anas Anser. *

Schäffer, elem. ornith. Tab. 20.

Forskäl, fn. orient. p. 6. n. 6. Descript. anim. p. 3. n. 6. Anas Anser. Arabisch: *Uäs araki*.

Philos. Transact. xv. n. 175. p. 1660. 5.

Plin. histor. nat. Lib. 10. c. 22. 59. L. 18. c. 35. Anser.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 257. n. 7. *die gemeine Gans*. *

β. DOMESTICUS. *Die zahme Gans* (2)

Müller, Natursystem, II. p. 282. a. *die zahme Hausgans mit weißen Federn*.

Borowsky,

- (2) Länge 3 Fufs; Flügelweite 5 2/3 Fufs. Wird 20 bis 24 Jahr alt; man will sogar Gänse von 80 Jahren gesehen haben. Eine Gans, die man nicht zum Brüten läßt, legt in drey Zeiträumen oft ein Schock Eyer. Gewöhnlich aber legt sie ihre gehörige Anzahl nicht eher, als bis sie zwey Jahre alt ist. Vier geschlachtete Gänse geben ein Pfund gemeine- und sechszehn ein Pfund Pflaumfedern. Wenn man auf ein Bette 40 bis 50 Pfund rechnet, so gehören 200 Gänse dazu. Eine Stadt also, worin 200000 Menschen wohnen, braucht 40 Millionen Gänse zu ihren Schlafbetten. Das Fleisch von den Gänsen ist mehr nahrhaft und schmackhaft als gesund. Den meisten Ueberfluß an rohen Säften haben die gemästeten Gänse, weil es ihnen an Bewegung gefehlt hat. — *Klein*, *Brisson* u. a. haben die wilde und zahme Gans als zwey besondere Gattungen angenommen. Beiläufig bemerke ich hier noch den Unterschied der Gänse überhaupt von den Enten. Die

Borowsky, Thierreich, III. p. 10. *gemeine Hausgans.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 382. b. *die zahmen Gänse.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 596. b. *die zahme Gans.* p. 620. *Hausgans, gemeine Hausgans, Bauerngans, Martinsgans, Wullah.*

Hall, Vögel, p. 542. n. 645 *die Hausgans.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 87. n. 95. *die zahme Gans.*

Klein, av. p. 129. n. 2. *Anser domesticus, rusticus.*

Klein, Vorbereit. p. 238. n. 2. *Bauer-, Haus-, zahme Gans.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 135. n. 2. *zahme Gans, Martinsgans.*

Klein, Vögeleyer, p. 34. Tab. 19. fig. 1.

Briffon, ornith. II. p. 431. n. 1. *Oye domestique.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 842. n. 26. β. *Anas Anser (domesticus).*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 323. *die Hausgans.*

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 330. *die zahme Gans.*

Z z 2

Taube,

Die Gans unterscheidet sich von der Ente: 1) durch die Größe des Körpers; 2) den erhabenern Rücken; 3) den längern Hals; 4) stärkern Schnabel; und vornämlich 5) durch die Füße, welche höher, und nahe an der Mitte des Körpers gestellt sind, und dessen Gleichgewicht erhalten, daher auch die Brust der Gänse freyer und erhabener ist; dahingegen die Füße der Enten dem Hintern näher sind, und vorn das Uebergewicht zu verursachen scheinen, wie an ihrem wackelnden Gange wahrzunehmen ist. Auch in der Stimme ist ein merklicher Unterschied. *Klein* und *Briffon* haben daher aus Gänsen und Enten zwey besondere Geschlechter gemacht.

- Taube*, Slavon. und Syrm. I. p. 40. *Gänse*.
Schlözer, Erdbeschreib. von Amerika, p. 150.
Gänse.
Georgi, Reise d. Rufsl. p. 482. *die gemeine Hausgans*.
Knox, Reif. n. Ceylon, p. 57. *Gänse*.
Molina, Naturgesch. von Chili, p. 210. *Gänse*.
Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 138. *die Gans*.
Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffnung, Edit. in 4. p. 387.
die Gänse.
Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 167.
 n. 4. b. *zahme Gans*.
 Naturf. XII. p. 133. n. 73. *die zahme Hausgans*.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 62. n. 69.
die Gans.
Sander, ökon. Naturgesch. II. p. 19. *die Gans*.
Walther, ökon. Naturgesch. p. 130. *die Gans*.
Geoffroy, mat. med. VII. p. 316. *die Haus- oder zahme Gans*.
Krünitz, Encykl. XVI. p. 21. *zahme Gans, Lichtgans*.
Zückert, Speisf. a. d. Thierr. p. 99.
 Berlin. Samml. VII. p. 497.
Loniceri, Kräuterbuch, p. 644. *Gansß*.
Ludovici, Kaufmannslex. II. p. 1503.
André u. Bechstein, Spatzierg. III. p. 350. *die zahme Gans*.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 123. n. 7. β . *Anser domesticus*.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 112. β . *Anser domesticus*.
Linné, fn. Suec. II. p. 40. n. 114. β . *Anser domesticus*.
Linné, it. Oel. p. 83. *Anser domesticus*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 209. Anser domesticus,
zahme Gans.

Rzaczynsk. histor. nat. Polon. I. p. 301. Auct.
p. 432.

Kramer, Austr. p. 338. n. 4. β . Anser domesticus;
einheimische Gans.

Mohring, av. gen. p. 60. n. 61. Anas.

Jonston, av. p. 138. Anser domesticus.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 22. 59. Anser.

Varro, de re rust. L. 3. c. 10. Anser.

Columella, de re rust. L. 8. c. 13. Anser.

Palladius, de re rust. L. I. c. 30. Anser.



Tiling, obs. de periculof. symptom. ex morfu an-
seris etc. in den Eph. Nat. Cur. Dec. II. An. 2.
obs. 75.

Schulze, de vivacitate anserum; *das.* Dec. I. an. 6.
et 7. obs. 169. p. 233.

Gifeter, de penna anserina monstrosa; *das.* an. 2.
obs. 80. p. 155.

Lachmund, de anseri domestico cristato; *das.*
an. 6. et 7. obs. 182. p. 241. c. f.

Id. de cranio anseris monstroso; *das.* dec. I. an.
4. et 5. obs. 181. p. 226.

Paulini anser cornutus; *das.* dec. II. an. 6. app.
p. 19.

Böhm, von vierfüßigen Gänsen; Bresl. Natur-
und Kunstgesch. 1726. p. 713.

Polifus, de anserculo quadrupede; Eph. nat. cur.
dec. II. an. 4. obs. 41. p. 100.

Menzel, de tribus in uno anseri cordibus; *das.*
dec. I. an. 9. et 10. obs. 108. p. 267. c. fig.

Bartholin. ex anserino sterno de hyeme praesa-
gium; Hist. anat. Cent. 5. hist. 67. p. 137.

- Peyer*, de ventriculo et renibus anserinis; Eph. nat. cur. dec. II. an. I. obs. 85. 86. p. 199.
- Von Gänfen, in deren Magen Gold gefunden worden; f. Bresl. Nat. u. Kunstgesch. 31. Verh. p. 153.
- Hanow*, von einem mit Federn bewachsenen Gänsemagen; Merkwürdigk. d. Nat. I. p. 255.
- Gedanken über die Haltung der Gänse auf den Gütern; Lpzg. Samml. IX. p. 392.
- Hannöv. Samml. 1757. p. 670. et 941. — Hannöv. Beytr. 1762. p. 631. et 1255. — Wittenberg. Wochenbl. I. p. 337. — warum die jungen Gänse im Jun. und Jul. so häufig hinfallen, und von den Mitteln dagegen.
- Mus. russ. et commun. III. p. 143. — *Hirsch*, gesammelte Nachr. der ökon. Gesellschaft in Franken, II. p. 319. — Wittenb. Wochenbl. 1768. p. 245. — Gaz. litt. de Berlin, 1770. p. 390. — Berlin, Samml. III. p. 398. — Neueste Mannichfalt. II. p. 40. — Fränkische Samml. II. p. II. — Gel. Beytr. zu den Braunschw. Anz. 1767. St. 101. — Lpz. Intelligenzbl. 1767. p. 263. 1776. p. 347. — Oekonom. Nachr. IV, p. 305. *vom Mästen der Gänse.*
- Hannöv. Magazin, 1767. St. 69. — Lpz. Intelligenzbl. 1772. p. 317. — Leipzig. Samml. III, p. 802. — Götting. gemeinnütz. Abhandl. 1772. p. 145. — Oekon. Nachr. der patriot. Gesellsch. in Schlesien, 1774. p. 179, 1778. p. 314. — *Rammelt*, gemeinnütz. Abh. II. p. 252. — *Paulet*, Beytr. zu einer Gesch. der Viehseuchen, II, p. 266. — *von den Krankheiten der Gänse.*
- Allg. Haushalt. u. Landwissensch. I. p. 845 ff.

65. MONTANA. *Die Berggans.*

Kolbe, Vorgeb. d. g. H. Edit. in 4. p. 388. n. 5.
die Gebürg-Gans.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 841. n. 25. Anas
(Montana) capite, collo alarumque pennis ru-
bro-viridibus.

66. CANA. *Die grauköpfige Gans.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 840. n. 22. Anas
(Cana) ferrugineo-rufa, capite colloque gri-
seis, speculo alarum viridi, humeris albis.

67. RUFICOLLIS. *Die Rothhalsgans.* (3)

Pennant, arct. Zool. II. p. 532. C. *die Rothhals-
gans.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 688. *die
Rothhalsgans.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 129. n. 114. *die Rothhalsgans.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 841. n. 23. Anas
(Ruficollis) supra nigra, collo rufo, corpore
subtus macula ante oculos strigaeque longitudi-
nali colli utrinque alba.

Pallas, Naturgesch. merkwürd. Th. VI. p. 24.
die Rothhalsgans. Tab. 4.

Pallas, Reise, III. p. 476. *Rothhalsgänse.*

Pallas, Reif. III. Anh. p. 12. n. 3. Anser *ruficol-
lis*, Ostiacis *Tschakwoi* (a voce); Samoiedis
Tschagan.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 11. *die bunte Nord-
gans.* (Anser pulchricollis.)

Catal. mus. Petropol. p. 419. n. 62. Anser ferus
minor, niger, collo rufo.

Lz 4

Catal.

(3) Länge 1 Fuß 10 Zoll. Flügelweite 3 Fuß 10 Zoll. Ge-
wicht 3 Pfund Troy. *Pennant.*

Catal. mus. Petropol. p. 406. n. 628. Anser *Chafsarka* Russorum, *Tschakwoi Affjach* Lappo-
nibus.

Schwed. Abhandl. XLI. p. 24. Anas ruficollis.
Sander, Gröfse und Schönheit in der Natur, I.
p. 262. *eine Gans mit rothem Hals.*

Decouv. Russ. II. p. 19.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 159. not. y. et e.

46. CASARCA. *Die rothe Ente.* (4)

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 101. n. 39. a. *die astra-
canische Ente.*

Latham, Syn. Supplem. p. 273. Ryddy Goose.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 841. n. 24. Anas
(Casarca) rufa, remigibus rectricibusque ni-
gris, speculo alari albo.

Pallas, nord. Beyträge, III. p. 12. *die so genann-
te rothe Ente.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 9. *die kleine wilde
Gans, Kasarka genannt.*

Georgi, Reif. d. Russl. II. p. 482. *rothe Ente.*

Schwed. Abhandl. XLI. p. 24. Anas rutila.

Lichtenberg, Magaz. f. d. Neueste u. f. w. II. 1.
p. 107. *die so genannte rothe Ente.*

Dec. Russ. I. p. 417. 464.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 149. Anas
Casarca.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 257. n. 8.
die rothe Ente.

10. AEGYPTIACA. *Die ägyptische Gans.*

Müller, Naturfystem, II. p. 284. n. 10. *egyptische
Gans.*

Briffon, ornith. II. p. 437. n. 9. Oye d'Egypte.

Latham,

(4) Länge, nach *Lepechin*, 1 Fuß, 8 Zoll, 2 Linien; Flügelweite
2 Fuß 5 Zoll.

Latham, Syn. III. 2. p. 453. n. 16. Egyptian Goose.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 840. n. 21. Anas (Aegyptiaca) rostro subcylindrico, corpore undulato, vertice albo, speculo alari candido, fascia nigra.

Schwedische Abhandlung, XLI. p. 24. Anas aegyptiaca.

Hermann, tab. affin. anim. p. 158. o. Anas aegyptiaca.

β. *Latham*, Syn. III. 2. p. 454. n. 16. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 840. n. 21. β.

68. SEGETUM. *Die Bohnengans.* (5)

Pennant, arct. Zool. II. p. 507. n. 390. *die Bohnengans.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 620. n. 3. *die Bohnengans.*

Bechstein, Musterung schädli. Thiere, p. 120. n. 2. *die Bohnengans.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 843. n. 28. Anas (Segetum) cinereo-fusca, subtus albida, alis griseis, tectricibus maioribus remigibusque secundariis apice albis.

69. BOREALIS. *Die Gulaudente.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 593. E. *die Gulaudente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 843. n. 30. Anas (Borealis) rostro angusto, capite viridi nitente, pectore abdomineque albis.

(5) Länge 2 Fufs 7 Zoll; Gewicht 6 1/2 Pfund. *Pennant.*

II. ERYTHROPUS. Die Bernackelgans. (6)

Müller, Natursystem, II. p. 284. n. II. Rothfußgans.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 226. n. *.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 623. n. 5. die Bernackelgans. p. 624. schottische Gans, Rothfußgans.

Onomat. hist. nat. I. p. 411. der wilde Rothfuß.

Klein, av. p. 130. n. 8. Anser Brenta. (Mit *Anas Bernicla* verwechselt.)

Briffon, ornithol. II. p. 441. n. 14. Bernacle.

Gesner, Vögelb. p. 73. Branta oder Bernicla.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 843. n. 31. Anas (Erythropus) cinerea, supra nigro alboque undulata, collo nigro, facie abdomineque albis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 43. n. 73. die Rothfußgans.

Pennant, arct. Zool. II. p. 513. n. 397. die Bernackelgans.

Pallas, Reise, Ausz. II. p. 6. sogenannte Kasarben. (Anser erythropus.)

Pallas,

(6) Länge, nach Pennant, 2 Fufs 1 Zoll; Flügelweite 4 Fufs 5 Zoll. Gewicht 5 Pfund. Ich muß hier dasjenige wiederholen, was ich bereits in der 9ten Anmerkung bey *Anas albifrons*, n. 64. gesagt habe. Ich habe die Synonymen so gut geordnet, als ich gekonnt habe. Aber die ungeheure Verwechselung der deutschen und ausländischen Synonymen bey der *Bläffengans* der *Bernackelgans*, und der *Brenigans*, und die so wenig übereinstimmenden Beschreibungen und Bestimmungen der Naturforscher bey diesen Gattungen, machen es fast unmöglich hier überall etwas mit Gewisheit anzugeben. Die grössten und bewährtesten Ornithologen sind hier nicht einig. Auch die Lathamschen Synonymen weichen oft von den Linneischen und Gmelinschen ab, und wenn man beym Nachschlagen alle vergleicht, findet man wieder neue Schwierigkeiten.

Pallas, Reif. Ausz. III. p. 474. *Nordgänse.*

Pallas, nord. Beytr. III. p. II. *die gemeine rothfüßige Nordgans oder Kasarka.*

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. VI. p. 31. *die Bernakelgans.*

Lepechin, Tagebuch d. ruffisch. Reif. III. p. 13. *Nordgänse oder Kasarken.*

Fabric. Reif. nach Norwegen, p. 348. *Anas Erythropus.*

Georgi, Rufsl. II. p. 482. *die weißköpfige kleine Gans.*

Olaassen, Reise durch Island, I. p. 34. 292. *Helting oder Bernicla.*

Schwed. Abhandl. XII. p. 24. *Anas Erythropus.*

Stralfund, Magazin, I. p. 148. *die gelbfüßigen canadischen Gänse?*

Leem, Nachricht von den Lappl. p. 140. *eine Art kleiner wilder Gänse?*

Naturf. XXV. p. 9. n. 3. *Anas Erythropus?*

Linne, Syst. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 5. *Anser erythropus.*

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 123. n. 8. *Anas (Erythropus) cinerea, fronte alba.*

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 113. *Anas (Erythropus) cinerea, fronte alba.*

Charleton, onomast. zoic. p. 98. n. 4. *Bernicla.*
Philos. Transact. II. p. 853. XII. p. 923.

β. *A. cinerea*, marginibus pennarum albidis, subtus et uropygio alba, capite anteriore et guttore fulvis, vertice et cervice nigricantibus, collo subtus et pectore fuscis. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 844. n. 31. β.

Briffon, ornithol. II. p. 442. n. 15. *Bernicla minor. Petite Bernacle.*

Raj. Syn. p. 137. A. 7. Brenthus.

Will. orn. p. 361. Rat Goose or Road Goose.

12. CAERULESCENS. *Die blauffittige Gans.*

Müller, Naturfyst. II. p. 285. n. 12. *blaue Gans.*

Halle, Vögel, p. 550. n. 655. *die blaue Norden-*
gans.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 47. *die blaugeflügelte*
Gans.

Pennant, arct. Zool. II. p. 508. n. 392. *die blau-*
fittige Gans.

Klein, verb. Vögelhist. p. 138. n. 15. *blaue Gans.*

Briffon, ornitholog. II. p. 434. n. 5. Oye sauvage
de la Baye de Hudson.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 838. n. 13. Anas
(Caerulescens) grisea, subtus alba, tectricibus
alarum dorsoque postico caerulescentibus.

β. A. alba, collo postice imo interscapulio scapulari-
busque plumbeis, tectricibus alarum caudae-
que caerulescentibus. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 837. n. 13. β.

γ. A. grisea fusco-varia, capite colloque supremo
albis, postice nigro variis, tectricibus alarum
caudaeque caerulescentibus. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 837. n. 13. γ.

13. BERNICLA. *Die Brentgans.* (7)

Müller, Naturfyst. II. p. 285. n. 13. *Ringelgans.*

Borowsky, Thierreich, III. p. II. n. 3. *die schotti-*
sche Gans.

Blumen-

(7) Wegen der häufigen Verwechslungen, die sich in den Synonymen und Beschreibungen bey dieser und einiger der vorhergehenden Gattungen finden, beziehe ich mich auf die vorige Note und auf die Anmerkung bey *Anas albifrons*, n. 64.

- Blumenbach*, Handb. d. Naturgesch. p. 226. n. 4.
 Anas (Bernicla) fusca, capite, collo pectore-
 que nigris; collari albo; *Baumgans*, *Roth-*
gans.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 621. n. 4.
 die *Brentgans*. p. 623. *Ringelgans*, *Berna-*
kelgans, *schottische Gans*, *Rotjes*, *Rotges*.
- Halle*, Vögel, p. 548. n. 650. die *Baumgans*,
Nonnengans, *Rothgans*.
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
 II. p. 98 n. 96. die *Baumgans*.
- Onomat. hist. nat. I. p. 409. die *schottische Gans*,
Rothgans.
- Handb. d. Naturgesch. II. p. 370. die *Klostergans*,
Bernakel.
- [*Klein*, av. p. 130. n. 8. Anas Brenta.
- Klein*, Vorbereit. p. 240. n. 8. *Brentgans*, *Baum-*
gans.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 136. n. 8. *Brentgans*.]
 Mit *Anas erythropus* verwechselt.
- Briffon*, ornitholog. II. p. 442. n. 16. Cravant.
- Gesner*, Vögelb. p. 74. *Baumgansß*; mit 1 Fig.
- Batsch*, Thiere, II. p. 376. die *schottische oder*
Baumgans.
- Pennant*, arct. Zoolog. II. p. 512. n. 16. 396. die
Brentgans.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 844. n. 32. Anas
 (Bernicla) fusca; capite colloque nigris, colla-
 ri albo.

Bock,

S. auch *Fabric*. faun. groenl. p. 67. n. 41. Im Handb. der
 Naturgesch. a. a O wird die Benennung *Nonnen-* oder *Klo-*
stergans (Oye nonnette) davon hergeleitet, weil ihr Fleisch an
 einigen Orten in der Fastenzeit zu essen erlaubt sey. — Rich-
 tiger möchte doch wohl *Jonstons* Ableitung seyn: *Monacha-*
rum ornathu, quae colorem album atro superimponunt, similis.

- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 329. n. 75.
Ringelgans, Brentgans.
- Lepechin*, Tagebuch der russ. Reif. III. p. 13. *Berniclen.*
- Pontoppidan*, Naturgesch. von Dännem. p. 167.
 n. 5. *Radgaas, Bernikel, Reyhengaas.*
- Olaffen*, Island, I. p. 292. *Hrota?*
- Leem*, Nachr. von den Lappen in Finnmarken,
 p. 145. *eine besondere Art brauner Vögel in
 der Größe einer Ente?*
- Stralfund. Magaz. I. p. 153. *Neemka?*
- Schwed. Abhandl. XLI. p. 24. *Anas Bernicla.*
 Naturf. XII. p. 135. n. 75. *Ringelgans.*
- Stopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 73. n. 84.
die Brentgans, Baumgans.
- Linné*, auserles. Abhandl. II. p. 291. n. 72. *die
 Bernikel-Gans.*
- Valentin*. mus. museor. I. p. 494. *Anas Scoticus
 verus; Bernicla dictus; c. fig.*
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 22. n. 6. *Bernicla.*
- Linné*, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 124. n. ii. *Anas
 (Bernicla) fusca, capite colloque nigris, col-
 lari albo.*
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 114. *Anas
 (Bernicla) fusca, capite, collo pectoreque ni-
 gris, collari albo. (dän. Ray-Gaas, Rad-Gaas,
 norweg. Raat-Gaas, Gaul, Gagl; isländisch:
 Helsingen.)*
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 15. *Anas
 (Hrota) grisea, capite colloque nigris; (nor-
 weg. Gaul; isländisch: Hrota, Mar-Giaes,
 Gagl)?*
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 213. *Anser arborum;
 ein Baum-Gans, Baum-Endle.*
- Charleton*, onomast. zoic. p. 8. n. 3. *Branta.*

Jonston, av. p. 141. *Branta* seu *Bernicla*. *Gal-
lis Cravant* et *Oye Nonnette*, *Ifidoro Barliata*,
Alberto Barbates, *Hollandis Rotgansen* di-
citur.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 258. *die
Baumgans*.

70. TORQUATA. *Die Gans mit dem Hals-
bande.*⁽⁸⁾

Latham, Syft. ornith. II. p. 849. n. 45 β . *Anas
nigra*, temporibus fascia oculari et suboculari
et torque albis, lateribus colli castaneis.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 688.

14. CANADENSIS. *Die canadische Gans.*⁽⁹⁾

Müller, Naturfyft. II. p. 286. n. 14. *canadische*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 10. n. c. *die wilde
canadische Gans*.

Halle, Vögel, p. 547. n. 648. *die kanadenser
Gans*.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 98. n. 97. *die canadische Gans*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 505. n. 389. *die cana-
dische Gans*.

Klein, av. p. 129. n. 6. *Anser Canadensis*.

Klein, Vorbereit. p. 239. n. 6. *kanadenser Gans*.

Klein,

(8) Nach *Latham* eine Varietät von *Anas Histrionica*; nach
Bechstein eine Varietät von *Anas Ruscollis*.

(9) Unzählige Heerden erscheinen jährlich im Frühjahr, in der
Hudsonsbay, ziehen um zu brüten weiter gegen Norden,
und kehren im Herbst nach Süden zurück. Eine große An-
zahl brütet auch in der Hudsonsbay. Die Engländer tödten
dieselbst in guten Jahren 3 bis 4000, die sie einsalzen und auf-
bewahren. Die man im Herbst fängt, wenn die Alten mit
ihren Jungen zurückkommen, werden nicht gerupft, sondern
man läßt sie mit den Federn gefrieren, um frisches Fleisch
im Winter zu haben.

Klein, verbeff. Vögelhiift. p. 136. n. 6. *canadenfer Gans*.

Briffon, ornithol. II. p. 433. n. 4. Oie fauvage de Canada.

Latham, Syft. ornithol. II. p. 838. n. 17. Anas (Canadensis) cinerea, capite colloque nigris, genis gulaque albis.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 84. *die canadener Gans*. (Fig. Catesb.)

Seligmann, Vögel, V. Tab. 46. *die canadifche Gans*. (Fig. Edw.)

Linné, auserl. Abhandl. II. p. 279. n. 5. *die canadifche Ente*.

Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 123. n. 9. Anas (Canadensis) fusca, capite colloque nigro, gula alba.

Fabric. fn. groenl. p. 66. n. 2. Anas canadensis.

Dorndorf, Handb. der Thiergefch p. 258. n. 10. *die canadifche Gans*.

15. MOLLISSIMA. *Die Eidergans*. (10)

Müller, Naturfyft. II. p. 287. n. 15. *Eyder-Gans*,

Leske, Naturgefch. p. 287. n. 3. *die Eidergans*.

Borowsky,

- 10) Flügelweite 3 Fuß. Gewicht des Weibchen 3½ Pfund. Schwimmt, taucht und fliegt vortrefflich. Nährt sich von Fischen, Muscheln, Schnecken, Insekten, z. E. Krebsen, kleinen Wasserwürmern und Seegräsern; holt auch vom Boden die Eingeweide der Fische, welche von den Fischern in die See geworfen werden, herauf. Nistet in Felsenklippen, auch im Grase, unter Wachholderbüschen. Legt dreymal Eyer, das erste mal 5, das andere mal 3, das dritte mal mehrentheils nur *eins*, aber jedes mal in ein anderes Nest. Die erste Brut geschieht zu Ende des Junius und Anfang des Julius. In Island werden dem Vogel die beyden ersten male die Eyer mit sammt den Federn, an andern Orten aber nur das erste mal weggenommen. Die ganze Legezeit dauert 6

bis

Borowsky, Thierreich, III. p. 5. n. 1. *der Eider-
vogel.* Tab. 97.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 226. n. 5.
Anas (Mollissima) rostro cylindrico, cera po-
stice bifida, rugosa; *der Eidervogel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 384. n. 5. *die Eider-
gans.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 625. n. 6.
die Eidergans. p. 636. *Eidervogel, Eider, St.
Kuthbertsente.* Tab. 21. 22.

Fanke, Naturgesch. I. p. 315. *der Eidervogel.*

Ebert, Naturl. II. p. 69. *der Eidervogel.*

Halle, Vögel, p. 549. n. 652. *die Eidergans.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere,
II. p. 99. n. 98. *der Eidervogel.*

Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 506. *Eider-
gans.*

Onomat. histor. nat. I. p. 421. *die Eydergans.*

Klein, av. p. 130. n. 10. Anas, plumis mollissimis.

Klein, Vorber. p. 241. n. 10. *Eidergans.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 137. n. 10. *Eider-
gans.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 514. n. 398. *die Ei-
dergans.*

Beckmann, Naturhist. p. 43. n. c. *der Eider.*

Briffon,

bis 7 Wochen. Das Weibchen brütet 28 Tage. Das Alter
dieses Vogels erstreckt sich auf 25 bis 30 Jahr. Die Dunen
aus einem Neste wiegen etwa $3\frac{1}{4}$ Unzen. Sie sind so ela-
stisch, daß man zur Ausstopfung eines ganzen Bettes nur et-
wa 5 Pfund nöthig hat. Die isländische Compagnie verkauft
beynahe jährlich für 4000 Thaler Dunen nach Danemark und
Schleswig. In Island und Norwegen sind die Eidergänse in
manchen Gegenden halb gezähmt, und nisten in Menge nahe
an den Wohnungen.

Briffon, ornitholog. II. p. 440. n. 13. Oie à duvet ou Eider.

Batsch, Thiere, I. p. 377. *der Eydervogel*.

Latham, Syn. Suppl. p. 274. Eider or Cuthbert Duck.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 845. n. 35. Anas (Mollissima) rostro cylindrico, cera postice basi rugosa.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 91. *die große weiße und schwarze Ente*.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 330. n. 76. *die Eydergans*.

Phipps Reif. n. d. Nordpol, p. 97. *der Eider*.

Uno von Troil, Reif. d. Isl. p. 116. *Eider*.

Olassen, Isl. I. p. 33. 119. 293 *Eidervogel*.

Cranz, Hist. von Grönl. p. 115. *der Eider Vogel*.

Egede, Besch. v. Grönl. p. 117 *der Eidervogel*.

Pennant, Reif. n. Schottl. I. p. 42. *Eider Enten, St. Cuthberts Enten*.

Tremarec, Reif. n. d. Nordsee, p. 76.

Fabricius, Reisen n. Norwegen, p. 294. *Eidervogel*.

Leem, Lappl. p. 140. *Aedderfugle*.

Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 168. n. 6. *Eddergaas*.

Pontoppidan, Naturhistorie von Norwegen, II. p. 132. *Edder, Aedder Aedderfugl*; mit 1 Fig.

Linné, Reif. d. Oel. und Gothl. p. 230.

Debes, Hist. der Inf. Feroë, p. 122

Schwed. Abh. XLI. p. 24. Anas mollissima.

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 193. n. 18. *die Eidergans*.

Oekon. Zool. p. 71. n. 11. *die Eydergans*.

Krünitz, ökon. Encyklop. X. p. 331. *Eidergans*.

Meidinger, Vorles. I. p. 123. *die Eidergans*.

Sander,

Sander, über die Größe u. Schönheit in der Nat.

I. p. 251. *Eydergans*.

Berlin. Samml. I. p. 96. VII. p. 156. *Eydervogel*.

Neueste Mannichfalt. I. p. 177. II. p. 123.

Beckmann, physikal. ökonom. Bibl. III. p. 244.
VI. p. 188.

Hübner, Handlungslex. p. 61f.

Bohn, Waarenlager, p. 255.

Ludovici, Kaufmannslex. II. p. 115f.

Brünnich, natürl. Hist. des Eider-Vogels; aus dem
dän. überf. m. K. Kopenh. 1763 8.

Linné, Syst. Nat. Ed. II p. 54. *Eider*.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 92. n. 8. Anas
plumis mollissimis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 124. n. 12. Anas
(Mollissima) rostro cylindrico, cera postice
bifida rugosa.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 116. Anas
(Mollissima) rostro cylindrico, cera postice
bifida rugosa.

Bartholin, act. med. Hafn. I. p. 90. — Med. dan.
dom. p. 65.

Thorlacii diss. chorograph. hist. Island. Witt.
1661. fol. 15.

Buchanani oper. Lugd. Bat. 1725. I. p. 44.

Mus. Besler. p. 36. Avis inter Anserem et Anatem
feram media. Tab. 9. n. 6. *Abbild. des Weib-*
chens schlecht.

Sibbald. Scot. illustr. II. 3. p. 21. Tab. 18.

Downdorff, Handb. der Thiergesch. p. 258. n. 11.
die Eydergans.

16. MOSCHATA. Die Bisamente.

Müller, Natursystem, II. p. 288. n. 16. *Bisam-*
Ente.

- Leske*, Naturgeschichte, p. 287. n. 4. *die Bisamente.*
- Borowsky*, Thierreich, III. p. 11. n. 4. *die Bisamente, lybische Ente.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 386. n. 6. *die Bisamente.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 636. n. 7. *die Bisamente.* p. 633. *indianische, kairische, lybische Ente.*
- Halle*, Vögel, p. 553. n. 658. *die türkische Ente.*
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 106. n. 99. *die Bisamente.*
- Onomat. histor. nat.* I. p. 413. *die Bisamente.*
- Klein*, av. p. 131. n. 2. *Anas Indica.*
- Klein*, Vorbereit. p. 242. n. 2. *türkische Ente, fremde Ente, indianischer Endrath.*
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 138. n. 2. *türkische Ente.*
- Gesner*, Vögelb. p. 64. *indianischer Entrath; mit 1 Figur.*
- Briffon*, ornithol. II. p. 446. n. 3. *Canard musqué.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 376. 378. *die Bisamente.*
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 846. n. 37. *Anas (Moschata) facie nuda papillosa.*
- Bock*, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 330. n. 77. *Bisamente, moscowitische Ente.*
- Cetti*, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 336. *die Ente aus der Barbarey.*
- Georgi*, Reise d. Rußl. II. p. 482. *die Moschusente.*
- Naturf.* XII. p. 135. n. 76. *Bisam-Ente.*
- Hübner*, physikal. Tageb. II. p. 161. *Bisamänte.*
- Schwed. Abh.* XLI. p. 24. *Anas Moschata.*
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 74. n. 85. *die türkische Ente.*
- Linné*, Syst. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 11. *Anas moschata.*

Linne', Syst. Natur. Edit. X. I. p. 124. n. 13. Anas
(Moschata) facie nuda papillofa.

Charleton, onomast. zoic. pl. 9. n. 2. Anas Indica.
n. 3. A. Lybica. n. 4. A. Muscovitica. n. 5.
A. Cairina.

Jonston, av. p. 143. Anas Cairina, Lybica, In-
dica.

Phil. Transact. IVII. p. 348.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 259. n. 12.
die Bisamente.

71. RUF A. *Die braunköpfige Ente.* (1)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 659. n. 3.
der Rothhals.

Latham, Syn. III. 2. p. 477. n. 32. Rufous - ne-
cked Duck.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 863. n. 78. Anas
(Rufa) cinerea, capite et collo rufis, rostro,
pectore pedibusque nigris.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 72. n. 81.
der Rothhals.

72. LEUCOCEPHALA. *Die weißköpfige Ente.* (2)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 680. n. 1.
die weißköpfige Ente.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 858. n. 64. Anas
(Leucocephala) cinereo lutescens nebulosa,
fusco pulverato, corpore antice fusco, luteo-
nigro undulato, capite colloque albis, macula
verticis collarique nigris.

A a 3

Scopoli,

(1) Nach *Latham* und *Bechstein* eine Spielart von *Anas Ferina*,
p. 530. n. 31.

(2) Nach *Bechstein* eine Spielart von *Anas Glaucion* p. 525.
n. 26. Nach *Latham* gehört auch *Anas Marfa* p. 520. n. 84.
mit hierher.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 70. n. 79.
die weißköpfige Ente.

73. **MONACHA.** *Die Mönchente.*⁽³⁾

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 680. n. 2.
die Mönchente.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 847. n. 40. Anas
(Monacha) albo nigroque varia, rostro flavescente, apice nigro, speculo alarum viridi violaceo.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 71. n. 80.
die Mönchente.

74. **MELANURA.** *Die schwarzwänzige Ente.*⁽⁴⁾

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 681. n. 3.
die schwarzwänzige Ente.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 861. n. 72. Anas
(Melanura) cinerea, rostro pedibusque testaceis, vertice dorsoque rufis, remigibus rectricibusque nigris.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 72. n. 82.
die schwarzwänzige Ente.

75. **TORRIDA.** *Die schwarznackige Ente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 681. n. 4.
die schwarznackige Ente.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 845. n. 33. Anas
(Torrída) capite albo, collo supra nigro, subtus castaneo.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 75. n. 86.

76. AL-

(3) Nach *Bechstein* eine Spielart von der gemeinen Ente.

(4) Nach *Bechstein*, nebst den beyden folgenden Gattungen, bloße Spielarten der gemeinen oder Bastarde von der gemeinen und *Bisumente*.

76. ALBICANS. *Die weißstirnige Ente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 681. n. 5.
die Weißstirn.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 845. n. 34. Anas
(Albicans) supra fusca, fronte subtusque alba,
capite colloque fusco-rufis.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 75. n. 87.
die Weißstirn.

77. GEORGICA. *Die georgische Ente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 847. n. 41. Anas
(Georgica) cinereo-nebulosa, rectricibus ala-
rum cinerascens, speculo alarum viridi al-
bo maculato, remigibus rectricibusque nigri-
cantibus.

17. BAHAMENSIS. *Die bahamische Ente.*

Müller, Natursystem, II. p. 289. n. 17. *bahamische*
Ente.

Pennant, arct. Zool. II. p. 524. n. 413. *die baha-*
mische Ente.

Halle, Vögel, p. 561. n. 675. *die Bahamerente,*
mit vergoldetem Dreyecke auf der Nase.

Klein, av. p. 134. n. 18. Anas Bahamensis.

Klein, Vorbereit. p. 247. n. 18. *Bahamer.*

Klein, verbeff. Vögelhist. p. 141. n. 18. *bahamische*
Ente.

Briffon, ornitholog. II. p. 456. n. 12. Canard de
Bahama.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 855. n. 58. Anas
(Bahamensis) grisea, rostro plumbeo, macu-
la laterali fulva, macula alarum viridi lutea-
que.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 86. *die bahamische*
Ente mit bleifarbenem Schnabel.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 124. n. 14. Anas (Bahamensis) grisea, rostro plumbeo, macula laterali fulva, alarum viridi luteoque.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 158. Anas Bahamensis.

Fonston, av. p. 208. Mareca, anatis sylvestris species, sed parva.

78. BRASILIENSIS. *Die brasilianische Ente.*

Halle, Vögel, p. 566. n. 689. die braune Ente.

Briffon, ornitholog. II. p. 557. n. 13. Canard du Brésil.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 856. n. 59. Anas (Brasilienfis) fusca, subtus griseo-aurea, inter rostrum et oculum albo-flavescens, speculo alarum viridi-caeruleo nigro, subtus marginato.

Fonston, av. p. 208. Mareca, alia species.

79. ERYTHORHYNCHA. *Die rothschnäbli-ge Ente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 855. n. 57. Anas (Erythrorhyncha) fusca, subtus alba, pectore lateribus maculis fuscis, fascia alarum alba, alteraque subtus lutescente, cauda nigra.

18. ALBEOLA. *Die Gespenstente. (5)*

Müller, Naturfyst. II. p. 290. n. 18. *Weißling*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 519. n. 405. die Gespenstente.

Klein, av. p. 136. n. 33. Anas parva ex nigro et albo variegata.

Klein, Vorbereit. p. 251. n. 33. kleine schwarz- und weißbunte Ente.

Klein,

(5) *Latham* rechnet hierher auch die *Anas Bucephala* Linn. p. 521. n. 21. und nimmt die *Anas Rustica* Linn. p. 524. n. 24. für das Weibchen an.

Klein, verb. Vögelhist. p. 143. n. 33. *schwarz- und weißbunte Ente.*

Briffon, ornitholog. II. p. 481. n. 38. *Sarcelle de la Louifiane.*

Latham, Syft. ornithol. II. p. 866. n. 86. *Anas (Albeola) alba*, dorso remigibusque nigris, capite colloque caerulescente, fericeo nitente, occipite albo.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 95. *die kleine schwarz- und weiße Ente.*

Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 124. n. 15. *Anas (Albeola) alba*, dorso remigibusque nigris, capite caerulescente, occipite albo.

Philos. Transact. IXII. p. 416. n. 18.

80. **STELLERI.** *Stellers Ente.* (6)

Müller, Natursystem, Suppl. p. 102. n. 39. c. *die Stellersente.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 525. n. 415. *Stellers Ente.* Tab. 23. obere Figur.

Hermann, tab. aff. anim. p. 158. I. *Anas Stelleri.*

19. **CLYPEATA.** *Die Löffelente.* (7)

Müller, Naturyst. II. p. 290. n. 19. *Löffelente.*

Leske, Naturgesch. p. 287. n. 5. *die Löffelente.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 12. n. 5. *die Löffelente, Schildente, Spadelente.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 227. n. 7.

Anas (Clypeata) rostri extremo dilatato rotundato, ungue incurvo; die Löffelente.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 388. n. 14. *die Löffelente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 675. n. 21. *die Löffelente.* p. 677. *Schildente, (Spatelen-*

Aaa 5

te.)

(6) *Latham* rechnet sie zu *Anas Dispar* p. 535. n. 107.

(7) Flügelweite 2 Fuß 7 1/2 Zoll. Gewicht 22 Unzen.

te,) *Leppelschnute*, *Breitschnabel*, *deutscher Pelikan*, *Sefasan*; bey den Jägern *Taschenmaul*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 691. n. 161.

Pennant, arct. Zool. II. p. 517. n. 403. *die Löffelente*.

Ebert, Naturl. II. p. 70. *die Löffelente*.

Halle, Vögel, p. 558. n. 668. *die Löffelente*.

Neuer Schaupl. der Nat. V. p. 182. *Löffelente*.

Onomat. hist. nat. I. p. 418. *die Schildente*.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 371. *die Löffelente*.

Klein, av. p. 132. n. 10. *Anas latirostra*.

Klein, Vorber. p. 245. n. 10. *Löffelente*, *Breitschnabel*, *Schallente*, *Lepelgans*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 140. n. 10. *Löffelente*.

Klein, stemm. av. p. 31. Tab. 35. fig. I. a-c.

Klein, av. p. 134. n. 20. *Anas latirostra americana*.

Klein, Vorbereit. p. 248. n. 20. *aufgeworfener Breitschnabel aus Amerika*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 141. n. 20. *aufgeworfener Breitschnäbler*.

Gesner, Vögelb. p. 84. *ein großer Breitschnabel*, (*Räsgenkopff*). p. 85. *eine andere Gattung*, (*Breitschnabelkopff*).

Briffon, ornithol. II. p. 450. n. 6. *Souchet*.

Batsch, Thiere, I. p. 378. *die Löffelente*.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 856. n. 60. *Anas* (*Clypeata*) *rostri extremo dilatato, rotundato, ungue incurvo*.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 330. n. 78. *Löffelente*, *Stockente*.

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 80. n. 84. *Schildente*, *Löffelente*.

Pennant, Reis. n. Schottl. I. p. 18. *Löffelenten*.

Linné, Reis. d. Oel. und Gothl. p. 185.

Pallas,

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die breitschnäblichte Ente.*

Naturf. XII. p. 135. n. 77. *Löffel-Ente.*

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 92 *die americanische Ente mit breitem Schnabel.*

Lepechin, Tagebuch der russ. Reif. I. p. 189. III. p. 14. *Schildenten.*

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 168. n. 7. *Leffel, Kropand eller Stockand, Kropente oder Stockente.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 45. n. 76. *die Löffelente.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 63. n. 70. *die Löffel-Ente.*

Sander, Gröfse und Schönheit in der Natur, I. p. 261. *die Löffelente.*

Schneider, zool. Abh. p. 139. *Anas Clypeata.*

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 12. *Anas Clypeata.*

Limé, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 124. n. 16. *Anas (Clypeata) rostri extremo dilatato rotundato, ungue incurvo.*

Miller, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 117. *Anas (Clypeata) rostri extremo dilatato-rotunda o, ungue incurvo.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 204. *Anas latirostra; ein Löffel-Endtle, breitschnäblichte Wild-Endtle.*

Charleton, onomast. zoic. p. 9. n. 7. *Anas Platyrynchos Gesneri.*

Muf. Worm. p. 301. *Anas platyrynchos; c. fig.*

Jonston, av. p. 145. *Platyrynchi; Schellenten, Taschermaul.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 159. t. x. *Anas Clangula.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 259. n. 13.
die Löffelente.

β. Die Morente.

Halle, Vögel, p. 557. n. 667. die Morente, Fliegenente.

Klein, av. p. 132. n. 9. Anas Muscaria.

Klein, Vorbereit. p. 245. n. 9. Morente, Muck-, Fliegen-, Murentel, Muggente.

Klein, verb. Vögelhist. p. 139. n. 9. Morente.

Briffon, ornitholog. II. p. 451. n. 6. A. Souchet à ventre blanc.

Gesner, Vögelb. p. 81. Muckent; mit 1 Fig.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 205. Anas fera 17. seu minor 5. ein Muck-Endtle, Mos-Endtle, Mur-Endtle.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 857. n. 60. β. A. macula alari purpurea utrinque nigra albaque, pectore rufescente.

Jonston, av. p. 145. Anas muscaria.

γ. Die Tempatlahoac.

Latham, Syn. III. 2. p. 511.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 857. n. 60. γ. Anas fera boschas mexicana Briff.

Briffon, ornithol. II. p. 449. n. 5. Canard sauvage du Mexique.

81. MEXICANA. Die mexikanische Löffelente. (Yacapatlahoac.)

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 857. n. 61. Anas (Mexicana) supra nigro fulvo alboque varia, subtus fulva, tectricibus alarum minoribus albis, macula alarum viridi aurea.

Briffon, ornitholog. II. p. 452. n. 7. Souchet du Mexique.

82. RUBENS. *Die rothbrüstige Löffelente.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 857. n. 62. Anas
 (Rubens) fusca, iugulo et pectore rubro-fuscis,
 speculo alarum purpureo-albo-maculato,
 cauda brevi alba.
83. JAMAICENSIS. *Die jamaicaische Löffelente.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 857. n. 63. Anas
 (Jamaicensis) fusco croceo ferrugineoque varia,
 dorso, alis caudaque fuscis, capite superiore nigro,
 subtus cum gula albo maculis nigris.
84. MERSA. *Die Ruderente.*⁽⁸⁾
Müller, Naturfyst. Suppl. p. 102. n. 47. *die Ruderente.*
Pallas, Reif. Ausz. II. Anh. p. 15. n. 29. Anas
 mersa. Tab. H.
85. SCANDIACA. *Die lappmärkische Ente.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 536. M. *die lappmärkische Ente.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 859 n. 68. Anas
 (Scandiaca) spadiceo-fusca, rostro ampliato,
 corpore supra nigro, linea alari, pectore et abdomine albis.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 16. n. 13. Anas
 (Skorra) supra fusca, punctis confertis; taenia
 alarum obliqua, maculaque utrinque ad basin
 rostri albis, hypochondriis ferrugineis.
Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken,
 p. 140. *Skoarra.*
20. STREPERA. *Die Schnatterente.*
Müller, Naturfystem, II. p. 291. n. 20. *Schnatterente.*
Borowsky,

(8) Ist, nach *Latham*, mit *Anas leucocephala*, p. 516. n. 72. einerley.

- Borowfsky*, Thierreich, III. p. 12. n. 6. *die Schnarr-
ente.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 386. n. 7. *die Schnat-
terente.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 642. n. 9.
die Schnatterente. p. 644. *Schnarrente, graue
und braune Ente.*
- Halle*, Vögel, p. 555. n. 663. *die Schnarrente.*
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 107. n. 100. *die Schnatterente.*
- Onomat. hist. nat.* I. p. 415. *die graue oder brau-
ne Ente.*
- Pennant*, arch. Zoolog. II. p. 536. L. *die Schnat-
terente.*
- Klein*, av. p. 132. n. 6. *Anas fera 10. seu strepera.*
- Klein*, Vorbereit. p. 244. n. 6. *Schnarrente, Mit-
telente.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 139. n. 6. *Schnarr-
ente.*
- Briffon*, ornithol. II. p. 452. n. 8. *Chipeau.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 378. *die Schnatterente.*
- Gesner*, Vögelb. p. 86. *ein Leiner.*
- Latham*, Syst. ornithol. I. p. 859. n. 69. *Anas
(Strepera) speculo alarum rufo nigro albo.*
- Bock*, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 331. n. 79.
Schnarr-, Schnatterente.
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 80. n. 77.
Schnatterente.
- Cetti*, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 338.
n. 90. *die Schnatterente, Lärmente.*
- Pontoppidan*, Naturgesch. v. Dännemark, p. 168.
n. 8. *Knarand.*
- Naturforsch. XII. p. 136. n. 78. *Schnatterente.*
- Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. *Anas strepera.*
- Linné*, Syst. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 20. *Strepera.*
Linné,

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 125. n. 15. Anas
(Strepera) macula alarum rufa, nigra alba.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 118. Anas
(Strepera) speculo alarum rufo, nigro albo.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 202. Anas fera 10. seu
strepera; *Scherr-Endtin*.

Jonston, av. p. 145. Anas platyrhynchos rostro ni-
gro et plano.

Donndorf, Handb. der Thiergesch. p. 260. n. 14.
die Schnatterente.

86. FALCARIA. *Die Sichelente.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 534. I. die Sichelente.
Tab. 23. untere Figur.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 860. n. 70. Anas
(Falcaria) cristata, corpore cano fuscoque va-
riegato, pectore squamato undulato, fronte,
gula, torque colli fasciaque alarum albis.

Pallas, Reise, Ausz. III. Anh. p. 12. n. 34. Anas
falcaria; Mongolis Boro-Nogossun, et Char-
tologoi-Nogossun.

21. BUCEPHALA. *Die dickköpfige Ente.* (9)

Müller, Naturf. II. p. 291. n. 21. Dickkopf.

Halle, Vögel, p. 567. n. 694. die dickköpfige
Cardinalente.

Klein, av. p. 134. n. 19. Anas minor, capite pur-
pureo.

Klein, Vorbereit. p. 247. n. 19. Purpurköpfchen
mit weißen Backen.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 141. n. 19. Büffels-
kopf.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 90. die kleine Ente
mit purpurfarbenem Kopf.

Briffon,

(9) Nach *Latham* mit *Anas Apeola*, p. 517. n. 18, einerley.

- Briffon*, ornitholog. II. p. 454. n. 10. Canard d'hyver.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 46. n. 77. *der Dickkopf*.
Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde,
VII. p. 455. n. 27. *der Dickkopf*.
- Linné*, auserl. Abh. II. p. 279. n. 6. *die Büffelkopf-Ente*.
- Linné*, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 125. n. 19. Anas (Bucephala) albida, dorso remigibusque nigris, capite supra infraque tumido fericeo nitente.
- Hermann*, tab. affin. animal. p. 152. Anas Bucephala.

22. DOMINICA. *Die Ente von St. Domingo.*

- Müller*, Natursystem, II. p. 292. n. 22. *dominische Ente*.
- Briffon*, ornithol. II. p. 484. n. 42. Sarcelle de St. Domingue.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 874. n. 102. Anas (Dominica) rufa, capite anteriore fuliginoso, speculo alarum candido, rectricum scapis aterrimis.

87. SPINOSA. *Der Stachelschwanz.*

- Latham*, Syst. ornith. II. p. 874. n. 103. Anas (Spinosa) fusco-nebulosa, genis gulaque albis, vertice fascia per oculos alteraque maxillari utrinque nigris, rectricibus mucronatis.

88. AFRICANA. *Die afrikanische Ente.*

- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 875. n. 105. Anas (Africana) dorso, alis caudaque nigris, capite, collo pectore supremo abdomineque fuscorufis, macula pectoris inferioris fasciaque alarum albis.

89. MADAGASCARIENSIS. *Die madagascarische Ente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 875. n. 105. Anas (Madagascariensis) obscure viridis, facie ultra oculos, gula abdomineque albis, iugulo, imo pectore et lateribus ferrugineis fusco-undulatis, infra aures macula ovata viridi.

90. COROMANDELIANA. *Die Ente von Coromandel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 875. n. 106. Anas (Coromandeliana) alba, vertice, dorso, alis caudaque aeneo-fuscis, collo maculis striisque nigricantibus, macula alarum alba.

91. MANILLENSIS. *Die manillische Ente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 875. n. 107. Anas (Manillensis) fusca, capite anteriore, gula iugulique parte suprema albis, abdomine albo lunulis nigris, remigibus rectricibusque schiffi colore.

92. FORMOSA. *Die schöne Ente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 876. n. 108. Anas (Formosa) fusca, vertice nigro albo marginato, gula rufescente nigro maculata, alarum speculo nigro testaceo-marginato, anterieus macula obliqua viridi nitente insignito.

β. A. fusca, vertice nigro, capite lateribus fusco-flavescentibus, pone oculos viridi macula incurvata nigra. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 876. n. 108. β.

93. HINA. *Die chinesische Ente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 876. n. 109. Anas (Hina) regione oculorum viridi,

23. CLANGULA. Die Quackente. ⁽¹⁰⁾
 Müller, Natursystem, II. p. 292. n. 23. Quacker-
 Ente.
 Leske, Naturgesch. p. 288. n. 6. die Quackerente.
 Bechstein, Naturgesch. I. p. 386. n. 8. die Quack-
 ente.
 Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 645. n. 10.
 die Quackente. p. 647. Kobel-ente, Quackeren-
 te, Klangente, Hohle-ente, Dickkopf; das Mär-
 chen; Köllje; das Weibchen: Köllje-Quene
 (Straufsente) Vieräuglein.
 Hall, Vögel, p. 559. n. 671. die Baument-ente, gold-
 äugige Ente.
 Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
 II. p. 107. n. 101. die Kobelente, Straußente.
 Pennant, arch. Zoolog II. p. 518. n. 507. die Ko-
 belente.
 Neuer Schauplatz der Natur, II. p. 602. n. 12.
 Schreyer, Goldäuglein.
 Onomat. hist. nat. I. p. 417. die Klangente, Hohl-
 ente.
 Klein, av. p. 133. n. 13. Anas Clangula.
 Klein, Vorbereit. p. 246. n. 13. Golden Aenglein.
 Klein, verbesserte Vögelhist. p. 140. n. 13. Golden
 Aenglein.
 Klein, av. p. 135. n. 27. Anas Platyrinchos.
 Klein, Vorbereit. p. 250. n. 27. Vieräuglein.
 Klein, verbess. Vögelhist. p. 142. n. 27. Vier-
 äuglein.
 Brisson, ornith. II. p. 470. n. 27. Garrot.
 Gesner, Vögelb. p. 82. Clangula oder Klünger.
 Latham, Syst. ornithol. II. p. 867. n. 87. Anas
 (Clangula) nigro alboque varia, capite tumido
 violaceo, finu oris macula alba.

Beseke,

(10) Flügelweite 31 Zoll. Gewicht 2 Pfund. Pomm.

- Beseke*, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 46. n. 78.
die Quackerente.
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 80. n. 83.
Quackente.
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 332. n. 80.
Quakerente.
- Lepechin*, Tageb. d. russ. Reis. III. p. 14. *Klap-
perenten.*
- Linné*, Reis. d. Oel. u. Gothl. p. 56.
- Pallas*, nord. Beytr. IV. p. 14 *die Brillenente.*
- Pontoppidan*, Naturgesch. von Dännem. p. 168.
n. 10. *Hvinand, Blankekniv.*
- Pontoppidan*, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 126.
Hvin- oder Quin Ander.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 64. n. 71.
das Goldäuglein.
- Naturf. XII. p. 136. n. 79. *Quackerente.*
- Schwed. Abh. XLI. p. 23. *Anas Clangula.*
- Sander*, Gröfse u. Schönheit in der Nat. I. p. 261.
die Quackerente.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. II. p. 54. *Clangula.*
- Linné*, Syst. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 19. *Clan-
gula.*
- Linné*, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 125. n. 20. *Anas
(Clangula) nigro alboque varia, capite tumido
nigro-viridi, sinu oris macula alba.*
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 14. n. 119. *Anas
(Clangula) nigro alboque varia, capite tumido
violaceo, sinu oris macula alba.*
- Kramer*, Austr. p. 341. n. 13. *Anas nigro albo-
que variegata, capite nigro viridi, sinu oris
alba macula; Eiß-Ente.*
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 200. *Anas fera 6. seu
cristata; ein Strauß-Endte, Kobel-Endte.*
- Phil. Transact. IXII. p. 417. n. 48.

Herrmann, tab. affinit. animal. p. 158. 159. Anas Clangula.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 260. n. 15. die Quackente.

24. RUSTICA. Die graue Halbente. (1)

Müller, Naturfyst. II. p. 293. n. 24. graue Halbente.

Klein, av. p. 134. n. 22. Anas minor ex albo et fusco varia.

Klein, Vorbereit. p. 249. n. 22. Graukopf mit weißen Backen.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 142. n. 22. Graukopf.

Briffon, ornitholog. II. p. 284. n. 39. Sarcelle de la Caroline.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 867. n. 86. β. A. fusco cinerea, macula aurium alarumque alba.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 96. die kleine weiße und braune Ente.

Fischer, Naturgesch. von Livl. p. 80. n. 78. Graukopf.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 135. n. 21. Anas (Rustica) fusco-cinerea, macula aurium alarumque alba.

25. PERSPICILLATA. Die Brillenente. (2)

Müller, Naturfyst. II. p. 293. n. 25. Brillente.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 516. n. 402. die schwarze Ente.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 475. n. 5. die Brillenente.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 143. n. 36. schwarze Ente mit weißer Platte.

Briffon,

(1) Nach *Latham* das Weibchen von *Anas Albeola*, p. 517. n. 18.

(2) Flügelweite 35 Zoll. Gewicht 2 Pfund, 2 Unzen. *Penn.*

Briffon, ornithol. II. p. 472. n. 30. grande Ma-
creuse de la Baye de Hudson.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 847. n. 42. Anas
(*Perspicillata*) nigra, vertice nucaque albis,
macula nigra rostri pone nares.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 125. n. 22. Anas
(*Perspicillata*) nigra, vertice nucaque albis,
macula nigra rostri pone nares.

Philos. Transact. IXII. p. 417.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 260. n. 16.
die Brillenente.

26. GLAUCION. *Die Spatelente.*

Müller, Natursystem, II. p. 293. n. 26. *Breit-*
schnabel.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 677. n. 22.
die Spatelente. p. 679. *Breitschnäbel, breit-*
schnäblige Enten, Löffelenten, Leppelschnuten.
(*Lepegänse*) *Schallenten, Schellenten, Blau-*
augen.

Halle, Vögel, p. 565. n. 686. *die Ringente.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 106. n. 102. *die Löffelente.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 533. F. *die Spatelente.*

Gesner, Vögelb. p. 72. *Glaucion.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 868. n. 88. Anas
(*Glaucion*) corpore nigricante, pectore nebulo-
so, speculo alarum albo lineari.

Briffon, ornithol. II. p. 468. n. 25. *Morillon.*

Beseke, Vögel Kurlands, p. 25. n. 80. *der Breit-*
schnabel.

Pontoppidan, Dännemark, p. 168. n. 10. *Kruk-*
kop, Dyker.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 65. n. 72.
die eisengraue Ente.

- Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. Anas Glaucion.
Linné, Syst. Natur. Edit. II. p. 54. Glaucium.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 22. n. 21. Glaucion.
Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 126. n. 23. Anas (Glaucion) iridibus flavis, capite griseo, col-
 lari albo.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 15. n. 120. Anas (Glaucion) corpore nigricante, pectore nebuloso, speculo alarum albo lineari.
Fabric. fn. groenl. p. 70. n. 44. Anas (Glaucion) corpore nigricante, pectore nebuloso, speculo alarum albo lineari.
Brünnich, ornithol. bor. p. 20. n. 89. Glaucion?
Charleton, onomast. zoic. p. 100. n. 4. Glaucius.
Jonston, av. p. 145. Glaucius.

94. NOVAE HISPANIAE. *Die surinamische Ente.*

Briffon, ornitholog. II. p. 480. Sarcelle du Mexique.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 868. n. 89. Anas (Novae Hispaniae) alba nigro-maculata, capite fulvo-nigricante, et viridi-caeruleo vario, tectricibus alarum et crisso caeruleis, macula inter rostrum et oculum fasciaque alarum alba.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 261. n. 17. *die surinamische Ente.*

95. MALACORHYNCHOS. *Die weichschnäblige Ente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 862. n. 76. Anas (Malacorhynchos) caeruleo-cinerea, rostri apice flexili membranaceo, vertice viridi-cinereo, alarum macula transversa alba.

96. GLOCITANS. *Die gluckende Ente.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 535. ad K. *gluckende Ente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 862. n. 75. Anas (Glocitans) subcristata fusca, nigro undulata, capite viridi, macula ante poneque oculos ferruginea, pectore maculis nigris, speculo alarum viridi, albo marginato.

Schwed. Abh. XLI. p. 22. *die gluckfende Ente.*

Gmelin, Catal. mus. Petropol. I. p. 408. n. 670. *Querquedula glocitans torquata.*

97. AMERICANA. *Die amerikanische Pfeifente.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 528. n. 420. *die amerikanische Pfeifente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 861. n. 74. Anas (Americana) ferrugineo nigroque undulata, abdomine albido, capite albo nigroque maculato, pone oculos striga utrinque ad nucham nigro-virescente, tectricibus alarum medio albis.

98. CAPENSIS. *Die capische Pfeifente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 861. n. 73. Anas (Capensis) cinerascens, dorso ex rubescente fusco, pennis margine flavescens, speculo alarum caeruleo-virescente, albo marginato.

97. PENELOPE. *Die (gemeine) Pfeifente.* (3)

Müller, Natursystem, II. p. 294. n. 27. *Pfeifente.*

Tab. 22. fig. 6.

Borowsky, Thierreich, III. p. 13. n. 7. *die Pfeifente.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 387. n. 9. *die Pfeifente.*

Bbb 4

Bechstein,

(3) Flügelweite 2 Fuß 3 Zoll. Gewicht 23 Unzen. *Penn.*

- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 648. n. 11. die *Pfeifente*. p. 651. *Speckenten*, *Penelopen*, *Schmünten*.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 692. die *Pfeifente*.
- Halle*, Vögel, p. 555. n. 664. die *Pfeifente*.
Onomat. histor. nat. V. p. 245. *Penelope*.
- Klein*, av. p. 132. n. 7. *Anas Fistularis*.
- Klein*, Vorbereit. p. 244. n. 7. *Pfeifente*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 139. n. 7. *Pfeifente*.
- Klein*, Vögeleyer, p. 35. Tab. 21. fig. 3.
- Gesner*, Vögelb. p. 72. *Penelope*.
- Gesner*, Vögelb. p. 85. ein *Pfeiffent*.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 535. K. die *Pfeifente*.
- Briffon*, ornithol. II. p. 464. n. 21. Canard siffleur.
- Batsch*, Thiere, I. p. 378. die *Pfeifente*.
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 860. n. 71. *Anas* (*Penelope*) cauda acutiuscula, crisso nigro, capite brunneo, fronte alba, dorso cinereo undulato.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 47. n. 81. 82. die *Pfeifente*.
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 80. n. 80. *Brandente*, *Rothhals*. (welche Synonymen ihr eigentlich nicht zukommen.)
- Lepetchin*, Tageb. d. russ. Reif. I. p. 89. III. p. 14. *Penelopen* oder *Pfeifenten*.
- Cetti*, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 339. die *Penelope*.
- White*, Naturgesch. von England, p. 62. n. 13. *Pfeifente*.
- Pallas*, nord. Beytr. IV. p. 14. *Anas Fistularis* *Briff.* p. 22. A. *Penelope*.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 72. *Speck- oder Pfeiffente*.

Linné, auserl. Abh. II. p. 285. n. 48. *die Pfeifente.*

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 168. n. II. *Brunnacke.*

Naturf. XII. p. 136. n. 80. *Pfeifente?*

Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. *Anas Penelope.*

Krünitz, Encykl. XI. p. 41. *Pfeif- oder Speckänten.*

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 126. n. 24. *Penelope.*

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 22. *Penelope.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 126. n. 24. *Anas (Penelope) cauda acutiuscula subtus nigra, capite brunneo, fronte alba.*

Müller, zool. dan. prodr. p. 15. n. 121. *Anas (Penelope) cauda acutiuscula, crisso nigro, capite brunneo, fronte alba, dorso cinereo-undulato.*

Kramer, Austr. p. 342. n. 16. *Anas capite brunneo, fronte alba, cauda subtus nigra; Eißente mit weißer Platte.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 202. *Anas fera II seu canora; ein Pfeiff-Endtlin.*

Charleton, onomast. zoic. p. 100. n. 2. *Boschas, aliis Anas Fistularis.*

Jonston, av. p. 146. *Penelope.*

β. KAGOLKA. Latham, Syst. ornith. II. p. 861. n. 71. β.

28. ACUTA. *Der Pfeilschwanz.* (4)

Müller, Natursystem, II. p. 295. n. 28. *Pfeilschwanz.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 651. n. 12. *der Pfeilschwanz.* p. 653. *Langhals, Nadel-*

Bbb 5 *schwanz,*

(4) Flügelweite 3 Fuß, 2 Zoll. Gewicht 24 Unzen. Penn.

- schwanz, Spitzschwanz, Spießente, Pfeifente, Pylstert.
- Beustein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 691. Fasmenente, p. 695. graue Mittelente.
- Halle*, Vögel, p. 560. n. 672. die Spiesente.
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 108. n. 104. der Pfeilschwanz.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 527. n. 418. der Nadelschwanz.
- Klein*, av. p. 133. n. 15. Anas Caudacuta.
- Klein*, Vorbereit. p. 246. n. 15. Spiesente, Spitzschwanz.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 141. n. 15. Spießente.
- Klein*, av. p. 136. n. 32. Anas fera, ventre candido?
- Klein*, Vorber. p. 251. n. 22. wilde Ente mit einem weißen Bauche?
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 143. n. 32. Weißbauch?
- Gsner*, Vögelb. p. 86. ein Spitzschwanz.
- Brisson*, ornitholog. II. p. 459. n. 16. Canard à longue queue.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 864. n. 21. Anas (Acuta) cauda acuminata elongata, subtus nigra, occipite utrinque linea alba, dorso cinereo undulato.
- Beseke*, Vögel Kurlands, p. 48. n. 82. der Pfeilschwanz.
- Lepeschin*, Tagebuch der ruff. Reis. I. p. 189. Pfeifmenente. III. p. 14. spitzschwänzige Enten.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 65. n. 73. die Spießente.
- Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. Anas Acuta.
- Neue schwed. Abhandl. I. p. 299. die isländische Ente.
- Linné*, auserles. Abhandl. II. p. 291. n. 74. die Spies-Ente.
- Linné*,

Linne', Syst. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 10. Anas cauda acuta.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 126. n. 25. Anas (Acuta) cauda acuminata elongata subtus nigra, occipite utrinque linea alba.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 15. n. 122. Anas (Acuta) cauda acuminata elongata subtus nigra, occipite utrinque linea alba, dorso cinereo undulato.

Brünnich, ornithol. bor. app. p. 77. Anas Acuta.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 202. Anas fera 12. seu Caudacuta; ein Spi's - Endte.

Charleton, onomast. zoic. p. 9. n. 10. Anas Caudacuta.

Jonston, av. p. 146. Anas Caudacuta.

Hermann, tab. affin. anim. p. 159. Anas Acuta.

99. FERRUGINEA. Die rothbraune Ente. (5)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 536. N. die rothe Ente.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 866. n. 84. Anas (Ferruginea) fusco-rufa, abdomine albo, rostro dilatato pedibusque pallide caeruleis.

Linne', Syst. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 16. Anas fluviatilis.

Linne', fn. Suec. I. n. 112. II. n. 134. Anas rufa, rostro pedibusque cinereis.

29. HYE-

(5) Gewicht, nach *Pennant*, 10 Unzen. Weder in der X. noch XII. Edition des Syst. Nat. hat *Linne'* diese Gattung aufgeführt. In den Faun. Suec. I. und II. Ed. steht nicht *Anas rutila*, sondern *rufa*. Die Charaktere stimmen auch mit *Pennants* Beschreibung gar nicht überein. *Linne'* hat das Thier, nach seinem eignen Geständniß, nicht gesehen. Fn. II. l. c. *Latham* ist geneigt es für das Weibchen von *Anas Dispar*, p. 535. n. 107. zu halten.

29. HYEMALIS. Die Winterente. (6)

Müller, Naturfyst. II. p. 295. n. 29. Winterente.

Halle, Vögel, p. 560. n. 673. die Isländerente.

Halle, Vögel, p. 564. n. 685. die nordliche Schwanzente.

Onomat. hist. nat. I. p. 409. der Spitzschwanz.
p. 410. die Winterente.

Klein, av. p. 133. n. 16. Anas Islandica, cauda protensa.

Klein, Vorbereit. p. 247. n. 16. isländische Spießente mit langem Schwanz.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 141. n. 16. isländische Spießente, Gadelbusch.

Klein, verb. Vögelhist. p. 143. n. 37. Weißback mit langen Schwanzfedern.

Briffon,

(6) Unter den Synonymen dieser und der folgenden Gattung herrscht große Verwechslung und die Meynungen der Ornithologen sind sehr getheilt, ob beyde als wirklich von einander verschiedene Gattungen, oder nur als Spielarten zu betrachten sind. So nimmt z. E. Latbam die *Anas Glacialis* für das erwachsene Männchen; die *Anas Hyemalis* mit den Synonymen aus *Raj Will. Edw. Tab. 156. Briff. n. 17.* und *Fn, Suec n. 125.* für ein junges Männchen; *Pennant's long-tailed Duck*, für das Weibchen; und *Briffon's Querquedula Feroensis* als eine Spielart an. Aus den Synonymen des *Pennant* erhellet, daß er ebenfalls die *Anas Hyemalis* und *Glacialis* für einerley hält; hält aber *Briff. Querquedula Feroensis* für das Weibchen. Bey *Müller* und *Brünich* finde ich der *Anas Glacialis* gar nicht gedacht. *Fabricius* (fn. groenl. p. 71.) nimmt die *Anas Hyemalis Linn.* zur Hauptgattung, sieht *Brünich's* n. 75. als das Männchen, n. 76. als ein junges Männchen, n. 77. 78. als das Weibchen, und n. 79. als ein junges Weibchen an. *Brünich* selbst aber ist ungewiß, wie alle diese dem Alter, Geschlecht (Sexus) oder Gattung nach verschieden seyn mögen. Ich habe die Synonymen überhaupt nach Anleitung unsers Systems geordnet; bin aber sehr geneigt, mit *Bechstein* die *Anas Hyemalis* und *Glacialis* für einerley Gattung anzunehmen.

- Briffon*, ornithol. II. p. 460. n. 17. Canard à longue queue d'Islande.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 865. n. 82. β . *Anas cauda cuneata*, rectricibus intermediis longis, corpore albo, temporibus, pectore, dorso alisque nigris.
- Leem*, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 145. *die Hav-Aelder*.
- Olaassen*, Reise durch Island, I. p. 292. c. *Havvella?*
- Pontoppidan*, Naturgesch. v. Dännemark, p. 168. n. 13. *Gadisse, Klashan, Ungle, Dykere, Angeltaske*.
- Linné*, auserles. Abhandl. II. p. 291. n. 73. *die Schwanz-Ente*.
- Schwedische Abhandlung, XLI. p. 24. *Anas Hyemalis*.
- Seligmann*, Vögel, V. Tab. 51. *die langgeschwänzte Ente aus der Hudsons-Bay*.
- Martini*, Naturlex. II. p. 581. *Angeltasche*.
- Sander*, Grösse und Schönheit in der Natur, I. p. 262. *Angeltasche*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 9. *Anas cauda forcipata*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 126. n. 26. *Anas (Hyemalis) cauda cuneata*, rectricibus intermediis longis, corpore griseo, temporibus albis.
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 15. n. 123. *Anas (Hyemalis) cauda cuneata*, rectricibus intermediis longis, corpore albo, temporibus, pectore, dorso alisque nigris.
- Charleton*, onomast. zoic. p. 99. n. 8. *Anas Islandica, Havellaea* ipsis dicta.
- Hermann*, tab. aff. anim. p. 159. *Anas Hyemalis*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 261. n. 18.
die Winterente.

β. QUERQUEDULA FERROENSIS BRISS.
Die Feroe Kriechente.

Pennant, arct. Zool. II. p. 528. ad n. 420. die
Feroe-Kriechente des Brisson.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 865. n. 82. ♂. A.
fusco-nigricans subtus alba, capite lateribus
dilute griseo, orbitis candidis, occipite, gula,
collo maculis fuscis, macula alarum fusco-ru-
fescēte.

30. GLACIALIS. Die Eisente.

Müller, Naturf. II. p. 296. n. 30. die Eisente.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 654. n. 13.
die Winterente. (Eisente.) p. 656. Weißba-
cken mit langen Schwanzfedern. Spitzschwän-
ze, Langschwänze von Neu-land, Langschwän-
ze von Island, Hanik, Klashanik.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 527. n. 419. die Eis-
ente, Kirre.

Brisson, ornitholog. II. p. 461. n. 18. Canard à
longue queue de Terre-neuve.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 864. n. 82. Anas
(Glacialis) cauda acuminata elongata, corpore
nigro, subtus albo. (Mas adultus.)

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 865. n. 82. γ.
A. cauda cuneata, corpore nigricante, rufo et
griseo vario, dorso nigro, collari abdomine-
que imo albis. (Femina.) (Pennants Long-
tailed Duck.)

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 66. n. 74.
die Winterente.

100. FULVA. Die goldgelbe Ente.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 863. n. 79. Anas (Fulva) fulva, corpore superiore et alis fulvo fuscoque striatis, cauda albo nigroque varia.

Briffon, ornitholog. II. p. 464. n. 20. Millouin du Mexique.

31. FERINA. Die Tafelente. (?)

Müller, Naturfyst. II. p. 296. n. 31. Rothhals.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 387. n. 10. die Tafelente.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 656. n. 14. die Tafelente. p. 659. der (eigentliche) Rothhals, die braune Ente, der Rothkopf, die braunköpfige, die rothe Mittelente, Wildente, Quellje.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 693. die Tafelente.

Halle, Vögel, p. 554. n. 660. die Ente mit rothem Halse.

Onomat. histor. nat. I. p. 407. die braune wilde Ente.

Klein, av. p. 132. n. 5. Anas fera fusca vel media.

Klein, Vorbereit. p. 243. n. 5. wilde braune Ente.

Klein, verb. Vögelhist. p. 139. n. 5. braune Ente.

Gesner, Vögelb. p. 79. wilde graue oder Mittelente. Fig. p. 80.

Briffon, ornitholog. II. p. 462. n. 19. Millouin.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 862. n. 77. Anas (Ferina) cinereo undulata, capite brunneo, fascia pectorali, crisso uropygioque nigro.

Pennant,

- (7) Flügelweite 2 1/2 Fuß, Gewicht 1 Pfund 12 Unzen. Penn — Nach Beseke ist dies Frischens Sécelster Tab. 164, und nach Bechstein: Frischens afrikanische Ente, Tab 165. — Bock hält sie gar mit Anas Fusca p. 507. n. 6. für einerley.

Pennant, arct. Zool. II. p. 521. n. 409. *die Tafelente*.

Besike, Vögel Kurl. p. 48. n. 83. 84. *der Rothhals*.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 332. n. 81. *Rothhals, Brandente, Rothkopf*.

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 80. n. 81. *graue wilde Ente*.

Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 168. n. 14. *Brunnakke*.

Pontoppidan, Naturhistorie von Norwegen, II. p. 127. *Röd-Nakker*.

Pennant, Reif. n. Schottl. I. p. 18. *Rothhälse*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 410. *die Mittel-Ente*.
Naturforsch. XII. p. 136. n. 81. *Rothhals*.

Schwed. Abh. XLI. p. 23. *Anas Ferina*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 22. n. 15. *Anas fera fusca*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 126. n. 27. *Anas* (Ferina) *alis cinereis immaculatis, uropygio nigro*.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 15. n. 124. *Anas* (Ferina) *cinereo-undulata, capite brunneo, fascia pectorali, crisso uropygioque nigro*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 201. *Anas fera 8 seu Erythrocephalos 2. ein braun Endte, braunköpfigte Endte, rote Endte, Mittel-Endte, wilde graue Endte*.

Charleton, onomast. zoic. p. 99. n. 9. *Anas Fusca, quibusdam Media*, p. 100. n. 3 *Penelope*.

Jonston, av. p. 145. *Anas fusca*. p. 146. *Penelope. Canne à la tête rousse*.

Forsskal, fn. orient. p. VI. n. 13. h. *Descript. animal.* p. 4. n. 13. *Anas ferina?* Arabisch *Batt?*

β. *Bech*.

β. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 659. n. 2.
die Sumpffente.

Briffon, ornithol. II. p. 463. n. 19. A. Millouin
noir.

Latham, Syn. III. 2. p. 524. n. 68. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 863. n. 77. β.
Anas nigricans, capite colloque castaneis, pe-
ctore et abdomine fusco cinereoque variis, alis
albo griseoque variis.

γ. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 659. n. 4.
die rothköpfige Ente.

Briffon, ornitholog. II. p. 463. n. 19. B. Milouin
à tête brune.

101. LURIDA. *Die bleufarbene Ente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 876. n. III. Anas
(Gmelini) nigra, capite spadiceo, pectore li-
neis rubris transversis.

102. KEKUSCHKA. *Die Kekuschka.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 877. n. 112. Anas
(Kekuschka) ochracea, subtus nivea, dorso
cinereo, uropygio caudaque nigerrimis.

Pallas, nord. Beyr. IV. p. 8. *die Ente Kekusch-
ka genannt.*

32. QUERQUEDULA. *Die Knäckente.*⁽⁸⁾

Müller, Naturf. II. p. 296. n. 32. *Winter-Halb-
ente.*

Bechstein,

(8) Flügelweite 28 Zoll. — Bleibt das ganze Jahr, und zieht
nur vom November bis im März von einem Teiche und Flus-
se zum andern, um immer offenes Wasser zu haben. Nährt
sich von Fischen, Wasserinsekten, Schnecken u. s. w. Legt
12 bis 15 gelblich weisse Eyer an das Ufer ins Gras auf ein
schlecht zusammengelegtes Nest von Binsen und Grasshalmen.

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 387. n. 11. *die Knäckente.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 662. n. 16. *die Knäckente.* p. 665. *Bergente, Winterhalbente, Rothhällein.*
- Halle*, Vögel, p. 556. n. 665. *die Kriechente.*
- Onomat. hist. nat.* I. p. 417 *die Kriechente, Krickente.* (Mit n. 33. verwechselt.)
- [*Klein*, av. p. 132. n. 8. *Anas fera* 15. *Schwenkf.* feu minor 2.
- Klein*, *Vorbereit.* p. 244. n. 8. *gemeine Krück-Kriech-Kriegente, grau Endelein, Bickilchen, scheckigt Entlein, sprenklicht Entlein, Kernel.*
- Klein*, *verbess. Vögelhist.* p. 139. *Kriechente, Kernel u. s. w.]*
- Mit *Anas Crecca* und *Circia* verwechselt.
- Briffon*, ornithol. II. p. 573. n. 31. *Sarcelle.*
- Pennant*, arct. Zoolog. II. p. 537. O. *die Knäckente.*
- Latham*, Syft. ornitholog. II. p. 872. n. 99. *Anas* (Querquedula) *macula alarum viridi, linea alba supra oculos.*
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 332. n. 82. *Winterhalbente.*
- Fischer*, Livland, p. 80. n. 82. *Winter-Halbente.*
- Cetti*, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 335. *Cabizoni?*
- White*, Naturgesch. von Engl. p. 62. n. 14. *Winterhalbente.*
- Lepechin*, Tagebuch der russ. Reise, III. p. 14. *Kriekenten.*
- Pennant*, Reif. d. Schottl. I. p. 18. *Kriechenten.*
- Olassen,*

Brüter 28 bis 30 Tage. Beyde Eltern führen die Jungen. Das Fleisch hat der Nahrung halber einen thranigen Geschmack.

Olaffen, Isl. I. p. 292. e. *Oert*.

Ponttoppican, Dännem. p. 168. n. 15. *Krikand*.

Linné, auserles. Abh. II. p. 292. n. 78. *die Franz-Ente*.

Scopoli, Bemerck. a. d. Naturgesch. I. p. 67. n. 75. *die Krickente, Kriechente*.

Schwed. Abh. XLI. p. 23. Anas *Querquedula*.

Schneider, zool. Abhandl. p. 139. *Querquedula*. p. 153. *Krickente*.

Naturf. XII. p. 136. n. 82. *Winterhalbente*.

Linné, Syft. Nat. Ed. II. p. 54. *Querquedula*.

Linné, Syft. Natur. Edit. VI. p. 22. n. 23. *Querquedula*.

Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 126. n. 28. Anas (*Querquedula*) macula alarum viridi, linea alba supra oculos.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 15. n. 125. Anas (*Querquedula*) macula alarum viridi, linea alba supra oculos.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 204. Anas fera 15. seu minor 3; *ein scheckicht Endtlin, Sprenglicht Endte Kernel*.

Charleton, onomast. zoic. p. 101. n. 3. *Kernell*.

Jonston, av. p. 144. Anas *Circia*; *Kernell circa Argentoratum dicta*.

33. CRECCA. *Die Krickente*. (9)

Müller, Naturfyft. II. p. 297. n. 33. *Kriechente*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 388. n. 12. *die Krickente*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 666. n. 17. *die Krickente*. p. 668. *Kriechente, Spiegelente*,

Ccc 2

Krik-

- (9) Wird von manchen für eine Varietät von *Anas Querquedula* gehalten. (*Fischer, Bock u. a. m.*) *Latham* rechnet auch die *Anas Balbal* p. 543. n. 124. so wie die folgende *A. Circia* als Spielarten hierher.

- Krikente, Krugente, Kriechen, Krikke, Biekelchen, Karnellen, Karnel, Wäbke, scheckig Entlein*; das Weibchen: *das Grauentchen.*
Halle, Vögel, p. 557. n. 666. die kleine Kriechente.
- Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 109. n. 107. die Kriechente.*
- Pennant, arch. Zool. II. p. 537. P. die Kriechente.*
Onomat. hist. nat. I. p. 416. Drossel, Krickente.
- Klein, av. p. 133. n. 14. Anas Querquedula Francica.*
Klein, Vorber. p. 246. n. 14. fränkische Kriechente.
- Klein, verb. Vögelhist. p. 141. n. 14. Franzente.*
Klein, av. p. 136. n. 31. Anas Querquedula.
Klein, Vorbereit. p. 251. n. 31. Rothhalslein.
Klein, verb. Vögelhist. p. 143. n. 31. Rothhalslein.
Klein, stamm. av. p. 31. Tab. 35. fig. 2. a. b.
- Gesner, Vögelb. p. 70. Kruckentlein, Kleineent, Grauentlein, Murentlein, Sorentlein, Tröfel, Socke, Kriechentlein, Krigentlein.*
- Gesner, Vögelb. p. 69. Phascades.*
- Briffon, ornithol. II. p. 476. n. 32. petite Sarcelle.*
- Batsch, Thiere, I. p. 378. die Kriechente.*
- Latham, Syn. Supplem. p. 276. Common Teal.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 872. n. 100. Anas (Crecca) speculo alarum viridi, linea alba supra infraque oculos.
- Beseke, Vögel Kurl. p. 48. n. 85. die Kriechente.*
- Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 332. Kriechente, Sommerhäbente,*
- Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 81. n. 86. Schapsente.*
- Carver, Reif. d. Nordamer. p. 388. die Kriechente.*
Pallas,

Pallas, nord. Beytr. I. p. 8. *die Krickente.*

Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 340. *die Kriechente.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 72. *Kriechente.*

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 168. n. 16. *Krikand, Attelingand.*

Naturf. XII. p. 137. n. 83. *Kriechenté.*

Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Freunde, VII. p. 456. *die Kriechente.*

Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. *Anas Crecca.*

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 24. *Phaschas.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 126. n. 29. *Anas (Crecca) macula alarum viridi, linea alba supra infraque oculos.*

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 15. n. 126. *Anas (Crecca) speculo alarum viridi, linea alba supra infraque oculos.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 203. *Anas fera 13. seu minor 1. Krück-Enntlin, graw Endtlin.*

Charleton, onomast. zoic. p. 100. *Böschas minor.*

Jonston, av. p. 144. *Querquedula minor.*

Schäfer, element. ornith. Tab. 19.

Philos. Transact. Ixii. p. 419. n. 51.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 261. n. 19. *die Kriechente.*

β. *Die Krickente, welche einen goldgrünen sichelförmigen Streif von den Augen an bis zum Nacken hat.*

IV *Bechstein*, Naturg. Deutschl. II. p. 668. Var. 1.

γ. *Die Krickente mit einem weißen Streifen unter den Augen und braunen Backen.**

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 669. Var. 2.

δ. *Anas dorfi* marginibus pennarum rufis, *genis, gula* et corpore subtus rufo-albis; *speculo* absque nigredine. *

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 873. n. 100. γ.

34. CIRCIA. Die Sommerhalbente. (10)

Müller, Naturfyst. II. p. 297. n. 34. die Sommer-Halbente.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 388. n. 13. die Sommerhalbente.

Bechstein Naturgesch. Deutschl. II. p. 669. n. 18. die Sommerhalbente. p. 671. die kleine Kricke, das Schäckchen, Biekielchen, Birkelchen, Zirzente.

Klein, av. p. 132. n. 8. *Anas Circia*. (Mit *A. Querquedula* verwechselt.)

Briffon, ornitholog. II. p. 477. n. 33. Sarcelle d'Été.

Gesner, Vögelb. p. 71. ein Birkielgen.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 873. n. 100. β. *Anas speculo* alarum varii coloris, linea alba superciliari, rostro pedibusque cinereis.

Beseke, Vögel Kurlands, p. 48. n. 87. die Sommerhalbente.

Fischer, Naturgesch. von Livl. p. 81. n. 85. Kriechente.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 14. *Anas Circia*.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 68. n. 76. *Anas Circia*.

Schriften der berlin. Gefellsch. naturf. Fr. VII. p. 457. n. 30. Sommerhalbente.

Schneider, zool. Abh. p. 139. 154. *Anas Circia*.

Linne', Syst. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 25. *Circia*.

Linne',

(10) Nach *Latham* eine Varietät von *Anas Crecca*, p. 532. n. 33.

Linne', Syft. Nat. Edit. X. I. p. 127. n. 32. Anas (Circia) macula alarum varia, linea alba supra oculos, rostro pedibusque cinereis.

Linne', fn. Succ. II. p. 46. n. 130. Anas (Circia) macula alari varia, linea alba supra oculos, rostro pedibusque cinereis.

Schwenkfeld., av. Siles. p. 204. Anas fera 14 fetu minor 2; *ein graw Endtlin*, *Birckilgen*.

Charleton, onomast. zoic. p. 101. n. 1. Anas Circia.

103. CAROLINENSIS. *Die amerikanische Kriechente.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 570. n. 422. *die amerikanische Kriechente.*

Latham, Syft. ornitholog. II. p. 874. n. 101. Anas (Carolinensis) nigro alboque undulata, capite colloque supremo castaneis, fascia pone oculos speculoque alari viridibus, humeris lunula alba, infra oculos linea obsoleta alba.

Philos. Transact. IXII. p. 519. n. 51. (Anas Crec. var.)

35. HISTRIONICA. *Die Kragenente.*

Müller, Naturfyft. II. p. 297. n. 35. *die Kragenente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 672. n. 9. *die Kragenente.* p. 673. *der Harlekin, die schäckige Ente; das Männchen: Plümente.*

Briffon, ornithol. II. p. 457. n. 14. Canard à collier de Terre-neuve.

Latham, Syft. ornitholog. II. p. 849. n. 45. Anas (Histrionica) fusca albo caeruleoque varia, auribus, temporibus linea gemina, collari fasciaque pectorali albis.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 93. *die dunkle und gefleckte Ente.*

- Egede*, Besch. von Grönl. p. 122. *Tornoviarfuk*.
 Stralfund. Magaz. I p. 149. *die buntköpfige Ente*.
Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 127. n. 30. Anas
 (*Histrionica*) fusca, albo caeruleoque varia,
 auribus, temporibus linea gemina, collari fa-
 sciaque pectorali albis.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 15. n. 127. Anas
 (*Histrionica*) fusca, alba.
 Philos. Transact. IXII. p. 417.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 262. n. 20.
der Harlekin.

36. MINUTA. *Die Zwergente.* (1)

- Müller*, Naturyst. II. p. 298. n. 36. *Zwergente*.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 673. n. 20.
die Zwergente.
Klein, verbesserte Vögelhist. p. 143. n. 38. *braune*
Kriechente mit weißen Hauptflecken.
Briffon, ornitholog. II. p. 483. n. 41. Sarcelle de
 la Baye de Hudson.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 849. n. 45. β . Anas
 grisea, auribus albis, remigibus primoribus
 nigricantibus.
Seligmann, Vögel, V. Tab. 52. *die kleine braun*
und weiße Ente.
Linne', Syst. Natur. Edit. X. I. p. 127. n. 31. Anas
 (*Minuta*) grisea, auribus albis, remigibus pri-
 moribus nigricantibus.

104. FUSCESCENS. *Die braune Ente*.

- Pennant*, arct. Zoolog. II. p. 526. n. 417. *die*
braune Ente.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 849. n. 46. Anas
 (*Fuscescens*) fuscescens, capite colloque dilu-
 tiore,

(1) Nach *Fabricius* und *Latham* das Weibchen von *Anas Histrionica*.

tiore, alis cinereis, speculo caeruleo, margine albo, cauda obscura.

105. POEKILORHYNCHA. *Die buntschnäblige Ente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 850. n. 47. Anas (Poecilorhyncha) nigra, genis cum parte iuguli cinereis, alarum speculo viridi, supra albo, subtus albo nigroque cincto, remigibus secundariis candidis.

Berlin. Samml. IX. p. 195. *die buntschnäblichte zeylonische Ente.*

Neueste Mannichfalt. I. p. 191. *die buntschnäblichte zeylonische Ente.*

106. DAMIATICA. *Die damiatische Ente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 850. n. 48. Anas (Damiatica) alba, capite, collo superiore, humeris caudaeque apice albis, nuchae lunula ferruginea, remigibus virescenti-atris.

Hasselquist, Reise n. Paläst. (Ed. germ.) p. 318. n. 35. Anas Damiatica.

107. DISPAR. *Die ostrogothische Ente.*⁽²⁾

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 866. n. 83. Anas (Dispar) alba, subtus ferruginea, occipitis macula fronteque virescentibus, orbitis, gula, iugulo collari dorsoque nigris.

37. DISCORS. *Die Blässenente.*

Müller, Naturyst. II. p. 298. n. 37. *bunte Ente.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 529. n. 421. *die Blässenente.*

Halle, Vögel, p. 562. n. 678. *die bunte amerikanische Kriechente.*

(1) Nach *Latham* mit *Anas Stelleri* p. 518. n. 80. einerley.

- Halle*, Vögel, p. 567. n. 695. *die Schuppenente*.
Klein, av. p. 134. n. 24. *Anas Querquedula americana variegata*.
Klein, Vorbereit. p. 249. n. 24. *Blaukopf, weiß gezeichnet, aus Amerika*.
Klein, verbess. Vögelhist. p. 142. n. 24. *Blaukopf, weiß gezeichnet*.
Briffon, ornitholog. II. p. 479. n. 35. *Sarcelle d' Amerique*.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 854. n. 55. *Anas (Discors) tectricibus alarum caeruleis, remigibus secundariis extus viridibus, fascia frontali alba. (mas.)*
Seligmann, Vögel, IV. Tab. 100. *scheckiges amerikanisches Kriechentlein*.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 262. n. 21. *die Blässenente*.
- β. *Klein*, av. p. 134. n. 23. *Anas Quacula. (3)*
Klein, Vorbereit. p. 249. n. 23. *grau Kriech mit blauen Schultern*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 142. n. 23. *graue Kriechente mit blauen Schultern*.
Briffon, ornithol. II. p. 479. n. 36. *Sarcelle de Virginie*.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 854. n. 55. *Anas tectricibus alarum caeruleis, corpore griseofusco, subtus griseo, speculo alarum viridi, fascia superius alba. (femina.)*
Seligmann, Vögel, II. Tab. 98. *blaues amerikanisches Kriechentlein*.
- γ. *Latham*, Syn. III. 2. p. 504. n. 50. *Var. A*.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 854. n. 55. β. *A. pileo caudaque nigris, tectricibus alarum caeruleis,*

(3) Nach *Briffon*, *Klein* u. a. eine eigne Gattung.

ruleis, maioribus macula alba, remigibus secundariis extus gula abdomineque albis.

38. VIDUATA. *Die spanische Ente.*

Müller, Naturfyst. II. p. 298. n. 38. *die Wittwe.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 858. n. 65. Anas (Viduata) fusca, capite antico albo, postico nigro, pedibus caeruleis.

β. A. rufescente nigricanteque undatim varia, capite colloque antice dimidia parte albis, pectore rufo, cervice collari sub gula alis caudaque nigris. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 858. n. 65. β.

Büffon, IX. p. 255. pl. enl. 808. Canard à face blanche de Maragnon.

108. JACQUINI. *Jacquins - Ente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 863. n. 80. Anas (Jacquini) spadicea, dorso nigricante, rostro pedibusque nigris.

109. DOMINICANA. *Die Dominikaner-Ente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 859. n. 60. Anas (Dominicana) griseo-cinerea, facie gulaque albis, fascia oculari, occipite, collo pectoreque nigris.

39. AUTUMNALIS. *Die Herbstente.*

Müller, Naturf. II. p. 298. n. 39. *die Herbstente.*

Halle, Vögel, p. 563. n. 679. *das Entenrothkehlchen?*

Klein, av. p. 135. n. 25. Anas fera, griseo colore, mente cinnabrino, undulante pectore?

Klein, Vorbereit. p. 249. n. 25. *Rothbart mit wellenförmiger Brust?*

Klein, verb. Vögelhist. p. 142. n. 25. *Rothbart?*

Klein,

Klein, verb. Vögelhist. p. 138. n. 17. *rothschwänzige Gans*.

Briffon, ornitholog. II. p. 466. n. 23. Canard siffleur d'Amérique.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 852. n. 52. Anas (Autumnalis) grisea, remigibus, cauda ventreque nigris, speculo alarum fulvo alboque.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 89. *die pfeifende Ente mit rothem Schnabel*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 127. n. 33. Anas (Autumnalis) grisea, remigibus, cauda ventreque nigris, area alarum fulva alboque.

Marsf. Dan. p. 108. Tab. 52. Anas fera mente cinnabrino?

110. LABRADORIA. *Die labradorische Ente.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 519. n. 406. *die scheckige Ente*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 859. n. 67. Anas (Labradora) dorso, alis et abdomine fuscis, capite, collo, scapularibus remigibusque secundariis albis, torque fasciaque pectoris nigris,

111. SUPERCILIOSA. *Die Ente mit weißen Augenbraunen.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 852. n. 51. Anas (Superciliosa) cinereo-fusca, fascia supra et infra oculos, gula iuguloque albis, speculo alarum viridi-caerulescente, nigro marginata.

112. CURVIROSTRA. *Die krummschnäblige wilde Ente.* (4)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 852. n. 50. Anas (Curvirostra) atra, rectricibus intermediis (maris)

(4) Sollte nicht diese Gattung mit der folgenden einerley, und sollten nicht beyde, Spielarten der gemeinen Ente seyn? *Pallas* sagt:

ris) recurvatis, gula macula ovali alba, rostro incurvo.

Pallas, Naturgesch. merkwürd. Th. VI. p. 39.
die Krummschnabel-Ente.

41. ADUNCA. *Die krummschnäblige zahme Ente.*
(Krummschnäblige Hausente.)⁽⁵⁾

Müller, Naturf. II. p. 300. n. 41. *krummschnäblichte Ente.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 19. n. 14. *die krummschnäblichte Ente.*

Bechstein,

sagt: es sey ihm diese Gattung nur ein einziges mal wild vorgekommen, und glaubt, daß die unter unsern Enten nicht ungewöhnliche Krummschnabelenten von dieser wilden Gattung entstanden seyn mögen. Aus der besondern Farbe, Zeichnung, und dem ganzen Ansehen des einzigen Exemplars, welches in Holland gefangen war, und sich 1764. in einer Vögelsammlung im Haag befand, schließt er, daß sie nicht von der gemeinen wilden Ente oder Hausente entstanden seyn könne, sondern eine eigne Art ausmache, die nur wegen ihrer Seltenheit den rechten Ursprung der krummschnäbligen Enten bisher zweifelhaft gelassen habe. Zur Bestätigung dieser Behauptung führt er den Umstand an, daß die Zucht der Krummschnabelenten hauptsächlich im mittlern Europa, sonderlich Niederdeutschland und Holland, wo sich auch die wilde Gattung allein aufzuhalten scheint, ihren Ursprung genommen, und in Rußland noch vor wenig (nun etwa vor 30) Jahren, ehe sie aus Holland dahin gebracht worden, so wie in ganz Sibirien weder wild noch zahm anzutreffen gewesen. Auch sollen die dunkelfarbigen unter den zahmen Krummschnabelenten, die man in Holland erzielt, fast immer die Farbe der von ihm beschriebenen wilden haben, und diese Farbe unter den gemeinen Hausenten, so mannichfaltig man sie auch abgeändert siehet, doch noch nie bemerkt worden seyn.

(5) Nach *Latham* u. a. eine Varietät von *Anas Beschar*. S. die vorhergehende Anmerkung.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 391. n. 6. *die krummschnablige Ente.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 719. n. 2. *die krummschnablige Ente.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 28. n. III. *die krummschnablichte Ente.*

Beckmann, Landwirthschaft, p. 475.

Klein, av p. 133. n. 17. *Anas rostro adunco.*

Klein, Vorbereit. p. 247. n. 17. *krummer Breit-schnabel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 141. n. 17. *krummer Breit-schnabel.*

Briffon, ornitholog. II. p. 445. n. 2. *Canard à bec courbé.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 851. n. 49. ♂ *Anas reatricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro incurvato.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 128. n. 35. *Anas (Adunca) reatricibus intermediis (maris) recurvatis, rostro incurvato.*

Frisch, Vögel, Tab. 179?

113. DOMESTICA. *Die gemeine Hausente.* (6)

Borowsky, Thierreich, III. p. 17. n. 13. *die gemeine Ente.*

Bechstein,

(6) *Klein*, *Briffon* u. a. m. betrachten zwar die Hausente als eine eigne Gattung; die mehresten Naturhistoriker aber sehen sie doch nur als eine Spielart von der wilden an. Farbe und Zeichnung ist, wie bey allen Hausvögeln, gar sehr verschieden. Die Paarungszeit fängt schon im März an. Auf einen Erpel rechnet man 10 bis 12 Enten. Beyde aber taugen nur etwa 4 bis 6 Jahre zur Fortpflanzung. Bey gutem Futter legt eine Ente, ehe sie brüten will, 20 bis 30 grünlich blauweisse Eyer, glätter und grösser als Hühnereyer. Brüter 28 bis 30 Tage. Ueberhaupt aber legt eine in

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 389. n. 15. b. *die zahme Ente*.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 705. n. 1. b. *die zahme Ente*. — *Entrich, Aentrich, Ant-rach, Anter, Enter, Erpel, Entvogel, Drake, Wyt, Warte*. (das Männchen.) p. 719. *Hausenten, Schnatterer, Rättschen, Hatschen*.
- Gatterer*, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 125. n. 110. *die Hausente, Ente, Aente*.
- Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 598. n. 1. *die zahme Ente*.
- Handbuch der deutschen Thiergeschichte, p. 106. *die zahme Ente*.
- Klein*, Vorbereit. p. 242. n. 1. *Haus-, zahme Ente*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 138. n. 1. *zahme Ente*.
- Klein*, Vögeleyer, p. 34. Tab. 20. fig. 1.
- Gesner*, Vögelb. p. 59. *zahme Ente*; mit 1 zieml. guten Figur.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 68. n. 77. *die zahme oder Hausente*.
- Briffon*, ornitholog. II. p. 443. n. 1. *Canard domestique*.
- Sander*, ökonom. Naturgesch. II. p. 18. n. 2. *die Ente*.
- Walther*, ökon. Naturgesch. p. 124. *Ente*.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 851. n. 49. β . *Anas domestica*.
- Bock*, Preussen, IV. p. 332. n. 84. *Hausente*.

Knox,

in einem Jahre 80 und mehrere Eyer. *Bechstein* führt ein Beyspiel von einer Ente an, die 105 Eyer gelegt hat. Die zahmen Enten scheinen die größte Neigung zu unnatürlicher Paarung zu haben, so das z. E. die Erpel auf Hühner erpicht sind, und wieder umgekehrt, Enten auch den welschen Hähnen nachlaufen, und sie zu reitzen suchen.

Knox, Reif. n. Ceylon, p. 57. *Enten*.

Pallas, Naturg. merkwl. Thiere, XI. p. 37. ***

(vom Haushahn getreten, und ganz weiß gestaltete zweydeutige Junge aus eignen Eyern selbst ausgebrütet.)

Kämpfer, Beschreib. von Japan, p. 141. *Enten*.

Naturf. XII. p. 137. n. 84. *gemeine Ente*.

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 194. n. 19. *die zahme Hausente*.

Krünitz, ökon. Encyklop. XI. p. 33. *Hausenten*.

Phyf. ökon. Patriot. IV. p. 189 ff.

Taube, Beytr. zur Naturk. des Herzogth. Zelle, p. 257.

Fränk. Samml. V. p. 354 ff.

Linné, Syft. Natur. Edit. X. I. p. 127. n. 34. β .

Anas domestica.

Linné, Syft. Natur. Edit. XII. I. p. 206. n. 40. β .

Anas domestica.

Brünicb, ornitholog. bor. p. 20. n. 88. *Anas domestica*.

Kramer, Austr. p. 341. n. 11. β . *Anas domestica*.

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 195. *Anas domestica*; ein *Rätsche*, *Hatsche*. Siles.

Charleton, onomast. zoic. p. 9. n. 1. *Anas domestica*.

Moehring, av. gen. p. 60. n. 61. *Anas*.

Jonston, av. p. 143. *Anas domestica*.

Varro, de re rust. L. 3. c. 11. *Anates*.

Columella, de re rust. L. 8. c. 15. L. 6. c. 7. *Anates*.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 55. L. 20. c. 5. *Anates*.

Turner. av. *Plin.* voc. *Anas*.



Mylii physf. Belust. V. p. 392. Nachricht von einer monströsen Ente.

Böhm,

Böhm, von vierfüß. Enten und Gänsen. Bresl. Naturgesch. 1726. p. 713.

Schulze, de intestinis in anate monstrosis. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. obs. 71. p. 56.

Hannaew, de cornu anatino. ib. Dec. II. an. 9. obs. 169. p. 316.

Bemerk. über Enten, deren Oberkiefer am Schnabel kürzer als der untere ist. Wittenberg. Wochenbl. XIII. p. 380.

Allgem. Haushalt. und Landwissensch. I. p. 852. von den Enten.

40. BOSCHAS. Die gemeine wilde Ente. (7)

Müller, Natursystem, II. p. 299. n. 40. gemeine Ente. *

Leske, Naturgeschichte, p. 288. n. 7. die gemeine Ente. *

Borowsky, Thierreich, III. p. 17. n. 13. die gemeine Ente. *

Blumen-

(7) Flügelweite 35 Zoll. Gewicht $2\frac{1}{2}$ Pfund. Pennant. Wird wahrscheinlich sehr alt, da man in sichern Gegenden ein Paar viele Jahre hinter einander antrifft. Im Sommer leben sie paarweise. Im October aber schlagen sich mehrere Familien zusammen, und im November bilden sie große Schaaeren, die besonders des Nachts von einem Teich, Fluß, oder See zum andern fliegen, denn es sind bloße Strichvögel. Die Begattungszeit fällt in den März, früher oder später, nachdem die Witterung günstig ist. Ohngefähr in der Mitte des Aprils legt das Weibchen 10 bis 16 blasgrüne längliche Eyer, brütet drey Wochen, und bedeckt die Eyer, wenn es der Nahrung halber vom Neste aufsteigt. Das Männchen löst es bey dem Brüten einige Stunden im Mittage ab, und führt die Jungen mit. Das Fleisch ist zarter, aber nicht so rein vom Geschmack, als das von der zahmen Ente. — Die mit einem * bezeichneten Synonymen gehen auf die wilde und zahme Ente zugleich.

- Blumenbach*, Handb. d. Naturgesch. p. 227. n. 6.
Anas (Boschas) rectricibus intermediis (maris)
recurvatis, rostro recto; *die Ente*. *
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 389. n. 15. a. *die wil-*
de Ente.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 682. n. 1. a.
die wilde Ente. p. 705. *gemeine wilde Ente,*
Märzente, Blumente, Spiegelente, grobe wil-
de Maschente.
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 690. *die*
wilde Ente.
- Meyer*, Thiere, I. Tab. 12.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 210. *die Ente*. *
- Halle*, Vögel, p. 551. n. 657. *die Hausente*. *
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 110. n. 109. *die wilde Ente*.
- Pennant*, arch. Zoolog II. p. 524. n. 412. *die wil-*
de Ente.
- Beckmann*, Naturhist. p. 44. d. *die Ente*. *
- Klein*, av. p. 131. n. 3. Anas sylvestris vera.
- Klein*, Vorbereit. p. 343. n. 3. *gemeine wilde Ente,*
Blauente, Groß-, Blau-Ente.
- Klein*, verbesserte Vögelhist. p. 138. n. 3. *gemeine*
wilde Ente.
- Gesner*, Vögelb. p. 77. *kleinere wilde blaue Ente,*
Blauent, Spiegelent, Großent, Merzent, Hag-
ent; mit 1 Fig.
- Briffon*, ornitholog. II. p. 447. n. 4. Canard
sauvage.
- Batsch*, Thiere, I. p. 379. *die gemeine Ente*. *
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 850. n. 49 Anas
(Boschas) cinerea, rectricibus intermediis (ma-
ris) recurvatis, rostro recto, torque albo.
- Beseke*, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 49. n. 88.
die gemeine Ente.

- Böck, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 322. *die Märzente.*
- Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 81. n. 87. *gemeine wilde Ente, Blaunte.*
- Cetti, Sardin II. p. 334 *die wilde Ente.*
- Rytshkow, orenb. Topogr. p. 245. *wilde Enten.*
- Strahlenberg, Europa u. Asien, p. 352. *Enten.*
- Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 136. *wilde Enten.*
- Olaassen, Reise durch Island, I. p. 292. *Blaakolls-Oend.*
- White, Naturgesch. von England, p. 62. n. 11. *die wilde Ente.*
- Pallas, Reif. III. p. 91 - 93. Ausz. II. p. 7. *Enten.*
- Pallas, nord. Beyträge, III. p. 10. IV. p. 8. *die Märzente.*
- Lepchin, Tageb. d. russ. Reif. III. p. 14. *gemeine Enten.*
- Pennant, Reif. d. Schottl. I. p. 18. *gemeine wilde Enten.*
- Schlözer, Erdbeschreib. von Amerika, p. 150. *Enten.*
- Steller, Beschr. von Kamtschatka, p. 190 *Enten.*
- Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 168. n. 18. *Vildand.*
- Döbel, Jägerprakt. I. p. 70. *wilde Enten.*
- Loniceri, Kräuterb. p. 645. *Endte, Antvogel. **
- Linné, auserles. Abh. II. p. 285. n. 48. p. 292. n. 75. *die gemeine Ente.*
- Lichtenberg, Magaz. f. d. Neueste u. s. w. II. 1. p. 103. *die Märzente.*
- Schwed. Abh. XLI. p. 23. *Anas Boschas.*
- Geoffroy, mat. med. VII. p. 300. *die gemeine wilde Ente.*

- Stralfund. Magazin, I. p. 147. Anas Boschas.
 Naturf. XII. p. 132. n. 70. *gemeine wilde Ente.*
Bechstein, Musterung schädli. Thiere, p. 132. n. 3.
die wilde Ente.
Zorn, Petinotheol. II. p. 409. *die gemeine wilde Ente.*
 Anweisung Vögel zu fangen, u. f. w. p. 184.
die Ente.
 Oekonom. Zool. p. 72. n. 12. *die gemeine Ente.* *
Krinitz, Encyklop. XI. p. 42. *die gemeine wilde Ente.*
Jablonsky, allgemein. Lex. p. 298. *Ente.* *
Merklein, Thierreich, p. 255. *Ente.* *
Kraft, Ausrott. grauf. Thiere, p. 235. 236. 584.
wilde Enten.
Helwing: Bresl. Samml. Mart. 1721. Cl. 5. Art. 1.
 (wilde Enten zahm zu machen.) Cf. Schwed.
 Abhandl. XIII. p. 326.
 Hannöv. nützl. Samml. 1758. St. 89. Col. 1423 f.
Schönfeld, Landwirthschaft, p. 705.
Zückert, Speisf. a. d. Thierr. p. 100.
Schreber, Sammlung verschiedener Schriften, II.
 p. 281.
 Allgem. Haushaltungslex. I. p. 419. *Ente.*
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 54. *Boschas.* *
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 17. *Boschas.* *
Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 127. n. 34. Anas
 (Boschas) rectricibus intermediis (maris) recur-
 vatis, rostro recto. *
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 16. n. 12. Anas
 (Boschas) rectricibus intermediis (maris) re-
 curvatis, rostro recto. *
Charleton, onomast. zoic. p. 99. n. 6. Anas fera.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 197. Anas fera I. seu
 torquata minor; *ein wilde blaw Endte, Mertz-
 Endte.*

Endte, Gros-Endte, Rätſch-Endte, Blas-Endte, Spiegel-Endte.

Jonſton, av p. 144. *Bofcades maiores.*

Hermann, tab. aff. anim. p. 159. *Anas Boſchas.*

Phil. Transact. IXII. p. 419.

Forkſkål, fn. orient. p. 6. n. 9. d. *Descript. animal.* p. 3. n. 9. *Anas Boſchas.*

Donndorff, Handb. der Thiergeſch. p. 262. n. 22. *die gemeine Ente.* *

β. *CIRRATA. Die gehäubte wilde Ente.*

Briffon, ornitholog. II. p. 444. n. 1. A. *Anas domestica cirrata; Canard domestique hupé.*

Friſch, Vögel, Tab. 178. *die hollige Hausente.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 699.

γ. *PERSICA. Die perſiſche Ente.*

Briffon, ornitholog. II. p. 445. n. 1. B. *Anas persica; Canard de Perſe.*

Friſch, Vögel, Tab. 167. *die perſiſche Ente.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 694.

δ. *MAIOR. Die Störente.*

Briffon, ornitholog. II. p. 448. n. 4. A. *Boſchas maior; grand Canard ſauvage.*

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. II. p. 704. n. 1. *die Störente, Störente, Sterzente.*

Klein, av. p. 131. n. 3. *Anas fera 2. feu torquata maior. Schwenkf.*

Klein, Vorbereit. p. 243. n. 3. *Stor- oder Sterzente.*

Klein, verbess. Vögelhiſt. p. 139. n. 3. *die zweyte wilde Ente.*

Gesner, Vögelb. p. 78. *größere wilde blawe Ente, Stortzent genannt.* Fig. p. 79.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 851. n. 49. γ. *Boſchas maior.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 198. Anas fera 2. seu torquata maior; ein *Stor-Endte*, *Stertz-Ente*, *große Wild-Endte*.

Döbel, Jägerpraktik, p. 71. die sonst allgemeine große Ente.

ε. *GRISEA. Die Schmalente.*

Briffon, ornitholog. II. p. 448. n. 4. B. Boschas maior grisea; *Grand canard sauvage gris*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 704. n. 2. die Schmalente.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 696. die Schmalente.

Frisch, Vögel, 173. Anas iuncea.

Gesner, Vögelb. p. 78. Anas iuncea vel graminea; ein Schmilent.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 851. n. 49. δ. Boschas maior grisea.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 199. Anas fera 4. seu iuncea; ein *Schmäl-Endte*, *Schmil-Endte*, *Schmelichen*.

ζ. *NAEVIA. Die Rosente.*

Müller, Naturfyst. II. p. 300. Spiegelenten.

Briffon, ornitholog. II. p. 449. n. 4. C. Boschas maior naevia; *grand Canard sauvage tacheté*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 705. n. 3. die Rosente.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 851. n. 49. ε. Boschas maior naevia.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 199. Anas fera 3. seu maior; ein *Ros-Ente*, *Mertz-Endte*, *große wilde Endte*.

η. *NIGRA. Die Schildente.*

Briffon, ornithol. II. p. 449. n. 4. D. Anas fera nigra; *Canard sauvage noir*.

Bechstein,

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 705. n. 4.
die Schildente.

42. GALERICULATA. Die chinesische Haubenente.
Müller, Naturfyst. II. p. 300. n. 42. Federkappe.
Halle, Vögel, p. 564. n. 684. die Chineserente,
mit grünem Federbusche.

Klein, av. p. 136. n. 34. Anas Sinensis.

Klein, Vorbereit. p. 251. n. 34. sinesische Ente.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 143. n. 34. sinesische
Ente.

Briffon, ornitholog. II. p. 478. n. 34. Sarcelle de
la Chine.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 99. sinesisches Kriech-
entlein.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 871. n. 98. Anas
(Galericulata) crista dependente, dorsoque postico
utrinque penna recurvata compressa elevata.

Linne', Syst. Natur. Edit. X. I. p. 128. n. 36. Anas
(Galericulata) crista dependente dorsoque po-
co utrinque penna recurvata compressa elevata.

43. SPONSA. Die Sommerente. (8)

Müller, Naturf. II. p. 301. n. 43. die Braut.

Borowsky, Thierreich, III. p. 20. n. 16. die
Braut.

Halle, Vögel, p. 562. n. 677. die amerikanische
Sommerente, Plümagenente.

Klein, av. p. 134. n. 21. Anas cristata americana.

Klein, Vorbereit. p. 248. n. 21. Plümmente aus
Amerika.

Klein, verb. Vögelhist. p. 141. n. 21. Plümmente.

Briffon, ornithol. II. p. 455. n. 11. Canard d'été.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 90. 94. die Sommer-
ente.

D dd 4

Latham,

(8) Flügelweite 30 Zoll. Penn.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 871. n. 97. Anas (Sponsa) crista dependente duplici viridi caeruleo alboque varia.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 128. n. 37. Anas (Sponsa) crista dependente duplici viridi caeruleo alboque varia.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 263. n. 23. die Sommerente.

44. ARBOREA. Die Baumentente.

Müller, Naturfyst. II. p. 301. n. 44. Baumentente.

Pennant, arch. Zoolog. II. p. 522. n. 410. die Baumentente.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 138. n. 17. schwarzschwänzige Gans.

Briffon, ornitholog. II. p. 467. n. 24. Canard siffleur de la Jamaïque.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 852. n. 53. Anas (Arborea) grisea, capite subcristato, abdomine albo nigroque undulato.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 88. die pfeifende Ente mit schwarzem Schnabel.

Bankroft, Naturgeschichte von Guiana, p. 102. Schopfente mit breitem u. schwarzem Schnabel.

Naturf. XII. p. 137. n. 85. Baumentente?

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 128. n. 38. Anas (Arborea) grisea, capite subcristato, abdomine albo nigroque maculato.

Linne', Syst. Nat. Edit. XII. I. p. 207. n. 44. Anas (Arborea) grisea, capite subcristato, abdomine albo nigroque maculato.

Hermann, tab. affin. anim. p. 159. Anas arborea.

45. CRISTATA. Die Haubenente von Statenland.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 870. n. 93. Anas (Cristata) cristata cinerea, fronte, genis colloque

que postico cinerascens, gula iuguloque flavescens, maculis ferrugineis, speculo alarum caeruleo subtus albo.

115. **OBSCURA.** *Die dunkelbraune Ente von Neuyork.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 525. n. 414. *die dunkelbraune Ente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 871. n. 96. Anas (Obscura) fusca, collo striis longitudinalibus obscuris, speculo alarum caeruleo nigro marginato, rectricibus albo marginatis.

116. **ISLANDICA.** *Die gelbfüßige isländische Ente.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 534. H. *die isländische Ente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 871. n. 95. Anas (Islandica) cristata nigra, iugulo, pectore abdomineque albis, pedibus croceis.

Olaassen, Island, I. p. 292. *Hrafu - Oend.*

117. **NOVAE SEELANDIAE.** *Die schwarze neuseeländische Ente.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 870. n. 92. Anas (N. Seelandiae) nigra viridinitens, subtus cinerascens, capite colloque postice caeruleo et purpureo nitente, fascia alarum alba.

118. **RUFINA.** *Die Kolbenente.*

Müller, Naturfyst. Suppl. p. 102. n. 46. *die einsame Ente.*

Halle, Vögel, p. 567. n. 692. *die Karminente.*

Klein, av. p. 135. n. 26. Anas cristata flavescens.

Klein, Vorbereit. p. 249. n. 26. *Gelbschups mit einem Federbusche.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 142. n. 26. *Gelbschopf.*

Briffon, ornithol. II. p. 465. n. 22. Canard fifeur hupé.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 870. n. 94. Anas (Rufina) nigra, dorso et alis fuscis, capite colloque testaceo - rubris, vertice rufescente, speculo albo nigro - marginato.

Pallas, Reise Ausz. II. p. 240. eine Art großer Seeenten mit rothem gehäubten Kopfe.

Pallas, Reise, Ausz. II. Anh. p. 15. n. 28. Anas rufina.

Pallas, nord. Bey'r. III. p. 12. die Kolbente.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 14. Anas fistularis cristata *Briff.*

Pallas, Naturgesch. merkwürd. Thiere, VI. p. 40. Tab 5. die Rothkopfente.

Lichtenberg, Magaz. f. d. Neueste u. f. w. II. 1. p. 108. die Kolbente.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 201. Anas fera 9. seu Erythrocephalos 2; ein Brandt - Entte, Rott - Hals, Rott - Kopf.

Kramer, Austr. p. 339. n. 8. Anas rostro cocineo, capite rufo cristato, macula alarum pallide carnea; türkische Ente.

Rzaczynsk. histor. natur. Polon. p. 357. Anas Erythrocephalos; Brandente.

119. NYRACA. Die Nyraca.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 869. n. 91. Anas (Nyraca) atro - olivacea, capite, collo pectoreque castaneis, uropygio nigro, abdomine, cristato maculaque alarum albis.

120. ARABICA. Die arabische Ente.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 877. n. 113. Anas (Arabica) griseo - maculata, subtus et uropygio

gio albida maculis cinereis, alarum speculo nigricante, anterieus et posterius albo.

121. ALEXANDRINA. *Die alexandrinische Ente.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 877. n. 114. Anas (Alexandrina) rostro crissoque nigris, collo cinereo femicirculis nigris, (beym *Forskål* steht *albis*) abdomine albo, pedibus cinereo flavis.

122. GATTAIR. *Die Gattair.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 877. n. 115. Anas (Gattair) fusca, alis nigris subtus albis, margine fuscis, remigibus 4-20 medio albis.

123. SIRSAEIR. *Die Sirsaeir.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 877. n. 116. Anas (Sirsaeir) rostro subtus flavo, speculo alarum oblique dimidiato, supra fericeo-viridi subtus nigro, antice et postice albo.

124. BALBUL. *Die Balbul.*(⁹)

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 874. n. 100. ♂. Anas rostro nigro, speculo alarum supra oblique viridi, infra oblique nigro.

45. FULIGULA. *Die europäische Haubenente.*

Müller, Naturyst. II. p. 302. n. 45. europäische Haubenente.

Borowsky, Thierreich, II. p. 19. n. 15. europäische Haubenente.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 721. n. 1. die europäische Haubenente. p. 723. Straußente, Freske, kleine Tauchente, Pfeifente, kleine Haubenente, rußfarbige Ente.

Bechstein,

(8) Nach *Latham* eine Varietät von *Anas Crecca*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 695. 696.
Reiger-oder Straußente.

Halle, Vögel, p. 558. n. 669. *die schwarze See-
ente, mit dem Federbusche und weißem Flü-
gelstriche.*

*Onomat. hist. nat. I. p. 413. die buschige oder kam-
mige kriechende Straußente.*

Klein, av. p. 133. n. II. *Anas fuligula.*

Klein, Vorbereit. p. 245. n. II. *Schups-, schwar-
ze Ente, Moorente.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 140. n. II. *schwarze
Schopfente, Moorente.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 534. G. *die Haubenente.*

Briffon, ornithol. II. p. 469. n. 26. *petit Mo-
rillon.*

Batsch, Thiere, I. p. 380. *die Haubenente.*

Gesner, Vögelb. p. 84. *Anas Fuligula; mit Ab-
bildung des Kopfs. (Rüsgenkopf.)*

Gesner, Vögelb. p. 85. *Anas cirrhata.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 869. n. 90. *Anas
(Fuligula) crista dependente, corpore nigro,
abdomine speculoque alarum albis.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 49. n. 90. *die euro-
päische Haubenente.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 81. n. 88.
Schopfente.

Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 341. *der
Schwarzkopf.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 334. n. 86.
Moor-, Schopf-, Haubenente.

Lepchin, Tageb. d. russ. Reif. I. p. 189. III.
p. 14. *russige Enten.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die Moorente.*

Stralfund, Magaz. I p. 147. *Anas Fuligula.*

Schwed. Abhandl. XLI. p. 23. Anas Fuligula.

Naturf.

Naturf. XII. p. 138. n. 86. *europäische Haubenente*.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 69. n. 78.
die schwarze Ente, Schopfente.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 54. Fuligula.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 18. Fuligula.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 128. n. 39. Anas
 (Fuligula) crista dependente, corpore nigro,
 ventre maculaque alarum albis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 16. n. 129. Anas
 (Fuligula) crista dependente, corpore nigro,
 abdomine speculoque alarum albis.

Brünnich, ornitholog. bor. p. 21. n. 90. Anas Fu-
 ligula.

Kramer, Austr. p. 341. n. 12. Anas crista depen-
 dente, corpore nigro, ventre maculaque ala-
 rum albis.

Charleton, onomast. zoic. p. 101. n. 2. Querque-
 dula cristata f. Colymbus.

Fonston, av. p. 144. Querquedula cristata.

β. *Die braune Haubenente, mit schwarzem Kopf,
 Schnabel und Füßen.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 69. n. 78.
 erste Abänderung.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 869. n. 90. β.
 Anas cristata fusca, capite violaceo-nigro, uro-
 pygio fuliginoso albo vario, rostro pedibusque
 nigris.

γ. *Die schwarze Haubenente, mit braunem Rücken,
 mit rothbraunem Kopf, und dergleichen Anfang
 des Halses.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 69. n. 78.
 zweyte Abänderung.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 869. n. 90. γ. Anas
 subcristata nigra, dorso fusco, capite ac initio
 colli

colli rufis, remigibus albis, ad basin alarum fascia alba.

δ. Die Haubenente, mit weißem Unterleibe, rothbraunem Kopf und Halfe.

Scopoli, Bemerk a. d. Naturgesch. I. p. 70. dritte Abänderung.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 869. n. 70. δ. Anas cristata, subtus alba, capite rufo, temporibus viridinitidis, alis fascia rufa, postea viridinitente, denique nigra, remigibus fuscis.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 194. β. Cygnus Manfuc- p. 501. n. 47. Anas Olor.
tus.

p. 206. β. Anas domestica. p. 538. n. 113. Anas Dome-
stica.

p. 197. n. 9. γ. Anser cana- p. 509. n. 64. Anas Albi-
densis fuscus maculatus. frons.

Das Geschlecht ist übrigens mit 79 Gattungen vermehrt. Bey der 11ten Gattung sind die zu dieser und *Anas Albifrons* n. 64, so wie bey der 13ten die zu dieser, und *Anas Erythropus* n. 11. gehörige Synonymen getrennt. Bey der 10ten Gattung sind zwey, bey der 15ten zwey, bey der 27ten zwey, bey der 28ten zwey, bey der 29ten zwey, bey der 31ten drey, bey der 33ten zwey, bey der 40ten sieben, bey der 45ten vier Varietäten aus einander gesetzt. Bey der 19ten ist die Var. γ, und bey der 37ten die Var. γ hinzugekommen.

B. Un-

B. Unbestimmtere Thiere.

1. Die livländische Haubenente.

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 81. n. 90.

Bock, Naturgeschichte von Preussen, IV. p. 334.
n. 85.

2. Die rothköpfige Ente.

Bock, Preussen, IV. p. 335. n. 87.

Naturf. XII. p. 136. n. 87.

3. Zwey Enten mit schieferfarbenem an der Spitze
schwarzem Schnabel u. s. w.

Schneider, zool. Abh. p. 154.

4. Eine Ente mit an den Seiten rothgelbem, vorn
und in der Mitte schwarzem Schnabel, und
lichtgelben Füßen.

Schneider, zool. Abh. p. 155.

5. Die kurzschnäblige Ente (Anas Brachyrhynchus.)

Beseke, Vögel Kurl. p. 49. n. 1. Tab. 5.

6. Die weiße Ente mit zinnoberrothen Augenringen.
(Anas Erythrophthalmos.)

Beseke, Vögel Kurlands, p. 50. n. 2.

7. Die rußschwarze Ente. (Anas Orphanos.)

Beseke, Vögel Kurlands, p. 51. n. 3.

8. Eine, der europäischen Haubenente ähnliche Ente,
aber ohne Federbusch.

Beseke, Vögel Kurl. p. 51. n. 4.

9. Anas (Denudata) alba, occipite, dorso, remigibus
secundariis rectricibusque, quatuor intermediis
exceptis, aeneis, facie ultra oculos nuda, cera
rostri medio depressa, antice in lobulum ex-
planata.

Hermann, tab. affin. anim. p. 158.

10. *Anas* (*Melanocephala*) *albicans*, dorso nigricante, abdomine speculoque alarum albis, capite tumido fusco.

Hermann, tab. affin. anim. p. 161.

11. *Anas* (*Leucotis*) *fusca*, ventre pallidior, macula ante et post oculos, speculoque alarum albis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 161.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Die ganz schwarze Ente, mit weißen Flügelrändern und rothem Schnabel, aus Neuhoiland.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 834. n. 4. *Anas* (*Atrata*) tota atra, margine alarum albo, rostro rubescente.

Phillips voy. Bot. Bay, p. 98. Black Swan.

2. *Die nelkenfarbige indianische Ente, mit blauen Füßen.*

Latham, Syn. Supplement p. 276. Pink-headed Duck.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 866. n. 85. *Anas* (*Caryophyllacea*) fusco-badia, rostro, capite colloque supremo caryophyllaceis, speculo ferrugineo, pedibus caeruleis.

3. *Die Ente von der Insel Aland.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 876. n. 110. *Anas* (*Sparrmanni*) subtus sordide alba, supra nigro ferrugineo alboque varia, scapularibus nigris, margine lineisque disci albo-ferrugineis, antice in angulum coalescentibus variegata.

Mus. Carl. fascic. III. Tab. 60. *Anas alandica*.

68. GESCHLECHT. MERGUS. *Der Sägetaucher. (Taucher, Tauchente, Wasserhuhn, Tauchgans, Säger, Sägeschnäbler.)*

Müller, Naturfyft. II. p. 303. Gen. LXVIII.

Leske, Naturgesch. p. 268. Gen. LXXII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 20. Gen. XXXIII.

Blumenbäch, Handbuch der Naturgesch. p. 227.

Gen. LXXVII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 392. Gen. XXII.

Halle, Vögel, p. 578. Gen. III.

Pennant, arct. Zool. II. p. 498.

Neuer Schaupl. der Natur, VII. p. 411.

Onomat. hist. nat. V. p. 164.

Klein, av. p. 140. Gen. II. Plotus Serrator.

Briffon, ornith. II. p. 423. Gen. CV. Merganser.

Batsch, Thiere, I. p. 367. Gen. XC.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 828. Gen. XCVI.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 156.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 263.

Gen. XXIX.

I. CUCULLATUS. *Der Kappentaucher.*

Müller, Naturfyftem, II. p. 303 n. 1. *Kappentaucher.*

Halle, Vögel, p. 581. n. 724. *der Mohrenvogel mit weißem Bunde.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 134. n. 120. *der Kappentaucher, virginische Taucher.*

Onomat. histor. nat. V. p. 166. *der Mohrenvogel, Mohrenmütze.*

Klein, av. p. 140. n. 3. Serrator Cucullatus.

Klein, Vorbereit. p. 259. n. 3. *Mohrenmütze.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 148. n. 3. *Säger mit der Mohrenmütze.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 500. n. 385. *der Kappentaucher.*

Briffon, ornitholog. II. p. 429. n. 8. Harle hu-
pé de Virginie.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 830. n. 5. Mer-
gus (Cucullatus) crista globosa, utrinque alba,
corpore supra fusco, subtus albo.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 88. *die gehaubte Ente.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 129. n. 1. Mer-
gus (Cucullatus) crista globos., utrinque alba,
corpore supra fusco, subtus albo.

Jonston, av. p. 184. *Heatototl.*

Nieremberg, Hist. East. L. 10. c. 47. *Heatototl.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 152. Mergus Cu-
cullatus.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 263. n. 1.
der Kappentaucher.

2. MERGANSER. *Die Tauchergans.*

Müller, Naturyst. II. p. 304. n. 2. *Taucher-
gans.*

Leske, Naturgeschichte, p. 289. n. 1. *die Tau-
chergans.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 21. n. 1. *der Seera-
che, die Tauchergans.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 227. n. 1.
Mergus (Merganser) crista longitudinali-ere-
ctiuscula, pectore albido immaculato, rectri-
cibus cinereis, scapo nigricante; *der Kneifer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 392. n. 1. *die Tau-
chergans.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 724. n. 1.
die Tauchergans. p. 732 *Seerrachen, Seera-
ben, Täucherkiebitze, Gänsefägetaucher, Knei-
fer,*

- fer*, Schöbboje, *Straben*, *Mohren*, *Schnarrgänse*, *Bottervögel*, *Straußtäucher*, *Merch*, *Ganner*, *große Kolbentaucher*, *Winternörks*.
Halle, Vögel, p. 579. n. 722. *der gezackte Taucher*.
Halle, Vögel, p. 578. n. 723. *der Täucher kinviz*.
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 134. n. 121. *die Tauchergans*.
Onomat. histor. nat. V. p. 107. *der gezackte Taucher*, *Tauchersäge*.
Pennant, arct. Zool. II. p. 498. n. 383. *die Tauchergans*.
Klein, av. p. 140. n. 1. *Serrator*.
Klein, Vorbereit. p. 258. n. 1. *Kneifer*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 148. n. 1. *gemeiner Säger*.
Gesner, Vögelb. p. 95. *Anas raucedula*.
Gesner, Vögelb. p. 97. *Merganser*.
Briffon, ornitholog. II. p. 423. n. 1. *Harle*.
Batsch, Thiere, I. p. 380. *der Seerachen*.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 828. n. 1. *Mergus* (*Merganser*) *subcristatus albus, capite, collo supremo, dorso remigibusque nigro - nitentibus, cauda cinerea*.
Beseke, Vögel Kurl. p. 52. n. 98. *die Tauchergans*.
Fischer, Naturgesch. v. Livl. p. 82. n. 91. *gezopfter Kneifer*, *Tauchergans*.
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 335. n. 88. *großer Taucher*.
Lepchin, Tagebuch der russ. Reise, III. p. 14. *große Tauchenten*.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 78. n. 90. *der Mohr*.
Lichtenberg, Magazin f. d. Neueste u. f. w. IV. 2. p. 148. *Tauchergans*.
Naturf. XII. p. 138. n. 88. *Tauchergans*.

Pontoppidan, Naturg. von Dännemark, p. 168.
n. 1. *Skiöränd*.

Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 126.
Mort-Aender, Fisk-Aender.

Pallas, Reif. III. p. 475. *Serrabe*.

Debes, Hist. der Insel Feroë, I. p. 130.

Göts, Naturgesch. einiger Vögel, p. 73. *die Tauchergans*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 406. *die Schnarr-Ganß*.
Neue schwed. Abh. IV. p. 46. VI. p. 287. *Tauchergans*.

Sander, über die Gröfse u. Schönheit in der Nat.
I. p. 246. *die Tauchergans*.

Linné, Syft. Natur. Edit. II. p. 54. Merganser.

Linné, Syft. Nat. Ed. VI. p. 23. n. 1. Merganser.

Linné, Syft. Nat. Ed. X. I. p. 129. n. 2. Mergus
(Merganser) crista dependente, capite nigro-
caerulefcente, collari albo.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 16. n. 133 Mergus
(Merganser) crista longitudinali erectiuscula,
pectore albido immaculato, rectricibus cinereis,
scapo nigricante.

Charleton, onomast. zoic. p. 95. n. 1. Merganser.

Muf. Worm. p. 300. Merganser.

Moehring, av. gen. p. 61. n. 62. Mergus.

Jonston, av. p. 134. Merganser.

Schäfer, element. ornith. Tab. 47.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 264. n. 2.
die Tauchergans.

β. CASTOR. *Der* (so genannte) *Bibertaucher*.⁽⁹⁾

Müller, Naturfyftem, II. p. 306. n. 4. *der Biber-
taucher*.

Leske, Naturg. p. 289. ad n. 1. Mergus Castor.

Bech-

(9) Nach *Briffon* u. *Latham* eine eigne Gattung.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 731. Var. 1.
der Bibertaucher.

Onomat. histor. nat. V. p. 166. *die Biber-Ente.*

Briffon, ornitholog. II. p. 428. n. 7. *Harle-
cendré ou le Bièvre.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 829. n. 2. *Mer-
gus (Castor) cristatus cinereus, capite colloque
supremo spadiceis, gula, remigibus interme-
diis abdomineque albis.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 409. ad n. 383. *das
Weibchen oder der kastanienbraune Taucher.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 76. n. 88.
der Vielfraß.

Kramer, Austr. p. 343. n. 2. *Mergus crista depen-
dente cinereo albus, capite castaneo, pedibus
luteis; braunköpfiger Tilger, Taucher.*

Charleton, onomast. zoic. p. 95. n. 4. *Mergus
ruber.*

Jonston, av. p. 134. *Mergus ruber.*

γ. RUBRICAPILLUS. *Die rothköpfige Tau-
chergans.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 732. Var. 2.
die rothköpfige Tauchergans.

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 168.
n. 5. *Skallesluger.*

Neue Mannichfaltigk. III. p. 307. *der Muschel-
könig.*

3. SERRATOR. *Der Meerrachen.* (10)

Müller, Naturyst. II. p. 305. n. 3. *der Langschna-
bel.* Tab. 9. fig. 1.

Leske, Naturgesch. p. 282. n. 2. *der Meerrachen.*

Ecc 3

Borowsky,

(10) Flügelweite 2 Fufs 7 Z. Gewicht des Männchens 2 Pfund.
Pennant.

- Borowsky*, Thierreich, III. p. 22. n. 2. *der lang-
schnäblige Meerrachen.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 393. n. 2. *der Meer-
rachen.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 732. *der
Meerrachen.* p. 337. *Langschnabel, lang-
schnäbliger Säger, Schreckvogel, wahrer Säge-
taucher Sägeschnäbler, gezopfter Säger,
Tauchente, Scharbege, Norks, Fischtreiber.*
Tab. 24.
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 136. n. 122. *der Meerrache.*
- Onomat. histor. nat.* V. p. 168. *die Täuchergans,
der Täucher - Kwitz.*
- Klein*, av. p. 140. n. 2. *Serrator Cirratus.*
- Klein*, Vorbereit. p. 258. n. 2. *gezopfter Kneifer.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 148. n. 2. *gezopfter
Kneifer.*
- Klein*, stemmat. av. p. 33. Tab. 37. fig. 1. a - c.
- Gesner*, Vögelb. p. 95. *ein Langschnabel oder
Schluchtent; mit Abbild. des Kopfs.*
- Briffon*, ornithol. II, p. 424. n. 2. *Harle hupé.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 380. *der langschnäblige
Seerachen.*
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 829. n. 4. *Mergus
(Serrator) crista dependente, pectore rufescen-
te variegato, collari albo, rectricibus fuscis ci-
nereo variegatis.*
- Seligmann*, Vögel, IV. Tab. 85. *der größere
rothbrüstige Taucher.*
- Pennant*, arct. Zoolog. II. p. 499. n. 384. *der
Meerrachen.*
- Bock*, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 337. n. 89.
der Langschnabel, gemeiner Säger.
- Lepechin*, Tageb. d. russ. R. III. p. 14. *Sägetaucher.
Pontop.*

- Pontoppidan*, Dännemark, p. 168. n. 2. *Topand, Skrække.*
- Naturforscher*, XII. p. 139. n. 89. *der Langschnabel.*
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 77. n. 89. *der weißlichte Taucher.*
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 71. *der See-Rachen.*
- Sander*, Größe und Schönheit in der Natur, III. p. 174. *Meerrachen.*
- Beckmann*, physikal. ökonom. Bibl. VI. p. 223. *Meerrachen.*
- Linné*, Syst. Natur. Edit. II. p. 54. Mergus.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 23. n. 2. Mergus fuscus.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 129. n. 3. Mergus (Serrator) crista dependente, capite nigro maculis ferrugineis.
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 16. n. 134. Mergus (Serrator) crista dependente, pectore rufescente variegato, collari albo, rectricibus cinereis, scapo nigricante.
- Schwenkfeld*, aviar. Siles. p. 205. Anas longirostra 1; ein Langschnabel, Schlicht-Endte, Teucher, Wieselchen, weiße Tuch-Endte.
- Charleton*, onomast. zoic. p. 95. n. 3. Mergus Longirostrus.
- Jonston*, av. p. 134. Mergus quem Bellonius gallice *Herle* vocat. p. 133. Mergus Longirostrus.
- Fabric.* fn. groenl. p. 75. n. 48. Mergus (Serrator) crista dependente, pectore rufescente variegato, collari albo, rectricibus fuscis, cinereo-variegatis.
- Donndorf*, Handb. der Thiergesch p. 264. n. 3. *der Meerrachen.*

- β. SERRATUS. *Der Sägeschnäbler.* (1)
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 736. Var. I.
- γ. NIGER. *Der schwarze Meerrachen.* (2)
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 737. Var. 2.
Gesner, Vögelb. p. 95. Mergus niger; ein schwar-
 zer Täufer.
Briffon, ornithol. II. p. 427. n. 5. Harle noir.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 830. n. 4. γ.
 Mergus supra niger, subtus albus, collo spadiceo,
 taenia transversa in alis candida, remigibus
 maioribus rectricibusque nigris.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 207. Anas longirostra 3;
 ein großer Taucher, Rache, Tauch-Endte,
 schwarzer Taucher.
Fonston, av. p. 134. Mergus niger.
- δ. LEUCOMELAS. *Der bunte Meerrachen.* (3)
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 337. Var. 4.
Briffon, ornith. II. p. 427. n. 4. Harle blanc et noir.
Latham, Syn. III. 2. p. 425. n. 3. Var. A.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 830. β. M. supra
 niger subtus albus, remigibus maioribus nigris,
 rectricibus fuscis.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 208. Anas longirostra 6;
 eine große gefleckte Ente.
4. IMPERIALIS. *Der sardinische Sägetaucher* (4)
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 829. n. 3. Mer-
 gus (Imperialis) ex nigro fusco et griseo va-
 rius,

(1) Das Synonym aus Brün. n. 96. rechnet *Latham* zu seinem *Mergus, Castor*.

(2) Nach *Briffon* u. a. eine eigne Gattung. Nach *Latham* eine Spielart vom Weibchen des *M. Serrator*.

(3) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

(4) *Oedmann* hält ihn für das Weibchen einer unbekanntes Art,
 die

rius, capite laevi, remigibus primoribus nigris, speculo nullo, rostro pedibusque ex rufescente albis.

Oedmann: neue schwed. Abhandl. VI. p. 289. n. 2.
Anitra imperiale *Cetti*.

5. ALBELLUS. *Der weiße Sägetaucher.* (5)

Müller, Naturfystem, II. p. 306. n. 5: *die weiße Nonne*. Tab. 9. fig. 2.

Leske, Naturgesch. p. 289. n. 3. *der weiße Sägetaucher*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 22. n. 3. *der weiße Sägetaucher*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 393. n. 5. *die weiße Tauchente*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 738. n. 3. *die weiße Tauchente*. p. 742. *weiße Nonne, Merchente, Eisente, Eistaucher, Nonnenentchen, Elsterentchen, niederländisches Entchen, Winterente, Rheintaucher, Straßburger-Taucher, Scheckente, Kreuzente, weißer Sägetaucher, Weißzopf, Meventaucher, Mevendücker*.

Halle, Vögel, p. 564. n. 683. *die Winterente mit herabhängendem Federbusch*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 501. n. 386. *die Merchente, Eisente*.

Onomat. histor. natur. V. p. 165. *der weißliche Taucher*.

Klein, av. p. 140. n. 4. *Serrator minimus*.

Klein, Vorbereit. p. 259. n. 4. *kleiner weißköpfiger Säger*.

E e e 5

Klein,

die nicht eher zu bestimmen sey, bis man das Männchen entdeckt habe.

(5) Länge 18 Zoll. Flügelweite 26 Zoll. Gewicht 34 Unzen.

Pennant.

- Klein*, verb. Vögelhist. p. 149. n. 4. *kleiner weißköpfiger Säger*.
- Gesner*, Vögelb. p. 92. *Rheinente*.
- Briffon*, ornitholog. II. p. 425. n. 3. *petit Harle hupé, ou la Piette*.
- Batsch*, Thiere, I. p. 380. *der weiße Sägetaucher*.
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 831. n. 6. *Mergus (Albellus) crista dependente, occipite nigro, corpore albo, dorso temporibusque nigris, alis variegatis*.
- Befrke*, Vögel Kurl. p. 53. n. 9. *die weiße Nonne*.
- Bock*, Naturgeschichte von Preussen, IV. p. 337. n. 90. *die weiße Nonne, Weißzopf*.
- Pontoppidan*, Naturgesch. v. Dänemark, p. 168. n. 3. *Hvidfiden*.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 78. n. 91. *die Scheckente*.
- Zorn*, Petinotheol. II. p. 413. *die Scheck Ente*.
- Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Freunde, VII. p. 457. *die weiße Nonne*.
- Naturf. XII. p. 139. n. 90. *die weiße Nonne*.
- Neue schwed. Abh. I. p. 224. *Mergus Albellus*.
- Cetti*, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 325. *die weiße Tauchente*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 129. n. 4. *Mergus (Albellus) crista dependente, subtus nigra, corpore albo, dorso nigro, alis variegatis*.
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 16. n. 135. *Mergus (Albellus) crista dependente, occipite nigro, corpore albo, dorso temporibusque nigris, alis variegatis*.
- Kramer*, Austr. p. 344. n. 3. *Mergus cristatus niger alboque varius, utrinque ad dorsi alarumque principium duabus semicirculis nigris*.

Charleton, onomast. zoic. p. 95. n. 1. Mergus
Rhenanus, quibusdam Monialis alba.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 208. Anas longirostra 5.
Eys-Endte, *Nonn-Endte*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 209. Anas longirostra 7.
geschecktes Endtlin, *Elster-Endtlin*, *Nonn-Endtlin*, *Eyß-Endtlin*, *niederlendisch Endtlin*.

Jonston, av. p. 133. Mergus Rhenanus.

a. M A S. *Das Männchen.*

Klein, av. p. 135. n. 30. Anas Albella.

Klein, Vorbereit. p. 250. n. 30. *Weißzopf*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 142. n. 30. *Weißzopf*.

Naturf. XXV. p. II. n. 5. Mergus Albellus.

b. F E M I N A. *Das Weibchen.* (6)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 741. *die Sternente.*

Halle.

(6) Männchen und Weibchen sind bey dieser Gattung in GröÙe und Farbe so sehr von einander verschieden, daß *Briffon* und mehrere Ornithologen sie für zwey verschiedene Gattungen gehalten haben. Uebrigens bemerke ich hier und bey der folgenden Gattung eine solche Verwechslung der Synonymen, daß man gar nicht weiß, wie man durch das Labyrinth sich durcharbeiten soll. In unserm System ist z. E. bey *Mergus Minutus* p. 548. n. 6. *Linnés* *fn. Suec.* II. n. 138. angeführt, der ganze Charakter aber wie in der XIIten Edition p. 209. n. 6. bestimmt. Hier finde ich aber die *fn. Suec.* nicht nur von *Linné* selbst gar nicht angeführt, sondern man kann auch bey Vergleichung der ältern Linnéschen Synonymen nicht wohl annehmen, daß diese Stelle hierher gehöre. Denn 1) in der Edit. X. I. p. 129. n. 5. ist auf *fn. suec.* I. n. 115. hingewiesen, und *Albin. wezel-coot* als das einzige Synonym angeführt, dies ist aber offenbar das Weibchen von *Mergus Albellus*. 2) In der *fn. Suec.* II. p. 49. n. 138. wird *fn. Suec.* I. n. 115. wieder als Synonym angeführt. Ich sehe also nicht ab, wie diese Stelle auf *Mergus Minutus* Ed. XIII. (wenn dies eine

Halle, Vögel, p. 563. n. 682. *die Sternente*.

Klein, av. p. 135. n. 29. *Anas stellata*,

Klein, Vorbereit. p. 250. n. 29. *Sternente*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 142. n. 29. *Sternente*.

Briffon, ornithol. II. p. 428. n. 6. *Harle étoilé*.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 23. n. 3. *Mergus melanoleucus?*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 128. n. 5. *Mergus (Minutus) capite griseo laevi?*

Linné, fn. Suec. I. n. 115. II. n. 138. *Mergus (Minutus) capite griseo laevi?*

Naturf. XXV. p. 11. n. 5. *Mergus Albellus*.

6. MINUTUS. *Der kleine Sägetaucher*. (7)

Müller, Naturfyst. II. p. 306. n. 6. *Pfeilschwanz*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 742. Var. 1. *die kleine Tauchente*. p. 743. Var. 3. *die ungarische Tauchente*.

Onomat. histor. nat. V. p. 167. *die Sternente*.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 502. A. *die kleine Tauchente*.

Gesner, Vögelb. p. 93. *eine weiße Tauchente*.

Briffon, ornitholog. II. p. 426. n. 3. (Femina.)

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 832. n. 7. *Mergus (Minutus) cinereo fuscus, subtus gulaque candida, capite et collo superiore ferrugineo, macula alarum ante et pone alba*.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 337. n. 91. *Pfeilschwanz, Taucherlein*.

Scopoli,

eine eigne Gattung seyn soll) gehen könne. Noch auffallender ist es, daß *Latham* den *Mergus Minutus Linn.* Ed. XII. p. 209. n. 6. als das Weibchen von *Mergus Albellus* und die *fn. Suec. II. n. 138.* als Synonym von *Mergus Minutus* anführt.

(7) Nach *Leske*, *Bechstein*, *Latham* u. a. das Weibchen oder ein Junges von *Mergus Albellus*. S. die vorige Anmerk.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 79. n. 92.
die ungarische Tauchente.

Pontoppidan, Dännemark, p. 168. n. 3. *Tinus*.
n. 6. *Soestierne*.

Naturf. XII. p. 139. n. 91. *Pfeilschwanz*.

Hasselquist, Reise n. Paläst. (Ed. germ.) p. 322.
n. 37. *Mergus Tinus*.

Kramer, Austr. p. 344. n. 4. *Mergus vertice et*
fronte castaneo-ferrugineis, capite subcristato;
pedibus nigris, nigro-cinereo alboque varius;
kleines Taucherl, kleines Eißantl, Tuckantl.

Charleton, onomast. zoic. p. 95. n. 2. *Mergus*
Glacialis.

Jonston, av. p. 133. *Mergus Glacialis*. p. 134.
Mergus Albus.

β. ASIATICUS. *Der asiatische Sägetaucher*.⁽⁸⁾

Latham, Syst. ornithol. II. p. 832. n. 7. β. *Mer-*
gus capite laevi, dorso nigro abdomine albo,
rostrō pedibusque sanguineis, remigibus pri-
moribus nigris, cauda cinerea.

Oedmann: neue schwed. Abhandl. VI. p. 289.
n. 2. *Mergus asiaticus*.

7. FURCIFER. *Der gabelschwänzige Sägetaucher*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 832. n. 8. *Mergus*
(Furcifer) niger, capite laevi, collo, ano, ab-
domine et rectricibus lateralibus albis, fronte
genisque dilute fuscis, cauda furcata.

A. Ver.

(8) Soll, nach *Oedmann*, zu *Scopolis Mergus Aethiops* n. 90. —
folglich zu *Mergus Merganser* unsers Systems gehören. *Scopoli*
unterscheidet aber selbst seinen *Mergus Aethiops* vom *Mergus*
Merganser. Dies wäre also eine neue Schwierigkeit.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 209. n. 4. *Mergus Castor.* p. 545. n. 2. *β. Castor.*

Außerdem ist das Geschlecht mit zwey Gattungen, der 4ten und 7ten, vermehrt. Bey der 1sten ist die Var. γ , bey der 6ten die Var. β . hinzugefügt. Bey der 3ten sind vier Varietäten aus einander gesetzt, und bey dieser sowohl als bey der 5ten die Geschlechts- (Sexus) Synonymen besonders geordnet.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Ein dem Mergus Castor Linn. ähnlicher Vogel, aber ohne Federbusch.*

Sander: Naturf. XIII. p. 190.

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der braune Taucher von der Hudsonsbay.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 832. n. 9. Mergus (Fuscus) cristatus fuscus, subtus albus, gula pectoreque nigro maculatis, alis nigris fascia alba.

69. GESCHLECHT. ALCA. *Der Papageytaucher. (Alk.)*

Müller, Naturyst. II. p. 308. Gen. LXIX.

Leske, Naturgesch. p. 292. Gen. LXXVII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 29. Gen. XXXVIII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 228. Gen. LXXVIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 397. Gen. XXVIII.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 743. Gen. XVIII.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 471.

Onomat.

Onomat. hist. nat. I. p. 254.

Briffon, ornithol. II. p. 380. Gen. XCIII. *Fra-
tercula.* p. 382. Gen. XCIV. *Alca.*

Batsch, Thiere, I. p. 366. Gen. LXXXVI.

Latham, Syst. ornith. II. p. 791. Gen. LXXXIX.

Pallas, Naturg. merkwl. Thiere, VI. p. 9.

Hermann, tab. affin. anim. p. 149.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 264.
Gen. XXX.

4. ARCTICA. *Der Puffin.* (9)

Müller, Naturyst. II. p. 311. n. 4. *der Seepapagey.*
Tab. 9 fig 3.

Leske, Naturgeschichte, p. 293. n. 3. *der Puffin.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 31. n. 2. *der Seepa-
pagey, Lunde.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 228. n. 1.
Alca (Arctica) rostro compresso-ancipiti sulca-
to, sulcis 4, oculorum orbita temporibusque
albis, palpebra superiore mucronata; *der Pa-
pageyentaucher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 705. *See-
papagoy.*

Halle, Vögel, p. 594. n. 742. *die Polarente.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere,
II. p. 144. n. 128. *die Seelster.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 473. n. 344. *der
Puffin.*

Klein, av. p. 146. n. 3. *Plautus arcticus.*

Klein, Vorbereit. p. 269. n. 3. *Weißback, But-
telnase.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 155. n. 3. *Weißback,
Seepapagey.*

Handb.

(9) Flügelweite 21 Zoll. Gewicht 12 Unzen. *Penn.* — Man
findet diesen Vogel bald mit weissen bald mit grauen Backen.

- Handb. d. Naturgesch. II. p. 351. *der Seepapagei.*
Briffon, ornitholog. II. p. 380. n. 1. *Macareux.*
Batsch, Thiere, I. p. 373. *der Seepapagay.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 792. n. 3. Alca
 (Arctica) rostro compresso - ancipiti fulcato,
 fulcis quatuor, oculorum orbita temporibusque
 albis, palpebra superiore mucronata.
Phipps, Reif. nach d. Nordpol, p. 97. *der See-*
papagay.
Olassen, Island, I. p. 119. *Lunda oder Seepapagay.*
 p. 297. *der Lund.*
Pennant, Reif. d. Schottl. I. p. 25. *Seetaucher.*
 p. 293. *der große nordische Taucher.*
Leem, Lappl. p. 146. *Lunder.*
Pontoppidan, Naturhistorie von Norwegen, II.
 p. 163. *Lund oder Lund-Talle.*
Steller, Kamtschatka, p. 182. *Ipatka.*
Pallas, Naturgesch. merkwl. Th. V. p. 10. *Lun-*
de, See-Papagoy.
Frisch, Vögel, Tab. 192. *der Seepapagey.*
Eberhard, Thiergesch. p. 126. *der Seepapagoi.*
Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 23. Arctica.
Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 130. n. 3. Alca
 (Arctica) rostro compresso - ancipiti fulcato,
 fulcis quatuor, oculorum orbita, temporibus-
 que albis.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 17. n. 140. Alca
 (Arctica) rostro compresso - ancipiti fulcato,
 fulcis quatuor, oculorum orbita temporibusque
 albis, palpebra superiore mucronata.
Charleton, onomast. zoic. p. 101. n. 15. Puffinus.
Moehring, av. gen. I. p. 62. n. 64. Spheniscus.
Herrmann, tab. aff. animal. p. 150. Alca arctica.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 265. n. 1.
der Puffin.

β. *Latham*, Syn. III. 1. p. 318. n. 3. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 792. n. 3. β. A. nigra, vertice cinereo, genis, pectore abdomineque albis.

6. LABRADORICA. *Der labradorische Papageytaucher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 474. n. 346. *der Papageytaucher von Labrador.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 793. n. 4. Alca (Labradora) rostro carinato, mandibula inferiore gibba, ad apicem macula nigra, oculorum orbita temporibusque albidis, abdomine albo.

3. IMPENNIS. *Der große nordische Papageytaucher.*

Müller, Naturfyst. II. p. 310. n. 3. *der nordische Penguin.*

Leske, Naturgesch. p. 292. n. 2. *der ungeflügelte Penguin.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 32. n. 3. *der nordische Penguin, Fettgans.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 143. n. 127. *der nordische Penguin.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 471. n. 341. *der große Papageytaucher.*

Briffon, ornithol. II. p. 382. n. 1. *grand Pingoin.*

Batsch, Thiere, I. p. 372. *der nordische Penguin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 791. n. 1. Alca (Impennis) rostro compresso- ancipiti sulcato, macula ovata utrinque ante oculos.

Pallas, Naturgesch. merkwl. Thiere, V. p. 2. *der nordliche Penguin.*

Seligmann, Vögel, V. Tab. 42. *der nordliche Penguin.*

- Sander*, Gröfse u. Schönheit in der Nat. I. p. 243.
Alca impennis.
- Eberhard*, Thiergeschichte, p. 127. *die nordische Fettgans.*
- Linné*, Syft. Nat. Edit. VI. p. 23. n. 2. Anser magellanicus.
- Linné*, Syft. Natur. Edit. X. I. p. 130. n. 2. Alca (Impennis) rostro compresso - ancipiti fulcato, macula ovata utrinque ante oculos.
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 17. n. 139. Alca (Impennis) rostro compresso - ancipiti fulcato, macula ovata utrinque ante oculos.
- Charleton*, onomast. zoic. p. 96. n. 10. Mergus Americanus.
- Nieremb.* exot. Lib. 10. c. 27. Mergus Americanus.
- Hermann*, tab. affinit. animal. p. 150. Alca Impennis.
- Donndorff*, Handb. der Thiergesch. p. 265. *der große Papageytaucher.*

2. PICA. *Der Schwarzschnabel.* (10)

- Müller*, Naturf. II. p. 310. n. 2. *der Elster-Alk.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 398. n. 2. *der Elsteralk.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 747. n. 2. *der Elsteralk.*
- Pennant*, arct. Zoolog. II. p. 472. n. 343. *der Schwarzschnabel.*
- Briffon*, ornithol. II. p. 383. n. 3. *petit Pingoin.*
- Latham*, Syft. ornitholog. II. p. 793. n. 5. β. A. rostro laevi compresso unifalcato, corpore toto subtus apicibusque remigum posticarum albis,
Müller,

(10) Flügelweite nach *Pennant* 25 Zoll. Gewicht 18 Unzen. — Nach *Latham* eine Varietät, oder vielmehr ein Junges von *Alca Torda*.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 17. n. 138. Alca
(Pica) rostro laevi compresso, corpore toto
subtus apicibusque remigum posticarum albis,
pedibus rubris.

Neue schwed. Abhandl. III. p. 104. Alca pica.

Naturf. XIII. p. 180. Alca Pica?

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. V. p. 12. Alca
pica?

Jonston, av. p. 225 Mergus Bellonii.

Hermann, tab. affin. anim. p. 150. Alca pica.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 266. n. 3.
der Schwarzschnabel.

β. BALTICA. Der baltische Papageytaucher.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 749. der
baltische Alk?

Pennant, arct. Zoolog II. p. 473. ad n. 343. Alca
baltica.

1. TORDA. Der Klub-Alk (1)

Müller, Naturfyst. II. p. 308. n. 1. Alk.

Leske, Naturgesch. p. 292. n. 1. der Alk.

Borowsky, Thierreich, III. p. 33. n. 4. der
Klub-Alk, Scheerschnabel.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 397. n. 1. der Alk.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 744 n. 1.
der Alk. p. 747. Scheerschnabel, Wasserchna-
bel, Alcke, Scheermesserschnäbler, Klubalk,
Tordalk.

Halle, Vögel, p. 596. n. 744. der krummschnäbli-
ge Taucher.

Pennant, arct. Zool. II. p. 472. n. 342. der Was-
ferchnabel, Alk.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 142. n. 126. der Alk.

Fff 2 Klein,

(1) Flügelweite 27 Zoll. Gewicht an 23 Unzen. Penn.

- Klein*, Vorber. p. 271. n. 5. *Scheermesserschnäbler*.
- Klein*, verbesserte Vögelhist. p. 156. n. 5. *Scheerschnäbler*.
- Briffon*, ornitholog. II. p. 383. n. 2. Pingoin.
- Batsch*, Thiere, I. p. 773. *der Klub-Alk*.
- Latham*, Syn. Supplement. p. 264. Razor-bill.
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 793. n. 5. Alca (Torda) rostro fulcis quatuor, linea utrinque alba a rostro ad oculos.
- Pennant*, Reif. n. Schottl. I. p. 25. *Alken*. p. 285. *Papagaytaucher*.
- Debes*, Hist. der Insel Feröe, I. p. 128.
- Leem*, Nachricht von den Lappl. p. 146. *die Klubb-Alker*.
- Pontoppidan*, Norwegen, II. p. 124. *Alk*.
- Pallas*, Naturgesch. merkwürd. Thiere, V. p. 12. *Scheerschnäbel, oder Klubalk*.
- Linné*, auserles. Abh. II. p. 293. n. 81. *die krummschnäblige Polarente*.
- Scopoli*, Bermerk. a. d. Naturgesch. I. p. 81. n. 94. Alca Torda.
- Eberhard*, Thiergesch. p. 127. *die kleine Fettgans*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. VI. p. 23. n. 3. Alca.
- Linné*, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 130. n. 1. Alca (Torda) rostri fulcis quatuor, linea utrinque alba a rostro ad oculos.
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 16. n. 136. Alca (Torda) rostri fulcis quatuor, linea utrinque alba a rostro ad oculos.
- Hermann*, tab. affin. anim. p. 150. Alca Torda.
- Donndorff*, Handb. d. Thiergesch. p. 266. n. 4. *der Klub-Alk*.
- β. *Pallas*, Naturgesch. merkwürd. Th. V. p. 12. *eine Nebenart des Scheerschnabels, mit weniger als*

als halb so großem Schnabel, ohne Quersfurchen und anstatt der weißen Halfterlinie am Vorkopf nur auf jeder Seite der Anfang eines schrägen weißen Strichs.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 794. n. 5. γ. A. subtus tota a rostro ad caudam candida, linea a rostro ad oculos nulla.

Müller, zool. dan. prodr. p. 17. n. 137. Alca (Baltica) subtus tota a rostro ad caudam candida?

Brinich, ornitholog. bor. p. 25. n. 1. Alca (Baltica) subtus tota a rostro ad caudam candida, linea a rostro ad oculos nulla?

7. CRISTATELLA. *Der Haubentapageytaucher.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 34. n. 6. der gehäubelte Alk.

Pennant, arct. Zool. II. p. 477. n. 351. der Haubentapageytaucher.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 794. n. 6. Alca (Cristatella) rostro compresso subfulcato, corpore nigricante, dorso maculis ferrugineis, cristata frontali antrorsum inclinante.

Batsch, Thiere, I. p. 372. der Haubenalk.

Pallas, Naturgesch. merkwl. Th. V. p. 26. die gehäubelte Alke. Tab. 3. u. 5. fig. 7-9.

Catal. mus. Petrop. p. 419. n. 60. Lunda minor cristata.

Steller, Beschr. von Kamtschatka, p. 181. Starik.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 149. 196. Alca cristatella.

8. TETRACULA. *Der Hühner-Alk.*

Müller, Natursystem, Suppl. p. 105. n. 9. der vierfärbige Papageyentaucher.

Pennant, arct. Zool. II. p. 477. n. 352. der dunkelbraune Papageytaucher.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II p. 148. n. 131. *der Hühneralk.*

Latham, Syft. ornitholog. II. p. 794. n. 7. Alca
(Tetracula) rostro laevi compresso, corpore
nigro subtus cinerascente, nucha maculis re-
ctricibusque lateralibus apice ferrugineis, fronte
subcrifata.

Pallas, Naturgesch. merk⚭. Th. V. p. 31. *die Hüh-
ner-Alke.*

Sander, Gröfse und Schönheit in der Natur, I.
p. 245. Alca tetracula.

Hermann, tab. aff. anim. p. 141. Alca tetracula.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 266. n. 5.
der Hühner-Alk.

9. PSITTACULA. *Der Meerpapagey.*

Müller, Naturfyft. Suppl. p. 104. n. 7. *der See-
parkit.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 476. n. 350. *der Meer-
papagey*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 147. n. 130. *die Alke mit dem Sichel-
schnabel.*

Latham, Syft. ornitholog. II. p. 794. n. 8. Alca
(Psittacula) rostro compresso subfulcato, cor-
pore nigricante, abdomine albo, facie produ-
cta, ad basin rostri coarctata.

Pallas, Naturgesch. merk⚭. Th. V. p. 22. *die
Alke mit dem Sichel schnabel.*

Steller, nov. Comment. Petropolit. IV. p. 426.
Tab. 13. fig. 25. 26.

Hermann, tab. aff. anim. p. 149. Alca Psittacula.

10. CIRRHATA. *Der gehörnte Papageytaucher.*

Müller, Naturfyft. Suppl. p. 104. n. 6. *Mänen-
papagay.*

Borowsky,

Borowsky, Thierreich, III. p. 30. n. 1. *der Alk mit weißen Augenbraunfedern.* Tab. 38.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 146. n. 129. *der kamtschatkische Alk.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 475. n. 349. *der gehörnte Papageytaucher.*

Latham, Syst. ornitholog. II, p. 791. n. 2. Alca (Cirrhatta) rostro compresso - ancipiti fulcato, fulcis tribus, superciliis albis, postice flavis elongatis cirrhatis.

Pallas, Naturgesch. merkwl. Th. V. p. 15. *die Alke mit hängenden weißen Augenbraunfedern.* Tab. 1. u. 5. fig. 1-3.

Steller, nov. Comment. Petropolit. IV. p. 421. tab. 12. fig. 16.

Catal. mus. Petropol. p. 419. n. 56. *Lunda maior cirrhata.*

Steller, Kamtschatka, p. 182. *Mitschagatka oder Igylma.*

Krascheninnikow, Kamtschatka, p. 189. *Meuschagatka, Igilma.* Alca monochroa, sulcis tribus, cirrho duplici utrinque dependente. Anas arctica cirrhata *Stell.*

Sander, Grösse u. Schönheit in der Nat. I. p. 244. Alca cirrhata.

Herrmann, tab. affinit. animal. p. 150. Alca cirrhata.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 267. n. 6. *der gehörnte Papageytaucher.*

5. ALLE. *Der kleine Papageytaucher.*

Miller, Naturyst. II. p. 312. n. 5. *grönländische Taube.* Tab. 9. fig. 4.

Pennant, arct. Zool. II. p. 474. n. 346. *der kleine Papageytaucher.*

- Klein*, av. p. 146. n. 1. Plautus Columbarius. (Mit *Colymbus Grylle* verwechselt)
- Klein*, Vorber. p. 268. n. 1. Taube aus Grönland.
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 154. n. 1. Seetaube.
- Briffon*, ornithol. II. p. 378. n. 2. petit Guillemot.
- Latham*, Syft. ornithol. II. p. 795. n. 10. Alca (Alle) rostro laevi conico, abdomine toto subtus remigumque posticarum apicibus albis, pedibus nigris.
- Pennant*, Reif. n. Schottl. I. p. 288. Seetauben.
- Phipps*, Reif. nach d. Nordpol, p. 97. grönländische Seetaube.
- Forster*, Reif. Ed. in 8. I. p. 114. Murre.
- Seligmann*, Vögel, IV. Tab. 77. der kleine schwarz und weiße Taucher.
- Linné*, Syft. Natur. Edit. X. I. p. 131. n. 6. Alca (Alle) rostro laevi conico, abdomine fasciaque alarum alba, pedibus nigris.
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 17. n. 142. Alca (Alle) rostro laevi conico, abdomine toto subtus, remigumque posticarum apicibus albis, pedibus nigris.
- Hermann*, tab. affin. animal. p. 149. Alca Alle.
- Donndorff*, Handbuch der Thiergesch. p. 267. n. 7. der kleine Papageytaucher.
- β. Der weiße Papageytaucher.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 475. ad n. 346.
- Latham*, Syft. ornithol. II. p. 795. n. 10. β. Alca candida.
- γ. Der Papageytaucher mit röthlicher Brust.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 475. ad n. 346.
- II. ANTIQUA. Der Greis.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 475. n. 347. der Greis.
- Latham*,

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 795. n. 9. Alca (Antiqua) rostro nigro basi albido, corpore nigricante, abdomine albo, pennis cervicalibus linearibus elongatis albis.

12. PYGMAEA. *Der Zwergpapageytaucher.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 475. n. 348. *der Zwergpapageytaucher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 796. n. 11. Alca (Pygmaea) rostro carinato basi depresso, corpore atro subtus cinereo.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit *sieben* Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung sind *zwey*, bey der 2ten *zwey*, bey der 4ten *zwey*, und bey der 5ten *drey* Varietäten aus einander gesetzt.

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT.

APTENODYTES. *Der Penguin. (Fettgans.)*

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 228.

Gen. LXXIX.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 395. Gen. XXVI.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 176.

Gen. XXXIV.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 878. Gen. XCVIII.

Forster, hist. aptenodyt. — in Comment. Soc. Sc. Gott. 1780. Vol. III. p. 121 sqq.

Briffon, ornithol. II. p. 385. Gen. XCV. Spheniscus.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 268.

Gen. XXXI.

1. CHRYSOCOME. *Der gehäubte Pinguin.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 878. n. 1. Aptenodytes (Chryfocome) rostro rufo-fusco, pedibus flavescentibus, crista frontali erecta, auriculari deflexa sulphurea.

Phil. Transact. IXVI. p. 103.

2. PATAGONICA. *Die Fettgans von Patagonien.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 229. n. 1. Aptenodytes (Patagonica) rostro pedibusque nigris, macula parotica aurea.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 878. n. 2. Aptenodytes (Patagonica) rostro pedibusque nigris, macula ad aures utrinque flavo-aurea, collum ambiente.

Sonnerat, Reif. n. Neuguinea, p. 64. die neuguineische Meer-gans; mit 1 Figur.

Naturf. I. p. 258. der patagonische Pinguin.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 268. n. 1. die Fettgans von Patagonien.

3. PAPUA. *Der Papuspenguin.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 879. n. 3. Aptenodytes (Papua) rostro pedibusque rubicundis, macula occipitali alba.

Sonnerat, Reif. nach Neuguinea, p. 64. die Papusmeergans.

4. ANTARCTICA. *Der antarctische Pinguin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 879. n. 4. Aptenodytes (Antarctica) rostro atro, pedibus rubicundis, linea gulari nigra.

5. MAGELLANICA. *Der magellanische Pinguin.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 229. n. 2.

Aptenodytes (Magellanica) rostro nigro, pedibus

dibus rubicundis, fasciis duabus albis, una includente oculos, altera pectorali.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 380. n. 6. Aptenodytes (Magellanica) rostro nigro, fascia purpurascente, superciliis albis, fascia pectorali et torque medio colli nigris.

6. DEMERSA. *Der schwimmende Penguin.*

Müller, Natursystem, II. p. 321. n. 2. *schwimmende Penguin.*

Leske, Naturgesch. p. 293. n. 2. *der schwimmende Penguin.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 28. n. 2. *der schwimmende Penguin.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 395. *der schwimmende Penguin.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 176. *der schwimmende Penguin.*

Halle, Vögel, p. 595. n. 743. *die Fettgans mit ledrigen Flügeln, die entfedert scheinen.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere II. p. 152. n. 137. *der Penguin, Pinguin, die Meerpigmäe, magellanische Gans.*

Onomat. histor. nat. III. p. 621. *die Fettgans.*

Klein, av. p. 147. n. 4. *Plautus pinguis.*

Klein, Vorbereit. p. 270. n. 4. *Fettgans mit der vierten unächtigen Zehe.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 155. n. 4. *Fettgans.*

Briffon, ornitholog. II. p. 385. n. 1. *Manchot.*

Batsch, Thiere, I. p. 375. *der südliche Penguin, magellanische Gans.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 879. n. 5. Aptenodytes (Demersa) rostro pedibusque nigris, superciliis albis, fascia pectorali nigra.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 83. *Penguins mit schwarzen Füßen.*

Eberhard, Thiergesch. p. 115. *die magellanische Gans.*

Meidinger, Vorlesung. I. p. 126. n. 2. *der schwimmende Penguin.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 131. n. 2. *Diomedea (Demersa) alis impennibus, pedibus tetradactylis.*

Charleton, onomast. zoic. p. 98. n. 5. *Anser magellanicus.*

Fonston, av. p. 181. *Anser magellanicus.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 147. *Diomedea demersa.*

β. *Briffon*, ornitholog. II. p. 386. n. 2. *Manchot tacheté.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 880. n. 5. β. *Apt. rostro nigro, fascia alba, superciliis albis, fascia pectorali nigra.*

Latham, Syn. III. 2. p. 567. n. 5. A.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 83. *Penguin mit schwarzen Füßen.*

γ. *Latham*, Syst. ornithol. II. p. 880. n. 5. γ. *Aptenodytes rostro nigro fascia alba, mento orbitisque nigris.*

Pernett. voy. II. p. 17. tab. 7. fig. 3. *Pinguin à lunettes?*

7. CATARRACTES. *Der rothfüßige Penguin.*

Müller, Natursystem, II. p. 337. n. 2. *der schwimmende Phaëton.*

Leske, Naturgeschichte, p. 291. n. 2. *der schwimmende Tropikvogel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 24. n. 2. *der schwimmende Phaëton.*

Onomat,

Onomat. histor. nat. VI. p. 310. *der schwimmende Phaëton.*

Briffon, ornith. II. p. 387. n. 1. Gorfou.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 881. n. 8. Aptenodytes (Catarractes) rostro pedibusque rubris, capite fusco.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 97. *die Fettgans.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 135. n. 2. Phaëton (Demersus) alis impennibus, rostro mandibulis edentulis, digito postico distincto.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 147. Phaëton demersus.

8. TORQUATA. *Der Penguin mit dem Halsbände.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 880. n. 7. Aptenodytes (Torquata) rostro pedibusque nigris, areis oculorum nudis sanguineis, semitorque albo.

Sonnerat, R. n. Neuguinea, p. 64. *die neuguineische Meergans mit dem Halsbände*; m. 1 Fig.

9. MINOR. *Der kleine Penguin.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 881. n. 9. Aptenodytes (Minor) rostro nigro, pedibus albidis.

10. CHILOENSIS. *Der Quethu.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 881. n. 10. Aptenodytes (Chiloensis) corpore lanuginoso cinereo.

11. CHILENSIS. *Der chilesische Penguin.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 881. n. 11. Aptenodytes (Molinae) cinereo caeruleoque varia, subtus alba, pedibus tridactylis.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 268. n. 2. *der chilesische Penguin.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das ganze Geschlecht ist hier neu. Die *sechste* und *siebente* Gattung sind aus andern Geschlechtern hi her versetzt; die übrigen ganz neu hinzugekommen.

70. GESCHLECHT. PROCELLARIA. *Der Sturmvogel.*

Müller, Naturyst. II. p. 340. Gen. LXX.

Leske, Naturgesch. p. 291. Gen. LXXV.

Borowsky, Thierreich, III. p. 35. Gen. XXXIX.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 222.
Gen. LXXIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 398 Gen. XXIX.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 176.
Gen. XXXVI.

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 714.

Onomat. hist. nat. VI. p. 640.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 495.

Briffon, ornithol. II. p. 395. Gen. XCIX. Puffi-
nus. p. 398. Gen. C. Procellaria.

Batsch, Thiere, I. p. 366. Gen. LXXXVII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 820. Gen. XCV.

Hermann, tab. affin. anim. p. 154.

Downdorff, Handbuch der Thiergesch. p. 269.
Gen. XXXII.

7. OBSCURA. *Der dunkelbraune Sturmvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 828. n. 24. Pro-
cellaria (Obscura) nigricans, sabbus alba, col-
lo lateribus fusco nebuloso, tectricibus alarum
medio albido variegatis.

8. PACIFICA. *Der Sturmvogel vom stillen Ocean.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 827. n. 23. Procellaria (Pacifica) atra, subtus obscura, rostro plumbeo, pedibus pallidis.

9. CAERULEA. *Der blaue Sturmvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 827. n. 22. Procellaria (Caerulea) cano-caerulescens, corpore subtus et rectricibus apice albis, fascia pectoris alarumque expansarum obscuris.

Forster, Reif. Ed. in 8. I. p. 93. 107. *die blauen Sturmvögel.*

10. VITTATA. *Der blaulichgraue Sturmvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 827. n. 21. Procellaria (Forsteri) caerulescens, subtus alba, remigibus, rectricibus apice fasciaque alarum expansarum fusco-nigris, rostro basi dilatato.

11. URINATRIX. *Der Sturmtaucher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 827. n. 20. Procellaria (Urinatrix) fusco-nigricans subtus alba, gula plicata nigra, calcare obsoleto.

Forster, Reif. Ed. in 8. I. p. 120. 199. *die kleinen Sturmtaucher.*

1. PELAGICA. *Die Sturmschwalbe.*

Müller, Naturfyst. II. p. 315. n. 1. *der Ungewittervogel.* Tab. 9. fig. 5.

Leske, Naturgeschichte, p. 291. n. 1. *der Ungewittervogel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 35. n. 1. *der Ungewittervogel.* Tab. 39.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 222. n. 1. Procellaria (Pelagica) nigra, uropygio albo; *der Sturmvogel.*

Bechstein,

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 399. *der Ungewittervogel.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 177. *der Ungewittervogel.*
- Funke*, Naturgesch. I. p. 323. *der Sturmvogel.*
- Halle*, Vögel, p. 599. n. 751. *der Sturmvogel.*
Fig. 54.
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 148. n. 132. *die Sturmschwalbe, der Sturmvogel, Sturmverkündiger, St. Petersvogel, Petrell, das Orkanmiewchen.*
- Beckmann*, Naturhist. p. 44. n. 2. *der Sturmvogel.*
- Pennant*, arch. Zool. II. p. 497. n. 381. *die Sturmschwalbe.*
- Onomat. hist. nat.* VI. p. 647. *der Ungewittervogel.*
- Handb. d. Naturgesch.* II. p. 662. *der Sturmvogel.*
- Klein*, av. p. 148. n. 12. *Plautus minimus, Procellarius.*
- Klein*, Vorbereit. p. 272. n. 12. *Sturmeve, kleiner schwarzer Sturmvogel.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 158. n. 12. *Sturmvoegel, Sturmeve, Sturmfinke.*
- Briffon*, ornitholog. II. p. 398. n. 1. *Petrel.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 374. *der Ungewittervogel.*
- Latham*, Syn. Supplem. p. 269. *Stormy Petrel.*
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 826. n. 19. *Procellaria (Pelagica) nigra, uropygio albo.*
- Seligmann*, Vögel, IV. Tab. III. *die kleinste Meve, mit röhrenförmigen Nasenlöchern.*
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 82. n. 95. *der kleine schwarze Sturmvogel.*
- Linné*, auserles. Abhandl. II. p. 293. n. 84. *der See-Sturmvoegel.*
- Schwed. Abhandl.* VII. p. 93. *Ungewittervogel.*
Tab. 6.

Forster, Reif. Ed. in 8. I. p. 53. die gewöhnlichen kleinen Sturmvögel.

Berlin. Samml. V. p. 484. Sturmvogel.

Schriften der dronth. Gesellschaft, I p. 161. der Ungewitter- oder St. Peters- Vogel.

Eberhard, Thiergesch. p. 117 der Sturmvogel.

Meidinger, Vorles. I. p. 125. n. 1. der Ungewittervogel.

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 196 n. 20. der Sturmvogel.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 32. n. 1. Avis Petri.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 131. n. 1. Procellaria (Pelagica) nigra, uropygio albo

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 17. n. 143. Procellaria (Pelagica) nigra, uropygio albo.

Mochring, av. gen. p. 67. n. 72. Procellaria.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 269. n. 1. die Sturmschwalbe.

β. *Latham*, Syn. III. 2. p. 413. n. 18. Var. A

Latham, Syst. ornithol. II. p. 826. n. 19. β. Pr. nigra, purpureo caerulefcenteque varia, tectricibus alarum uropygioque albo maculatis.

Salern. ornithol. p. 383.

2. FREGATTA. Der Segler.

Müller, Naturfyst. II. p. 315. n. 2. der Segler.

Onomat. histor. nat. VI. p. 645. der Segler.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 826. n. 17. Procellaria (Fregatta) nigra, subtus alba, pedibus nigris.

12. FURCATA. Der Gabelschwanz.

Pennant, arct. Zool. II. p. 497. n. 380. der Gabelschwanz.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 825. n. 16. Procellaria (Furcata) argenteo-grisea, gula pallida,

da, crisso albo, remigibus caudaque forficata nigricantibus, rectrice extima extus alba.

13. FULIGINOSA. *Der tahitische Sturmvoegel.*

Latham, Syst. ornitholog. I. p. 825. n. 15. Procellaria (Fuliginosa) fuliginoso-fusca, capite, collo, remigibus reetricibusque nigris, cauda emarginata.

14. DESOLATA. *Der graugrüne Sturmvoegel.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 825. n. 14. Procellaria (Desolata) cinereo-caerulescens, subtus alba, reetricibus apice fasciaque alarum expansarum nigricantibus.

15. NIVEA. *Der weiße Sturmvoegel.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 825. n. 13. Procellaria (Nivea) alba, rachibus pennarum nigris, rostro pedibusque caeruleis.

16. MELANOPUS. *Der nordamerikanische Sturmvoegel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 824. n. 12. Procellaria (Melanopus) cinereo-nigricans, capistro gulaque griseis, maculis minutis nigricantibus, rostro toto digitisque dimidiato-nigris.

3. GLACIALIS. *Der Fulmar.*

Müller, Naturf. II. p. 316. n. 3. *das Serpferd.*

Leske, Naturgesch. p. 292. n. 2. *der große Sturmvoegel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 36. n. 2. *der große Sturmvoegel.*

Halle, Vögel, p. 570. n. 699. *die große Nordmöve, Eismöve, Mallemugge.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 149. n. 133. *die Eismöve, der Mallemucke.*

Onomat.

Onomat. hist. nat. VI. p. 645. *das Seepferd.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 144. n. 2. *Malle mugge.*

Briffon, ornithol. II. p. 399. n. 2. Petrel cendré.

Baisch, Thiere, I. p. 375. *der große Sturm-
vogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 823. n. 9. Procellaria (Glacialis) albicans, dorso canescente, rostro pedibusque flavescens.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 495. n. 378. *der Fulmar, Malle mucke.*

Phipps, Reif. n. d. Nordpol, p. 97. *Eissturmvogel, oder Malle mucke.*

Forster, Reif. Ed. in 8. p. 55. *der Malmuck.*

Pontoppidan, Naturhistorie von Norwegen, II. p. 143. *Hav. Hst.*

Leem, Lappl. p. 143. *das Seepferd.*

Schriften der dronth. Gesellsch. I. p. 155. *das Seepferd.*

Schwed. Abh. XXI. p. 94. *eine Procellaria, die sich um den Nordpol findet.*

Meidinger, Vorles. I. p. 125. n. 2. *der große Sturmvogel.*

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 17. n. 144. Procellaria (Glacialis) albicans, dorso canescente.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 270. n. 2. *der Fulmar.*

β. *Latham*, Syn. III. 2. p. 405. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 823. n. 9. β. Pr. alba, dorso medio canescente, alis nigricantibus.

17. CINEREA. *Der aschgraue Sturmvogel.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 824. n. 10. Pr. (Cinerea) supra cinerea subtus alba, cauda nigricante, rostro flavo, pedibus cinerascens.

18. **GIGANTEA.** *Der größte Sturmvogel.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 498. n. 382. *der große Sturmvogel?*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 820. n. 1. Procellaria (Gigantea) fusco-nebulosa, subtus albida, remigibus rectricibusque nigricantibus, rostro pedibusque flavis.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 270. n. 3. *der größte Sturmvogel, Riesenvogel.*
19. **BRASILIENSIS.** *Der brasilianische Sturm-
vogel.*
Briffon, ornith. II. p. 397. n. 4. Puffin du Bresil.
Latham, Syst. ornithol. I. p. 822. n. 2. Procellaria (Brasiliana) fusco-nigricans, collo inferiore flavo, rectricibus fusco-nigricantibus.
4. **A EQUINOCTIALIS.** *Der große schwarze
Sturmvogel.*
Müller, Natursystem, II. p. 316. n. 4. *der Wetter-
rabe.*
Onomat. hist. nat. VI. p. 643. *der Wetterrabe.*
Klein, av. p. 148. n. 14. Plautus Albatros spurius maior.
Klein, Vorbereit. p. 273. n. 14. *der größere un-
ächte Albatros.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 158. n. 14. *unächter A-
batros, der größte.*
Briffon, ornithol. II. p. 397. n. 3. Puffin du Cap
de bonne esperance.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 821. n. 3. Procellaria (Aequinoctialis) fusca immaculata, rostro flavo, pedibus fuscis.
Seligmann, Vögel, IV. Tab. 73. *der große
schwarze Peter, ganz schwarz mit gelbem
Schnabel.*

Forster.

Forster, Reif. Ed. in 8. I. p. 56. eine große schwarze Art von Sturmivögeln.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 132. n. 2. Procellaria (Aequinoctialis) fusca immaculata, rostro flavo.

Brown, Jamaika, p. 482. Shearwater?

β. Pennant, arct. Zoolog. II. p. 498. n. 382. der große Sturmivogel?

Latham, Syn. III. 2. p. 399. n. 3. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 821. n. 3. β.

20. GRISEA. Der graue Sturmivogel.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 821. n. 4. Procellaria (Grisea) fuliginoso-atra, tectricibus alarum inferioribus albis, rostro fusco, pedibus antice caerulescentibus.

21. GELIDA. Der Eissturmvogel.

Latham, Syst. ornith. II. p. 822. n. 5. Pr. (Gelida) cinereo-caerulescens, dorso nigricante, gula, iugulo pectoreque albis, rostro flavo, pedibus caeruleis.

22. ALBA. Der weißbrüstige Sturmivogel.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 822. n. 6. Procellaria (Alba) fusco-nigricans, pectore, abdomine crissoque albis.

β. Pr. fuliginosa subtus cinerea, facie albo fuscoque varia, pedibus flavescens, digitis dimidiato nigris. *

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 822. n. 6. β.

23. ANTARCTICA. Der antarctische Sturmivogel.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 822. n. 7. Procellaria (Antarctica) fusca, subtus albo-caerulescens,

lescens, remigibus secundariis, uropygio caudaque albis, rectricibus apice nigris.

Forster, Reif. Edit. in 8. p. 112. *die antarktischen Sturmvögel.*

5. CAPENSIS. *Der capsche Sturmvogel.*

Müller, Natursystem, II. p. 465. n. 5. *der Landzeiger.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 37. n. 3. *der Landzeiger, die capische Taube.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 149. n. 134 *die capsche Taube.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 644. *der Landzeiger, oder Damier.*

Klein, av. p. 148. n. 14. *Plautus Albatros spurius minor.*

Klein, Vorbereit. p. 273. n. 14. *der kleine schwarz und weiße unächte Albatross.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 158. n. 14. *der schwarz und weißbunte.*

Briffon, ornithol. II. p. 400. n. 3. *Petrel tacheté appelle vulgairement Damier.*

Batsch, Thiere, I. p. 374. *der Landzeiger.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 822. n. 8. *Procellaria (Capensis) albo fuscoque varia.*

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 75. *der weiß und schwarz gefleckte Peter.*

Forster, Reif. Edit. in 8. I. p. 53. *die Pintaden.* p. 93. *der Cap-Sturmvogel.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 133. n. 3. *Procellaria (Capensis) albo fuscoque varia.*

β. *Latham*, Syn. III. 2. p. 402. var.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 823. n. 8. β. *Pr. lutescente fuscoque varia.*

6. PUFFINUS. *Der Wasserscheerer.* (2)

Müller, Naturfyst. II. p. 317. n. 6. *der Sturmver-
kündiger.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 37. n. 4. *der Puffin.*
Halle, Vögel, p. 576. n. 715. *die Erdmöwe.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 150. n. 135. *die Puffinmöwe.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 648. *der Puffin-
vogel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 496. n. 379. *der Was-
ferscheerer, Puffinmeve.*

Klein, av. p. 139. n. 18. *Larus piger cunicularis,*
Puffinus seu Pupinus.

Klein, Vorbereit. p. 257. n. 18. *Pupin.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 146. n. 19. *Pupin.*

Briffon, ornithol. II. p. 395. n. 1. *Puffin.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 824. n. 11. *Procella-
ria (Puffinus) corpore supra nigro, subtus albo,
pedibus rufis.*

Latham, Syn. Supplem. p. 269. *Shearwater.*

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännemark, II.
p. 181. *Skrabe.*

Forster, Reif. Ed. in 8. I. p. 52. *der gewöhnliche
große Sturmvogel.* p. 118. *schwarze Sturmvogel.*

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 18. n. 144. *Pro-
cellaria (Puffinus) corpore supra nigro, sub-
tus albo, pedibus rufis.*

Charleton, onomast. zoic. p. 94. n. 2. *Diomedea
avi.*

Jonston, av. p. 146. *Puffinus.* p. 128. *Avis Dio-
medea.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 271. n. 4.
der Wasserscheerer.

Ggg 4

β. Brisf.

(2) Flügelweite 31 Zoll. Gewicht 17 Unzen. *Pennant.*

- β. *Briffon*, ornith. II. p. 396. n. 2. Puffin cendré. (3)
Latham, Syn. III. 2. p. 407. n. II. Var. A.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 824. n. II. β. Pr.
 supra cinerea, subtus alba, rectricibus candidis.

A. Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit 17 Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung sind zwey, bey der 3ten zwey, bey der 4ten zwey, bey der 5ten zwey, und bey der 6ten zwey Varietäten aus einander gesetzt,

B. Neuere Gattungen.

1. *Procellaria* (Marina) dorso, tectricibus alarum fuscis, vertice et cervice caerulefcenti - cinereis, uropygio caerulefcente, genis corporeque toto subtus albis. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 826. n. 18.
Latham, Syn. III. 2. p. 410. n. 17. Frigate Petrel.

71. GESCHLECHT. DIOMEDEA. *Der Albatross* (Penguin, Schiffsvogel, Rinnenschuabel.)
Müller, Naturfyst. II. p. 320. Gen. LXXI.
Leske, Naturgesch. p. 293. Gen. LXXVIII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 27. Gen. XXXVII.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 222. Gen. LXXIV.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 396. Gen. XXVII.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 175. Gen. XXXIII.
 Onomat. hist. nat. III. p. 621.
Briffon, ornitholog. II. p. 393. Gen. XCVIII. Albatrus.

Batsch,

(3) Nach *Briffon* eine eigne Gattung.

Batsch, Thiere, I. p. 367. Gen. LXXXVIII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 789. Gen. LXXXVIII.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 153.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 271.
Gen. XXXIII.

I. EXULANS. *Der wandernde Albatroß.* (4)

Müller, Natursystem, II. p. 71. n. 1. *der fliegende
Penguin.*

Leske, Naturg. p. 293. n. 1. *der fliegende Penguin.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 27. n. 1. *der Kriegs-
schiffs-Vogel, Albatros.* Tab. 37.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 222. n. 1.
Diomedea (Exulans) alis pennatis longissimis,
pedibus aequilibribus tridactylis.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 396. n. 1. *der Kriegs-
schiffsvogel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 176. *der
Kriegsschiffsvogel.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 150. n. 136. *der Albatros.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 468. n. 340. *der wan-
dernde Albatroß.*

Onomat. hist. nat. III. p. 622. *der Albatros, der
Fremdling.*

Klein, av. p. 148. n. 13. *Plautus Albatrus.*

Klein, Vorbereit. p. 273. n. 13. *Albatroß.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 158. n. 13. *Albatros.*

Briffon, ornitholog. II. p. 394. n. 1. *Albatros.*

Batsch, Thiere, I. p. 375. *der Albatros oder Fre-
gattvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 789. n. 1. *Diome-
dea (Exulans) supra fusco-rufescens, nigricante*

Ggg 5

striata

(4) Flügelweite von 7 Fuß 7 Zoll. bis zu 10 Fuß 7 Zoll. Ge-
wicht von 12 bis zu 23 Pfund.

friata et maculata, subtus alba, collo supra et lateribus fusco transversim striatis, remigibus maioribus nigris, minoribus rectoribusque plumbeo-nigricantibus.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 71. *der Albatroß.*

Forster, Reif. Edit. in 8. I. p. 53. 89. *Albatrosse.*
p. 124. *ein großer weißer Albatros.*

Pallas, Naturg. merk̄w. Thiere, V. p. 36. *Albatroß.*

Eberhard, Thiergesch. p. 128. *das Kriegsschiff.*

Hawkesworth, Gesch. der engl. Seereif. II. p. 48. *Albatroß.*

Sander, Größe u. Schönheit in der Nat. I. p. 230. *Penguins.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 132. n. 1. *Diomedea (Exulans) alis pennatis, pedibus tridactylis.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 152. 154. 169. *Diomedea Exulans.*

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 271. n. 1. *der wandernde Albatroß.*

β. *Pennant*, arct. Zool. II. p. 469. *der braune Albatroß.*

Pallas, Naturgesch. merk̄w. Th. V. p. 41. *eine Spielart des Albatroß, über den ganzen Körper fahlschwärzlich, obenher am dunkelsten.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 790. n. 1. β.

γ. *Pennant*, arct. Zoolog. II. p. 469. *der weiße Albatroß.*

Pallas, Naturgesch. merk̄w. Thiere, V. p. 41. *eine weiße Spielart, am Rücken zwischen den Flügeln schwärzlich, auch mit fahlschwarzen Schwung- und Schwanzfedern.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 790. n. 1. γ.

2. SPADICEA. *Der kastanienbraune Albatross.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 790. n. 2. Diomedea (Spadicea) rostro albido, corpore saturate castaneo-fusco, abdomine pallido, facie alisque subtus albis.
3. CHLORORHYNCHOS. *Der gelbschnäblige Albatross.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 790. n. 3. Diomedea (Chlororhynchos) rostro nigro, supra basique flavo, corpore supra atro-caeruleo, subtus uropygioque albo.
4. FULIGINOSA. *Der dunkelbraune Albatross.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 791. n. 4. Diomedea (Fuliginosa) rostro nigro, corpore fuliginoso-fusco, pone oculos lunula alba.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 214. n. 2. Diomedea Demersa.

p. 557. n. 6. Aptenodytes demersa.

Das Geschlecht ist zwar überhaupt nur um zwey Gattungen vermehrt, aber es sind doch der neuen Gattungen drey hinzugekommen; die zweyte der XIIten Edition ist in ein anderes neues Geschlecht versetzt.

72. GESCHLECHT. PELECANUS. *Der Pelikan.*

Müller, Naturyst. II. p. 323. Gen. LXXII.

Leske, Naturgesch. p. 285. Gen. LXX.

Borowsky, Thierreich, III. p. 38. Gen. XL.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 223. Gen. LXXV.

Bechstein,

Bechstein, Naturgesch. I. p. 399. Gen. XXX.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 749.
Gen. XIX.

Halle, Vögel, p. 586. b.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 538.

Onomat. hist. nat. VI. p. 238.

Klein, av. p. 142. Fam. VI.

Briffon, ornitholog. II. p. 489. Gen. CX. Sula.

p. 494. Gen. CXI. Phalacorax. p. 497. Gen.

CXII. Onocrotalus.

Batsch, Thiere, I. p. 367. Gen. CXII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 882. Gen. XCIX.

Hermann, tab. affin. anim. p. 154 fqq.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 272.
Gen. XXXIV.

* *Mit ungezähneltem Schnabel.*

I. ONOCROTALUS. *Die Kropfgans.* (5)

Müller, Naturlyst. II. p. 323. n. 1. *die Kropfgans.*

Tab. 9. fig. 1.

Leske, Naturgesch. p. 285. n. 1. *die Kropfgans.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 40. n. 2. *die Kropfgans, Pelikan.*

Blumen.

- (5) Flügelweite 11 bis 15 Fufs. Gewicht 18 bis 25 Pfund.
Penn. — Wird über 50 Jahr alt. Der beutelförmige Kropf am Unterschnabel läfst sich so ausdehnen, das er wohl 30 Pfund Wasser fassen kann. Das Fleisch ist thranig, wird aber gegessen. Die Haut wird samt den Federn gegerbt, und als Pelzwerk getragen. Aus den Säcken werden Beutel, Säcke, Mützen u. dgl. gemacht. — Wenn im Frühjahr die Paarungszeit eintritt, so schwillt den Kropfgänsen an der Wurzel des Schnabels ein runder, wie ein Borstorferapfel grosser Höker empor, der schwammig, weich, und fleischfarbig ist, und sich im Sommer wieder verliert. — *Forskäl* hat die Kropfgans in Arabien brüten gesehen, und gefunden, das sie vier Eyer legt, die nicht grösser sind als Gänseeyer. (a. a. O.)

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 223. n. 1.
Pelecanus (Onocrotalus) gula faccata; die
Kropfgans.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 399. n. 1. die Kropf-
gans.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 750. n. 1.
die Kropfgans. p. 156. Pelikan, Beutelgans.
Sackgans, Schneegans, Kropfpelikan, Riesen-
pelikan, Schwanentaucher, Vielfraß, Nimmer-
satt, Wasservielfraß, Ohrvogel, Eselfchreyer.

Funke, Naturgesch. I. p. 324. der Pelikan.

Ebert, Naturl. II. p. 75. der Pelikan.

Halle, Vögel, p. 586. n. 732. die Kropfgans.
Fig. 53.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 153. n. 138. der Eselfchreier u. s. w.

Pennant, arct. Zool. II. p. 538. n. 423. der Rie-
senpelikan, Kropfgans,

Beckmann, Naturhist. p. 44. die Kropfgans.

Neuer Schaupl. d. Natur, IV. p. 809. Kropfgans.

Onomat. histor. nat. V. p. 697. die Kropfgans.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 393. die Kropfgans.
Tab. 8.

Klein, av. p. 142. n. 1. Plancus Gulo.

Klein, Vorb. p. 263. n. 1. Kropfgans, Schneegans.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 151. n. 1. Kropfgans.

Gesner, Vögelb. p. 387. Onvogel, Schneegans,
Meergans, Vogelheine. Eselfchreyer, Kropff-
vogel, Sackgans. Fig. p. 388.

Briffon, ornitholog. II. p. 497. n. 1. Pelican.

Batsch, Thiere, I. p. 383. die Beutelgans.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 882. n. 1. Pele-
canus (Onocrotalus) albus, gula faccata.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 338. n. 92.
die Kropfgans.

Wolf.

- Wolf*, Reif. n. Zeilan, p. 135. *Kropfgans.*
Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 343.
die Löffelgans. Tab. 6.
Lepchin, Tagebuch der russ. Reise, I. p. 307.
Kropfgänse.
Adanson, Senegall, p. 202. *Pelikanen.*
Rytschkow, orenb. Topogr. p. 242. *Baba.*
Pallas, Reif. Ausz. I p. 98. *Kropfgänse.* p. 314.
Baba. II. p. 7. *Kropfgänse.*
Pallas, nord. Beyträge, I. p. 7. *die Kropfgans.*
Le Brun, Reif. n. Mosk. u. Pers. II p. 161.
S. G. Gmelin, Reif. I. p. 123. *Kropfgans.*
Seligmann, Vögel, IV. Tab. 79. *der Pelican.*
Perrault, *Charvas*, u. *Dodart*, Abhandl. aus der
 Naturgesch. II. p. 341. anatom. Beschreibung
 zweyer Pelikane. Tab. 85. *der Pelican.* Tab.
 86. die Zergliederung.
 Naturf. XII. p. 140. n. 92. *die Kropfgans.*
 Berlin. Samml. V. p. 277. *der Pelikan.*
Frisch, Vögel, Tab. 186. *die Kropfgans oder*
Schwannentaucher.
Linné, auserles. Abhandl. II. p. 285. n. 51. *die*
Kropfgänse.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 83. n. 97.
der Nimmersatt, Kropfgans.
 Mannichfaltigk. IV. p. 211. *der Pelikan*; m. 1 F.
 Neue Mannichfalt. III. p. 316. *der Pelikan.*
 Neueste Mannichfaltigk. I. p. 171. II. p. 124. *der*
Pelikan.
 Hamb. Magazin, VI. p. 594. *der Pelikan.*
 Neu Hamb. Magazin, St. 84. p. 463.
Lichtenberg, Magazin f. d. Neueste u. f. w. III. 2.
 p. 154. *Pelikane.*
Goetze, nützl. Allerley, I. p. 146. II. p. 216. n. 1.
der Pelikan.

Beckmann,

Beckmann, physikal. ökonom. Bibl. VII. p. 132.
die Kropfgans.

Meidinger, Vorles. I. p. 126 n. 1. die Kropfgans.

Ökonom. Zool. p. 74. n. 15. die Kropfgans.

Eberhard, Thiergesch. p. 114. die Kropfgans,
Meergans.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 561. Pelikan.

Loniceri, Kräuterb. p. 669. Schneegansß, Meer-
gansß.

Franke, diss. de Pelecano. Lips. 1640 4.

Funcii comment. de Pelecano. Gorlic. 1692. 4.

Deusing, de Pelecano; in dissertt. Fasc. diss. 14.

Ol. Borich. de Pelecano; in *Bartholin*. Epist.
Cent. III. ep. 93. p. 399.

Volkamer, de Pelecano; in Eph. Natur. Cur.
Dec. III. an. 4. obs. 119. p. 247.

Fischer, de Pelecano. Nov. Act. Nat. Cur. I.
p. 284.

Neue gefellsch. Erzähl. II. p. 367. (über die Haut
des Pelikans.)

Urtsperger, Nachricht. von Georg. u. Carolin. I.
p. 849.

Cardan. de rer. variet. L. 7. c. 36. p. 214. Ono-
crotali.

P. Martyr, de nov. orb. Lib. 6. decad. 3.

Linné, Syft. Nat. Ed. II. p. 54. Onocrotalus.

Linné, Syft. Nat. Ed. VI. p. 23. n. 1. Onocrotalus
gula faccata.

Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 132. n. 1. Pele-
canus (Onocrotalus) gula faccata.

Forskål, faun. orient. p. 7. n. 6. Onocrotalus
Ahdjirbu.

Charleton, onomast. zoic. p. 94. n. 1. Onocro-
talus.

Moehring, av. gen. p. 63. n. 65. Onocrotalus.

Schwenk.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 311. Onocrotalus, Truo;
ein Kropffgans, Ohnvogel.

Jonston, av. p. 126. Onocrotalus.

Hermann, tab. affin. anim. p. 155. Onocrotalus.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 47. Onocrotali.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 10. n. 149. Πελεκανος.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 273. n. 1.
die Kropffgans.

β. Die Kropffgans mit gezähneltem Schnabel?

Briffon, ornitholog. II. p. 499. n. 1. A. Pelican à bec dentelé. (6)

9. ROSEUS. Die rosenfarbene Kropffgans. (7)

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 883. n. 2. Pelecanus (Roseus) roseus, gula faccata.

Sonnerat, Reif. n. Neuguin. p. 34. der Pelikan mit lebhaft rosenfarbenem Gefieder.

10. FUSCUS. Die dunkelbraune amerikanische Kropffgans. (8)

Müller, Naturyst. II. p. 725. ad n. 1. der amerikanische Pelikan.

Pennant, arct. Zool. II. p. 539. n. 424. der dunkelbraune Pelekan.

Klein, av. p. 143. ad n. 1. Onocrotalus fuscus.

Klein, Vorbereit. p. 263. ad n. 1. der braune Eselschreyer.

Klein, verb. Vögelhist. p. 151. ad n. 1. die braune Kropffgans.

Briffon,

(6) *Latham* rechnet dies Synonym zu *P. Thagus* p. 577 n. 30.

(7) *Sonnerat* glaubt, diese Gattung möge wohl mit *Pelecanus Manillensis*, n. 11. einerley seyn, und der Vogel verändere vielleicht seine Farben nur mit dem Alter.

(8) Nach *Klein*, *Sloane*, *Liuné*, u. a. nur eine Varietät von *Pelecanus Onocrotalus*.

Briffon, ornithol. II. p. 499. n. 2. Pelican brun.

Latham, Syft. ornitholog. II. p. 883. n. 3. Pelecanus (Fuscus) cinereo - fuscus, gula faccata.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 81. *der amerikaniſche Pelican.*

Ellis, Hudſonsb p. 37. *der Pelican.*

Cetti, Naturgeſch. von Sardinien, II. p. 346. *der amerikaniſche Pelikan.*

Schlözer, Erdbefchreib. von Amerika, p. 110. *der Pelican.*

Mannichfaltigk. IV. p. 214. *der amerikaniſche Pelikan.*

Linne', Syft. Nat. Edit. X. I. p. 133. n. 1. β . Onocrotalus f. Pelecanus fuscus.

Linne', Syft. Nat. Ed. XII. I. p. 215. n. 1. β . Onocrotalus occidentalis.

Hift. Californ. I. p. 40. Great Gull.

Gentl. Magaz. XX. tab. p. 210. Brown Pelican.

11. MANILLENSIS. *Die manilliſche Kropfgans.* (9)

Latham, Syft. ornitholog. II. p. 833. n. 4. Pelecanus (Manillensis) fuscus, gula faccata.

Sonnerat, Reif. n. Neuguin. p. 34. *der braune Pelikan der Inſel Luſon.*

12. PHILIPPENSIS. *Die philippiniſche Kropfgans.* (10)

Latham, Syft. ornithol. II. p. 883. n. 5. Onocrotalus (Philippensis) subcristatus albus, corpore supra griseo - cinereo, gula faccata.

13. RUFESCENS. *Die röthliche Kropfgans.*

Latham, Syft. ornithol. II. p. 884. n. 6. Pelecanus (Rufescens) cristatus rufescens, capite collo-

(9) S. vorher die ſiebente Anmerkung.

(10) *Latham* rechnet hieher auch den *Alcatras*. Phil. Transact. XXIII. p. 1394. n. 40.

colloque fuscescente-albis, cauda saturate-cinerea, gula faccata.

14. CAROLINENSIS. *Die carolinische Kropfgans.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 540. n. 425. *der carolinische Pelecan.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 884. n. 7. Pelecanus (Carolinensis) supra obscurus, subtus albus, gula faccata.

β. *Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 884. n. 7. β.

γ. *Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 884. n. 7. γ.

15. ERYTHORHYNCHOS. *Die rothschnablige nordamerikanische Kropfgans.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 884. n. 8. Pelecanus (Trachyrhynchus) cristatus albus, gula faccata nigro striata.

Philos. Transact. LXII. p. 419. n. 54.

2. AQUILUS. *Die Fregatte.*

Müller, Naturf. II. p. 327. n. 2. *Fregatvogel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 42. n. 3. *der Fregatvogel.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 223. n. 2. Pelecanus (Aquilus) alis amplissimis, cauda forficata, corpore nigro, rostro rubro, orbitis nigris; *die Fregatte.*

Halle, Vögel, p. 162. n. 100. *die Fregatte.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 154. n. 139. *die Fregatte.*

Onomat. histor. nat. III. p. 967. V. p. 239. *die Fregatte, der Meeradler.*

Briffon, ornitholog. II. p. 493. n. 6. *Fregate.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 387. *die Fregatte.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 885. n. 10. Pelecanus (Aquilus) cauda forficata, corpore nigro, rostro rubro, orbitis nigris.

Batsch,

Batsch, Thiere, I. p. 383 *der Fregattvogel.*

Seligmann, Vögel, VIII. Tab 99. *die Fregatte.*

Forster, Reif. Edit. in 8. I. p. 49 257. *Fregatt-
tenivögel.*

Berlin. Samml. V. p. 520. *die Fregatte.*

Eberhard, Thiergeschichte, p. 113. *die Fregatte.*

Neueste Mannichfalt. I. p. 549. *der Fregattvogel.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 133 n. 2. Pelecanus (Aquilus) cauda forficata, corpore nigro, capite abdomineque albis.

Moehring, av. gen. p. 82. n. 108. Attagen.

Jonston, av. p. 213 Caripira.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 154. Pelecanus Aquilus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 273. n. 2. *die Fregatte.*

16. MINOR. *Die kleine Fregatte. (1)*

Briffon, ornith. II. p. 494. n. 7. petite Frégate.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 885 n. 11 Pelecanus (Minor) cauda forficata, corpore ferrugineo, rostro orbitisque rubris.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 7. *der kleine Seerabe?*

17. LEUCOCEPHALOS. *Der weißköpfige Pelikan.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 886 n. 12. Pelecanus (leucocephalus) cauda forficata, corpore fusco, capite, collo, pectore et abdomine albis, rostro obscuro.

18. PALMERSTONI. *Der Pelikan von der Insel Palmerston.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 886. n. 13. Pelecanus (Palmerstoni) cauda forficata, corpore fusco,

H h h 2

fulco,

(1) Länge, nach *Briffon*, 23/4 Fuß 9 Zoll. *Briffon* ist geneigt, ihn für das Weibchen vom vorigen zu halten.

fusco, viridi nitente, subtus albo, iugulo albo nigroque vario, abdomine albo, criffo nigro.

3. CARBO. *Der Kormoran.*(²)

Müller, Naturfyft. II. p. 328. n. 3. *der Kormoran*. Tab. II. fig. 3.

Leske, Naturgefch. p. 285. n. 2. *der Kormoran*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 38. n. 1. *der Kormoran*. Tab. 40.

Blumenbach, Handb. d. Naturgefch. p. 284. n. 3. Pelecanus (Carbo) cauda rotundata, corpore nigro, roftro edentulo, capite fubcriflato; *die Scharbe*.

Bechftain, Naturgefch. I. p. 401. n. 2. *der Kormoran*.

Bechftain, Naturgefch. Deutchl. II. p. 756. n. 2. *der Kormoran*. p. 761. *Wafferrabe*, *Seerabe*, *Feuchtarfch*, *Schaluchorn* od. *Schlucker*, *Scharb*, *ſchwarzer und kohlfchwarzer Pelikan*.

Funke, Naturgefch. I. p. 324. *der Kormoran*.

Ebert, Naturl. II. p. 77. *Cormoran*, *Wafferrabe*.

Halle, Vögel, p. 589. n. 736. *der Seerabe*.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 155. n. 140. *der Wafferrabe*.

Neuer Schauplatz der Natur, IX. p. 574. *Wafferrabe*.

Onomat. hiftor. nat. II. p. 634. V. p. 241. *der groſſe ſchwarze Seeraab*.

Handb.

(2) Länge, nach *Briffon*, 27½ Fufs 6 Linien. Flügelweite 42½ Fufs 6 Linien — Länge nach *Pennant* 3 Fufs 4 Zoll. Flügelweite 4 Fufs 2 Zoll. Gewicht 7 Pfund. Wird oft mit der folgenden Gattung verwechfelt — *Brünnich* hat *Linnés* *Pel. Carbo*, und *Briffon's Phalacorax*, als zwey verfchiedene Gattungen getrennt. *Müller* nimmt letztern als eine Varietät von *Pelecanus Graculus* L. an.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 390. *der Wasserrab.*

Corvus aquaticus.

Klein, av. p. 144. n. 5. *Plancus Corvus, lacustris, aquaticus.*

Klein, Vorbereit. p. 266. n. 5. *Seewasser-Rabe, Feuchtars, Schlucker.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 153. n. 5. *Wasserrabe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 540. n. 427. *der Cormoran.*

Gesner, Vögelb. p. 97. 99. *Morfex, Stolucherez, Scholucher, Scharbe, Scaluer, Schuluer, Scalucher; Carbo aquaticus.*

Briffon, ornithol. II. p. 495. n. 1. *Cormoran.*

Batsh, Thiere, I. p. 383. *der Kormoran.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 886. n. 14. *Pelecanus (Carbo) cauda rotundata, corpore nigro, capite subcristato.*

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 82. n. 92. *Seerabe.*

Cetti, Naturg. v. Sardin. II. p. 342. *der Cormoran.*

Olaassen, Reise d. Island, I. p. 34. *der Pelikan.* p. 257. *Skarfen.* III. p. 200. *Dilaskarfs, Hvidlaaring?*

Lepetchin, Tageb. d. ruff. R. I. p. 307. *Wasserraben.*

Pennant, Reise n. Schottl. I. p. 24. *Kormoran.*

Pallas, Reise, Ausz. II. p. 7. *Seeraben.*

Pallas, nord. Beytr. III. p. 13. *die Seeraben.* IV. p. 7. *der große Seerabe.* IV. p. 20. *der schwarze Wasserrabe.*

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 143. *Seeraben.*

Neuhoff, Gesandtschaft nach China, I. p. 134. *Louwa.*

Dapper, Sina, p. 140. *Louwa.*

- Pontoppidan*, Naturgesch. von Dännem. p. 169.
n. 1. *Adekrage.*
- Pontoppidan*, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 181,
Skarbe.
- Allgem. Reif. V. p. 260. *Lou-wa*
- Linné*, a serl. Abh. II. p. 292. n. 8. *der Seerabe.*
- Schneider*, zool. Abh. p. 144. *der Seerabe.*
- Scopoli*, Bemerk a. d. Naturgesch. I. p. 84. n. 98.
der schwarze Pelekan.
- Goeze*, nützl. All. I. p. 210. *der Kormoran.*
- Lichtenberg*, Magazin f. d. Neueste u. f. w. I. 2,
p. 11. *Wasserrabe.*
- Schriften der berlin. Gefellsch. naturf. Fr. VII.
p. 430.
- Neues berlin. Intelligenzbl. 1788. p. 1141.
- Mannichfaltigk. I. p. 808. fig. 812. II. p. 615.
fig. 618.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. II. p. 54. *Carbo aquaticus.*
- Linné*, Syst. Natur. Edit VI. p. 23. n. 2. *Carbo*
aquaticus.
- Linné*, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 123. n. 3. *Pele-*
canus (Carbo) cauda aequa, corpore cinereo,
rostro edentulo.
- Linné*, fn. Suec. I. n. 116. *Pelecanus corpore atro,*
subtus albicante, rectricibus quatuordecim.
- Linné*, fn. Suec. II. p. 51. n. 145. *Pelecanus (Car-*
bo) cauda rotundata, corpore nigro, rostro
edentulo.
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 18. n. 146. *Pele-*
canus (Carbo) cauda rotundata, corpore nigro,
rostro edentulo, capite subcristato.
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 18. n. 148. *Pele-*
canus Phalacorax.
- Brünniche*, ornith. bor. p. 30. n. 120. *Pelecanus*
(Carbo) capite laevi, rectricibus 14.

Brünniche, ornith. bor. p. 31. n. 122. Phalacorax
Briff.

Fabric. fn groenl. p. 88. n. 57. Pelecanus (Carbo)
cauda rotundata, corpore nigro, rostro eden-
tulo, capite laevi.

Charleton, onomast. zoic. p. 95. n. 5. Phalacorax.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 246. Corvus lacustris;
Seerrabe, Wasserrabe, Feuchtars.

Jonston, av. p. 131. Phalacorax. Corvus aquati-
cus. p. 134. Morfex.

Albert, hist. anim. Lib. 5: c. 3.

Hermann, tab. aff. anim. p. 146. Pelecanus Carbo.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 274. n. 3.
der Kormoran.

4. GRACULUS. *Der kleine Kormoran.* (3)

Müller, Natursystem, II. p. 330. n. 4. *der Was-
ferrabe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 761. n. 3.
der Wasserrabe. p. 763. *Seekräh, Seeheher,
Krähenspelikan.*

Halte, Vögel, p. 591. n. 737. *die Schwimmkräh.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 540. n. 426. *der Was-
ferrabe.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 242. *der kleine Cor-
moran.*

Klein, av. p. 145. n. 6. Plancus Corvus minor;
aquaticus.

Klein, Vorbereit. p. 267. n. 6. *Seekräh, Seeheher.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 153. n. 6. *Seekräh.*

Briffon, ornith. II. p. 496. n. 2. petit Cormoran.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 887. n. 15. Pele-
canus (Graculus) cauda rotundata, corpore

Hhh 4 nigro

(3) Flügelweite 3 Fufs 8 Zoll. Gewicht 4 Pfund *Pennant.*

Wird von einigen für eine Varietät, von andern für das
Weibchen von *Pei. Carbo* gehalten.

nigro, subtus fusco, rectricibus duodecim, rostro edentulo.

Bock, Naturgeschichte von Preussen, IV. p. 338. n. 93. *der See-Wasserrabe.*

Pennant, Reif. d. Schottl. I. p. 24. *Wasserraben.* Naturf. XII. p. 140. n. 93. *der Wasserrabe.*

Perrault, *Charras* u. *Dodart*, Abhandl. aus der Naturgesch. I. p. 247. anatomische Beschreib. eines Cormorans. Tab. 32. *der Cormoran.* Tab. 33. die Zergliederung.

Neue schwed. Abh. III. p. 104. *Pelecanus Graculus.* *Pontoppidan*, Dänemark, p. 169. n. 2. *Fiskeren.* n. 3. *Hvidlaaring.*

Linne, Syst. Nat. Edit. VI. p. 23. n. 3. *Graculus palmipes.*

Müller, zoolog. dan prodr. p. 18. n. 147. *Pelecanus (Graculus) cauda rotundata, corpore nigro, subtus fusco, rectricibus duodecim, rostro edentulo.*

Charleton, onomast. zoic. p. 95. n. 6. *Graculus palmipes, Corvus marinus, Mergus magnus niger.*

Jonston, av. p. 132. *Graculus palmipes, feu Corvus aquaticus minor.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 274. n. 4. *der kleine Kormoran.*

β. P. rostro edentulo, corpore ex nigro-viridescente nigroque caerulefcente varie fusco, gula lutea, cauda cuneata. *

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 827. n. 15. β. *Mus. Carlson. fasc. III. Tab. 6r.*

γ. P. cauda rotundata, corpore nigricante, subtus fusco, supra pennis margine nigris. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 828. n. 15. γ.

[*Buffon*,

[*Büffon*, hist. nat. des ois. VIII. p. 374. le petit fou brun.

Büffon, pl. enl. 974. Fou brun de Cayenne.]

Vid. *Gmel. Syst.* p. 579. ad n. 8.

19. PYGMAEUS. *Der Zwergpelikan.*

Müller, Natursystem, Suppl. p. 106. n. 4. a. *der Zwergpelikan.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 890. n. 25. Pelecanus (Pygmaeus) ater, pectore virescente, orbitis atomis albis sparsis, tectricibus alarum medio fuscis, collo, pectore lateribusque punctis sparsis niveis.

Pallas, Reise, Ausz. II. Anh. p. 14. n. 26. Pelecanus Pygmaeus. Tab. G.

Pallas, Reif. Ausz. II. p. 7. Pelecanus pygmaeus. p. 240. eine ganz kleine Art von Seeraben.

β. P. gula murina, rostro edentulo, pedibus nigris. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 890. n. 25. β.

20. PUNCTATUS. *Der punktirte Pelikan.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 889. n. 19. Pelecanus (Punctatus) cristatus niger, cauda rotundata, orbitis nudis, alis fusco-cinereis, nigro punctatis, lateribus colli linea utrinque alba.

21. CRISTATUS. *Der Haubenkormoran.*(4)

Pennant, arct. Zool. II. p. 542. A. *der Haubenkormoran.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 888. n. 16. Pelecanus (Cristatus) corpore viridi-nitente, subtus obscuro, rostro pedibusque obscuris, capite cristato.

Olaassen, Reif. durch Island, II. p. 295. *Topfkarfr. Hraukur.*

Hhh 5

Müller,

(4) Flügelweite 3 Fufs 6 Zell. Gewicht 3 3/4 Pfund. Penn.

Müller, zool. dan. prodr. p. 18. n. 150. *Pelecanus* (Cristatus) crista suberecta, corpore atro immaculato, rectricibus duodecim.

22. **VIOLACEUS.** *Der violette Kormoran.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 543. B. *der violette Cormoran.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 888. n. 17. *Pelecanus* (Violaceus) crista erecta, corpore toto nigro violaceo-nitente.

23. **URILE.** *Der Schnarrkormoran.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 543. C. *der Schnarrkormoran.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 888. n. 18. *Pelecanus* (Urile) viridi-nitens, gutture et orbitis albis, facie nuda ex caerulefcente rubra, alis caudaque obscuris, pedibus nigris.

Steller, Kamtschatka, p. 179. *Urill der Kamtschadalen.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 275. n. 5. *der Schnarrkormoran.*

24. **NAEVIUS.** *Der bunte Kormoran.*

Ist nach *Latham* mit *Pelecanus Punctatus*, n. 20. einerley.

25. **CARUNCULATUS.** *Der warzige Kormoran.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 889. n. 20. *Pelecanus* (Carunculatus) niger, subtus albus, facie nuda carunculata rubra, orbitis elevatis caeruleis, fascia alarum alba.

26. **MAGELLANICUS.** *Der magellanische Pelikan.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 889. n. 21. *Pelecanus* (Magellanicus) niger, macula pone oculos abdomineque albis, temporibus mentoque

toque nudis rubescentibus, hypoehondriis albo striatis.

27. **VARIUS.** *Der braun und weiße Pelikan.*

Latham, Syft. ornitholog. II. p. 890. n. 22. Pelecanus (Varius) fuscus, subtus albus, supercillii pallidis, dorso postico, uropygio, femoribus, remigibus caudaque nigris.

28. **CIRRHATUS.** *Der neuseeländische gehäubte Pelikan.*

Latham, Syft. ornithol. II. p. 22. n. 23. Pelecanus (Cirrhatuſ) niger, subtus albus, vertice cristato, litura alarum alba, rostro, orbitis pedibusque flavis.

29. **AFRICANUS.** *Der afrikanische Pelikan.*

Latham, Syft. ornitholog. II. p. 890. n. 24. Pelecanus (Africanus) fusco-niger, subtus albo nigricanteque varius, gula alba, tectricibus alarum caeruleo-griseis, margine et apice nigris.

** *Mit gezähnettem Schnabel.*

30. **THAGUS.** *Der Thage.⁽⁵⁾*

Latham, Syft. ornith. II. p. 884. n. 9. Pelecanus (Thagus) cauda rotunda, rostro ferrato, gula faccata.

Vidaure,

(5) Ich habe schon in der net. 6. bey *Pel. Onocrotalus* n. 1. bemerkt, daß *Latham* die im Syft. p. 599. aufgeführte Varietät β , und das daselbst befindliche *Brisson'sche* Synonym, *hier* rechnet. Ist dieß richtig, so muß auch der *Alcatraz* des *Hernand.* und die übrigen von mir angeführten Synonymen hierher gezogen werden. *Molina*, außer welchem ich in unfrem System kein Synonym bemerkt finde, sagt: daß sein *Pelecanus Thagus*, der Spanier *Alcatraz* sey. Diese Benennung finde ich auch bey *Vidaure*, aber die Größe wird

Vidaure, Gesch. v. Chile, p. 72. *der Alcatraz*.
Hernand. Mex. tab. p. 672. Atototl Alcatraz, Onocrotalus mexicanus dentatus. Avis aquatica?
Hermann, tab. affinit. animal. p. 155. *Alcatraz*.
 Journ. de Phys. 1779. Decembr. p. 475.

5. BASSANUS. *Die schottische Gans.*

Müller, Natursyst. II. p. 330. n. 5. *die schottische Gans*. Tab. II. fig. 2.

Borowesky, Thierreich, III. p. 42. n. 4. *die schottische Gans*.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 224. n. 4. Pelecanus (Bassanus) cauda cuneiformi, corpore albo, rostro ferrato, remigibus primoribus nigris, facie caerulea.

Halle, Vögel, p. 588. n. 733. *die schottische Gans*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 239. *die schottische Gans*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 541. n. 428. *der Bassaner, der Gannet*.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 156. n. 141. *der Bassaner, Bassanergans*.

Klein, av. p. 143. n. 2. Plancus, Anser Bassanus.

Klein, Vorbereit. p. 265. n. 2. *Bassaner, schottische Gans*.

Klein,

von beyden ganz verschieden angegeben. *Molina* bestimmt den Körper des Thiers nicht größer als den einer Schnepfe; *Vidaure* hingegen kleiner als eines *kalekutischen Habus*. *Molina* sagt: die Eingebornen des Landes gebrauchten seinen zusammengenäheten Beutel, um Taback darin aufzubewahren, auch verfertigten sie Laternen daraus, weil er, getrocknet, so durchsichtig wie Horn würde; er habe Lampen gesehen, die anderthalb Fuß hoch gewesen, und aus einem einzigen solchen Sack gemacht wären. — Wie ein Vogel von der Größe einer Schnepfe einen solchen Sack haben könne, ist wohl kaum zu begreifen.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 152. n. 2. *schottische Gans*.

Gesner, Vögelb. p. 135. *Solend od. Schottengansß*.

Briffon, ornith. II. p. 492. n. 5. Fou de Bassan.

Batsch, Thiere, I. p. 384. *die schottische Gans*.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 891. n. 26. Pelecanus (Bassanus) cauda cuneiformi, corpore albo, rostro ferrato, remigibus primoribus nigris, facie caerulea.

Pennant, Reif. d. Schottl. I. p. 51. *Gannets od. Solandgänse*.

Pennant, R. d. Schottl. II. p. 272. *schottische Gänse*.

Pallas, nord. Beytr. II. p. 299. *der weiße Seerabe*.

Olaffen, Isl. I. p. 120. *Hafsula*. III. p. 201. *Sula*.

Pontoppidan, Norwegen, II. p. 145. *Hav-Sule, Gentelmann*.

Sander, Größe u. Schönheit in der Nat. I. p. 239. *Bassaner-Pelecan*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 133. n. 4. Pelecanus (Bassanus) cauda cuneiformi, rostro ferrato, remigibus primoribus nigris.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 18. n. 149. Pelecanus (Bassanus) cauda cuneiformi, corpore albo, rostro ferrato, remigibusque primoribus nigris, facie caerulea.

Moehring, av. gen. p. 64. n. 66. Graculus.

Jonston, av. p. 131. Anser Bassanus seu Scoticus.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 275. *die schottische Gans*.

β. SULA MAIOR. *Die Charniergans*.⁽⁶⁾

Halle, Vögel, p. 588. n. 734. *die Charniergans mit dem Schnabelgelenke*.

Klein,

(6) Nach *Briffon*, *Klein*, *Halle*, u. a. eine eigene Gattung.

Klein, av. p. 144. n. 3. Plancus congener Anseri Bassano.

Klein, Vorbereit. p. 265. n. 3. *großer Dölpel*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 152. n. 3. *großer Dölpel*.

Briffon, ornithol. II. p. 490. n. 2. grand Fou.

Latham, Syn. III. 2. p. 620. n. 25. Var. A.

Latrom, Syst. ornitholog. II. p. 891. n. 26. β . P.

fuscus albo-maculatus, capite, collo et pectore concoloribus, subtus albus, area oculorum nuda nigricante.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 541. ad n. 428.

Siegmann, Vögel, IV. Tab. 72. *der große Dölpel*. (der Kopf.)

Neue Mannichfaltigk. I. p. 401. *die große Charniergans*.

6. PISCATOR. *Der Fischer*.

Müller, Naturfyst. II. p. 331. n. 6. *der Fischer*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 43. n. 5. *der Einfaltspinsel, weiße Pelikan, Fischer*.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 157. n. 142. *der Fischer*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 243. *der Fischer*. (Mit dem vorigen β verwechselt.)

Briffon, ornith. II. p. 491. n. 4. Fou blanc.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 892. n. 27. Pelecanus (Piscator) cauda cuneiformi, rostro serrato, corpore albo, remigibus omnibus nigris, facie rubra.

7. SULA. *Der weiße Fischer*.

Müller, Naturf. II. p. 332. n. 7. *der weiße Fischer*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 44. n. 6. *der weiße Fischer*.

Halle, Vögel, p. 589. n. 735. *der Wassertölpel mit dem Schnabelgelenke*.

Onomat.

Onomat. hist. nat. VI. p. 244. *der kleine Fischer, kleiner Tölpel.*

Klein, av. p. 144. n. 4. Plancus Morus.

Klein, Vorbereit. p. 266. *Dölpel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 153. n. 4. *Dölpel.*

Briffon, ornitholog. II. p. 489 n. 1 Fou.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 892. n. 28. Pelecanus (Sula) cauda cuneiformi, corpore albedo, rostro dentato, remigibus primoribus apice nigricantibus, facie rubra.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 74. *der Dölpel.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 134. n. 5. Pelecanus (Piscator) cauda cuneiformi, rostro serrato, remigibus omnibus nigris.

8. FIBER. *Der braune Fischer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 332. n. 8. *der bräune Fischer.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 241. *der braune Fischer.*

Briffon, ornitholog. II. p. 491. n. 3. Fou brun.

Latham, Syst. ornith. II. p. 893. n. 29. Pelecanus (Fiber) cauda cuneiformi, rostro serrato, corpore fuscescente, remigibus omnibus nigricantibus, facie rubra.

31. PARVUS. *Der kleine cayennische Pelikan.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 893. n. 30. Pelecanus (Parvus) niger, subtus albus, facie plumosa.

52. MACULATUS. *Der gefleckte Pelikan. (7)*

Latham, Syst. ornith. II. p. 892. n. 26. γ. P. fuscus, maculis albis triquetris, subtus albidus fusco-maculatus, rostro, remigibus, cauda pedibusque fuscis.

A. Ver.

(7) Nach *Latham* eine Varietät von *Pelecanus Bassanus*.

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 215. n. 1. *β. Pel. onocr.* p. 570. n. 10. *Pelecanus Occidentalis.* *Fuscus.*

Das Geschlecht ist mit 24 Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung sind zwey, und bey der 5ten ebenfalls zwey Varietäten aus einander gesetzt.

73. GESCHLECHT. PLOTUS. *Der Schlangenvogel.* (Langhals, Breitfuß.)

Müller, Naturfyst. II. p. 233. Gen. LXXIII.

Leske, Naturgesch. p. 288. Gen. LXXI.

Borowsky, Thierreich, III. p. 24. Gen. XXXV.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 221. Gen. LXXI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 394. Gen. XXIV.

Onomat. hist. nat. VI. p. 586.

Brisson, ornithol. II. p. 485. Gen. CVIII. *Anhinga.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 895. Gen. CI.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 276. Gen. XXXV.

I. ANHINGA. *Der Anhinga.*

Müller, Naturfyst. II. p. 233. *Schlangenkopf.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 25. *der Schlangenvogel.* Tab. 35.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 221. n. 1. *Plotus (Anhinga) ventre albo.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 394. *der Schlangenvogel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 175. *der Schlangenvogel.*

Halle, Vögel, p. 592. n. 739. *der Schlangenvogel.*

Ebert,

- Ebert, Naturl. II. p. 78. *der Anhinga*.
 Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
 II. p. 158. n. 143. *der Anhinga, Schlangenhals*.
 Onomat. hist. nat. VI. p. 587. *der Schlangenvogel*.
 Klein, av. p. 145. n. 8. *Plancus Brasiliensis*.
 Klein, Vorber. p. 268. n. 8. *brasilianischer Patzsch-*
fuß, Anhinga genannt.
 Klein, verbess. Vögelhist. p. 154. n. 8. *Anhinga*.
 Brisson, ornithol. II. p. 485. n. 1. *Anhinga*.
 Latham, Syst. ornitholog. II. p. 895. n. 1. *Plotus*
 (*Anhinga*) *capite laevi, abdomine albo*.
 Moehring, av. gen. p. 61. n. 63. *Ptynx*.
 Jonston, av. p. 211. *Anhinga*.
 Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 276. n. 1.
der Anhinga.

2. MELANOGASTER. *Der schwarzbäuchige Schlangenvogel.*

- Latham, Syst. ornith. II. p. 895. n. 2. *Plotus (Melanogaster) capite laevi, abdomine albo*.
 Naturf. I. p. 275. n. 12. *Anhinga mit schwarzem Bauche*.
 Berlin. Samml. IX. p. 194. n. 12. *der schwarzbäuchige Anhinga von Zeylon und Java*.
 Neueste Mannichfaltigk. I. p. 190. n. 12.

β. Latham, Syst. ornithol. II. p. 896. n. 2. β. Pl. corpore supra fusco, subtus nigro, scapularibus striis tectricibusque alarum albo flavicantibus, cauda apice rufa.

γ. Latham, Syn. III. 2. p. 625. n. 2. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 896. n. 2. γ. Pl. niger, dorso et scapularibus albo maculatis, tectricibus alarum albo - flavicantibus, cauda apice rufa.

δ. *Latham*, Syn. III. 2. p. 626. n. 2. Var. C.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 896. n. 2. γ. Pl.
niger, capite, collo et tectricibus alarum rufo
fuscoque striatis.

3. SURINAMENSIS. *Der surinamische Schlangenvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 896. n. 3. Plotus
(Surinamensis) corpore supra fusco, subtus al-
bo, vertice et collo posteriore nigris, gula, ju-
gulo et fascia oculari albis, lateribus colli al-
bo nigroque lineatis.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 276. n. 2.
der surinamische Schlangenvogel.

A. *Veränderungen gegen die XIIIte Edition, und Ver-
mehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit zwey Gattungen vermehrt.

74. GESCHLECHT. PHAËTON. *Der Phaëton.*
(Tropiker, Tropikvogel.)

Müller, Naturyst. II. p. 335. Gen. LXXIV.

Leske, Naturgesch. p. 290. Gen. LXXIV.

Borowsky, Thierreich, III. p. 23. Gen. XXXIV.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 221.
Gen. LXXII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 393. Gen. XXIII.

Onomat. hist. nat. VI. p. 310.

Briffon, ornith. II. p. 486. Gen. ClX. Lepturus.

Batsch, Thiere, I. p. 366. Gen. LXXXII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 893. Gen. C.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 153.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 277.
Gen. XXXVI.

I. AETHEREUS. *Der Tropikvogel.*

Müller, Natursystem, II. p. 335. n. I. *der fliegende Phaëton.* Tab. II. fig. 3.

Leske, Naturgesch. p. 291. n. I. *der fliegende Tropiker.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 23. n. I. *der fliegende Phaëton.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 221. n. I. Phaëton (Aethereus) rectricibus duabus longissimis, rostro serrato, pedibus aequilibribus, digito postico connexo; *Tropikvogel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 394. *der fliegende Tropikvogel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 174. *der fliegende Tropikvogel.*

Ebert, Naturl. II. p. 78. *der Tropikvogel.*

Halle, Vögel, p. 592. n. 738. *der Seefächer.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 158. n. 144. *die Tropikente.*

Neuer Schauplatz der Natur, IX. p. 152. *Tropikvogel.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 790. *der fliegende Phaëton.*

Klein, av. p. 145. n. 7. Plancus Tropicus, Avis tropicorum.

Klein, Vorbereit. p. 267. n. 7. *Tropikvogel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 154. n. 7. *Tropikvogel.*

Briffon, ornithol. II. p. 486. n. I. Paille en cul, ou oiseau des Tropiques.

Batsch, Thiere, I. p. 368. *der Tropikvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 893. n. I. Phaëton (Aethereus) albus, dorso, uropygio rectricibusque alarum minoribus nigro striatis, rectricum scapis basi fasciaque supraoculari nigris, rostro rubro.

Sander, Gröfse u. Schönheit in der Nat. I. p. 237.
Phaëton!

Neueste Mannichfalt. I. p. 549. *der Tropiker.*

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 134. n. 1. Phaëton (Æthereus) rectricibus duabus longissimis, rostro ferrato, digito postico adnato.

Moehring, av. gen. p. 64. n. 67. Lepturus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 153. Phaëton aethereus.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 277.
n. 1. *der Tropikvogel.*

β. LEPTURUS CANDIDUS. *Der weiße Tropikvogel.* (8)

Halle, Vögel, p. 577. n. 718. *die Erdgürtelmöwe.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 147. n. 22. *Tropikmeve.*

Briffon, ornitholog. II. p. 487. n. 2. *Paille-en-cul blanc.*

Latham, Syn. III. 2. p. 618. n. 1. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 894. n. 1. β. Phaëton albus, taenia supra oculos, scapularibus versus extremitatem fascia supra alas rectricumque scapis in exortu nigris.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. III. *der Tropikvogel.* (in fliegender Figur, nebst besonderer Abbild. des Kopfs und Fusses, in natürlicher Gröfse.)

γ. LEPTURUS FULVUS. *Der gelbe Tropikvogel.* (9)

Briffon, ornith. II. p. 488. n. 3. *Paille-en-cul fauve.*

Latham,

(8) Nach *Briffon* eine eigne Gattung. Länge 2 $\frac{1}{2}$ Fufs. Flügelweite 3 Fufs.

(9) Nach *Briffon* eine eigne Gattung. Länge 1 $\frac{5}{6}$ Fufs 8 Linien. Flügelweite 2 $\frac{3}{4}$ Fufs 6 Linien.

Latham, Syn. III. 2. p. 619. n. 1. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 894. n. 1. γ.

2. MELANORHYNCHOS. *Der schwarzschnäbli-
ge Phaeton.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 894. n. 2. Phaeton
(Melanorhynchus) albo-nigroque striatus, sub-
tus fronteque albus, taenia ante poneque ocu-
los, rostro pedibusque cinereis.

3. PHOENICURUS. *Der rosenfarbige Phaeton.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 894. n. 3. Phaëton
(Phoenicurus) roseo-incarnatus, rostro rectri-
cibusque 2 intermediis rubris, taenia supercilia-
ri pedibusque nigris.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 277.
n. 2. *der rosenfarbige Phaëton.*



A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Ver-
mehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 219. n. 2. Phaëton de-
mersus.

p. 558. n. 7. Aptenodytes
Cataractes.

Die Anzahl der Gattungen dieses Geschlechts ist
nur um *eine* vermehrt; aber die *zweyte* und *dritte* sind
neu, denn die zweyte der XIIten Edition ist in ein an-
deres Geschlecht versetzt. Uebrigens sind bey der
1sten drey Varietäten aus einander gesetzt.

75. GESCHLECHT. COLYMBUS. *Der Tau-
cher.* (Halbente, Steifsfuß.)

Müller, Natursyst. II. p. 338. Gen. LXXV.

Leske, Naturgesch. p. 289. Gen. LXXIII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 55. Gen. XLIII.

Blumenbach, Handb. der Naturgeschichte, p. 220.

Gen. LXIX.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 402. Gen. XXXI.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 763.

Gen. XX.

Neuer Schauplatz der Natur, VIII. p. 811.

Onomat. hist. nat. III. p. 194. VII. p. 651.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 462. 478. 480.

Klein, av. p. 149.

Briffon, ornithol. II. p. 367. Gen. XCI. Colym-

bus. p. 377. Gen. XCII. Uria. p. 388. Gen.

XCVII. Mergus.

Batsch, Thiere, I. p. 366. Gen. LXXXV.

Latham, Syst. ornith. II. p. 780. Gen. LXXXIV.

Podiceps. p. 796. Gen. XC. Uria. p. 799.

Gen. XCI. Colymbus.

Schriften der drouth. Gesellschaft, I. p. 201 ff.

Hermann, tab. affin. anim. p. 147.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 277.

Gen. XXXVII.

* *Mit dreyzehigen Füßen. Taucherhühner.*

12. MARMORATUS. *Der marmorirte Taucher.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 479. n. 355. *das marmorirte Taucherhuhn.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 799. n. 4. Uria

(Marmorata) supra castaneo fuscoque undulata, subtus fusco alboque nebulosa, rostro nigro, pedibus fulvis.

13. LACTEOLUS. *Der milchweiße Taucher.*

Pallas, Naturgesch. merkw. Th. V. p. 42. *der milchweiße Seetaucher.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 798. n. 3. Uria (Lacteola) nivea, dorso, alis basique caudae pallide

lide griseis, remigibus secundariis medio fuscescentibus.

β. *Latham*, Syst. ornithol. II. p. 798. n. 3. β. *Uria macula nigra* utrinque pone oculos, interscapulis et areis alarum nigris, mandibula superiore nigra, inferiore flavescente.

I. GRYLLE. *Die grönländische Taube.*

Müller, Natursystem, II. p. 388. n. 1. *grönländische Taube.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 57. n. 2. *die grönländische Taube.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 220. n. 1. *Colymbus (Grylle) pedibus palmatis tridactylis, corpore atro, tectricibus alarum albis; die grönländische Taube.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 772. n. 2. *das schwarze Taucherhuhn. p. 775. Seetaube, Täuchertaube, Grylltaucher. III. p. 702.*

Halle, Vögel, p. 593. n. 740. *die Täuchertaube.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 158. n. 145. *die grönländische Taube.*

Onomat. histor. natur. VII. p. 653. die schwarze grönländische Taube.

Pennant, arct. Zool. II. p. 478. n. 354. *das schwarze Täucherhuhn.*

Klein, av. p. 168. n. 2. *Columbus groenlandicus.*

Klein, Vorbereit. p. 311. n. 2. *die grönländische Taube.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 137. *grönländische Gans.*

Briffon, ornitholog. II. p. 379. n. 3. *petit Guillemot noir, appelé vulgairement Colombe de Groenland.*

Batsch, Thiere, I. p. 771. *die grönländische Taube.*

- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 797. n. 2. *Uria*
(*Grylle*) corpore atro, tectricibus alarum albis.
- Phipps*, Reif. nach d. Nordpol, p. 98. *Taucher-*
taube.
- Olaffen*, Isl. I. p. 257. 297. *Teifsta*.
- Pontoppidan*, Naturhistorie von Norwegen, II.
p. 189. *Teifst*.
- Steller*, Besch. von Kamtschatka, p. 183. *Cajouer*
oder Kahjuhr-Vogel.
- Leem*, Lappl. p. 146. *Teifste*.
- Schwed. Abh. II. p. 224. *Uria Grylle*.
- Schriften der dronth. Gefellsch. I. p. 220.
- Linne'*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 23. n. 4. *Columba*
groenlandica.
- Linne'*, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 130. n. 5. *Alca*
(*Grylle*) rostro laevi subulato, abdomine ma-
culaque alarum alba, pedibus rubris.
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 18. n. 151. *Co-*
lymbus (*Gryllus*) pedibus palmatis tridactylis,
corpore atro, tectricibus alarum albis.
- Moehring*, av. gen. p. 67. n. 73. *Uria*.
- Hermann*, tab. affinit. animal. p. 148. *Colymbus*
Grylle.
- Donndorff*, Handb. d. Thiergesch. p. 278. n. 1.
die grönländische Taube.
- β. *Latham*, Syn. III. 2. p. 333. n. 3. Var. A.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 797. n. 2. β. *Uria*
fuliginosa, fascia alarum gemina alba.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 479. ad n. 354.
- γ. *Klein*, av. p. 146. n. 1. *Plautus Columbarius?*
(Mit *Alca Alle* verwechselt. Siehe diese.)
- Latham*, Syn. III. 2. p. 333. n. 9. Var. B.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 798. n. 2. γ. *Uria*
nigricans, striis transversis saturatoribus, sub-
tus

tus alba, taeniis cinereis varia, tectricibus alarum superioribus mediis candidis, nigro-variegatis.

Briffon, ornitholog. II. p. 379. n. 4. petit Guillemot rayé. (10)

Seligmann, Vögel, II. Tab. 99. die gefleckte grönländische Taube.

δ. *Latham*, Syst. ornithol. II. p. 798. δ. *Uria dorso caudaque nigris, capite, collo, corpore subtus maculaque alarum albis.*

Brünnich, ornith. bor. p. 28. n. 115. *Uria baltica?*

ε. *Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 798. n. 2. ε. *Uria nigra, vertice albo-nebuloso, tectricibus alarum maioribus corporeque subtus albo nigroque variis, gula tota alba.*

ζ. *Latham*, Syn. III. 2. p. 334. n. 3. Var. E.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 798. n. 2. ζ. *Uria supra albo nigroque maculatum varia, subtus alba.*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 169. n. 4. *Sildeperris?*

Schriften der dronth. Gefellsch. I. p. 228. n. 1.

14. MINOR. *Das kleine Taucherhuhn.*(1)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 479. A. *das kleine Täucherhuhn.*

Iii 5

Scopoli,

(10) Nach *Briffon* eine eigene Gattung. *Latham* rechnet *Brünnichs Uria baltica* n. 116. zu *Briffons Uria minor striata* n. 4.

(1) Flügelweite 26 Zoll. Gewicht 19 Unzen. *Penn.* — Nach *Latham* eine Varietät von *Colymbus Troyle*, n. 2. — Ueberhaupt bemerke ich hier eine Verwechslung der Synonymen. *Scopoli*, dessen *Uria Lomvia* n. 103. in unserm System hieher gezogen ist, führt *Brünnichs Uria Lomvia* n. 108. an, die

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 88. n. 103.
die Lumme.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 797. n. 1. β . *Uria*
supra nigra, subtus, genis fasciaque alarum alba.

Brünniche, ornitholog. bor. p. 27. n. 110. *Uria*
Svarbag, Islandis *Svarbakur*?

Brünniche, ornith. bor. p. 28. n. 111. *Uria Ring-*
via, Islandis *Ringvia*.

2. TROILE. *Die Lumer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 239. n. 2. *das Taucher-*
huhn.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 220. n. 2.
Colymbus (Troile) pedibus palmatis tridactylis,
corpore fusco, pectore abdomineque ni-
veo, remigibus secundariis extremo apice al-
bis; *die Lumer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 402. n. 1. *das dum-*
me Täucherhuhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 764. n. 1.
das dumme Täucherhuhn. p. 772. *die Lumer,*
Lumme, Loom, Tauchermöwe, Taucherhuhn,
Mewenschnabel, Troiltaucher.

Halle, Vögel, p. 593. n. 741. *das Täucherhuhn.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 164. n. 153. *die Täuchermöwe.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 100. *der Mewenschnabel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 478. n. 353. *das dum-*
me Taucherhuhn.

Klein, av. p. 148. n. 8. *Lomben.*

Klein, Vorbereit. p. 272. n. 8. *Lomben.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 157. n. 7. *Lomme.*

Klein,

in unserm System zu *Colymbus Troile* gezählt wird. *Latham*
rechnet auch das Synonym aus *Scopoli* zu *Colymbus Troile* —
Die Trivialbenennung *Colymbus Minor* findet sich in unserm
System p. 591. n. 20. nochmals.

Klein, av. p. 168. n. 3. Lomben.

Klein, Vorber. p. 269. n. 2. *Meiwenschmabel*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 155. n. 2. *Meiwenschmäbler*.

Briffon, ornithol. II. p. 377. n. 1. Guillemot.

Latham, Syn. Suppl. p. 265. Foolish Guillemot.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 796. n. 1. *Uria* (Troile) corpore nigro, pectore abdomineque niveo, remigibus secundariis apice albis.

Pennant, Reif. d. Schottl. I. p. 24. *Seetauben*.

Egede, Besch. v. Grönl. p. 123. *Lomme*.

Trampler, Wallfischfang, p. 68. *der Lum*.

Phipps, Reif. n. d. Nordpol, p. 98. *der kleine schwarz und weiße Taucher, oder das Taucherhuhn*.

Pontoppidan, Norwegen, II. p. 156. *Langvie, Lomgieve, oder Lomvieve, Storfuglen*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 130. n. 4. *Alca* (*Lomvia*) rostro laevi oblongo, mandibula superiore margine flavescente.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 19. n. 152. *Colymbus* (*Troile*) pedibus palmatis tridactylis, corpore nigro, pectore abdomineque niveo, remigibus secundariis apice albis.

Moehring, av. gen. p. 68. n. 75. *Cataractes*.

Fonston, av. p. 135. *Uria*.

Hermann, tab. aff. anim. p. 148. *Col. Troile*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 278. n. 2. *die Lumer*.

β. *Col. reatricibus totis nigris*. *

Brünniche, ornith. bor. p. 28. n. 112. *Uria Alga*; *Danis Aalge*.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 797. n. 1. γ. *Uria Alga*.

γ. *Col.*

γ. Colymbus annulo oculorum et linea pone oculos albis. *?

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 19. n. 152. a.

Olaffen, Reif. d. Isl. I. p. 190. n. 6. *Langevige?*

δ. Col. oculis et capite immaculatis. *?

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 19. n. 152. b.

Olaffen, Reise d. Isl. I. p. 190. n. 7. *Stuttnefia?*

** *Mit vierzehigen Schwimmfüßen.
Eigentliche Taucher.*

15. SINENSIS. *Der chinesische Taucher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 802. n. 8. Colymbus (Sinensis) fusco-virescens, maculis saturationibus, pectore et abdomine rufo-albis, maculis rufis.

16. STRIATUS. *Der gestreifte Taucher.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 481. n. 359. *der gestreifte Taucher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 802. n. 7. Colymbus (Striatus) nigricans, subtus albus, capite colloque griseis nigro lineatis.

3. SEPTENTRIONALIS. *Der rothkehliche Taucher.* (3)

Müller, Naturyst. II. p. 339. n. 3. *rothhälfiger Taucher.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 58. n. 3. *der rothhälfige Taucher.*

Halle, Vögel, p. 584. n. 729. *das Seerothkehlchen.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 159. n. 146. *der rothhälfige Taucher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 482. n. 360. *der rothkehlige Taucher.*

Klein,

(2) Flügelweite 3 Fuß 5 Zoll. Gewicht 3 Pfund. Pennant.

Klein, av. p. 142. n. 3. Mergus rostro nigro, capite et lateribus colli plumbeis, cervice et lateribus thoracis nigris lineolis variegatis, gula cum inferiori collo rubris, internis digitis lobus angustus additus.

Klein, Vorbereit. p. 261. n. 3. *Halbente mit einem schwarzen Schnabel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 150. n. 3. *dritte Halbente.*

Briffon, ornith. II. p. 390. n. 3. Plongeon à gorge rouge.

Batsch, Thiere, I. p. 371. *der Lunte oder rothhäufige Taucher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 801. n. 5. Colymbus (Septentrionalis) corpore supra nigricante, subtus albo, collo antice macula scutiformi ferruginea.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 69. *der Taucher mit rother Kehle.*

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 53. n. 100. *der rothhäufige Taucher.*

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII. p. 459. n. 35. *rothhäufiger Taucher.*

Voyage en Sibirie, par Mr. l'Abbé Chappe d'Au-terroche, p. 199. Tab. 9. Plongeon.

Schriften d. dronth. Gesellsch. I. p. 203. *der Lom.* Tab. 2. fig. 1.

Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 158. *Lom, Liom, Lum;* mit 1 Figur.

Scheffer, Lappl. p. 334. *Loom.*

Léem, Nachricht von den Lappl. p. 142. *Loom.*

Müller, zool. dan. prodr. p. 19. n. 153. Colymbus (Septentrionalis) pedibus palmatis, tetradactylis, collo subtus macula scutiformi ferruginea.

Hermann,

Hermann, tab. affinit. animal. p. 147. *Colymbus septentrionalis*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 278. n. 3. *der rothkehlliche Taucher*.

4. ARCTICUS. *Die Polar-Ente.*⁽³⁾

Müller, Naturfyft. II. p. 339. n. 4. *die Polar-Ente*. Tab. 12. fig. 1.

Borowsky, Thierreich, III. p. 59. n. 4. *die Polar-Ente*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 403. n. 2. *der schwarzkehlliche Taucher*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 775. *der schwarzkehlliche Taucher*. p. 778. *Polarente, Polartaucher, Lumb, Lumbe, Lomme, Lunme*.

Halle, Vögel, p. 583. n. 727. *die gestreifte Halbente*.

Halle, Vögel, p. 583. n. 728. *der Seehahn*.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 159. n. 147. *die Polarente*.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 482. n. 361. *der schwarzkehlliche Taucher*.

Klein, av. p. 141. n. 2. *Mergus arcticus*.

Klein, Vorber. p. 261. n. 2. *die Polar-Halbente*.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 149. n. 2. *zweyte Halbente*.

Klein, verb. Vögelh. p. 150. n. 4. *vierte Halbente*.

Klein, Vögeleyer, p. 35. Tab. 21. fig. 1.

Briffon, ornith. II. p. 391. n. 4. *Plongeon à gorge noire*.

Batsch, Thiere, I. p. 370. *die Polarente*.

Latham,

- (3) Nistet am Ufer ins Schilf und die Sumpfräfer. Das Weibchen legt zwey braune, ziemlich grofse Eyer, welche von beyden Gatten wechselsweise in 4 Wochen ausgebrütet werden. Fleisch und Eyer werden genutzt, und die zähen Häute gahr gemacht, und zu Pulverbehältnissen, Mützenverbräunungen, Brustklätzen u. dgl. verarbeitet.

- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 800. n. 4. Colymbus (Arcticus) capite cano, collo subtus atro-violaceo, fascia alba interrupta.
- Seligmann*, Vögel, V. Tab. 41. die bunte Tauchente.
- Beseke*, Vögel Kurlands, p. 54. n. 101. die Polarente.
- Fischer*, Naturgesch. von Livl. Zuf. p. 46. n. 495. Seehahntaucher.
- Bock*, Naturgeschichte von Preussen, IV. p. 339. Polarente.
- Lepechin*, Tageb. d. ruff. R. III. p. 14. der große nordliche Taucher.
- Leem*, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 142. der Seehahn.
- Pallas*, nord. Beytr. IV. p. 22. der große Seetaucher.
- Linné*, auserlef. Abhandl. II. p. 282. n. 26. der nordische Seehahn.
- Linné*, auserl. Abh. II. p. 293. n. 82. der Seehahn, Taucherente.
- Naturf. XII. p. 140. n. 94. Polarente.
- Schriften der drontheim. Gefellsch. I. p. 205. der schwarz und weiß gesprenkelte Lom mit dem Halsbande, Hymber, Himbrine. Tab. 2. fig. 2.
- Pontoppidan*, Naturgesch. v. Dännemark, p. 169. n. 1. Lomme, Seehahn.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. VI. p. 23. n. 1. Colymbus arcticus.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 135. n. 1. Colymbus (Arcticus) pedibus palmatis indivisis, gutture nigro-purpurascete.
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 19. n. 154. Colymbus (Arcticus) pedibus palmatis tetradactylis, capite cano, collo subtus atro-violaceo, fascia alba interrupta.

- Jonston*, av. p. 226. *Hirundo exotica aquatica*.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 147. *Colymbus arcticus*.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 279. n. 4. *die Polar-Ente*.

17. **STELLATUS.** *Der gesprenkelte Taucher.*(4)
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 481. n. 358. *der gesprenkelte Taucher*.
Halle, Vögel, p. 582. n. 726. *die größte gefleckte Täucherente*.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 779. n. 2. *der gesprenkelte Taucher*.
Klein, av. p. 141. n. 1. *Mergus maximus*.
Klein, Vorbereit. p. 260. n. 1. *größte Halbente*.
Klein, verbess. Vögelhist. p. 149. n. 1. *erste Halbente*.
Klein, stemm. av. Tab. 37. fig. 2. a. b.
Gesner, Vögelb. p. 90. *Aethya?*
Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 169. n. 2. *Havgasse, Soëhane*.
Briffon, ornith. II. p. 389. n. 2. *Petit Plongeon*.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 800. n. 3. *Colymbus (Stellatus) cinereo-fuscus, lineolis albidis varius, subtus albus, capite et collo superioribus cinereis, pennis ad latera cinereo-albo fimbriatis*.
Nau: Naturf. XXV. p. 9. n. 2. *Spießgans*.
Otto: neue Mannichfalt. IV. p. 450. n. 2. *Aalschotwer*.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 80. n. 93. *die hinkende Halbente*. *Plotus claudicans*.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 20. n. 159. *Colymbus (Stellatus) corpore supra nigricante*.

(4) Flügelweite 3 Fufs 9 Zoll. Gewicht 2½ Pfund. *Penn.*

te, maculis stellatis albis innumeris, subtus albo.

Moehring, av. gen. p. 69. n. 76. *Cepphus*.

5. GLACIALIS. *Der Eistaucher.*⁽⁵⁾

Müller, Naturfyst. II. p. 340. n. 5. *Eistaucher*.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 480. n. 356. *der Eistaucher*.

Klein, av. p. 141. n. 1. (Mit dem vorigen verwechselt.)

Briffon, ornitholog. II. p. 392. n. 6. grand Plongeon tacheté.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 799. n. 1. *Colymbus* (Glacialis) capite colloque nigro-violaceo, fascia gulae cervicisque alba interrupta.

Phipps Reif. n. d. Nordpol, p. 98. *der große nordische Taucher*.

Müller, zool. dan. prodr. p. 19. n. 155. *Colymbus* (Glacialis) pedibus palmatis tetradactylis, capite colloque nigro-violaceo, fascia gulae cervicisque alba interrupta.

Fabric. fn. groenl. p. 97. n. 62. *Colymbus* (Glacialis) pedibus palmatis, capite colloque nigro-virescentibus, fascia gulae cervicisque interrupta ex albo nigroque lineata.

Charleton, onomast. zoic. p. 96. n. 11. *Mergus Arcticus* seu *Farrensis*.

Jonston, av. p. 225. *Mergus maximus Farrensis*.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 147. *Colymbus Glacialis*.

Donndörff, Handb. der Thiergesch. p. 279. n. 5. *der Eistaucher*.

β. *Briffon*,

(5) Flügelweite 4 Fufs 8 Zoll. *Penn.*

β. *Briffon*, ornitholog. II. p. 391. n. 5. Plongeon tacheté. (6)

6. IMMER. *Der Imber.*

Müller, Naturfyft. II. p. 340. n. 6. *Adventsvogel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 60. n. 5. *der Adventsvogel, Immer.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 780. n. 3. *der Imber.* p. 781. *Immer, Immertaucher, großer Seeflunder.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 162. n. 149. *der Imber.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 480. n. 357. *der Imber, Adventsvogel.*

Klein, av. p. 130. n. 12. Anfer, Embergoose dictus.

Klein, Vorbereit. p. 241. n. 12. *Embergans.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 137. n. 13. *Embergans.*

Klein, av. p. 150. n. 6. *Colymbus maximus?*

Klein, Vorbereit. p. 277. n. 6. *Buntflügel?*

Klein, verb. Vögelhist. p. 161. n. 5. *Buntflügel?*

Briffon, ornith. II. p. 389. n. 1. grand Plongeon.

Batsch, Thiere, I. p. 371. *der Immer.*

Latham, Syft. ornitholog. II. p. 800. n. 2. *Colymbus (Immer) corpore supra nigricante albo undulato, subtus toto albo.*

Pontoppidan, Norwegen, II. p. 152. *Imber, Imbrin, Ember.*

Martini, Naturlexicon, I. p. 399. *Adventsvogel.* Tab. 20.

Sander, Gröfse u. Schönheit in der Nat. I. p. 236. *der Immer.*

Schriften der dronth. Gefellsch. I. p. 210. *Immer, Imber.* Tab. 3. fig. 1. 2. (Kopf und Fufs.)

Müller,

(6) Nach *Briffon* eine eigne Gattung. Länge $2\frac{1}{12}$ Fufs. Flügelweite $3\frac{1}{4}$ Fufs.

Müller, zool. dan. prodr. p. 19. n. 156. *Colymbus* (Immer) pedibus palmatis tetradactylis, corpore supra nigricante albo undulato, subtus toto albo.

Jonston, av. p. 135. *Colymbus maximus*.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 148. *Colymbus Immer*.

*** *Mit vierzehigen gelappten Füßen.
Steißfüße.*

7. CRISTATUS. *Der Haubentaucher.* (7)

Müller, Naturf. II. p. 341. n. 7. *Haubentaucher*.

Leske, Naturgesch. p. 290. n. 2. *der Haubentaucher, Schlaghan*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 56. n. 1. *der gehörnte Seehahn, Haubentaucher, Seeteufel, Lorch*. Tab. 43.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 403. n. 3. *der große Haubentaucher*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 783. n. 1. *der große Haubentaucher*. p. 790. *der große gehaubte Taucher, der große Kobeltaucher, Steißfuß, große Arschfuß, große Haubensteißfuß, Schlaghan, Greue, Merch, Straußtaucher, Meerrachen, Zorch*.

Kkk 2

Halle,

- (7) Gewicht $2\frac{1}{2}$ Pfund. Penn. Länge, nach *Briffon*, 18 Zoll. Flügelweite $2\frac{1}{6}$ Fuß 9 Linien. Wer die von mir angeführten Stellen aus *Klein, Halle, Briffon* und *Latham* vergleicht, der wird finden, was für eine große Unbestimmtheit und Verwechslung der Synonymen bey dieser Gattung statt findet. Es ist fast unmöglich, sie aus einander zu finden, und überall richtig zu ordnen, da die Beschreibungen zum Theil so schwankend und zweydeutig sind. *Latham* rechnet auch den *Colymbus Urinator* *Lin.* als Spielart, oder vielmehr als einen einjährigen jungen Vogel hieher.

- Halle*, Vögel, p. 601. n. 753. *der große Taucher mit braungelbem Kwizschopfe.*
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 162. n. 150. *der Haubentaucher.*
- Pennant*, arct. Zoolog. II. p. 463. A. *der große Haubensteißfuß.*
- Onomat. histor. natur.* III. p. 197. *der große gehaubte Taucher.*
- [*Klein*, av. p. 149. n. 1. *Colymbus albus maior cristatus.*
- Klein*, Vorbereit. p. 274. n. 1. *bekappter und gehörnter Taucher.*
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 159. n. 1. *bekappter und gehörnter Taucher.*]
- Mit *Colymbus Auritus* und *Obscurus* verwechselt.
- Briffon*, ornith. II. p. 370. n. 4. *Grebe cornue.*
- Ratsch*, Thiere, I. p. 370. *der Haubentaucher.*
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 780. n. 1. *Podiceps (Cristatus) fuscus subtus albus, capite rufo tumido, collari nigro, remigibus secundariis albis. (Adulta avis.)*
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 54. n. 102. *der Haubentaucher.*
- Fischer*, Zuf. z. Naturgesch. v. Livl. p. 45. n. 494. *gezopfter Taucher.*
- Pennant*, Reise d. Schottl. I. p. 18. *großkappichte Seehühne, (Gnauts.)*
- Lepechin*, Tageb. d. ruff. Reif. III. p. 14. *Taucher mit dem Schopf.*
- Pontoppidan*, Naturgesch. von Dännem. p. 169. n. 2. *Topped Havskiærn, halskraved Dykker.*
- Olaffen*, Isl. II. p. 203. K. *Sef-Oend.*
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 85. n. 99. *der bekappte und gehörnte Taucher.*

Frisch, Vögel, Tab. 183. *der gehörnte Seehahn, oder Norike.*

Schneider, zool. Abh. p. 145. *gehaubte Taucher, Work, Lorch, Works.*

Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Fr. VII. p. 460. n. 36. *Haubentaucher.*

Stralsfund. Magazin, I. p. 167. *die gehaubte Tauchente?*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 23. n. 2. *Colymbus cornutus.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 135. n. 2. *Colymbus (Cristatus) pedibus lobato-fissis, capite rufo, collari nigro, remigibus secundariis albis.*

Müller, zool. dan. prodr. p. 19. n. 157. *Colymbus (Cristatus) pedibus lobatis, capite rufo, collari nigro, remigibus secundariis albis.*

Brünniche, ornith. bor. p. 41. n. 135. *Colymbus Cristatus.*

Schwenkfeld, aviar. Siles. p. 298. *Mergus maior; Teucher, großer Kobel-Teucher, Strauß-Teucher, Merch.*

Charleton, onomast. zoic. p. 95. n. 5. *Mergus cirrhatus seu cristatus.*

Nieremb. hist. exot. L. 10. c. 35. *Lepus aqueus?*

Jonston, av. p. 224. *Acitli, seu aquatilis lepus?*

Jonston, av. p. 135. *Colymbus maior alter.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 152. *Colymbus Cristatus.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 280. n. 6. *der Haubentaucher.*

β. *Halle*, Vögel, p. 604. n. 758. *der Meerhaase, Acitli.*

Briffon, ornith. p. 369. n. 2. *Grebe lupée.* (8)

K k k 3

Klein,

(8) Länge, nach *Briffon*, 1 7/12 Fuß 6 Lin. Flügelweite 2 1/2 F. 6 Lin. — eigne Gattung. Ich wiederhole hier die vorige Anmerkung.

Klein, av. p. 151. n. 3. Gargoas?

Klein, Vorbereit. p. 278. n. 3. Gargoas?

Klein, verb. Vögelhist. p. 161. n. 7. Gargoas?

Latham, Syst. ornithol. II. p. 780. n. 1. Podiceps subtus albus, gutture fasciculo plumoso utrinque longiore, remigibus secundariis albis. (*Avis biennis*?)

γ. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 789. *Haubentaucher mit schwärzlichem Halskragen.*

δ. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 789. *Haubentaucher mit gelber Kehle und schwärzlichen Flügeln.*

18. SUBCRISTATUS. *Der graukehlige Haubentaucher.*(9)

Bechstein, Naturgesch. I. p. 404. n. 2. *der graukehlige Haubentaucher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 790. n. 2. *der graukehlige Haubentaucher.* Tab. 25.

Beseke, Vögel Kurl. p. 54. n. 104. Colymbus subcristatus; *der kurzschopfige Taucher.*

8. AURITUS. *Der Ohrentaucher.*

Müller, Naturfyst. II. p. 341. n. 8. *Ohrentaucher.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 61. n. 6. *der Ohrentaucher.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 404. n. 5. *der Ohrentaucher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 796. n. 5. *der Ohrentaucher.*

Halle,

- (9) Nistet auf stehenden schilfigen Wassern, macht sich von dem über dem Wasser hervorstehenden Schilfe, durch niederbeugen und flechten und auftragen einen Damm, an welchem er sein aus Schilf geflochtenes Nest befestigt, und legt 5 bis 6 Eyer. Brütet auch in Kurland.

- Halle*, Vögel, p. 602. n. 755. *der Meerdrehhals.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
 II. p. 163. n. 151. *der Meerdrehhals.*
Onomat. hist. nat. III. p. 196. *der geöhrte Taucher.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 464. B. *der geöhrte*
Steißfuß.
Klein, av. p. 150. n. 4. *Colymbus minor.* (Mit
Colymbus Obscurus u. *C. Minor* verwechselt.)
Klein, Vorber. p. 276. n. 4. *Dachentlein, Schwarz-*
täucherlein, Käferente.
Klein, verbess. Vögelhist. p. 160. n. 4. *Schwarz-*
Täucherlein.
Gesner, Vögelb. p. 104. *ein ander Geschlecht Dü-*
chelein, oder Duchentlein.
Briffon, ornith. II. p. 372. n. 6. *Grebe à oreilles.*
Batsch, Thiere, I. p. 370. *der Ohrentaucher.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 781. n. 3. *Colymbus*
(Auritus) fusco-nigricans, subtus albus, capite
nigro, auribus cristato-ferrugineis.
Seligmann, Vögel, IV. Tab. 87. *der geöhrte*
Taucher.
Beseke, Vögel Kurlands, p. 54. n. 103. *der Ohren-*
taucher.
Lepechin, Tagebuch der russ. Reise, III. p. 14.
geöhrte Taucher.
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *der geöhrte*
Taucher.
 Neue schwed. Abhandl. III. p. 104. *Colymbus*
Auritus.
Linné, auserl. Abhandl. II. p. 293. n. 83. *die groß-*
öhrige Taucherente.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 86. n. 100.
der geöhrte Taucher.
Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 23. n. 3. *Trapa-*
zorola.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 135. n. 3. Colymbus (Auritus) pedibus lobatis, capite nigro, auribus cristato-ferrugineis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 20. n. 158. Colymbus (Auritus) pedibus lobatis, capite nigro, auribus cristato-ferrugineis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 299. Mergulus; ein klein schwarz Täucherlein, Duch-Endtlin, Käfer-Endtle.

Charleton, onomast. zoic. p. 96. n. 7. 2. Colymbus Minor.

Jonston, av. p. 135. Colymbus minor.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 280. n. 7. der geöhrte Taucher.

β. Der kleine Ohrentaucher. (10)

Gesner, Vögelb. p. 103. Mergulus?

Briffon, ornitholog. II. p. 371. n. 5. petite Grebe cornue.

Latham, Syn. III. I. p. 286. n. 4. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 782. n. 3. β.

Scopoli Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 87. n. 101. der schwärzlichte Taucher?

19. COR-

(10) Auch hier findet sich, so wie bey der ganzen Gattung, eine große Verwechslung der Synonymen, und ganz verschiedene Eintheilung derselben bey den Ornithologen *Latham* nimmt *Briffons* *Colymbus cornutus minor* als Spielart von *Colymbus Cornutus* (p. 591. n. 19.) an, und zieht *Briffons* *Colymbus cristatus minor* (Ornith. II. p. 69. n. 3) den *Briffon* selbst sehr ungewiss bestimmt, und dessen ich in unserm System gar nicht gedacht finde, als Varietät von unserm *Colymbus Auritus* hierher *Briffon* sieht seinen *Colymbus cornutus minor* als eine eigne Gattung an, und rechnet auch *Edw. Eared or horned Dobchick* Tab. 49 (*Col. cornutus* Linn. p. 591. n. 19.) so wie *Fernand.* und *Raj. Yacapitzaboac*, den *Latham* zum *Colymbus minor* (Linn. p. 591, n. 20.) zählt, mit dahin.

19. CORNUTUS. *Der gehörnte Taucher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 462. n. 334. *der gehörnte Steißfuß.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 782. n. 5. Colymbus (Cornutus) cristatus, collo subtus pectore-que fulvis, capite nigro tumido, per oculos fascia cirrhata flava.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 40. *das gehörnte Wasserhuhn.*

β. Col. Cristatus, collo subtus castaneo, capite colloque supremo nigro-virescentibus, fasciculo pone oculos aurantio-rufescente. *

Latham, Syn. III. I. p. 228. n. 6. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 783. n. 5. β.

Büffon, ois. VIII. p. 237. le petit Grebe cornu.

Büffon, pl. enl. 404. f. 2. Grebe d'Esclavonie.

Raj, Syn. p. 190. 14. Colymbus sive Podiceps minor.

20. MINOR. *Der kleine Taucher.* (1)

Bechstein, Naturgesch. I. p. 405. n. 7. *der kleine Taucher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 798. n. 6. *der kleine Taucher.* p. 803. *Duckchen, schwärzlicher Taucher, gemeines Taucherchen, Tauchentchen, Käferentchen.*

Klein, av. p. 150. n. 4. Colymbus minor. (Mit *Colymbus Auritus* verwechselt.)

Gesner, Vögelb. p. 90. Urinatrix. p. 91. *Lou-nam, Doucker, Ducher.*

Kkk 5

Briffon,

(1) Die Trivialbenennung, *Colymbus Minor*, ist p. 585. schon einmal da gewesen. Um beyde zu unterscheiden, könnte man jenen *Colymbus Ringuis*, oder diesen mit *Briffon Colymbus fluviatilis* nennen.

Briffon, ornitholog. II. p. 374. n. 9. Grebe de riviere ou Castagneux.

Latham, Syst. ornith. II. p. 784. n. 9. Colymbus (Minor) fulvo-fuscus, corpore subtus macula remigum uropygioque infimo albo-argenteis, collo subtus griseo-fulvo.

Neue schwed. Abh. III. p. 105.

Linné, Syst. Nat. Edit. XII. p. 223. n. 8. γ.

Raj, Syn. p. 177. *Tacapitzahoac*?

Jonston, av. p. 135. Colymbus minor Bellonii.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 208. n. 8. *der kleine Taucher*.

β. *Gesner*, Vögelb. p. 105. *Castagneux*?

Latham, Syn. III. I. p. 290. n. 10. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 784. n. 9. β.

21. PAROTIS. *Der schwarz und weiße Taucher.*(²)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 783. n. 6. β. Podiceps capite laevi nigro, gulae, aurium et subocularibus regionibus albidis nigro lineatis.

22. LUDOVICIANUS. *Der louisianische Taucher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 463. n. 336. *der louisianische Steißfuß*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 785. n. 13. Colymbus (Ludovicianus) fuscus, lateribus colli et corporis ferrugineis, corpore subtus albo, maculis transversis nigricantibus.

23. THOMENSIS. *Der Taucher von der Insel St. Thomae.*

Müller, Naturf. II. p. 107. n. 13. *der St. Thomas-taucher*.

Briffon, ornithol. II. p. 374. n. 8. Grebe de l'isle de S. Thomas.

Latham,

(2) Nach *Latham* eine Varietät von *Colymbus Rubricollis* n. 24.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 784. n. II. Colymbus (Thomensis) fuscus, subtus albus maculis griseis, remigibus pallide rufis; macula pectoris nigra.

24. RUBRICOLLIS. *Der rothhäufige Taucher.* (3)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 795. *der rothhäufige Taucher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 464. C. *der Rothhals.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 783. n. 6. Colymbus (Rubricollis) subcristatus fuscus, gula, genis, regione aurium cinerascens, collo subtus pectoreque ferrugineo-rubris, abdomine remigibusque secundariis albis.

Latham, Syn. Suppl. p. 260. tab. 118. Red-necked Grebe.

Linné, fn. Suec. II. p. 54. n. 152. (*Alia.*)

Brünniche, ornith. bor. p. 42. n. 138. Colymbus Auritus.

25. OBSCURUS. *Der dunkelbraune Taucher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 794. n. 4. *der dunkelbraune Taucher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 463. n. 337. *der dunkelbraune Steißfuß.*

Briffon, ornith. II. p. 373. n. 7. petite Grebe.

Latham, Syst. ornith. II. p. 782. n. 4. Colymbus (Obscurus) fusco-nigricans, subtus albus, macula utrinque inter rostrum et oculum, marginibus alarum remigibusque intermediis candidis.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 87. *der schwarz und weiße Taucher.*

26. CAYEN.

(3) Nach *Bechstein* das Männchen von *Colymbus Obscurus* n. 25.

26. CAYENNENSIS. *Der cayennische Taucher.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 781. n. 2. Colymbus (Cayanus) fusco-nigricans, subtus albus, collo subtus rufo.
9. URINATOR. *Der Erztaucher.* (4)
Müller, Natursystem, II. p. 342. n. 9. *der Erztaucher.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 61. n. 7. *der Erztaucher.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 220. n. 3. Colymbus (Urinator) capite laevi, palpebra inferiore lutea, macula alarum alba.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 405. n. 6. *der Erztaucher.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 792. n. 3. *der Erztaucher.*
Halle, Vögel, p. 602. n. 754. *der große Taucher ohne herabhängenden Schopf.*
Klein, av. p. 150. n. 3. Colymbus maior.
Klein, Vorber. p. 276. n. 3. *schlichtköpfiger großer Taucher.*
Klein, verbesserte Vögelhist. p. 160. n. 2. *schlichtköpfiger großer Taucher.*
Briffon ornithol. II. p. 368. n. 1. Grebe.
Batsch, Thiere, II. p. 371. *der Erztaucher.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 781. n. 1. β. Podiceps fuscus, subtus albus, capite laevi, macula alarum alba.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 87. n. 102. Colymbus vulgaris; *das Täuchentlein, gemeine Täucherlein.*
Charleton, onomast. zoic. p. 96. n. 7. 1. Colymbus maior.

Möhring,

(4) Soll, nach *Latham*; ein einjähriger junger Vogel von *Colymbus Cristatus* seyn.

Mohring, av. gen. p. 69. n. 77. Colymbus.

Jonston, av. p. 134. Colymbus maior primus.

27. CASPIUS. *Der caspische Täufer.*(5)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 784. n. 7. Podiceps (Caspicus) capite laevi, corpore supra ex fusco nigricante, infra ex argenteo albo, rostro plumbeo, gula genisque albis, tectricibus alarum fuscis.

10. DOMINICUS. *Der domingische Taucher.*

Müller, Naturfyst. II. p. 343. n. 10. *domingischer.*

Briffon, ornitholog. II. p. 376. n. 1. Grebe de riviere de S. Domingue.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 785. n. 10. Podiceps (Dominicus) capite laevi, corpore subtus confertim maculato.

28. HEBRIDICUS. *Der hebridische Taucher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 785. n. 11. Podiceps (Hebridicus) nigricans, gula nigra, iugulo ferrugineo, abdomine cinereo argenteo vario.

11. PODICEPS. *Der buntschnäblige Taucher.*(6)

Müller, Naturf. II. p. 343. n. 11. *der Arschfuß.*

Halle, Vögel, p. 603. n. 756. *der kleine braune Täufer, mit schwarzem Nasenpflaster.*

Pennant,

(5) Größe einer Haustaube. Soll, nach *Latham*, zu *Colymbus Rubricollis* gehören.

(6) Alle Taucher und Tauchenten (*Podicipes*) können auf der glatten Spiegelfläche des Wassers mit Hülfe der ausgespannten Flügel nicht nur gehen, sondern auch sehr schnell laufen, wobey sie sich in perpendicularer Richtung erhalten. Sie verrichten auch den Coitus auf dem Wasser perpendicular stehend, denn das Männchen kann bey der Begattung das

- Pennant*, arct. Zool. II. p. 462. n. 335. *der Bunt-*
schnabel. Tab. 22. unt. Fig.
- Klein*, av. p. 150. n. 5. *Colymbus fuscus.*
- Klein*, Vorbereit. p. 276. n. 5. *braun Tücherlein*
mit einem bunten Schnabel.
- Klein*, verbesserte Vögelhist. p. 160. n. 4. *braun*
Tücherlein.
- Briffon*, ornith. II. p. 375. n. 10. Grebe de rivie-
re de la Caroline.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 735. n. 12. Podi-
ceps (Carolinensis) corpore fusco, rostro fascia
sesquialtera, gula nigra.
- Seligmann*, Vögel, IV. Tab. 82. *braun Täu-*
cherlein.
- Linné*, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 136. n. 4. Co-
lymbus (Podiceps) pedibus lobatis, corpore
fusco, rostro fascia sesquialtera.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Ver-*
mehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Edit. XII.

p. 223. n. 8. *γ. Colymb.*
Fluviatilis.

Edit. XIII.

p. 591. n. 20. *Colymbus*
Minor.

Das Geschlecht ist mit *siebzehn* Gattungen vermehrt.
Bey der 1sten Gattung sind *sechs*, bey der 5ten *zwey*,
bey der 7ten *vier* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Un-*

das Weibchen nicht besteigen, sich auch nicht ohne Füße
darauf erhalten. Dafs *Linné* den Namen *Podiceps* für einen
Gattungsnamen seiner Spec. II. gebraucht hat, ist wohl nicht
recht, weil dies eine Eigenschaft aller Colymben und vieler
Enten (Tauchenten, *Podicipes*) ist; und zu einem Irrthum ver-
leiten kann, als ob diese Eigenschaft nur dieser einzigen
Gattung zukäme. Uebrigens ist die Colymbologie überhaupt
noch mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden. S. *Beseke*
Vögel-Kurl. p. 55.

B. Unbestimmtere Thiere.

1. Colymbus (Pyrenaicus) pedibus tridactylis lobatis, gutture castaneo, macula rostri nivea, alis brevissimis.

Thunberg, neue schwed. Abh. III. p. 105.

2. Colymbus (Longirostris) pedibus lobatis, tetradactylis, gula alba, maxilla triplici fascia fusca, rostro compresso, longissimo.

Thunberg, neue schwed. Abh. III. p. 105.

3. *Der unbekannte Taucher.*

Colymbus (Ignotus) corpore supra cinereo, subtus albo, lateribus colli cinerei maculis albis angulatis.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 782. n. 4.

4. *Ein dem Colymbus Troite ähnlicher Vogel.*

Sander, Naturf. XII. p. 192.

5. Colymbus (Borealis) corpore supra nigricante, maculis stellatis albis innumeris, subtus albo, collo antice rufo vix maculato.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 801. n. 6.

Brünniche, ornith. bor. p. 39. n. 131. *Hav. Gasse.*

76. GESCHLECHT. LARUS. *Die Meve.*
(Möwe. 7)

Müller, Naturyst. II. p. 344. Gen. LXXVI.

Leske, Naturgesch. p. 284. Gen. LXIX.

Borowsky,

(7) Die Larologie ist noch mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden. Es giebt sicherlich noch viele Ungewissheiten und Lücken; die Ursache von beyden liegt in der grossen Schwierigkeit ihrer habhaft zu werden, da nur selten ein Jäger auf die Höhe des Meers kommt, wo sie sich aufzuhalten pflegen, und wenn sie auch auf das angrenzende Land, bey stürmischem Wetter, längst den Flüssen ziehen, so sind sie

scheu

- Borowsky*, Thierreich, III. p. 44. Gen. LXI.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 220.
 Gen. LXX.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 406. Gen. XXXIII.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 803.
 Gen. XXI.
Halle, Vögel, p. 568. it. p. 596 sqq.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 488.
Oedmann: neue schwed. Abhandl. IV. p. 89.
 Neuer Schaupl. der Natur, V. p. 645.
 Onomat. hist. nat. IV. p. 746.
Klein, av. p. 136. Gen. II.
Briffon, ornith. II. p. 401. Gen. CI. Stercorarius.
 p. 403. Gen. CII. Larus.
Batsch, Thiere, I. p. 367. Gen. XCI.
Latham, Syst. ornith. II. p. 811. Gen. XCIV.
Hermann, tab. affinit. animal. p. 142 sqq.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 281.
 Gen. XXXVIII.

I. RISSA. *Die isländische Meve.* (8)

- Müller*, Naturfyst. II. p. 344. n. I. *die isländische Meve.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 804. n. I.
die isländische Meve.

Onomat.

schen und fliegen auch sehr hoch. So wie es ohnstreitig noch mehrere Gattungen giebt, so haben auch wahrscheinlich Alter und Geschlecht (Sexus) durch ihre Verschiedenheit unter den schon angenommenen Verwirrung veranlaßt. S. *Beseke* Vögel Kurl. p. 56. Ich will bey den folgenden Gattungen die Abweichungen der Ornithologen, bey Auseinanderfetzung der Synonymen, bemerken.

- (8) Nach *Oedmann* eine Varietät von *Larus Tridactylus* — *Latham* nimmt den *Larus Tridactylus* *Oedman.* zur Hauptgattung, und den *Larus Tridactylus* *Linn.* als Spielart davon an.

Onomat. hist. nat. IV. p. 756. *die isländische Mäwe.*
 Pennant, arct. Zool. II. p. 490. n. 373. *die isländische Mäwe.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 817. n. 11. Larus (Tridactylus) dorso canescente, rectricibus albis, digito postico mutico.

Phipps, Reif. n. d. Nordpol, p. 98. *isländische Mäwe.*

Pennant, Reif. n. Schottl. I. p. 51. *Kittivake.*

Olaassen, Reif. d. Isl. I. p. 190. n. 9. *Skegla-Ritur.*
 Tab. 23. Larus Rytfa.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 222. n. 4. *die dreyzehige Mäwe.*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 169. n. 8. *Lille Sölvet.*

Berlin. Samml. IX. p. 570. n. 1. *die schwedische Mäwe.*

Neue schwed. Abh. IV. p. 114. n. 15. Larus Riffa.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 20. n. 160. Larus (Riffa) albus, dorso cano, rectricibus totis albis, pedibus tridactylis.

Fabric. fn. groenl. p. 98. Larus (Tridactylus) albus dorso cano, extremitatibus remigum nigris, pedibus tridactylis.

2. TRIDACTYLUS. Die Wintermäwe. (9)

Müller, Natursystem, II. p. 345. n. 2. *die Wintermäwe.*

Borowsky,

(9) Oedmann ordnet die Synonymen nach dem verschiedenen Alter des Vogels folgendergestalt: a) Der junge *Tridactylus* ist das erste Jahr sehr dunkel, manchmal mehr oder weniger gefleckt. An jedem Ohre zeigt sich ein Fleck. Den Hinterrheil des Halses umgiebt ein schwarzer Ring und Halsband. In diesem Alter findet man den Vogel unter folgenden Namen; 1) *Eriffons Cavia cinerea* p. 185. f. 2. —

- Borowsky*, Thierreich, III. p. 47. n. 2. *die Wintermöwe.*
- Blumenbach*, Handb. d. Naturgesch. p. 221. n. 1. Larus (*Tridactylus*) albicans, dorso canescente, rectricum apicibus, excepto extremo, nigris, pedibus tridactylis.
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 407. n. 2. *die Wintermeve.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 805. *die Wintermeve.* p. 808. *Tarrok, weiße Meve, Hafmeve, dreysfingerige Meve.*
- Halle*, Vögel, p. 570. n. 698. *die graue Fischermöwe.*
- Halle*, Vögel, p. 598. n. 748. *der Seefächer.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 495. D. *der Tarrok.*
- Onomat. hist. nat. IV. p. 754. *die Wintermöwe.*
- Klein*, av. p. 137. n. 3. Larus cinereus piscator.
- Klein*, Vorbereit. p. 253. n. 3. *weiße Meve, Seeschwalbe, Fischahrmewe.*

Klein,

- 2) *Linné* Larus cinereus, Syst. N. n. 5. — 3) *Olaffens* Riffa junior. Tab. 25. — 4) *Pennants* Tarrock, n. 251. — 5) *Rajz* Larus cinereus, *Bellonii* Tarrock, p. 128. n. 4. — 6) *Gunneri* Krina-krykje. Act. Nidros. Tom. 3. — 7) *Albin* To. 2. Tab. 87. — 8) *Linné* Larus Tridactylus, Syst. N. n. 2. Fn. Suec. n. 157. — b) Nach einiger Zeit verschwindet das Halsband, aber die Flecken der Ohren erhalten sich noch. In dieses Zeitalter gehört: 1) *Sibbalds* Kittivake. 2) *Pennants* Kittivake, n. 250. tab. 89. — 3) *Briffons* Gavia cinerea minor, p. 178. Tab. 17. fig. 1. — 4) *Linné* Larus Cinerarius, Syst. Nat. n. 4. — 5) Larus Dingla. *Forsk.* descr. anim. p. 8. — c) Endlich verschwinden die Ohrenflecke, und in diesem dritten Stadio bekommen wir 1) *Brännichs* Larus Riffa, n. 140. — 2) *Linné* Larus Riffa, S. N. n. 1. — 3) *Pontoppidan* Larus Riffa. — 4) *Ströms* Krvekje, I. 241-18. *Cranz* Grönl. I. 114. Tattaret. — 5) *Martens* Kutge-gef. Spitzb. p. 59. Tab. N. lit. A. — 6) *Phipps* Nordp. a. a. O.

- Klein*, verb. Vögelhist. p. 144. n. 4. *weiße Mewe*.
Klein, av. p. 148. n. 9. *Larus Kautge-Gef*.
Klein, Vorber. p. 272. n. 9. *Kautge Gef*.
Klein, verb. Vögelh. p. 157. n. 8. *Kutgegeef*.
Klein, av. p. 169. n. 4. *Kautke-Gef*.
Klein, Vorber. p. 311. *Kautke-Gef*.
Briffon, ornithol. II. p. 410. n. 11. *Mouette cen-*
diée tachetée.
Batsch, Thiere, I. p. 382. *die Wintermöwe*.
Latham, Syn. Supplem. p. 268. *Tarrok*.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 817. n. 11. β .
Larus albicans, dorso canescente, rectricum
 apicibus, excepto extimo, nigris, pedibus tri-
 dactylis.
Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 340. n. 95.
Wintermewe, größte bunte Mewe, Hafmewe.
Fischer, Naturgesch. von Livl. p. 83. n. 93. *weiß-*
se Mewe.
Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken,
 p. 148. *Krokke?*
Pontoppidan, Naturhistorie von Norwegen, II.
 p. 156. *Krykkie*.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 223. *Larus Trida-*
ctylus.
 Naturf. XII. p. 142. n. 95. *Wintermewe*.
 Neue schwed. Abh IV. p. 111. *Larus Tridactylus*.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 136. n. 1. *Larus*
 (*Tridactylus*) *albicans*, dorso canescente, re-
 ctricibus excepto extimo nigris, pedibus tri-
 dactylis.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 20. n. 161. *La-*
rus (Tridactylus) albicans, dorso canescente,
 rectricum apicibus excepto extimo nigris, pe-
 dibus tridactylis.
Jonston, av. p. 129. *Larus albus*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 281. n. 1.
die Wintermeve.

β. *Latham*, Syn. III. 2. p. 393 n. 18. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 818. n. II. γ. L. albus, dorso canescente, rectricum apicibus excepto extimo nigris, fascia alarum obliqua nigra.

12. MINUTUS. *Die kleine Meve.* (10)

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 813. n. 5. Larus (Minutus) niveus, capite nigro, alis leucophaeis, pedibus coccineis.

Pallas, Reise, Ausz. III. Anh. p. 12. n. 35. Larus minutus.

Neue schwed. Abh. IV. p. 120. Larus (Minutus) niveus, alis leucophaeis, pedibus coccineis.

13. HYBERNUS. *Die Ringelmeve.* (1)

Halle, Vögel, p. 572. n. 705. die Ringmöve.

Halle, Vögel, p. 572. n. 706. die Wintermöve.

Klein, av. p. 138. n. 9. Larus hybernus.

Klein, Vorbereit. p. 254. n. 9. Ringelmewe.

Klein, verb. Vögelhist. p. 145. n. 10. Ringelmeve.

Briffon, ornith. II. p. 411. n. 12. Mouette d'hyver.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 816. n. 9. β. L. cinereus subtus niveus, capite albo, maculis fuscis vario, collo supra fusco, alis variis, rectricibus albis, fascia nigra.

Brünniche, ornitholog. bor. p. 44. n. 146. 147.
Larus maculatus?

Jonston, av. p. 199. Guzca Guacu.

14. EBURNEUS. *Die weiße Meve.*

Halle, Vögel, p. 597. n. 745. der Klippenvogel,
Rathsherr.

Pennant,

(10) Nach *Oedmann* zu *Larus Atricilla* gehörig.

(1) Nach *Latham* eine Varietät von *Larus canus*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 491. n. 374. *die weiße Meve.*

Klein, av. p. 148. n. 6. *Plautus Senator.*

Klein, *Vorbereit.* p. 272. n. 6. *Rathsherr.* p. 310. *der Raedsherr.*

Klein, *verbess. Vögelhist.* p. 156. n. 6. *Rathsherr.*

Latham, *Syst. ornitholog.* II. p. 816. n. 10. *Larus (Eburneus) corpore toto niveo, rosiro pedibusque plumbeis.*

Phipps, *Reis. n. d. Nordpol,* p. 98. *Larus (Eburneus) niveus immaculatus, pedibus plumbeo-cinereis.*

Trampler, *Wallfischf.* p. 70. *Rathsherren.*

Hermann, *tab. aff. anim.* p. 146. *Larus eburneus.*

Fabric. *fn. groenl.* p. 103. n. 67. *Larus (Candidus) totus niveus, rosiro pedibusque nigris.*

3. CANUS. *Die graue Meve.*(²)

Müller, *Natursystem,* II. p. 345. n. 3. *die kleine graue Meve.*

Leske, *Naturgesch.* p. 284. n. 1. *die graue Meve.*

Borowsky, *Thierreich,* III. p. 47. n. 3. *die kleine graue Meve.*

Bechstein, *Naturgesch.* I. p. 408. n. 3. *die gemeine Meve.*

Bechstein, *Naturgesch. Deutschl.* II. p. 808. n. 3. *die gemeine Meve.* p. 812. *Fischmeve, graue Meve, kleine graue Möve, weißgraue Meve, Fischer, große Seekrähe, Seemeve.*

Halle, *Vögel,* p. 570. n. 700. *die kleine Graumöve.*

LII 3

Halle,

(2) Flügelweite, nach *Pennant*, 3 Fufs. Gewicht 12½ Unze. *Oedmann* rechnet hieher: 1) *Raj.* *Larus fuscus sive hibernus,* p. 130. n. 14. — 2) *Pennants* *Vintergull,* n. 248. *Tab.* 86. — 3) *Briffons* *Gavia Hyberna,* n. 13. — 4) *Bränniches* *Larus Maculatus* n. 146.

- Halle*, Vögel, p. 571. n. 701. *die gelbweiße Möve.*
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
 II. p. 173. n. 155. *die kleine graue Möve.*
Pennant, arch. Zoolog. II. p. 491. n. 375. *die*
gemine Meve.
Onomat. histor. nat. IV. p. 748. *Meve mit einem*
schwarzen Schnabel.
Klein, av. p. 137. n. 5. Larus rostro nigro.
Klein, Vorbereit. p. 253. n. 5. *Mewe mit einem*
schwarzen Schnabel.
Klein, verbess. Vögelhist. p. 145. n. 6. *schwarz-*
schnäblige Meve.
Klein, av. p. 137. n. 4. Larus cinereus minor.
Klein, Vorber. p. 253. n. 4. *gemeine graue Mewe.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 145. n. 5. *gemeine*
graue Meve.
Briffon, ornith. II. p. 408. n. 8. Mouette cendrée.
Batsch, Thiere, I. p. 382. *die graue Möve.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 815. n. 9. Larus
 (Canus) albus, dorso cano, remigibus primo-
 ribus extremitate nigris, quarta et quinta ma-
 cula apicis nigra, extima extus nigra.
Beseke, Vögel Kurlands, p. 55. n. 105. *die klei-*
ne graue Mewe.
Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 341. n. 96.
kleine graue Mewe.
Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 83. n. 95.
graue Mewe.
Pennant, R. d. Schottl. I. p. 285. *graue Meven.*
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *die aschfarbene*
Fischmeve.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 89. n. 104.
die weißgraue Meve.
Tengmalm: neue schwed. Abhandl. IV. p. 47. *die*
Fischmeve.

Pontoppidan, Naturg. v. Dännemark, p. 169. n. 1.
Graanakke.

Leem, Lappl. p. 148. * *Larus canus.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 221. n. 3. *die gemeine Mewe.*

Naturf. XII. p. 143. n. 96. *kleine graue Mewe.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 437. *die kleinere Mewe.*

Linné, Syfl. Natur. Edit. II. p. 54. *Larus.*

Linné, Syfl. Nat. Ed. VI. p. 25. n. 1. *Larus albus dorso cano.*

Linné, Syfl. Natur. Edit. X. I. p. 136. n. 2. *Larus (Canus) albus dorso cano.*

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 20. n. 162. *Larus (Canus) albus, dorso cano.*

Jonston, av. p. 139. *Larus cinereus alter.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 281. n. 2. *die graue Mewe.*

β. *Briffon*, ornitholog. II. p. 410. n. 10. *grande Mouette cendrée.* (3)

Charleton, onomast. zoic. p. 94. n. 3. *Larus cinereus minor?*

4. **CINERARIUS.** *Die große aschgraue Mewe.* (4)

Müller, Naturfystem, II. p. 346. n. 4. *die große aschgraue Mewe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 812. n. 4. *die aschgraue Mewe.* p. 814. *die größte graue Mewe, kleine aschfarbene Mewe.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 749. *die kleine aschfarbene Mewe.*

LII 4

Gesner,

(3) Nach *Briffon* eine eigene Gattung. Nach *Lotham* gehört dies Synonym zu *Larus Argentatus*, n. 18. wohin es auch *Brünniche*, ornith. bor. p. 44. n. 149. rechnet

(4) Nach *Oedmann* zu *Larus Tridactylus* gehörig. Nach *Lotham* eine Varietät von *Larus Rübundus* n. 9.

Gesner, Vögelb. p. 374. *weiße Meerneben*.

Briffon, ornithol. II. p. 409. n. 9. petite Mouette cendrée.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 812. n. 2. β. L. albus, dorso cano, macula pone aures fusca.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 342. n. 97. die große aschgraue Mewe.

Pallas, Reif. Ausz. I. p. 370. Larus cinerarius.

Naturf. XII. p. 143. n. 97. die große aschgraue Mewe.

Neue schwed. Abh. IV. p. 113. n. 12.

Jonston, av. p. 129. Larus cinereus primus. —

Larus albus maior.

β. *Briffon*, ornith. II. p. 408. n. 7. petite Mouette grise. (5)

γ. *Forskål*, descr. animal. p. 8. n. 17. Larus rossro rubro, apice nigro, macula nigra temporali. (Visa ad Dardanellas, vernalis Februario advolans, aestate non permanens.) (6)

Neue schwed. Abhandl. IV. p. 113. n. 13.

15. ERYTHROPUS. Die rothfüßige Mewe. (7)

Pennant, arct. Zool. II. p. 495. E. das Rothbein.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 812. n. 2. γ. Larus albidus, capite fusco, maculis albis, dorso cano, rectricibus decem intermediis fascia nigra.

5. NAE-

(5) Nach *Briffon* eine eigene Gattung. *Briffon* rechnet hieher auch *Larus maculatus* *Marsf.* Dan. V. p. 54. tab. 45. und *Klein* av. p. 38. n. 14. — *Latham* nimmt *Briffons* *Gavia grisea minor*, und die eben genannten Synonymen als Variet. von *Larus crepidatus* n. 20. an.

(6) Nach *Oedmann* zu *Larus Tridactylus* gehörig; s. vorher not. 9.

(7) Nach *Latham* eine Varietät von *Larus Ridibundus*.

5. NAEVIUS. Die gefleckte Meve. (8)

Müller, Naturyst. II. p. 346. n. 5. die gefleckte Meve.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 814. n. 5. die gefleckte Meve.

Halle, Vögel, p. 572. n. 704. die große Falkmöve.

Onomat. hist. nat. IV. p. 753. die graue Fischermöve, weiße Möve, Seeschwalbe. (Lauter Namen, die ihr nicht zukommen.)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 489. n. 370. die gefleckte Meve.

Klein, av. p. 137. n. 6. Larus griseus maximus.

Klein, Vorbereit, p. 254. n. 6. graubraune große Meve.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 145. n. 7. graubraune große Meve.

Briffon, ornitholog. II. p. 406. n. 5. Goiland varié ou le Grisard.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 814. n. 6. γ . L. albus, dorso cinereo, rectricibus apice nigris.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 223. Larus Naevius.

Pallas, Reif. Ausz. I. p. 370. Larus naevius.

Neue schwed. Abh. IV. p. 112. n. 2.

ß. Briffon, ornithol. II. p. 410. n. 11. Mouette cendrée tachetée. (9)

Lll 5

γ . La-

(8) Länge, nach Pennant, an 2 Fufs; Flügelweite 4 F. 8 Z.; Gewicht 32 Unzen. Nach Latham eine Varietät von Larus Marinus n. 6. — Nach Oedmann zu Larus Tridactylus gehörig. — Latham rechnet hierher auch mit Briffon, den Wagellus Cornubiensium Raj. av. p. 130. A. 13. (Gmel. Syst. Linn. p. 562. n. 3. Proc. Glacialis.) Briffon wirft hier alles unter einander.

(9) Dies Synonym aus Briffon ist im System p. 595. bey Spec. 2. schon einmal angeführt, wohin es auch Latham und Oedmann,

γ. Pallas, nord. Beyträge, IV. p. 10. *die befleckte Möve.*

6. MARINUS. *Die Mantelmeve.* (10)

Miller, Naturf. II. p. 346. n. 6. *die Seemewe.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 48. n. 4. *die Seemewe.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 408. n. 4. *die Mantelmeve.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 815. *die Mantelmeve.* p. 817. *Seemewe, Fischmeve, größte bunte Meve.*

Halle, Vögel, p. 568. n. 696. *die große Seemöve.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 174. n. 156. *die Seemöve.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 488. n. 368. *die Seemewe, Mantelmeve.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 752. *die große Seemöve.*

Klein, av. p. 136. n. 1. *Larus maximus ex albo et nigro vel subcaeruleo varius.*

Klein, Vorber. p. 252. n. 1. *größte bunte Meve.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 144. n. 1. *größeste bunte Meve.*

Briffon, ornith. II. p. 403. n. 1. *Goiland noir.*

Batsch, Thiere, I. p. 381. *die Seemöve.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 813. n. 6. *Larus (Marinus) albus, dorso cano.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 56. n. 106. *die Seemewe.*

Pennant, Reise d. Schottl. I. p. 285. *Seemeven.*

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 169. n. 2. *Svartbag, Blaamaage.*

Leem,

Oedmann zählen. Das Synonym aus Bränniche rechnet Oedmann zu *Larus canus*. S. neue schwed. Abh. IV. p. 109. 112.

(10) Flügelweite nach Pennant 5 Fufs 9 Zoll. Gewicht zuweilen 5 Pfund — Latham rechnet auch den *Larus Argentatus*, und *Larus Naevius*, als Spielarten hieher.

Leem, Nachricht von den Lapp. p. 147. *Sortbag?*
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 220. n. 1. *die Mantelmewe.*

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII.
 p. 461. n. 39. *die Seemeve.*

Neue schwed. Abhandl. IV. p. 100. n. 3. *Larus marinus.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 24. n. 3. *Larus albus dorso atro.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 136. n. 3. *Larus (Marinus) albus dorso nigro.*

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 20. n. 163. *Larus (Marinus) albus dorso nigro.*

Fabric. fn. groenl. p. 102. n. 66. *Larus (Marinus).*

Moehring, av. gen. p. 66. n. 70. *Gavia.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 282. n. 3. *die Seemeve.*

16. ICHTHIAETUS. *Die caspische Fischmeve.*

Müller, Natursystem, Suppl. p. 108. n. 12. *der Fischjäger.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 811. n. 1. *Larus (Ichthiaetus) capite colloque supremo nigris, dorso alisque grifescens, remigibus primoribus albis, exterioribus quinque apice nigris, palpebris caudaque albis.*

Pallas, Reif. Ausz. II. Anh. p. 14. n. 27. *Larus Ichthiaetus.*

Pallas, Reif. Ausz. II. p. 240. *die größte schwarzköpfige Seemöve.*

Gmelin, Reif. I. p. 152. tab. 30. 31. *die große Lachmöve.*

[*Forskäl*, faun. orient. p. 7. n. 7. *Mærtis.*

Forskäl, descr. anim. p. 11. *Adjum, humano more ridendo clamat.*] Nach *Oedmann.*

7. Fuscus. Die braune Meve. (1)

Miller, Naturf. II, p. 347. n. 7. die braune Meve.

Borowsky, Thierreich, III, p. 49. n. 5. die Heringsmeve, die braune Meve, große Hofmeve.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 408. n. 5. die Heringsmeve.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 818. n. 7. die Heringsmeve. p. 819. große Graumeve, Bürgermeister.

Halle, Vögel, p. 569. n. 697. die große Graumeve.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 488. n. 369. die Heringsmeve.

Onomat. hist. nat. VI. p. 751. die größte Graumeve.

Klein, av. p. 137. n. 2. Larus cinereus maximus.

Klein, Vorber. p. 252. n. 2. größte graue Meve.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 144. n. 3. größte graue Meve.

Briffon, ornith. II. p. 405. n. 3. Goiland gris.

Batsch.

- (1) Flügelweite, nach Pennant, 4 Fufs 4 Zoll. Gewicht an 30 Unzen. Briffon und (sonst) Pennant machen diesen zu Martens Bürgermeister. Die Gegen Gründe hat Oedmann in den neuen schwed. Abhandl. a. a. O. aus einander gesetzt. Aus den Jungen dieses Vogels haben mehrere Schriftsteller eine besondere Gattung gemacht. Oedmann bringt dahin folgende Synonymen, als Abänderungen des jüngern Alters. 1) Pennants Vogel n. 247. tab. 88. — 2) Raii Vogel p. 130. n. 13. den man für Martens Mallamuck und Bürgermeister von Grönland angesehen hat. — 3) Briffons Larus varius sive Skua, II. p. 406. n. 5. (In unserm System wird dies Synonym zu Larus Naevius p. 598. n. 5. gezogen.) — 4) Briffons Gavia grisea p. 407. n. 6. Hiermit stimmt auch Latham a. a. O. überein. Aber Briffon rechnet dazu: Goiland ou Larus chlamyde leucophaea alis brevioribus, Feuillée III. p. 14. Klein, p. 139. n. 17. — 5) Brännichs Larus varius p. 45. n. 150. (Gmelin Syst. Linn. p. 598. ad n. 5.)

Batsch, Thiere, I. p. 382. *die Heringsmöwe.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 815. n. 8. Larus
(Fuscus) albus, dorso fusco, pedibus flavis.

Beseke, Vögel Kurlands, p. 56. n. 107. *die braune
Mewe.*

Fischer, Naturgesch. von Livl. p. 83. n. 94. *große
graue Mewe.*

Cetti, Naturg. v. Sardin. II. p. 300. *Mewe.*

Pennant, Reif. d. Schottl. I. p. 25. *braune Meeven.*

Lerm, Finnm. p. 148. *Sobmer?*

Pontoppidan, Dännemark, p. 169. n. 3. *Sildemaage.*
Neue schwed. Abhandl. IV. p. 104. n. 4. Larus
fuscus.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 220. n. 2. *die Hä-
ringsmewe.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 90. n. 107.
die graubraune Mewe.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 24. n. 2. Larus
albus dorso fusco.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 136. n. 4. Larus
(Fuscus) albus dorso fusco.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 20. n. 164. Larus
(Fuscus) albus, dorso cano.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 282. n. 4.
die braune Mewe.

17. GLAUCUS. *Der Bürgermeister.*⁽²⁾

Halle, Vögel, p. 597. n. 746. *die Tüchermöwe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 494. *der Bürger-
meister.*

Klein,

(2) Keine Mevenart hat den Schriftstellern mehr zu thun gemacht als diese. Sie führen ihn sparsam an, welches wohl daher zu rühren scheint, daß er in geringer Anzahl vorhanden ist, und abgelegene Oerter bewohnt. Die Eyer sind ganz bläulich, mit 5 bis 6 schwarzen Flecken bezeichnet.

- Klein*, av. p. 148. n. 7. *Plautus Praeconful.*
Klein, Vorbereit. p. 272. n. 9. *Bürgermeister.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 157. n. 9. *Bürgermeister.*
Briffon, ornith. II. p. 404. n. 2. *Goiland cendré.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 814. n. 7. *Larus*
 (*Glaucus*) *albus dorso alisque cauis, remigibus*
apice albis, rostro flavo, angulo croceo.
Leem, Finnm. p. 148. ** *Larus hyperboreus, dorso*
dilute cinereo, extremitatibus remigum albis;
Blaamager, Quitmaase.
Trampter, Wallfischf. p. 75. *Burgemeisters.*
Neue schwed. Abhandl. IV. p. 96. n. 1. Larus
glaucus.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 21. n. 169. *Larus*
 (*Glaucus*) *totus albus, dorso et alis canis, remi-*
gibus apice albis.
Pontoppidan, Dännemark, p. 169. n. 4. *Perle-*
maage.
Olassen, Reise d. Isl. I. p. 190. *Maor, Maafur.*
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 282. n. 5.
der Bürgermeister.

18. ARGENTATUS. *Die silberweiße Meve.* (3)
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 494. C. *die silber-*
weiße Meve.

Latham,

Manche haben mehr und grössere Flecken. Durchmesser der Länge 3 Zoll 3 Lin der Breite 2 Zoll 4 Lin. Umkreis der Schale, wo sie am dicksten ist, 6 Zoll 10 Lin. Sie sind am kleinen Ende ungewöhnlich spitzig, also von allen andern Meveneyern merklich unterschieden. *Oedmann.*

- (3) Nach *Latham* eine Varietät von *Larus Marinus* n. 6. Dieser und *Brünniche* rechnen *Briffons Gavia cinerea maior* p. 410. n. 10. hierher. (*Gmel. Syst. Linn. p. 597. n. 3. β.*) *Oedmann* will jedoch diese zu *Larus canus* ebenfalls rechnen; a. a. O. p. 120. n. 2.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 814. n. 6. β . L. albus, dorso alisque canis, remigibus primoribus versus apicem nigris.

Pontoppidan, Naturg.-sch. v. Dännemark, p. 169. n. 7. Larus Argentatus.

Müller, -zool. dan. prodr. p. 21. ad n. 161. L. Argentatus.

8. **ATRICILLA**. *Die schwarzfüßige Lachmeve*.⁽⁴⁾

Müller, Naturfyft. II. p. 348. n. 8. *der Spötter*.

Halle, Vögel, p. 575. n. 713. *die kleine weiße Möwe mit dem Mohrenkopf und rothem Schnabel*.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 489. n. 371. *die Lachmeve*.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 175. *der Spötter*.

Onomat. histor. natur. IV. p. 748. *die kleine weiße Möwe*.

Klein, av. p. 139. n. 16. Larus minor, capite nigro, rostro rubro.

Klein, Vorbereit. p. 256. n. 16. *Rothschnabel mit einem schwarzen Kopfe*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 146. n. 17. *Roth*.

Briffon, ornith. II. p. 412. n. 13. *Mouette rieuse*.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 813. n. 4. Larus (Atricilla) albus, capite nigricante, rostro rubro; pedibus nigris.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 78. *die kleine Meeve*.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 90. n. 106. *die weiße Meeve*.

Nov. Comment. Petrop. XV. p. 478. tab. 22. fig. 2. (Pullus.)

Linné,

(4) **Oedmann** rechnet hierher: 1) **Gmelin**, R. d. Russl. I. p. 72. II. p. 192. russ. *Tschaka*. 2) **Albin**. II. Tab. 86. *Brown headed Gull*. (**Gmel**, Syst. Linn. p. 601. ad n. 9.)

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 136. n. 5. Larus (Atricilla) albus, capite alarumque apicibus nigris, rostro rubro.

19. ATRICILLOIDES. *Die sibirische Meve.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 813. n. 3. Larus (Atricilloides) ex rubicundo albus, capite, orbitis colloque nigris, dorso alisque cinereis, pedibus coccineis.

9. RIDIBUNDUS. *Die rothfüßige Lachmeve.* (5)

Müller, Naturfyst. II. p. 348. n. 9. die Lachmeve.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 408. n. 6. die schwarzköpfige Lachmeve.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 819. n. 8. die schwarzköpfige Lachmeve.

Halle, Vögel, p. 571. n. 702. die graue Möve mit dem Mohrenkopfe, Seekröhe.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 490. n. 372. die schwarzköpfige Lachmeve.

Klein, av. p. 138. n. 8. Larus albus erythrocephalus.

Klein, Vorbereit. p. 254. n. 8. Braunkopf, rothköpfiger Seeschwalme.

Klein, verb. Vögelhist. p. 145. n. 9. Braunkopf.

Klein, steram. av. p. 32. Tab. 36. fig. 2. a-c.

Briffon, ornithol. II. p. 413. n. 14. Mouette rieuse à pattes rouges.

Latham, Syn. Suppl. p. 268. Black-headed Gull.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 811. n. 2. Larus (Ridibundus) albidus, capite nigricante, rostro pedibusque rubris.

Beseke,

(5) Flügelweite, nach *Pennant*, 37 Zoll; Gewicht 10 Unzen.

Latham rechnet den *Larus Cinerarius* p. 597. n. 4. und den

Larus Erythropus, p. ead. n. 15. als Spielarten hierher. Nach

Oedmann ist auch *Charletons Larus niger*, Onomat. zoic p 95.

n. 4. hierher zu ziehen.

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 56. n. 108.
die *Lachmeve*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 224. n. 5. die *Lachmeve*.

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 83. n. 96.
Lachmeve.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. die *große Lachmeve*.

Scopoli Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 89. n. 105.
die *aschgraue Meve*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 292. Larus maior cinereus; ein *weiße Seeschwalbe*, *großer Seeschwalm*, *grawer Meerschwalm*, *Fischahr*.

Fonston, av. p. 130. Larus cinereus tertius.

Schäfer, element. ornith. tab. 44.

10. PARASITICUS. *Der Strundjäger.*

Müller, Naturf. II. p. 348. n. 10. *der Struntjäger*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 45. n. 1. *der Strundjäger*, *Strandjäger*. Tab. 41.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 407. n. 1. *der Strundjäger*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 821. n. 9.
der Strundjäger. p. 824. *Mevenbüttel*, *Schmarotzermeve*.

Halle, Vögel, p. 577. n. 717. *die Polarmöwe*.

Halle, Vögel, p. 598. n. 749. *der Strandjäger*.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 175. n. 158. *die Schmarotzermöwe*, *Labbe*.

Pennant, arch. Zool. II. p. 492. n. 376. *die arctische Meve*, *Struntjäger*.

Onomat. histor. nat. IV. p. 755. *die Polarmöwe*, *Schrißfalke*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 147. n. 21. *Polmeve*.

Klein, av. p. 148. n. 10. *Plautus Stercorarius*.

- Klein*, Vorbereit. p. 272. n. 10. *Scheißfolke*.
- Klein*, verbesserte Vögelhist. p. 157. n. II. *Struntjäger*.
- Briffon*, ornith. II. p. 401. n. 1. Stercoraire.
- Briffon*, ornitholog. II. p. 402. n. 3. Stercoraire à longue queue.
- Batsch*, Thiere, I. p. 381. *der Strunt-od. Strandjäger*.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 819. n. 15. Larus (Parasiticus) supra niger, collo, pectore et abdomine albis, rectricibus duabus intermediis longissimis.
- Seligmann*, Vögel, V. Tab. 43. *der Nordvogel den man für den Er hält*.
- Seligmann*, Vögel, V. Tab. 44. *der Nordvogel den man für die Sie hält*.
- Leem*, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 150. *Kive, Kive Joen*.
- Olassen*, Isl. I. p. 121. 305. *Kioe, Kioven*.
- Trampler*, Wallfischf. p. 69. *die Struntjäger*.
- Pontoppidan*, Norwegen, II. p. 154. *Jo-Fugl, Jo-Tyv, Kirve*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. II. p. 54. Caprotherus.
- Linné*, Syst. Natur. Edit. VI. p. 24. n. 4. Larus rectricibus intermediis longissimis.
- Linné*, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 136. n. 6. Larus (Parasiticus) rectricibus duabus intermediis longissimis.
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 20. n. 166. Larus (Parasiticus) rectricibus duabus intermediis longissimis.
- Philos. Transact. LXII. p. 421. n. 23.
- Donndorff*, Handb. der Thiergesch. p. 283. n. 6. *der Struntjäger, arctische Meve*.

20. CREPIDATUS. *Die schwarzzehige Meve.* (6)

Pennant, arct. Zool. II. p. 492. n. 377. *die Meve mit schwarzen Zehen.*

Briffon, ornith. II. p. 401. n. 2. Stercoraire rayé.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 819. n. 14. Larus (Crepidatus) luteo fuscoque varius, subtus pallidior, macula alarum alba.

Müller, zool. dan. prodr. p. 21. n. 168. Larus Cephus.

Philos. Transact. LII. p. 135.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 283. n. 7. *die schwarzzehige Meve.*

β. L. griseus ex albo varius, subtus albus, remigibus primoribus rectricibusque nigricantibus albo terminatis, harum lateribus intus maxima parte albis? * (7)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 819. n. 14. β.

Latham, Syn. III. 2. p. 382. n. 10. Var. A.

21. CATARRHACTES. *Die Skua.* (8)

Müller, Naturyst. II. p. 350. n. 11. *der gestreifte Struntjäger.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 50. n. 6. *der gestreifte Strandjäger.*

Halle, Vögel, p. 571. n. 703. *die braune Stossmöve.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 176. n. 159. *die braune Stossmöve, Skua.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 493. A. *die Skua.*

Klein, av. p. 137. n. 7. Larus fuscus.

M m m 2

Klein,

(6) Länge, nach *Briffon*, 1½ Fuß 3 Lin. Flügelweite 3½ F. 3 Lin. — Gewicht, nach *Pennant*, 11 Unzen.

(7) Siehe vorher die Anmerkung 5, bey *Larus Cenerarius* β.

(8) Flügelweite 4½ Fuß, Gewicht 3 Pfund. *Penn.*

Klein, Vorber. p. 254. n. 7. *braun und geschuppte Mewe.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 145. n. 8. *braun geschuppte Mewe.*

Briffon, ornithol. II. p. 405. n. 4. *Goiland brun.*

Gesner, Vögelb. p. 374. *Catarractes.*

Batsch, Thiere, I. p. 381. *der gestreifte Strandjäger.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 818. n. 12. *Larus (Catarractes) griseus, remigibus rectricibusque basi albis, cauda subaequali.*

Forster, Reif. Ed. in 8. I. p. 113. *die große nordliche Mewe.*

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 21. n. 167. *Larus (Cataractes) griseus, remigibus rectricibusque basi albis, cauda subaequali.*

Pontoppidan, Norwegen, II. p. 182. *Skua.*

Charleton, onomast. zoic. p. 95. n. 6. *Larus Catarracta.*

Fonston, av. p. 130. *Catharracta.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 154. *Larus Catarractes.*

Aristot. histor. animal. L. 9. c. 10. n. 161. *Καταγακτὺς?*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 283. n. 8. *die Skua.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit *neun* Gattungen vermehrt. Bey der 2ten Gattung sind *zwey*, bey der 3ten *zwey*, bey der 4ten *drey*, bey der 5ten *vier*, bey der 9ten *drey* Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. Larus (Maximus) tetradactylus, albus, dorso alisque superne canis, palpebris fanguineis, remigum sex primorum apicibus nigris, albo terminatis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 146.

2. Larus (Keeask) fuscus, tectricibus alarum albo variegatis, cauda nigra, albo maculata, apice albo.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 818. n. 13.

77. GESCHLECHT. STERNA. *Die Meer-
schwalbe.*

Müller, Naturyst. II. p. 351. Gen. LXXVII.

Leske, Naturgesch. p. 283. Gen. LXVIII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 51. Gen. XLII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 219.

Gen. LXVIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 409. Gen. XXXIII.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 825.

Gen. XXV.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 484.

Onomat. hist. nat. VII. p. 299.

Briffon, ornith. II. p. 415. Gen. CIII.

Batsch, Thiere, I. p. 366. Gen. LXXXIV.

Latham, Syst. ornith. II. p. 803. Gen. XCIII.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 143.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 284.

Gen. XXXIX.

8. CASPIA. *Die caspische Meer-
schwalbe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 825. n. 1.
*die kaspiische Meer-
schwalbe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 487. B. *die kaspiische
Meerschwalbe.*

- Latham*, Syft. ornitholog. II. p. 803. n. 1. Sterna (Caspia) corpore supra plumbeo-cinereo, subtus colloque albo, rostro coccineo, capillitio pedibusque nigris.
- Pallas*, Reise, I. p. 429. II. p. 471.
- Pallas*, Reise, Ausz. I. p. 370. *Tschagrawi*.
Neue schwed. Abhandl. III. p. 221. Sterna: cauda forficata alba breviori, rostro coccineo, capillitio aterrimo, pedibus nigris. Maxima; *die Wimmermeve*.
- Mus. Carlson. fasc. III. Tab. 62.
- Donndorff*, Handb. der Thiergesch. p. 284. n. 1. *die caspische Meerschwalbe*.
- β. *Latham*, Syn. III. 2. p. 351. n. 1. Var. A.
Latham, Syft. ornithol. II. p. 804. n. 1. β. St. cinereo-cana, corpore subtus colloque albis, vertice nigro albo maculato, rectricibus ad apicem fasciis fuscis.
- γ. *Latham*, Syn. III. 2. p. 351. n. 1. Var. B.
Latham, Syft. ornithol. II. p. 804. n. 1. γ. St. cinereo-cana, corpore subtus colloque albis, vertice nigro, occipite subcristato, rectrice extrema a medio ad apicem alba.
- δ. St. rostro albo, capillitio nigro alboque vario, aurium regionibus nigris, dorso et alis cinereis, plumarum remigum primariarum apicibus nigris. *
- Latham*, Syft. ornithol. II. p. 804. n. 1. δ.
9. CAYENNENSIS. *Die große cayennische Meerschwalbe*.
Latham, Syft. ornithol. II. p. 804. n. 2. Sterna (Cayana) grisea, pennis rufo-marginatis, occipite nigro, corpore subtus albo.

10. SURINAMENSIS. *Die surinam. Meerschwalbe.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 804. n. 3. Sterna (Surinamensis) cinerea, subtus alba, rostro, capite, collo pectoreque nigris, pedibus rubris.

11. FULIGINOSA. *Der Eyvogel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 485. n. 364. die russ-schwarze Meerschwalbe.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 804. n. 4. Sterna (Fuliginosa) fuliginoso-atra, fronte corporeque subtus albis, striga per oculos nigra.

Forster, Reif. Ed. in 8. I. p. 119. der Eyvogel.

12. AFRICANA. *Die afrikanische Meerschwalbe.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 805. n. 5. Sterna (Africana) alba, corpore supra caerulecente, vertice nigro, alis fusco-maculatis.

1. STOLIDA. *Die Noddy, (9)*

Müller, Naturfyst. II. p. 351. n. 1. der Pinsel.

Leske, Naturgesch. p. 283. n. 1. die kirre Meerschwalbe.

Borowsky, Thierreich, III. p. 51. n. 1. die kirre Meerschwalbe. Tab. 42.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 219. n. 1. Sterna (Stolida) corpore nigro, fronte albicante, superciliis atris.

Halle, Vögel, p. 575. n. 712. die kleine weißköpfige Seeschwalbe.

Pennant, arct. Zool. II. p. 484. n. 363. die dumme Meerschwalbe.

Onomat. histor. nat. VII. p. 306. die dumme Meerschwalbe.

Klein, av. p. 139. n. 15. Larus, hirundo marina minor, capite albo.

M m m 4

Klein,

(9) Gewicht 4 Unzen. Penn.

Klein, Vorbereit. p. 256. n. 15. *Weißkopf*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 146. n. 16. *Weißkopf*.

Briffon, ornith. II. p. 414. n. 15. *Mouette brune*.

Batsch, Thiere, I. p. 369. *die kirre Meerfchwalbe*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 805. n. 6. *Sterna* (*Stolida*) corpore nigro, fronte albicante, superciliis atris.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 76. *die Meerfchwalbe mit dem weißen Kopfe*.

San ml. zur Phys. und Naturgesch. I. p. 227. *die Meerfchwalbe*.

Neueste Mannichfalt. I. p. 568. *Meerfchwalben*.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 137. n. 1. *Sterna* (*Stolida*) cauda cuneiformi, corpore nigro, fronte albicante.

Charleton, onomast. zoic. p. 115. n. 22. *Passer stultus*.

Hermann, tab. affinit. anim. p. 143. *Sterna Stolida*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 284. n. 2. *die Noddy*.

13. SIMPLEX. *Die kleine cayennische Meerfchwalbe*.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 805. n. 8. *Sterna* (*Simplex*) plumbeus; subtus alba, vertice albedo, rectricibus alarum mediis et majoribus albis.

β. *Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 806. n. 8. 1. *St. cinereo-nigricans*, fronte, collo, corpore subtus rectricibusque alarum inferioribus albis.

14. NILOTICA. *Die ägyptische Meerfchwalbe*.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 806. n. 9. *Sterna* (*Nilotica*) cinerea, subtus alba, vertice colloque superiore maculis nigricantibus, orbitis nigris albo maculatis.

Hasselquist, Reise n. Paläst. (Ed. germ.) p. 325.
n. 41. *Sterna nilotica*.

15. CANTIACA. *Die kentische Seeschwalbe.* (10)

Latham, Syn. Suppl. p. 266. Boy's Sandwich.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 806. n. 10. *Sterna* (Boysii) *alba*, dorso alisque canis, pileo nigro, fronte maculis albis, remigibus nigricantibus scapo albo.

β. St. supra nigro albo cinerascenque varie fusca, subtus alba, cauda forficata, rostro pedibusque nigris. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 806. n. 10. γ.

Mus. Carl. fasc. III. Tab. 63. *Sterna nubilosa*.
(Pullus.)

2. HIRUNDO. *Die Seeschwalbe.* (1)

Müller, Naturyst. II. p. 352. n. 2. *die europäische Meerschwalbe*. Tab. 13. fig. 3.

Leske, Naturgesch. p. 284. n. 2. *die größere Meerschwalbe*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 52. n. 3. *die europäische Meerschwalbe*.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 219. n. 2. *Sterna* (Hirundo) cauda forficata, rectricibus duabus extimis albo nigroque dimidiatis; *die Seeschwalbe*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 409. n. 2. *die gemeine Meerschwalbe*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 828. n. 3. *die gemeine Meerschwalbe*. p. 831. *europäische Meerschwalbe*, *Schwarzkopf*, *kleinere Meve*,
M m m 5 Rohr-

(10) Nach *Latham* gehört auch *Sterna Naevia*, p. 609. n. 5, als Spielart hierher.

(1) Flügelweite 30 Zoll; Gewicht 4¼ Unze. Penn.

*Rohrmeve, Rohrschwalm, Seeschwalbe, Meer-
schwalbe.*

*Halle, Vögel, p. 573. n. 708. die große Seeschwal-
be mit gespaltenem Schwanz.*

*Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 177. n. 161. die Seeschwalbe.*

*Pennant, arct. Zoolog. II. p. 485. n. 365. die
große Meerschwalbe.*

*Onomat. histor. nat. VII. p. 302. die europäische
Seeschwalbe.*

Klein, av. p. 138. n. 10. Larus albicans.

Klein, Vorbereit. p. 255. n. 10. Schwarzkopf.

*Klein, verb. Vögelhist. p. 145. n. 11. Schwarz-
kopf.*

Klein, av. p. 138. n. 11. Larus minor cinereus?

*Klein, Vorbereit. p. 255. n. 11. Rohrschwalm,
Fischerlein?*

*Klein, verb. Vögelhist. p. 145. n. 12. Rohrmeve,
Rohrschwalm?*

Klein, Stemmat. av. p. 32. Tab. 36. fig. 3. a-c.

*Gesner, Vögelb. p. 372. Stirn; mit 1 Fig. p. 373.
Spirer, Schnirring.*

*Briffon, ornith. II. p. 415. n. 1. grande Hirondel-
le-de-mer.*

*Batsch, Thiere, I. p. 369. die europäische Meer-
schwalbe.*

*Latham, Syst. ornitholog. II. p. 807. n. 15. Ster-
na (Hirundo) cauda forficata, rectricibus dua-
bus extimis albo nigroque dimidiatis.*

*Frisch, Vögel, Tab. 219. die schwarzplättige
Schwalbenmöve.*

*Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 342. n. 98.
die europäische Meerschwalbe.*

*Beseke, Vögel Kurl. p. 57. n. 109. die europäische
Meerschwalbe.*

Siemssen,

- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 216. n. 1. die gemeine *Meerschwalbe*.
- Phipps* Reif. n. d. Nordpol, p. 99. die europäische *Seeschwalbe*.
- Lepechin*, Tagebuch der russ. Reise, I. p. 245. *Seeschwalben*.
- Pallas*, Reif. Ausz. I. p. 370. Sterna Hirundo.
- Pallas*, nord. Beytr. IV. p. 24. Sterna Hirundo.
- Linné*, auserles. Abhandl. II. p. 282. n. 28. die *Seeschwalbe*.
- Fabricius*, Reisen n. Norwegen, p. 290. Sterna hirundo.
- Pontoppidan*, Dännemark, p. 170. n. 1. *Tärne*, *Kropkirne*.
- Pontoppidan*, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 176. *Sandtärne*, *Sandtal*, *Tendelöh*, *Ten*.
- Olassen*, Isl. I. p. 122. *Therna*, *Kriia*.
- Naturf. XII. p. 143. n. 38. europäische *Meerschwalbe*.
- Schneider*, zool. Abh. p. 145. 151. Larus hirundo; kleine *Fischmeve*, oder *Fischmeise*.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 91. n. III. die *Schwalbenmeve*.
- Leem*, Finnm. p. 150. die *Seeschwalben*, *Tänner*.
Berlin. Samml. IX. p. 571. die *Meerschwalbe*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 24. n. 1. Hirundo marina.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 137. n. 2. Sterna (Hirundo) cauda forficata, rectricibus duabus extimis albo nigroque dimidiatis.
- Müller*, zool. dan. prodr. p. 21. n. 1. Sterna (Hirundo) cauda forficata, rectricibus duabus extimis albo nigroque dimidiatis.
- Kramer*, Austr. p. 345. n. 1. Larus rostro pedibusque miniaceis, vertice et nucha atris, dorso cano, abdomine albo; *grauer Fischer*.

Schwenkfeld, av. Silef. p. 293. Larus minor cinereus; ein klein Seeschwalbe, Rohrschwalm, Fischerlein?

Charleton, onomast. zoic. p. 94. n. 3. Larus Piscator?

Moehring, av. gen. p. 68. n. 74. Larus.

Jonston, av. p. 129. Larus albus minor?

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 285. n. 3. die Seeschwalbe.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 808. n. 15. β. Sterna pedibus nigris, rectricibus extimis toto albis.

16. PANAYENSIS. Die Meerschwalbe von Panay.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 808. n. 16. Sterna (Panaya) subtus alba, vertice nigro maculato, cervice griseo-nigricante, alis caudaque fuscis.

Buffon, ois. VIII. p. 344. L'Hirondelle de mer de l'Isle de Panay.

Sonnerat, Reif. n. Neuguin. p. 44. die Meerschwalbe von der Insel Panay.

17. CINEREA. Die aschgraue Meerschwalbe.

Brisson, ornitholog. II. p. 417. n. 3. Hirondelle de-mer cendrée.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 808. n. 17. Sterna (Cinerea) cinerea, capite nigro, marginibus alarum, et tectricibus caudae inferioribus nigris.

Jonston, av. p. 130. Larus fidipes alius, alis brevioribus.

18. ALBA.

19. CANDIDA.

} Die weiße Meerschwalbe. (2)

Latham, Syn. Suppl. p. 266. White Tern.

Latham,

(2) Ich nehme diese beyden Gattungen hier zusammen, weil *Latham* seine *White Tern* selbst für *Sparrmanns sterna alba* ausgiebt, und im System sich weiter kein Synonym findet.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 808. n. 18. Sterna (Alba) corpore toto albo, rostro pedibusque nigris.

20. OBSCURA. *Die unbestimmte Meerschwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 810. n. 25. Sterna (Obscura) supra fusca, subtus alba, alis fusco cinereoque variis, capite nigro.

3. NIGRA. *Die schwarze Meerschwalbe. (3)*

Müller, Naturfyft. II. p. 253. n. 3. die schwarze Meerschwalbe. Tab. 13. fig. 4.

Borowsky, Thierreich, III. p. 52 n. 2. der Brandvogel, Mayvogel, die schwarze Meerschwalbe.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 836. n. 6. die graue Meerschwalbe.

Halle, Vögel, p. 574. n. 709. die kleine schwarze Seeschwalbe?

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 177. n. 162. der Mayvogel?

Onomat. histor. natur. VII. p. 305. die graue Seeschwalbe.

Briffon, ornithol. II. p. 418. n. 5. Hirondelle. de-mer à tête noire ou Gachet.

Batsch, Thiere, I. p. 369. die schwarze Meerschwalbe.

Latham, Syn. III. 2. p. 367. n. 22. Var. A.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 810. n. 24. Sterna (Nigra) cauda forficata, corpore cano, capite rostroque nigris, pedibus rubris.

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 343. n. 99. die schwarze Meerschwalbe.

Cetti, Naturg. v. Sardin. II. p. 299. Meerschwalbe.

Pallas.

(3) Wird oft mit *Sterna Fissipes* n. 7. verwechselt. *Latham* hält sie auch fast nur für eine Spielart.

Pallas, Reif. Ausz. I. p. 370. *Sterna nigra*.

Leem, Finnm. p. 150. *Glitter*.

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 170.
n. 2. *Söesvale*, *Sortkirre*, *Glitter*.

Naturf. XII. p. 144. n. 99. *die schwarze Meer-
schwalbe*.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 24. n. 2. *Sterna nigra*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 137. n. 3. *Sterna*
(*Nigra*) cauda subforficata, corpore cano, ca-
pite rostroque nigro, pedibus rubris.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 21. n. 171. *Ster-
na* (*Nigra*) cauda subforficata, corpore cano,
capite rostroque nigro, pedibus rubris.

21. AUSTRALIS. *Die Südmeerschwalbe.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 809. n. 21. *Ster-
na* (*Australis*) cinerea subtus grisea, fronte
albo-flavescente, remigibus albis.

22. SINENSIS. *Die chinesische Meerschwalbe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 809. n. 20. *Ster-
na* (*Sinensis*) alba, dorso cinereo, alis cauda-
que subforficata, griseo-canis, fascia vertica-
li nigra.

23. METOPOLEUCOS. *Die sibirische Meerschwalbe.*

Latham, Syn. III. 2. p. 365. n. 21. Hooded Tern.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 809. n. 22. *Sterna*
(*Metopoleucos*) capite colloque nigris, dorso
cano-nigricante, remigibus cinereis, fronte,
corpore subtus caudaque forficata albis.

4. MINUTA. *Die kleine Meerschwalbe.* (4)

Müller, Natursystem, II. p. 353. n. 4. *der kleine
Fischer*. Tab. 13. fig. 1.

Borowsky,

(4) Flügelweite 19½ Zoll. Gewicht 2 Unzen 8 Gran. Penn.

Borowsky, Thierreich, III. p. 55. n. 5. *der kleine Fischer.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 837. n. 7. *die kleine Meerfchwalbe.* p. 838. *das Fischerlein, die kleine Seefchwalbe, die zweyfarbige Meve, die kleinste Fischmeve.*

Halle, Vögel, p. 574. n. 710. *die kleinste Fischmöve.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 486. n. 366. *die kleinere Meerfchwalbe.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 503. *das Fischerlein.*

Klein, av. p. 138. n. 11. *Larus minor cinereus?*

Klein, Vorbereit. p. 255. n. 11. *Rohrfchwalme?*

Klein, verb. Vögelhist. p. 145. n. 12. *Rohrmeve?*

Klein, av. p. 138. n. 13. *Larus Piscator.*

Klein, Vorbereit. p. 255. n. 13. *Fischerlein, kleinste Meve.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 146. n. 14. *Fischerlein.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 217. n. 2. *die kleine Meerfchwalbe.*

Gesner, Vögelb. p. 373. *Meve, Fischerlein genannt.*

Briffon, ornith. II. p. 416. n. 2. *Petite Hirondelle de mer.*

Batsch, Thiere, I. p. 369. *die kleine Möve.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 809. n. 19. *Sterna (Minuta) cauda forficata, corpore albo, dorso cano, fronte superciliisque albis.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 343. n. 100. *der kleine Fischer.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 91. n. 110. *Larus bicolor; die zweyfarbige Meve.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 293. *Larus minor cinereus?*

Fonston, av. p. 129. *Larus albus minor?*

Charleton, onom. zoic. p. 94. n. 3. *Larus piscator.*

5. NAEVIA. *Die gefleckte Meerschwalbe.* (5)

Müller, Natursystem, II. p. 353. n. 5. *die Kirrmeve.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 54. n. 4. *die Kirrmeve.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 831. n. 4. *die gefleckte Meerschwalbe.* p. 833. *Kirrmeve, Girmöve, Scheerke.*

Halle, Vögel, p. 575. n. 711. *die grünbunte Möwe?*

Onomat. hist. nat. VII. p. 304. *die bunte Meerschwalbe, Kirrmöwe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 487. A. *die kamtschatkische Meerschwalbe.*

Klein, av. p. 103. n. 3. *Rallus cinereus, facie Lari.*

Klein, Vorbereit. p. 192. n. 3. *graue Rall, Afermeve.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 105. n. 3. *graue Ralle.*

Briffon, ornithol. II. p. 419. n. 6. *Hirondelle-demer tacheté.*

Batsch, Thiere, I. p. 369. *die Kirrmöwe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 806. n. 10. β . *St. cauda emarginata, corpore variegato, macula aurium nigra.*

Pallas, Reif. Ausz. I. p. 370. *Sterna naevia.*

Linné, auserles. Abh. II. p. 296. n. 92. *die Halbmeve, Ralle.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 125. n. 156. *der meevenförmige Rall.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 153. n. 3. *Rallus (Lariformis) subtus albido-flavescent., cervice caerulefcenti - maculato, digitis marginatis.*

24. STRIA-

(5) Nach Latham eine Varietät von *Sterna Cantiana*, n. 15.

24. **STRIATA.** *Die gestreifte Meerschwalbe.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 807 n. 11. Sterna (Striata) alba, occipite nuchaque nigris, corpore supra alisque striis transversis nigris.
25. **VITTATA.** *Die Meerschwalbe mit weißer Kopfbinde.*
Latham, Syn. III. 2. p. 359. n. 11. Wreathed Tern.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 807. n. 12. Sterna (Vittata) cinerascens, capite superiore nigro vitta alba circumdato, uropygio, crisso caudaque albis.
 β. *Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 801. ad n. 12.
26. **SPADICEA.** *Die braunrothe Meerschwalbe.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 807. n. 13. Sterna (Spadicea) fusco-rubescens, crisso albo, dorsi peninis rectricibusque alarum margine albidis scapularibus remigibusque secundariis apice albis.
6. **FUSCATA.** *Die braune Meerschwalbe.*
Müller, Naturfyst. II. p. 354. n. 6. die St. Domingische Kirrmeve.
Onomat. hist. nat. VII. p. 301. die braune Meerschwalbe.
Briffon, ornith. II. p. 420. n. 7. Hirondelle-de-mer brune.
Latham, Syn. III. 2. p. 360. n. 13. Dusky Tern.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 807 n. 14. Sterna (Fuscata) cauda emarginata, corpore nigricante immaculato, pedibus rubris, rostro fusco.
7. **FISSIPES.** *Der Brandvogel.* (6)
Müller, Naturfyst. II. p. 354. n. 7. der Spaltfuß.
Bechstein,
- (6) Wird in den Synonymen und Beschreibungen häufig mit Sterna Nigra n. 3. verwechselt.

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 410. n. 3. *die schwarze Meerschwalbe.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 833. n. 5. *die schwarze Meerschwalbe.* p. 835. *Brandvogel, Maivogel, schwarze Meve, kleine schwarze Seeschwalbe, Kleinmevchen, spaltfüßige Meerschwalbe, Anselmeve.*
- Halle*, Vögel, p. 574. n. 709. *die kleine schwarze Seeschwalbe?*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 486. n. 367. *die schwarze Meerschwalbe.*
- Onomat. hist. nat.* VII. p. 300. *die schwarze Meve, Brandvogel.*
- Gesner*, Vögelb. p. 373. *Meyvögelein.*
- Briffon*, ornithol. II. p. 417. n. 4. *Hirondelle-demer noire ou Epouvantail.*
- Klein*, av. p. 138. n. 12. *Larus minor niger.*
- Klein*, Vorbereit. p. 255. n. 12. *schwarze Mewe, Meyvogel, Brandvogel.*
- Klein*, verb. Vögelh. p. 145. n. 13. *schwarze Meve.*
- Latham*, Syn. Suppl. p. 267. *Black Tern.*
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 810. n. 23. *Sterna (Fiffipes) cauda emarginata, corpore nigro, dorso cinereo.*
- Frisch*, Vögel, Tab. 715. *die kleinste Mëve.*
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 218. n. 3. *die schwarze Meerschwalbe.*
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 90. n. 108. *die Anselmeve.*
- Charleton*, onomast. zoic. p. 95. n. 4. *Larus Niger.*
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 294 *Larus minor niger; ein klein schwarze Seeschwalbe, schwarzer Mewe, Meyvogel, klein Mübeßlin.*
- Jonston*, av. p. 130. *Larus niger. Larus fiffipes primus.*

Hermann, tab. affinit. anim. p. 143. *Larus fissipes*.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 185. n. 4.
 der *Brancvogel*.

A. Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit 19 Gattungen vermehrt. Bey der 2ten Gattung sind zwey Varietäten aus einander gesetzt.

B. Unbestimmtere Thiere.

1. *Die Tiegermeye. Larus Tigrinus.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 147. n. 23.
Halle, Vögel, p. 577. n. 719.
2. *Die Helische Schneemeve.*
Klein verbess. Vögelhist. p. 147. n. 24.
Halle, Vögel, p. 577. n. 720.
3. *Die Meve mit gelbem Schnabel und Füßen.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 147. n. 25.
4. *Helisches Fischerlein.*
Klein, verbess. Vögelhist. p. 148. n. 26.
Halle, Vögel, p. 578. n. 721. das *Möwchen*.

C. Neuere Gattungen.

1. *Die Stübbersche Meerschwalbe. Kleine Stübbersche Kirke.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 828. n. 2.
2. *Die philippinische Meerschwalbe.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 805. n. 7. *Sterna*
 (*Philippina*) *vinaceo-grisea*, pileo albo, vitta
 per oculos, remigibus, cauda, rostro pedibusque
 nigris.
Latham, Syn. Suppl. p. 267. *Philippine Tern*.

78. GESCHLECHT. RYNCHOPS. *Der Verkehrt schnabel.*

Müller, Naturfyft. II. p. 355. Gen. LXXVIII.

Leske, Naturgesch. p. 283. Gen. LXVII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 25. Gen. XXXVI.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 219.
Gen. LXVII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 395. Gen. XXV.

Onomat. hist. nat. VI. p. 863.

Briffon, ornithol. II. p. 420. Gen. CIV. Ryg-
ehopsalia.

Batsch, Thiere, I. p. 366. Gen. LXXXIII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 802. Gen. XCII.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 144.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 285. Gen. XL.

1. NIGRA. *Der Wasserschneider.*

Müller, Naturfyft. II. p. 355. n. 1. *der schwarze Verkehrt schnabel.*

Leske, Naturgesch. p. 283. *der schwarze Verkehrt schnabel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 26. n. 1. *der schwarze Wasserscherer.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 219. n. 1.
Rhinchops (Nigra) nigricans, subtus alba, ro-
stro basi rubro.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 395. *der schwarze Verkehrt schnabel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 175. *der schwarze Verkehrt schnabel.*

Funke, Naturgesch. I. p. 325. *der Verkehrt schnabel.*

Ebert, Naturl. II. p. 80. *der Wasserbeißer oder Wasserscherer.*

Halle, Vögel, p. 586. n. 731. *der Wasserbeißer, die Seescheere.*

Gatterer,

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II p. 179. n. 166. *der Wasserbeißer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 483. n. 362. *der Wasser-
schneider.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 863. *der schwarze Wasser-
beißer.*

Klein, Vorber. p. 262. n. 2. *verkehrter Schnäbler.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 150. n. 2. *verkehrter,
ungleicher Schnäbler.*

Briffon, ornith. II. p. 421. n. 1. Bec-en-cifeau.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 802. n. 1. Rhyn-
chops (Nigra) nigricans, subtus alba, rostro
basi rubro.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 80. *die große Meve
mit ungleichem Schnabel.*

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 138. n. 1. Rhynchops
(Nigra) nigra, subtus alba, rostro basi rubro.

Moehring, av. gen. p. 83. n. 109. Phalacorax.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 144.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 285. *der
Wasserschneider.*

2. FULVA. *Der gelbe Verkehrt schnabel.*

Müller, Naturf. II. p. 356. n. 2. *der Fahle.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 26. n. 2. *der fahle
Wasserschere.*

Briffon, ornith. II. p. 422. n. 1. Var. A. Bec-en-
cifeau fauve.

Onomat. histor. nat. VI. p. 863. *der gelbe Wasser-
beißer.*

Latham, Syn. III. 2, p. 348.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 803. n. 1. β . Rh.
fulva, rostro nigro.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 138. n. 2. Rhyn-
chops (Fulva) fulva, rostro nigro.

* * * * *

VIERTE ORDNUNG.

GRALLAE. (*Sumpfvögel. Stelzentäufer.*)

79. GESCHLECHT. PHOENICOPTERUS.

Der Flamingo.

Müller, Naturyst. II. p. 358. Gen. LXXIX.

Leske, Naturgesch. p. 281. Gen. LXVI.

Borowsky, Thierreich, III. p. 66. Gen. XLIV.

Blumenbach, Handb. der Naturgeschichte, p. 210.
Gen. LI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 412. Gen. XXXIV.

Briffon, ornithol. II. p. 501. Gen. CXIII.

Batsch, Thiere, I p. 385. Gen. XCIII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 788. Gen. LXXXVII.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 286.
Gen. XLI.

1. RUBER. *Der (rothe) Flamingo.*

Müller, Natursystem, II. p. 358. n. I. *der Flaminge*. Tab. 14. fig. 2.

Leske, Naturgesch. p. 281 *der Flamant*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 66. n. I. *der Flaminge, Flammenvogel, Flammenreiher*. T. 44.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. I. p. 210. n. I.
Phoenicopterus (Ruber) ruber, remigibus nigris; Flamingo, Flamant, Schartenschnäbler, Korkorre.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 179. *der rothe Flamant*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 412. *der rothe Flamant*.

Funke, Naturgesch. I. p. 325. *der Flamingo*.

Ebert, Naturl. II. p. 81. *der Flaminge*. Tab. 36.

Halle,

- Halle, Vögel, p. 536. n. 637. *der Flammenreiher, Pflugschnabel.*
- Halle, Vögel, p. 538. n. 638. *der Flammenreiher mit rosenfarbenem Flügel.*
- Halle, Vögel, p. 539. n. 639. *der weiße Flammenreiher.*
- Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 179. n. 167. *der Flamant, Karminpelikan.*
- Neuer Schaupl. d. Nat. VI. p. 581. *Phoenikopter.*
- Onomat. histor. nat. VI. p. 461. *Flaminger.*
- Pennant, arct. Zoolog. II. p. 467. n. 339. *der rothe Flamant.*
- Handb. d. Naturgesch. II. p. 379. *der Flamant.*
- Klein, av. p. 126. B. *Phoenicopterus.*
- Klein, Vorbereit. p. 234. B. *Schartenschnäbler.*
- Klein, verbesserte Vögelhist. p. 133. n. 1. *rother Flamant.*
- Klein, verbess. Vögelhist. p. 134. n. 2. *rothflügelichter Flamant.*
- Klein, verb. Vögelb. p. 134. n. 3. *weißer Flamant.*
- Gesner, Vögelb. p. 402. *Flambant, Flamman.*
- Briffon, ornith. II. p. 502. *Flamant.*
- Batsch, Thiere, I. p. 387. *der Flamingo.*
- Latham, Syn. Suppl. p. 263. *Red Flamingo.*
- Latham, Syst. ornith. II. p. 788. n. 1. *Phoenicopterus (Ruber) remigibus nigris.*
- Seligmann, Vögel, III. Tab. 46. *Flamingo, Phoenicopterus.*
- Seligmann, Vögel, III. Tab. 47. *der Schnabel des Phoenicopters in natürlicher Größe.*
- Adanson, Senegall, p. 243. *Flammenreiger.*
- Pallas, Reif. Ausz. I. p. 371. *rothe Gänse.* p. 357. *der Flamingo.*
- Lepetchin, Tageb. d. russ. Reif. I. p. 321. *Flamingo oder rothe Gänse.*

- Cetti*, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 303. *der Flamant*. Tab. 5.
- Fermin*, B. Schreib. von Surinam, II. p. 125. *der Phoenikopter*.
- Molina*, Naturgesch. von Chili, p. 215. *Becharu*.
- Kolbe*, Vorgeb. d. g. Hoffnung, Edit. in 4. p. 387. *der Flamand*.
- Allgem. Reis. II. p. 168. 445. *Flamingos*. V. p. 201. Tab. 16. *der Flamingo*. XIII. p. 241. *die Fläminger*. XVII. p. 671. *Fläminge*. (genaue Beschreib. des Nests.)
- Dampier*, Reis. I. p. 134. *Flamingos*.
- Perrault*, *Charras* u. *Dodart*, Abhandl. aus der Naturgesch. II. p. 217. anatomische Beschreib. eines *Becharu* oder *Flamingos*. Tab. 69, *der Becharu*. Tab. 70. die Zergliederung.
- Frisch*, Vögel, II. Tab. 152. *der weiße Schertenschnäbler*. (Ein einjähriger Vogel.)
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 93. n. 114. *der rothe Flamand*.
- Samml. z. Phys. u. Naturgesch. I. p. 227. *der Flamingo*.
- Goeze*, nützl. All. II. p. 217. n. 22. *der Flamingo*.
- Eberhard*, Thiergesch. p. 120. *der Flamant*.
- Zablonsky*, allgem. Lex. p. 338. *Flamingos*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 139. n. 1. *Phoenicopterus* (*Ruber*) *ruber*, remigibus primoribus nigris.
- Charleton*, onomast. zöic. p. 102. n. 3. *Phoenicopterus*.
- Jonston*, av. p. 150. *Phoenicopterus*.
- Moehring*, av. gen. p. 59. n. 59. *Phoenicopterus Auctorum*.
- Hermann*, tab. aff. anim. p. 142. *Phoenicopterus*.
- Staliger*, exercit. 232. p. 730.

Heliodor, hist. aethiop. Lib. 6.

Gassend, vit. Peirese. Lib. 2. in fin.

Plin, hist. nat. L. 10. c. 48. Phoenicopterus.

Sueton, Vitell, c. 13. Caligul. c. 22. Phoenicopterus.

Martial, epigr. L. 3. ep. 71. Phoenicopterus.

Aristophan, av. v. 553. Φοινικοπτερος.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 286. n. 1. der Flamingo.

2. CHILENSIS. Der chilefische Flamingo.

Vidaure, Chile, p. 71. Flamingo.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 789. n. 2. Phoenicopterus (Chilensis) ruber, remigibus albis,

Goeze, nützl. Allerley, III. p. 124. n. 9. der Flamingo.

Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit einer Gattung vermehrt.

80. GESCHLECHT. PLATALEA. Der Löffelreiher.

Müller, Natursystem, II. p. 361. Gen. LXXX.

Leske, Naturgesch. p. 280. Gen. LXIV.

Borowsky, Thierreich, III. p. 68. Gen. XLV.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 211. Gen. LII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 413. Gen. XXXV.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 1. Gen. XXIII.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 409.

Klein, av. p. 126. Trib. III. A.

Briffon, ornith. II. p. 300. Gen. LXXIX. Platea.

Batsch, Thiere, I. p. 385. Gen. XCIV.

- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 667. Gen. LXIV.
Onomat. hist. nat. VI. p. 561.
Neuer Schauplatz der Natur, V. p. 185.
Hermann, tab. affin. anim. p. 135.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 287.
 Gen. XLII.

I. LEUCORDIA. *Die Löffelgans.*

- Müller*, Natursystem, II. p. 361. n. 1. *der weiße Löffler*. Tab. 23. fig. 2.
Leske, Naturgesch. p. 281. n. 1. *der weiße Löffelreiher*.
Borowsky, Thierreich, III. p. 68. n. 1. *der weiße Löffelreiher*. Tab. 45.
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 211. n. 1.
 Platalea (Leucordia) corpore albo, gula nigra, occipite subcristato; *die Löffelgans*.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 413. *der weiße Löffelreiher*.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 2. *der weiße Löffelreiher*. p. 4. *Löffelgans, Spatelgans, Löffler, Pelikan*.
Funke, Naturgesch. I. p. 326. *die Löffelgans*.
Ebert, Naturl. II. p. 82. *die Löffelgans*.
Halle, Vögel, p. 535. n. 635. *der weiße Löffelreiher, Pelikan*.
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 180. n. 168. *die Löffelgans*.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 410. A. *der weiße Löffelreiher*.
Onomat. histor. nat. IV. p. 798. *der weiße Löffelreiher*.
Klein, av. p. 126. n. 1. Platea, Leucordia.
Klein, Vorbereit. p. 233. n. 1. *Löffelgans*.
Klein, verb. Vögelhist. p. 132. n. 1. *weißer Löffler*.
Klein,

Klein, Vögeleyer, p. 34. Tab. 18. fig. 4.

Gesner, Vögelb. p. 364. *Löffler*, *Löffelgans*,
Leffler, *Lepler*, *Schuster*. Fig. p. 365.

Brisson, ornitholog. II. p. 300. n. 1. Spatule.

Batsch, Thiere, I. p. 388. *der weiße Löffelreiher*.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 667. n. 1. Platalea (Leucordia) corpore albo, gula nigra occipite subcristato.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 344. n. 101. *der weiße Löffler*.

Eischer, Naturgesch. von Livl. p. 84. n. 97. *Löffelgans*.

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 370. 315. *Löffelreiger*.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 13. *Löffelreiger*.

Kolbe, Vorgeb. d. g. H. Edit. in 4. p. 402. *der Pelican*. Tab. 41. *Löffelgans*.

Frisch, Vögel, Tab. 200. *der Löffelreiger mit hubbrigem Schnabel*. (das Männchen.)

Frisch, Vögel, Tab. 201. *der Löffelreiher mit glattem Schnabel*. (das Weibchen.)

Scopoli Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 95. n. 115. *die weiß rosenfarbene Löffelgans*.

Naturforscher, XIII. p. 201. n. 101. *der weiße Löffler*.

Perrault, *Charras* u. *Dodart*, Abhandl. aus der Naturgesch. II. p. 193. anatom. Beschreibung von vier Palletten, Löffel- oder Spatelgänsen. Tab. 65. *die Spatelgans*. Tab. 66. die Zergliederung.

Bechstein, Musterung schäd. Thiere, p. 126. n. 1. *der Löffelreiher*.

Linne', Syst. Natur. Edit. II. p. 48. Platea.

Linne', Syst. Nat. Ed. VI. p. 22. n. 1. Platea.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 139. n. 1. Platalea (Leucordia) corpore albo.

Müller,

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 22. n. 172. Platalea (Leucordia) corpore albo, gula nigra, capite subristato.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 341. Platea; *Löffel-Gans*, *Löffler*, *Pelican*.

Charleton, onomast. zotic. p. 103. n. 2. Ardea alba; Cochlearia, Plateola.

Hermann, tab. affinit. anim. p. 135. Pl. Leucordia.

Albert. Magn. de anim. L. 23. c. de Aedra.

Cicero, de nat. Deor. L. 2. Sect. 49. Platalea.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 40. Platalea.

Aristot. de nat. anim. L. 9. c. 10. Πελεκάνες.

Aelian. hist. anim. L. 2. c. 20. Πελεκάνες.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 287. n. 1. die *Löffelgans*.

β. *Latham*, Syst. ornith. II. p. 668. n. 1. β.

Sonnerat, Reil. n. Neuguin. p. 33. der fast ganz weiße *Löffler*, mit gelben ins rothe fallenden Füßen.

γ. *Latham*, Syst. ornithol. II. p. 668. n. 1. γ.

Sonnerat, a. a. O. der ganz weiße *Löffler*, mit einer Haube auf dem Kopfe, und hellrothen und blassen Füßen.

α. AJAJA. Der rothe *Löffelreiher*.

Müller, Naturyst. II. p. 362. n. 2. der rothe brasilianische *Löffler*. Tab. 14. fig. 2.

Leske, Naturgesch. II. p. 281. n. 2. der rothe *Löffelreiher*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 69. n. 3. der rothe brasilianische *Löffler*, der *Karminpelikan*.

Onomat. histor. nat. VI. p. 562. der rothe brasilianische *Löffler*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 409. der rothe *Löffelreiher*.

- Klein*, av. p. 126. n. 2. Platea Brasiliensis, Ajaja dicta, Colherado Lusit.
- Klein*, Vorber. p. 233. n. 2. rosenfarbener Löffler.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 132. n. 2. rosenfarbener Löffler.
- Brisson*, ornith. II. p. 302. n. 2. Spatule couleur de Rose.
- Batsch*, Thiere, I. p. 388. der rothe brasilianische Löffler.
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 668. n. 2. Platalea (Ajaja) corpore roseo, rectricibus caudae coccineis, rectricibus roseis.
- Bankroft*, Naturgeschichte von Guiana, p. 102. die gujanische Löffelgans.
- Fermin*, Surinam, II. p. 132. der Löffler.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 140. n. 2. Platalea (Ajaja) corpore sanguineo.
- Barrere*, av. p. 135. Ardea rosea Spatula dicta.
- Jonston*, av. p. 198. Ajaja. p. 213. Ayaya.
- β. *Halle*, Vögel, p. 536. n. 636. der Karminpelekan mit schwarzem Halsringe.
- Klein*, av. p. 126. n. 3. Platea sanguinea tota. Tlauquechul.
- Klein*, Vorbereit. p. 233. n. 3. ganz blutrothe Löffler.
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 133. n. 3. hochrother Löffler.
- Brisson*, ornitholog. II. p. 303. n. 3. Spatule rouge. (7)
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 668. n. 2. β. Pl. corpore sanguineo, collo candido, torque nigro, rectricibus coccineis.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 140. n. 2. β. Tlauquechul, f. Platea mexicana.

Charles.

(7) Nach *Brisson* eine eigene Gattung.

Charleton, onomast. zoic. p. 116. n. 2. Tlauquechul.

Forston, av. p. 182. Tlahquechul.

3. PYGMAEA. *Der Zwerglöffler.*

Müller, Naturf. II. p. 363. n. 3. *der Zwerglöffler.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 669. n. 3. Platalea

(Pygmaea) corpore supra fusco, subtus albo.

Onomat. hist. natur. VI. p. 563. *der Zwerglöffler.*

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 103. *die oben braune und unten weiße Platalea.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 140. n. 3. Platalea

(Pygmaea) corpore supra fusco, subtus albo.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 135. Platalea

Pygmaea.

81. GESCHLECHT. PALAMEDEA. *Der Anhima.*

Müller, Naturf. II. p. 364. Gen. LXXXI.

Leske, Naturgesch. p. 278. Gen. LIX.

Borowsky, Thierreich, III. p. 69. Gen. XLVI.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 211.

Gen. LIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 414. Gen. XXXVI.

Onomat. hist. nat. VI. p. 1.

Briffon, ornith. II. p. 348. Gen. LXXXV. Caria-

ma. p. 349. Gen. LXXXVI. Anhima.

Latham, Syst. ornith. II. p. 669. Gen. LXV.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 136. 169.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 288.

Gen. XLIII.

1. CORNUTA. *Der Anhima.*

Müller, Naturf. II. p. 364. n. 1. *der Hornträger.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 69. *der Hornträger,*

Anhima.

Blumen-

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 211. n. 1.
Palamedea (Cornuta) alulis bispinosis, fronte-
que cornuta.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 414 *der Hornträger.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 180. *der
Hornträger.*

Halle, Vögel, p. 523. n. 610. *der graue braun
gewässerte Kranich, über dem Schnabel und an
den Flügeln gehörnt.*

Onomat. hist. nat. I. p. 446. *der Anhimavogel.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 346. *der Kamichy.*

Briffon, ornithol. II. p. 349. n. 1. *Kamichy.*

Batsch, Thiere, I. p. 396. *der brasilian. Kranich.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 669. n. 1. Pala-
medea (Cornuta) alulis bispinosis, fronteque
cornuta.

Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 122. *der
gehörnte Wasserträger.*

Samml. zur Phys. und Naturgesch. II. p. 614. *Ca-
moucle, Kamichi.*

Eberhard, Thiergeschichte, p. 102. *der gehörnte
amerikanische Adler.*

Goeze, Natur, Menschenl. und Vorf. V. p. 346.
der Camoucle.

Moehring, av. gen. p. 84. n. III. Palamedaea.

Jonston, av. p. 209. Anhima Brasiliensibus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 136. Palamedea
cornuta.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 281. *der
Hornträger.*

2. CRISTATA. *Der Cariama.* (8)

Müller, Natursystem, II. p. 365. n. 2. *der Bastard-
Kranich.*

Halle,

(8) Aus diesem hat *Briffon* ein eignes Geschlecht gemacht, weil ihm die Flügelstacheln und das Horn, an der Stirne fehlen.

Halle, Vögel, p. 523. n. 609. *der graue braun gewässerte Kranich, mit dem Federbusche über dem Schnabel.*

Briffon, ornithol. II. p. 348. n. 1. *Cariama.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 669. n. 1. *Palamedea (Cristata) inermis, fronte cristata.*

Onomat. histor. nat. II. p. 646. *der brasilianische Kranich.*

Fonston, av. p. 197. *Cariama.*

82. GESCHLECHT. MYCTERIA. *Der Fabiru.* (Kahlkopf.)

Müller, Naturyst. II. p. 366. Gen. I. XXXII.

Leske, Naturgesch. p. 278. Gen. LX.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 211.
Gen. LIV.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 180.
Gen. XLIV.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 670. Gen. LXVI.

Donndorff, Handb. der Thiergeschichte, p. 288.
Gen. XIV.

I. AMERICANA. *Der amerikanische Fabiru.*

Müller, Naturystem, II. p. 366. *der brasilianische Reiher.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 80. n. 3. *der brasilianische Storch.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 211. n. 1.
Mycteria Americana.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 180. *der Fabiru.*

Halle, Vögel, p. 522. n. 607. *der weiße nackte Kranich.*

Halle, Vögel, p. 522. n. 608. *der weiße Helm-
kranich.*

Onomat.

Onomat. hist. nat. V. p. 401. *der Kahlkopf, brasilianische Reiher, Nhanduapoa.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 670. n. 1. Mycteria (Americana) alba, remigibus rectricibusque nigro-purpurascentibus.

Briffon, ornith. II. p. 306. n. 4. Cigogne du Brésil.

Batsch, Thiere, p. 392. *der brasilianische Storch.*

Samml. z. Phys. u. Naturg. II. p. 613. Touioucou.

Neueste Mannichfalt. II. p. 124. *Jabiru.*

Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 140. n. 1. Mycteria americana.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 133. Mycteria.

Jonston, av. p. 195. *Jabiru guacu* Petiguaribus;

Nhanduapoa Tupinambis; Belgis *Deurvogel.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 288. *der Kahlkopf.*

β. Müller, Natursystem, II. p. 367. *Auarou?*

Onomat. hist. nat. VII. p. 402. *Auarou?*

Briffon, ornithol. II. p. 307. n. 5. Cigogne de la Guiane.

Jonston, av. p. 195. *Jabiru* Brasiliensibus; Belgis vulgo *Negro.*

A. Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Briffons *Ciconia Guianensis*, den dieser als eine eigne Gattung ansieht, ist als Varietät von seinem *Ciconia Brasiliensis* angenommen.

B. Neuere Gattungen.

I. Der asiatische *Jabiru.*

Latham, Syn. Suppl. p. 231. Indian *Jabiru.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 670. n. 2. Mycteria (Asiatica) alba, fascia per oculos, dorso infimo, remigibus rectricibusque nigris.

83. GESCHLECHT. CANCROMA. *Der Hohl-*
*schnabel.**Müller*, Naturfyst. II. p. 361. Gen. LXXXIII.*Borowsky*, Thierreich, III. p. 105. Gen. LVI.*Blumenbach*, Handbuch der Naturgesch. p. 212.
Gen. LV.*Briffon*, ornitholog. II. p. 344. Gen. LXXXIII.
Cochlearius.*Batsch*, Thiere, I. p. 401.*Latham*, Syst. ornithol. II. p. 671. Gen. LXVII.*Hermann*, tab. affinit. animal. p. 134.*Donndorff*, Handbuch der Thiergesch. p. 289.
Gen. XLV.1. COCHLEARIA. *Der Löffelschnabel.**Müller*, Naturf. II. p. 368. n. 1. *der Löffelschnabel.**Borowsky*, Thierreich, III. p. 106. n. 2. *der Löff-*
*schnabel.**Blumenbach*, Handb. d. Naturgesch. p. 212. n. 1.
Cancroma (Cochlearia) ventre rufescente.*Briffon*, ornitholog. II. p. 344. n. 1. Cuilliere.*Latham*, Syst. ornithol. II. p. 671. n. 1. Cancro-
ma (Cochlearia) cristata cinerascens, ventre ru-
fo, vertice lunulaque cervicis nigra.*Donndorff*, Handb. der Thiergesch. p. 298. n. 1.
*der Löffelschnabel.*β. *Müller*, Naturfyst. II. p. 368. *Arapapa.**Briffon*, ornith. II. p. 345. A. Cuilliere tachetée.*Latham*, Syn. III. 1. p. 27. Spotted Boat-bill.*Latham*, Syst. ornithol. II. p. 671. n. 1. β.2. CANCROPHAGA. *Die Tamatia.* (9)*Müller*, Naturfyst. II. p. 368. n. 2. *Krebsfresser.*

Tab. 23. fig. 4.

Borowsky,(9) Nach *Latham* eine Varietät oder das Weibchen von *Cancro-*
ma Cochlearia.

Borowsky, Thierreich, II. p. 105. n. 1. *der Krebs-
fresser*. Tab 56.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 183. *der
Krebsfresser*.

Onomat. histor. nat. VII. p. 424. Tamatia.

Briffon, ornith. II. p. 345. n. 2. Cuilliere brune.

Latham, Syn. III. 1. p. 28. Brown Boat-bill.

Latham, Syst. ornith. II. p. 671. n. 1. γ . C. cristata
ta rufo-fusca, abdomine albido, vertice nigro.

Jonston, av. p. 203. Tamatia.

Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Bev der 1sten Gattung ist die Var. β aus *Briffon* hinzugekommen.

* **INGESCHOBENES GESCHLECHT.**

SCOPUS. *Der Schattenvogel.*

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 183.

Gen. LIX.

Briffon, ornith. II. p. 343. Gen. LXXXII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 672. Gen. LXVIII.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 289.

Gen. XLVI.

1. UMBRETTA. Die Umbrette.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 184. *die
Umbrette*.

Briffon, ornith. II. p. 343. n. 1. *Ombrette*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 672. n. 1. Scopus
Umbretta.

Eberhard, Thiergesch. p. 101. *der senegalische
Scopus*.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 289.
Ombrette.

84. GESCHLECHT. ARDEA. *Der Reiher.* ⁽¹⁰⁾

Müller, Naturfyst. II. p. 369. Gen. LXXXIV.

Leske, Naturgesch. p. 279. Gen. LXIII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 73. Gen. XLVIII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 212.

Gen. LVI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 416. Gen. XXXVIII.

p. 419. Gen. XXXIX. p. 420. Gen. XL.

Bechstein, Naturg. Deutschl. III. p. 5. Gen. XXIV.

p. 46. Gen. XXV. p. 59. Gen. XXVI.

Ebert, Naturl. II. p. 83 ff.

Halle, Vögel, p. 517. 524. 533.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 410.

Neuer Schaupl. d. Natur, IV. p. 740. VII. p. 81.

VIII. p. 623.

Onomat. histor. nat. I. p. 684. IV. p. 48.

Klein, av. p. 121. Gen. XVIII. p. 122. 125.

Gen. XIX. Trib. I. 2.

Briffon, ornitholog. II. p. 304. Gen. LXXX. Ci-

conia. p. 312. Gen. LXXXI. Ardea. p. 346.

Gen. LXXXIV. Balearica.

Batsch, Thiere, I. p. 386. Gen. XCVII.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 672. Gen. LXIX.

Hermann, tab. affinit. anim. p. 132 sqq.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 289.

Gen. XLVII.

* *Mit Federbüschen auf dem Kopfe: Der Schnabel ist nicht länger als der Kopf.*

I. PAVONIA. *Der Pfauenreiher.*

Müller, Naturfyst. II. p. 370. n. I. *der Pfauenreiher.* Tab. 14. fig. 3.

Leske,

(10) *Briffon* und einige neuere machen aus dem *Reiher*, *Kranich* und *Storch* drey verschiedene Geschlechter.

Leske, Naturgesch. p. 279. n. 1. *der Pfauenreiher*.
Borowsky, Thierreich, III. p. 73. n. 1. *der Pfauenreiher*. Tab. 48.

Ebert, Naturl. II. p. 85. *der gekrönte kaspische Kranich*, *Akkaviak*. Tab. 28. fig. 1.

Halle, Vögel, p. 518. n. 601. *der weiße kurz-schnäblige Kranich*, *mit trichterförmigem Federbusche*, *Wasserpfaue*, *Diademkranich*.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 187. n. 175. *der balearische Kranich*, *Pfauenreiher*, *Seepfaue*, *Königsvogel*.

Kein, av. p. 121. n. 3. *Grus Balearica*.

Klein, Vorbereit. p. 224. n. 3. *Kranich von den balearischen Inseln*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 126. n. 1. *Akkaviak*.

Briffon, ornith. II. p. 346. n. 1. *Oiseau royal*.

Batsch, Thiere, I. p. 391. *der Pfauenreiher*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 672. n. 1. *Ardea (Pavonia) caerulefcens*, *crista setosa erecta*, *temporibus palearibusque binis nudis*.

Seligmann, Vögel, VI. Tab. 87. *der gekrönte afrikanische Kranich*.

Frisch, Vögel, Tab. 195. *der afrikanische oder barbarische gekrönte Kranich*.

Perrault, *Charras* u. *Dodart*, Abhandl. aus der Naturgesch. II. p. 355. anatomische Beschreib. zweyer Königsvögel. Tab. 87. *der Königsvogel*. Tab. 88. die Zergliederung.

Linne, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 141. n. 1. *Ardea (Pavonia) cristata setosa erecta*, *temporibus palearibusque binis nudis*.

Charleton, onomast. zoic. p. 110. n. 1. *Grus Balearica*.

Charleton, onom. zoic. p. 72. n. 3. *Pavo Chinenfis sine cauda*.

- Moehring*, av. gen. p. 72. n. 83. Ciconia.
Jonston, av. p. 168. Tab. 54. Grus Balearica.
Hermann, tab. aff. anim. p. 133. Ardea pavonica.
 Gentl. Magaz. XX. Tab. p. 264. Crowned Heron.
Plin. hist. nat. L. 2. c. 37. Grus balearica.
Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 290. n. 1.
 der Pfauenreiher.

2. VIRGO. *Die numidische Jungfer.*

- Müller*, Natur syst. II. p. 371. n. 2. die numidische
 Jungfer.
Borowsky, Thierreich, III. p. 84. die numidi-
 sche Jungfer, der Gaukler.
Ebert, Naturl. II. p. 86. das Fräulein von Nu-
 midien.
Halle, Vögel, p. 521. n. 605. der Opernkranich,
 Operette. Fig. 43.
Halle, Vögel, p. 521. n. 606. der Opernkranich,
 Gaukler.
Onomatol. hist. nat. IV. p. 54. das Fräulein aus
 Numidien.
Klein, av. p. 121. n. 6. Grus Numidiae.
Klein, Vorbereit. p. 225. n. 6. Fräulein von Nu-
 midien.
Klein, verbesserte Vögelhist. p. 127. n. 7. Fräulein
 aus Numidien.
Briffon, ornith. II. p. 311. n. 12. Grue de Numi-
 die, appelée vulgairement Demoiselle de Nu-
 midie.
Batsch, Thiere, I. p. 393. die numidische Jungfer.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 673. n. 2. Ardea
 (Virgo) superciliis albis, postice retrorsumque
 longe cristatis.
Seligmann, Vögel, V. Tab. 29. die Jungfer von
 Numidien.

Pallas,

Pallas, nord. Beytr. III. p. 14. die numidische Jungfer.

Schneider, zool. Abhandl. p. 141. die numidische Jungfer.

Allg. Reif. III. p. 332. Tab. 13. fig. 3. der afrikanische oder guineische Pfau, Kaiservogel, numidische Jungfer.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 141. n. 2. Ardea (Virgo) superciliis albis, retrorsum longe cristatis.

Moehring, av. gen. p. 73. n. 84. Scops.

Forskål, descr. anim. p. 9. n. 4. Kurki?

Philos. Transact. LVI. p. 210. Tab. II. p. 215.

** Kraniche, mit kahlem Kopfe.

3. CANADENSIS. Der canadische Kranich. (1)

Müller, Naturfyst. II. p. 371. n. 3. der canadische Kranich.

Halle, Vögel, p. 520. n. 604. der große aschfarbene Kranich.

Pennant, arct. Zool. II. p. 411. n. 257. der braune Reiher.

Klein, verb. Vögelhist. p. 127. n. 5. braunbunter Kranich.

Briffon, ornith. II. p. 310. n. II. Grue de la Baye de Hudson.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 675. n. 7. Ardea (Canadensis) sincipite nudo papilloso, corpore cinereo, alis extus testaceis.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 28. der braune und aschfarbene Kranich.

Donnicorff, Handb. d. Thiergesch. p. 290. n. 2. der braune Reiher.

(1) Flügelweite 3 Fuß, 5 Zoll. Gewicht 7½ Pfund. Penn.

4. GRUS. *Der gemeine Kranich.*(²)

Müller, Naturfyst. II. p. 372. n. 4. *der gemeine Kranich.*

Leske, Naturgesch. VI. p. 279. n. 2. *der Kranich.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 82. n. 2. *der gemeine Kranich.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 212. n. 1.

Ardea (Grus) occipite nudo papilloso, corpore cinereo, alis extus testaceis; *der Kranich.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 421. n. 1. *der gemeine Kranich.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 60. n. 1. *der gemeine Kranich.* p. 70. *Kranig, Kvanch, Scherian.*

Funke, Naturgesch. I. p. 240. *der Kranich.*

Ebert, Naturl. II. p. 83. *der gemeine Kranich.*

Halle, Vögel, p. 517. n. 599. *der schwarzgraue gemeine Kranich.*

Meyer, Thiere, I. Tab. 64.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 188. n. 175. *der Kranich.*

Onomat. histor. nat. IV. p. 48. *der schwarzgraue gemeine Kranich.*

Handb. der Naturgesch. II. p. 341. *der Kranich.*

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 109. *der Kranich.*

Klein, av. p. 121. n. 1. Grus nostras. Avis Palamedis.

Klein, Vorbereit. p. 224. n. 1. *grauer Kranich.*

Klein,

(2) Die Länge dieses Vogels wird von den Ornithologen gar verschieden angegeben. *Pennant* bestimmt sie auf 6 Fuß. *Gmelin* nimmt 5 Fuß an. *Briffon* $3\frac{1}{2}$ Fuß, Flügelweite $5\frac{2}{3}$ Fuß. *Borowsky* und *Bechstein* $3\frac{1}{2}$ Fuß u. s. w. Das Gewicht ist, nach *Pennant*, 10 Pfund. Die Eyer sind von der Größe der Schwaneneyer.

Klein, verb. Vögelhist. p. 126. n. 1. *grauer Kranich*.

Klein, Vögeleyer, p. 23. Tab. 17. fig. 1.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 422. A. *der gemeine Kranich*.

Siemssen, meklenb. Vögel. p. 157. n. 1. *der Kranich, Kroon*.

Gesner, Vögelb. p. 349. *Kranich, Kran, Kranich, Krye*. Fig. p. 350.

Briffon, ornith. II. p. 307. n. 6. *Grue*.

Batsch, Thiere, I. p. 392. *der gemeine Kranich*.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 674. n. 5. *Ardea* (Grus) occipite nudo papilloso, pileo remigibusque nigris, corpore cinereo, tectricibus intimis laceris.

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 57. n. 110. *der gemeine Kranich*.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 345. n. 102. *der gemeine Kranich*.

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 270. *der Kranich*.

Fischer, Naturg. v. Livl. p. 84. n. 98. *Kranich*.

Taube, Slavon. u. Syrmien, I. p. 23. *Kraniche*.

Lepechin, Tagebuch der russ. Reise, II. p. 5. *Kraniche*.

Pallas, Reif. Ausz. I. p. 357. *der Kranich*.

Pallas, nord. Beyträge, III. p. 15. IV. p. 22. *Kraniche*.

Kolbe, Vorgeb. d. g. Hoffn. p. 401. *die Kraniche*.

Pentoppidan, Naturgesch. von Dännern. p. 170. n. 1. *Trane*.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 101. n. 122. *der Kranich*.

Rytchkow, orenb. Topogr. p. 243. *Kraniche*.

Linné, auserles. Abh. II. p. 282. n. 30. p. 285. n. 50. *der Kranich*.

- Zorn*, Petinoth. I. p. 432. II. p. 512. *der Kranich.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 45. *der Kranich.*
Naumann, Vogelsteller, p. 175. *der Kranich.*
Geoffroy, mat. med. VII. p. 371. *Kranich.*
Beschstein, Musterung schäd. Thiere, p. 131. n. 9.
der Kranich.
Goeze, nützl. All. II. p. 217. n. 23. *der Kranich.*
Oekon. Zool. p. 76. n. 17. *der gemeine Kranich.*
Schneider, zool. Abh. p. 137. 143. *der Kranich.*
Frideric. II. Imp. de art. venand. c. avib. p. 88.
Grues.
Naturf. XIII. p. 202. n. 102. *der gemeine Kranich.*
Helwing, Lithograph. Angerb. I. p. 6.
Meidinger, Vorles. I. p. 135. n. 1. *der Kranich.*
Eberhard, Thiergesch. p. 100. *der Kranich.*
Stralsund. Magazin, I. p. 157. *Kranich.*
Jablonsky, allgemein. Lex. p. 550. *Kranich.*
Krünitz, Encyklop. Art. *Kranich.*
Loniceri, Kräuterb. p. 665. *Kranich.*
Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 98.
Ludovici, Kaufmannslex. II. p. 1505.
Hübner, Handlungslex. p. 1018.
Lemmery, Materiallex. p. 504.
Hamburg. Magaz. VI. p. 594.
Wittenb. Wochenbl. XIII. p. 305. (Beschaffenheit der Luftröhre.)
Beckmann, Naturhist. p. 46. d. *der Kranich.*
Merklein, Thierreich, p. 300. *Kranich.*
Kraft, Ausrott. grauf. Thiere, I. p. 233. 251. 533.
Kranich.
Bartholin. Gruis anatome; in *hist. anat.* Cent. IV. hist. 12. p. 231.
Hartmann. anatome Gruis pinguedine suffocatae. *Eph. Nat. Curios.* Dec. II. an. 7. obs. 33. p. 71. cum fig.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 53. Grus.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 25. n. 1. Grus.

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 141. n. 4. Ardea
(Grus) vertice nudo papilloso, fronte, remi-
gibus occipiteque nigris, corpore cinereo.

Linné, fn. Suec. I. n. 131. Ardea vertice papilloso.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 22. n. 137. Ar-
dea (Grus) occipite nudo papilloso, pileo re-
migibusque nigris, corpore cinereo, tectrici-
bus intimis laceris.

Schwenkfeld, av. Sil. p. 284. Grus; *Kranich*, *Kran.*

Charleton, onomast. zoic. p. 110. n. 1. Grus.

Moehring, av. gen. p. 71. n. 79. Grus.

Fonston, av. p. 166. Grus.

Hermann, tab. affinit. anim. p. 134. Ardea Grus.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 23. L. 31. c. 16. Grues.

Hesiod. oper. et d. v. 446. Γεργαυος.

Aristot. histor. anim. L. 9. c. 14. n. 148. c. 18.

n. 165. Γεργαυοι.

Aelian. hist. anim. L. 3. c. 13. Γεργαυος.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 290. n. 3.
der Kranich.

β. GRUS JAPONENSIS. *Der japanische Kra-
nich.* (3)

Mittler, Naturfyst. Suppl. p. 110. n. 6. c. *der japa-
nische Kranich.*

Klein, av. p. 121. n. 4. Grus Japonensis. (Mit
Ardea Americana verwechselt.)

Klein, Vorbereit. p. 225. n. 4. *weißer Krahn
aus Japan.*

Klein, verbeß. Vögelhist. p. 127. n. 4. *weißer
Kranich.*

Brisson, ornith. II. p. 309. n. 9. Grue du Japon.

Latham, Syn. III. 1. p. 42. Japan Crane.

Latham,

(3) Nach *Brisson* eine eigene Gattung.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 675. n. 5. β . Ardea occipite nudo papilloso rubro, corpore albo, collo inferiore remigibusque nigris.

Allgem. Reif. XIII, p. 692. *der Tsuru*.

Berlin. Samml. X. p. 152. *der Tsuru*.

Kämpfer; Japan; in *du Halde Chin.* IV. p. 140. *der Tsuru oder Kranich*.

Charleton, onomast. zoic. p. 110. n. 2. Grus Japonensis.

Jonston, av. p. 168. Grus Japonensis.

5. AMERICANA. *Der Keichreiher.*

Müller, Naturf. II. p. 373. n. 5. *der americanische Kranich*.

[*Halle*, Vögel, p. 520. n. 603. *der weiße Kranich*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 127. n. 4.]

Mit der vorhergehenden Var. β verwechselt.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 410. n. 256. *der Keichreiher*.

Briffon, ornith. II. p. 309. n. 10. Grue d'Amerique.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 675. n. 6. Ardea (Americana) vertice, nucha temporibusque nudis papillofis, fronte, nucha remigibusque primariis nigris, corpore albo.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 50. *der weiße amerikanische Kranich*.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 142. n. 5. Ardea (Americana) vertice temporibusque nudis papillofis, fronte, nucha remigibusque primariis nigris, corpore albo.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 291. n. 4. *der Keichreiher*.

6. ANTIGONE. *Der ostindische Kranich.*

Müller, Naturf. II. p. 374. n. 6. *der ostind. Kranich*.

Klein,

Klein, av. p. 121. n. 5. *Grus indica maior*.

Klein, Vorbereit. p. 225. n. 5. *grau* *Indianer*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 127. n. 6. *grauer Indianer*.

Briffon, ornith. II. p. 308. n. 7. *Grue des Indes orientales*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 674. n. 4. *Ardea* (*Antigone*) capite nudo collarique papilloso rubris, corpore cinereo, remigibus primoribus nigris.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 89. *der große indische Kranich*.

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 142. n. 6. *Ardea* (*Antigone*) capite nudo collarique papilloso, corpore cinereo, remigibus nigris.

II. GIGANTEA. *Der sibirische Kranich*.

Müller, Natur Syst. Supplem. p. 109. n. 6. a. *der weiße Kranich*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 424. B. *der sibirische Kranich*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 674. n. 3. *Ardea* (*Gigantea*) nivea, orbitis nudis, remigibus decem primoribus nigris, rostro pedibusque rubris.

Pallas, Reif. Ausz. II. Anh. p. 16. n. 30. *Grus Leucogeranos*. Tab. I.

Pallas, Reif. Ausz. II. p. 309. III. p. 474. *der weiße Kranich*.

Pallas, nord. Beytr. III. p. 10. IV. p. 10. *der große weiße Storch*.

Lichtenberg u. *Voigt*, Magaz. f. d. Neueste u. f. w. II. I. p. 105. *die großen weißen Störche*.

Hermann, tab. aff. anim. p. 132. *Grus Leucogeranos*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 291. n. 5. *der sibirische Kranich*.

*** Störche mit nackten Augenkreisen.

7. CICONIA. Der gemeine Storch.

Müller, Natursystem, II. p. 374. n. 7. der weiße Storch. Tab. 23. fig. 5.

Leske, Naturgesch. p. 280. n. 3. der Storch.

Borowsky, Thierreich, III. p. 78. n. 1. der weiße Storch.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 212. n. 2. Ardea (Ciconia) alba, orbitis nudis remigibusque nigris, rostro, pedibus cuteque sanguineis; der Storch, Hennotter, Aehbähr.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 419. n. 1. der weiße Storch.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 48. n. 1. der weiße Storch. p. 56. gemeiner Storch, Stork, Adebar, Ebeher, Ebiger, Odoboer, Hennotter, Aehbähr.

Funke, Naturgesch. I. p. 241. der Storch.

Ebert, Naturl. II. p. 87. der Storch.

Halle, Vögel, p. 533. n. 632. der weiße Storch. Fig. 47.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 190. n. 177. der Storch.

Pennant, arct. Zool. II. p. 424. C. der weiße Storch.

Beckmann, Naturhist. p. 46. c. der Storch.

Neuer Schaupl. der Natur, VIII. p. 625. der gemeine Storch.

Onomat. hist. nat. I. p. 688. der Storch.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 336. der Storch.

Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. 109. der Storch.

Klein, av. p. 125. n. 1. Ciconia alba.

Klein, Vorber. p. 232. n. 1. bunte, weiße, gemeine Storch.

Klein, verb. Vögelhist. p. 131. n. 1. weißer Storch.

Klein,

Klein, Vögeleyer, p. 34. Tab. 17. fig. 2.

Gesner, Vögelb. p. 487. *Storck*. Fig. p. 488. gut.

Briffon, ornith. II. p. 305. n. 2. Cigogne blanche.

Batsch, Thiere, I. p. 391. *der weiße Storch*.

Latham, Syn. Suppl. p. 234. White Stork.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 676. n. 9. Ardea
(Ciconia) alba, orbitis nudis remigibusque
nigris, rostro, pedibus cuteque sanguineis.

Frisch, Vögel. Tab. 196. *der Storch*.

Beseke, Vögel, Kurlands, p. 57. n. III. *der weiße Storch*.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 346. n. 103.
der bunte oder weiße Storch.

Fischer, Naturgesch. v. Livl. p. 84. n. 99. *Storch*.

Cetti, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 274. *die Störche*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 158, n. 2. *der Storch*,
Adebaar, *Langbeen*.

Taube, Slavon. und Syrm. I. p. 23. *Störche*.

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 309. *Störche*.

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 98. *Störche*.

Rytschkow, orenburg. Topogr. p. 241. *Aist oder Sterch?*

Kämpfer, Japan, p. 141. *die Störche*.

De la Porte, Reis. I. p. 166. *Storch*.

Shaw, Reis. p. 353. *der Storch*.

Wolf, Reis. n. Zeil. p. 135. *der Storch*.

Pontoppidan, Dännemark, p. 170. n. 2. *Stork*.

Pontoppidan, Norwegen, II. p. 186. *Stork*.

Allgem. Reis. VII. p. 79. XI. p. 692. *Störche*.

Döbel, Jägerpraktik, I. p. 70. *der Storch*.

Perrault, *Charras* u. *Dodart*, Abhandl. aus der
Naturgesch. II. p. 237. anatomische Beschreib.
zweyer Störche. Tab. 73. *der Storch*. Tab. 74.
die Zergliederung.

Naumann,

- Naumann*, Vogelsteller, p. 200. *der Storch.*
Linne', auserl. Abh. II. p. 295. n. 87. *der Storch.*
Reiger.
Scopoli Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 102. n. 123.
der Storch.
 Naturf. VII. p. 38. *der weiße Storch.*
 Naturf. XIII. p. 203 n. 103. *der weiße Storch.*
Lichtenberg, Magazin f. d. Neueste u. f. w. II. I.
 p. 106. *der gemeine Storch.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 14. 67. 416. 488. 550.
 686. 711. *der Storch.*
 Stralfund. Magazin, I. p. 157. *der Storch.*
Loniceri, Kräuterb. p. 666. *Stork, Ebiger.*
 Anweisung Vögel zu fangen, u. f. w. p. 554.
der Storch.
 Oekon. Zool. p. 77. n. 18. *der Storch.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 1146. *Storch.*
Zücker, Speis. a. d. Thierreich, p. 101.
Geoffroy, mat. med. VII. p. 358. *der Storch.*
Goeze, nützl. Allerl. II. p. 218. n. 24. *der Storch.*
Lemmer, Materiallex. p. 308.
Meidinger, Vorlesung. I. p. 155. n. 2. *der Storch.*
Merklein, Thierreich, p. 369. *Storch.*
Kraft, Ausrott. grauf. Th. I. p. 285. 530. *Storch.*
Eberhard, Thiergesch. p. 99. *der gemeine Storch.*
Aldrov. encom. Cicon. in *Donav.* Amphith. I.
 p. 448.
Schollii orat. de laude Ciconiae; in Ej. prax.
 Rhetor. Frcf. 1607. 8. p. 144.
Schwalbach, diss. de Ciconiis, gruibus et hiru-
 dinibus, eorumque hybernaculis. Spir. 1630. 4.
Heinsii diss. de pia ave, Ciconia. Witt. 1637. 4.
Schoockii tract. de Ciconiis. Gröning. 1620. 12.
 Amst. 1661. 12. (Edit. emend.)
Morhof, Carmen in Ciconiam. 1667. 4.

Lettaw, diff. de Ciconiis, earumque proprietatibus. Freib. 1679. 4.

Straussii diff. de Ciconia. Gieß. 1679. 4.

Camerar. Ciconiarum admiranda natura, bonitas et praestantia; in Syst. memorab. Cent. VII. P. 64. p. 475.

Naturgesch. des Storchs. Frankf. Beytr. 1780. St. 19.

Müller, Bemerk. vom Storche. *Mylii* phys. Be- lust. St. 18. p. 538.

Paullini de grata Ciconiae pietate. Eph. Natur. Cur. Dec. II. an. 4. p. 213.

Schulze, de Ciconiae vindicta. ib. Dec. I. an. 6. et 7. obs. 166. p. 230.

Jacobaei anatome Ciconiae. Act. Hafniens. V. p. 247. *Mangeti* Bibl. Tom. II. P. I. p. 8.

Schellhammer, Ciconiae anatome. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 6. obs. 109. p. 206.

Limprecht, Ciconiae anatome. ibid. Cent. VI. obs. 18. p. 209.

Fog, diff. de Ciconiarum hybernaculis. Hafn. 1692. 4.

Von der Wiederkunft der *Störche* und Schwalben. Bresl. Nat. u. Kunstgesch. 7. Vers. p. 321. 8. Vers. p. 457. 19. Vers. p. 283. 28. Vers. p. 409.

Neu Hamburg. Magaz. St. 81. p. 195.

Mannichfaltigk. I. p. 621.

Beckmann, physik. ökon. Bibl. I. p. 339.

Böhmer, syst. litter. Handb. II. 1. p. 521.

Sturm, disput. de agricolarum regulis, p. 8.

Linné, Syst. Natur. Edit. II. p. 53. Ciconia.

Linné, Syst. N. Ed. VI. p. 25. n. 6. Ciconia alba.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 142. n. 7. Ardea (Ciconia) alba, remigibus nigris, cute sanguinea.

Müller, zool. dan. prodr. p. 22. n. 174. Ardea (Ciconia) alba, orbitis nudis remigibusque nigris, rostro, pedibus cuteque sanguineis.

Kramer, Austr. p. 348. n. 12. Ardea alba remigibus nigris.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 234. Ciconia; *Storch*, *Stork*, *Ebinger*.

Charleton, onomast. zöic. p. 102. n. 1. Ciconia.

Moehring, av. gen. p. 71. n. 81. Ardea.

Schäfer, element. ornith. Tab. 26.

Jonston, av. p. 147. Ciconia.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 23. Ciconia.

Aristot. hist. anim. L. 9. c. 20. n. 167. Πελαργος.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 292. n. 6. der *Storch*.

32. MAGUARI. *Der amerikanische Storch.*

Müller, Naturfyft. II. p. 377. ad n. 8. *Maguari*.

Halle, Vögel, p. 534. n. 634. *der weiße Storch mit rother Haut um den Augen.*

Onomat. hist. nat. II. p. 858. *der amerikan. Storch.*

Klein, av. p. 125. n. 3. Ciconia Americana.

Klein, Vorber. p. 232. n. 3. *amerikanischer Storch.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 132. n. 3. *amerikanischer Storch.*

Briffon, ornitholog. II. p. 305. n. 3. Cigogne d' Amerique.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 677. n. 10. Ardea (Maguari) alba, orbitis nudis coccineis, remigibus nigro-virescentibus, tectricibus caudae superioribus nigris.

Jonston, av. p. 198. *Maguari*.

3. NIGRA. *Der schwarze Storch.*

Müller, Naturfyft. II. p. 376. n. 8. *der schwarze Storch*,

Müller,

- Müller*, Naturfyft. Suppl. p. III. n. 8. *der braune Storch.*
- Borowsky*, Thierreich, III. p. 79. n. 2. *der schwarze Storch.*
- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 420. n. 2. *der schwarze Storch.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 56. n. 2. *der schwarze Storch.*
- Halle*, Vögel, p. 534. n. 633. *der schwarze Storch.*
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 191. n. 178. *der schwarze Storch.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 426. D. *der schwarze Storch.*
- Klein*, av. p. 125. n. 2. *Ciconia nigra.*
- Klein*, Vorber. p. 232. n. 2. *schwarze Storch.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 132. n. 2. *schwarzer Storch.*
- Klein*, Vögeleyer, p. 34. Tab. 18. fig. 1.
- Gesner*, Vögelb. p. 494. *schwarze Storck.* Fig. p. 495.
- Briffon*, ornith. II. p. 304. n. 1. *Cigogne brune.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 392. *der schwarze Storch.*
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 677. n. II. *Ardea (Nigra) nigra, orbitis nudis, pectore abdomineque albo.*
- Frisch*, Vögel, Tab. 197. *der schwarze Storch.*
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 57. n. 112. *der schwarze Storch.*
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 159. n. 3. *der schwarze Storch.*
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 85. n. 100. *schwarzer Reiher.*
- Bock*, Preussen, IV. p. 350. *der schwarze Storch.*
- Cetti*, Naturg. v. Sardin. II. p. 283. *der schwarze Reiher? Aghiron nero? Perdezornadas?*

- Rytfschkow*, orenb. Topogr. p. 241. *Aist?*
Strahlenberg, Asien, p. 421. *Störche.*
Pallas, nord. Beyträge, III. p. II. *der schwarze Storch, Aist.*
Lichtenberg, Magazin f. d. Neueste u. s. w. II. I. p. 106. *der schwarze Storch.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 103. n. 124. *der schwarze Reyher.*
Linné, auserles. Abh. II. p. 295. n. 88. *die schwarzen Reiger.*
Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 170. n. 3. *der schwarze Storch.*
 Naturf. VII. p. 40. *schwarzer Storch.*
 Naturf. XIII. p. 205. n. 104. *der schwarze Storch.*
 Stralfund. Magazin, I. p. 157.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 25. n. 5. *Ciconia nigra.*
Müller, zool. dan. prodr. p. 22. n. 175. *Ardea (Nigra) orbitis nudis, pectore abdomineque albo.*
Kramer, Austr. p. 348. n. II. *Ardea nigra pectore abdomineque albo.*
Schwenkfeld, av. Siles. p. 236. *Ciconia nigra.*
Rzaczynsk. histor. natur. Polon. p. 274. *Ciconia nigra.*
 Mus. Worm. p. 306. *Ciconia nigra.*
Fonston, av. p. 147. *Ciconia nigra.*
 Decouv. Russ. II. p. 77.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 292. n. 7. *der schwarze Storch.*

*** *Reiher. Der mittlere Vorderzehe am innern Rande gezähelt.*

27. DUBIA. *Der unbestimmte Reiher.*

Latham, Syn. Suppl. p. 232. Tab. II5.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 676. n. 8. *Ardea (Argala) cinerea, capite, collo sacculoque*

que iugulari nudis, abdomine humerisque candidis.

28. TORQUATA. *Der braunrückige Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 688. n. 42. Ardea (Torquata) occipite nigro cristato, dorso fusco, collo et abdomine fordide albis, pectore nigro, lunulis flavescensibus.

9. NYCTICORAX. *Der Nachtreiher.*

Müller, Naturfyst. II. p. 371. n. 9. *der Quackreiher.* Tab. 15. fig. 1.

Borowsky, Thierreich, III. p. 74. n. 2. *der Schildreiher.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 417. n. 2. *der Nachtreiher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 37. n. 14. *der Nachtreiher.* p. 41. *Nachtrabe, Schildreiher, Quackreiher, bunter Reiher, Focke.* Tab. 3.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 708.

Ebert, Naturl. II. p. 89. *Quackreiher.*

Halle, Vögel, p. 528. n. 617. *der Nachtreiher.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 191. n. 179. *der bunte Reiher.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 420. n. 273. *der Nachtreiher.*

Neuer Schauplatz der Natur, VI. p. 15. *Nachtrabe.*

Onomat. hist. nat. V. p. 650. *der Nacht-Reiher.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 328. *der Nachtrab.*

Klein, av. p. 123. n. 5. Ardea varia.

Klein, Vorbereit. p. 228. n. 5. *bunter Reyger, Nachtram* u. s. w.

Klein, verb. Vögelhist. p. 129. n. 7. *bunter Reyger, Focken.*

Klein, Stemmat. av. p. 29. Tab. 31. fig. 1-4.

- Klein*, Vögeleyer, p. 34. Tab. 18. fig. 2.
Gesner, Vögelb. p. 384. *Nachtram oder Nachtrabe*. Abbild. mittelm.
Briffon, ornithol. II. p. 341. n. 45. Bihoreau.
Batsch, Thiere, I. p. 391. *der Schildreiher*.
Latham, Syn. Suppl. p. 234. Night-Heron.
Latham, Syst. ornith. II. p. 678. n. 13. Ardea (Nycticorax) crista occipitis tripenni alba horizontali, dorso nigro, abdomine flavescente. (Mas.)
Frisch, Vögel, Tab. 203. *der aschgraue Reiher mit drey Nackenfedern*.
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 160. n. 4. *der Quackreiher*.
Götz, Naturgeschichte einiger Vögel, p. 86. *der Quackreiher*.
Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 351. n. 105. *der Nachtrabe*.
Cetti, Sardinien, II. p. 281. *der Schildreiher*.
Fischer, Livland, p. 85. n. 101. *Nachtrabe*.
Lepetchin, Tageb. d. ruff. Reif. I. p. 309. *schwarze Reyher*.
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *der türkische Reiher*.
S. G. Gmelin, Reif. I. p. 124.
Lapeirouse: neue schwed. Abh. III. p. 105. Ardea nycticorax.
 Naturf. XIII. p. 206. n. 105. *der Quackreiher*.
 Naturf. XV. p. 261. *der Quackreiher*.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 96. n. 116. *der Nachtreiher*, *Focke*.
Bechstein, Musterung schäd. Thiere, p. 129. n. 5. *der Nachtreiher*.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 142. n. 9. Ardea (Nycticorax) crista occipitis tripenni dependente, dorso nigro, abdomine flavescente.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 226. Ardea varia; ein bundter Reger, Schild-Reger, Focker, Focke, Nachtram.

Charleton, onomast. zoic. p. 71. n. 9. Nycticorax.

Jonston, av. p. 132. Nycticorax.

Hermann, tab. affin. anim. p. 135. A. Nycticorax.

Dec. Ruff. II. p. 77.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 293. n. 8. der Nachtreiher.

b. GRISEA. Der graue Reiher. (4)

Müller, Natursystem, II. p. 386. n. 22. der ostindische Reiher.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 38. der graue Reiher.

Briffon, ornith. II. p. 317. n. 9. Heron gris.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 678. n. 13. β.

A. capite laevi fusco, corpore fuscescente subtus albo, remigibus primoribus apice macula alba. (Femina.)

Dec. Ruff. II. p. 146.

29. JAMAICENSIS. Der jamaicische Reiher. (5)

Latham, Syst. ornith. II. p. 679. n. 14. Ardea (Jamaicensis) subcristata fusca, collo abdomine-

Ppp 4 que

(4) In der XIIten Edition nahm Linné diesen Reiher mit *Briffon* als eine eigne Gattung an. *Briffon* beschreibt ihn umständlich, ohne irgend ein Synonym anzuführen. *Gmelin* und *Latham* betrachten ihn als das Weibchen von *A. Nycticorax*. Wenn man aber erwägt was *Bechstein* a. a. O. p. 38, S. G. *Gmelin*, Reif. I. p. 114, und *Lapeyrouse*, neue schwed. Abh. III. p. 105. darüber sagen, so scheint die Sache noch nicht so ganz ausgemacht zu seyn.

(5) Nach *Latham* ist es noch ungewiß, ob diese Gattung vom Weibchen der *A. Nycticorax* wirklich verschieden sey.

que fusco alboque striatis, tectricibus alarum apice macula triangulari alba.

30. CALEDONICA. *Der neucaledonische Reiher.* (6)
Latham, Syst. ornithol. II. p. 679. n. 15. Ardea
 (Caledonica) fusco-ferruginea, subtus superciliisque albis, vertice nigra, crista occipitis tripenni alba.
31. CAYENNENSIS. *Der cayennische Reiher.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 680. n. 17. Ardea
 (Cayanensis) crista sexpenni, corpore caeruleo-cinereo, dorso striis nigris, capite nigro, pileo fasciaque suboculari albis.
10. PURPUREA. *Der Purpurreiher.*
Müller, Naturfyst. II. p. 378. n. 10. *der Purpur-Reiher.* Tab. 15. fig. 2.
Borowsky, Thierreich, III. p. 74. n. 3. *der Purpurreiher.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 18. n. 3. *der Purpurreiher.* Tab. 2. p. 21. *Bergreiher.*
Briffon, ornithol. II. p. 321. n. 14. Héron pourpré hupé.
Batsch, Thiere, I. p. 391. *der Purpurreiher.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 697. n. 72. Ardea
 (Purpurea) occipite nigro, crista dependente, pennis duabus elongatis, corpore olivaceo, subtus purpurascente.
Lepechin, Tageb. d. russ. R. I. p. 324. *purpurfarbener Reyher.*
6. ARDEA CASPIA. *Der caspische Reiher.* (7)
Latham, Syn. Suppl. p. 237. African Heron.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 698. n. 73. Ardea
 (Caspica) cristata, corpore cinereo, collo, pectore

(6) Nach *Latham* vielleicht eine Spielart von *A. Nycticorax*.

(7) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

stomacho abdomineque ferrugineis, gula alba, collo lineis tribus nigris.

12. MAIOR. *Der große Reiher.* (8)

Müller, Naturf. II. p. 380. n. 12. *der blaue Reiher.*

Bachstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 15. n. 2. *der große Reiher.* Tab. I. ib. p. 707.

Halle, Vögel, p. 524. n. 611. *der graue Reiher mit dem Federbusche.* Fig. 44.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 413. n. 260. *der gemeine Reiher.*

Gesner, Vögelb. p. 443. *ein anderes Reigelgeschlecht.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 161. n. 5. *der Reiher, Schittreiher.*

Briffon, ornithol. II. p. 313. n. 2. *Heron hupé.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 691. n. 54. *Ardea (Cinerea) occipite crista nigra dependente, corpore cinereo, collo subtus linea fasciaque pectorali nigris. (Mas.)*

Frisch, Vögel, Tab. 199. *der Reiger mit weißer Platte.*

Molina, Naturgesch. von Chili, p. 207. *der graue europäische Reiher.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 98. n. 117. *der aschgraue Reyher.*

Zinnan. Uov. p. 113. Tab. 21. fig. 101. *Garza cinerizia grossa.*

b. CINEREA. *Der gemeine Reiher.* (9)

Müller, Naturf. II. p. 378. n. 11. *der graue Reiher.* Tab. 23. fig. 6.

Ppp 5

Leske,

(8) S. die folgende Anmerkung.

(9) Briffon, Linné u. a. m. haben diesen Reiher als eine eigne Gattung aufgeführt. Neuere Ornithologen geben ihn für das Weibchen

Leske, Naturgeschichte, p. 280. n. 4. *der graue Reiher*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 75. n. 4. *der graue Reiher*.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 212. n. 3. Ardea (Cinerea) occipite nigro laevi, dorso caerulescente, subtus albido, pectore maculis oblongis nigris; *der graue Reiher, Fischreiher*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 416. n. 1. *der gemeine Reiher*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 5. n. 1. *der gemeine Reiher*. p. 13. *der Reiher, Reyer, Reiger, graue Reiher, große Kammreiher, Fischreiher*. it. p. 706.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 192. n. 180. *der Reiher u. f. w.*

Onomat. histor. nat. I. p. 689. *der aschgraue Reiher, große Kammreiher*.

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 109. *der Reiher, Fischreiher*.

Klein, av. p. 122. n. 1. Ardea Pella, pulla, cinerea.

Klein, Vorbereit. p. 226. n. 1. *grauer, blauer, aschfarbener Reyer, Reihel, Heergans*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 128. n. 1. *grauer Reyer*.

Gesner, Vögelb. p. 436. *aschfarbener oder grauer Reigel*; mit 1 Fig.

Beckmann, Naturhist. p. 46. a. *der Reiher*.

Briffon, ornith. II. p. 312. n. 1. Héron.

Batsch, Thiere, I. p. 390. *der graue oder gemeine Reiher*.

Latham,

Weibchen von *Ardea Maior* aus. Die Sache scheint aber so ganz ausgemacht noch nicht zu seyn. *Bechstein* hat a. a. O. p. 13 ff. die Gegengründe sehr überzeugend aus einander gesetzt. Im Magen eines Weibchens vom gemeinen *Reiher* fand dieser eine *gemeine Spitzmaus*.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 691. n. 54. *Ardea*
occipite nigro laevi, dorso caerulefcente, sub-
tus albida, pectore maculis oblongis nigris.
(*Femina.*)

Frisch, Vögel, Tab. 198. *der gemeine Reiher.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 161. β. *der unge-
häubte Reiher.*

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 58. n. 113.
der graue Reiher.

Bock, Naturgesch. v. Preußen, IV. p. 351. n. 106.
der graue aschfarbige Reiher.

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 284.
Airon nero.

Fischer, Livl. p. 85. n. 102. *grauer Reiher.*

Leem, Finnm. p. 130. *Guorga.*

Olaffen, Isl. I. p. 190. *Hegre.*

Lepechin, Tagebuch der russ. Reise, I. p. 309.
graue Reyher.

Pontoppidan, Naturgesch. von Dännem. p. 170.
n. 4. *Fischreiher oder Fischhäher.*

Pontoppidan, Naturhistorie von Norwegen, II.
p. 146. *Heire.*

Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 131. *der
aschfarbene Reiger.*

Naturf. XIII. p. 207. n. 106. *der graue Reyger.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 69. *Fisch-Reiher oder
Reiger.*

Loniceri, Kräuterb. p. 674. *Reyger.*

Naumann, Vogelsteller, p. 189. *Reiger.*

Sander, Nat. u. Rel. p. 228. *Reiher.*

Bechstein, Musterung schäd. Thiere, p. 127. n. 2.
der gemeine Reiher.

Goeze, nützl. Allerl. II. p. 219. n. 25. *der Fisch-
reiher.*

Zorn, Petinoth. II. p. 417. *der Reiger, Fischreiger.*
Oekon.

- Oekon. Zool. p. 77. n. 28. *der gemeine Reiher.*
 Geoffroy, mat. med. VII. p. 348. *der graue Reiher.*
 Merklein, Thierreich, p. 342. *Reyer.*
 Kraft, Ausrott. grauf. Thiere, I. p. 284. *Fisch-Reyher.*
 Zückert, Speif. a. d. Thierreich, p. 101.
 Hannöv. Magaz. 1780. p. 422.
 Ludovici, Kaufmannslex. II. p. 1500. IV. p. 1016.
 Lemmery, Materiallex. p. 94.
 Meidinger, Vorlesung. I. p. 136. n. 3. *der graue Reiher.*
 Jablonsky, allgem. Lex. p. 904. *Reiger.*
 Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 53. Ardea cinerea.
 Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 25. n. 3. Ardea cinerea cristata.
 Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 143. n. 10. Ardea (Cinerea) occipite crista pendula, dorso caerulefcente, subtus albida, pectore maculis oblongis nigris.
 Müller, zoolog. dan. prodr. p. 22. n. 176. Ardea (Cinerea) occipite nigro laevi dorso caerulefcente; subtus albida, pectore maculis oblongis nigris.
 Mus. Worm. p. 307. Ardea.
 Schwenkfeld, av. Siles. p. 223. Ardea subcaerulea; *aschenfarbener Reger, blauer Reger, grauer Reigel.*
 Jonston, av. p. 151. Ardea cinerea maior.
 Schäfer, element. ornith. tab. 21.
 Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 293. n. 9. *der Fischreiher.*

c. ARDEA RHENANA. *Der Rheinreiher.*

- Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 12. c.
 Latham, Syst. ornitholog. II. p. 692. ad n. 54.

13. GARZETTA. *Der kleine Silberreiher.*

Müller, Naturfyſtem, II. p. 381. n. 13. *der weiße Reiher.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgeſch. p. 213. n. 4.
Ardea (Garzetta) occipite criſtato, corpore albo,
roſtro nigro, loris pedibusque viſcentibus.

Bechſtein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 43. n. 16.
der kleine Silberreiher.

Halle, Vögel, p. 526. n. 614. *der kleine weiße Reiher?*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
II. p. 194. n. 181. *der kleine weiße Reiher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 415. n. 264. *der kleine Silberreiher.*

Briffon, ornith. II. p. 322. n. 16. Aigrette.

Latham, Syſt. ornithol. II. p. 694. n. 64. Ardea
(Garzetta) occipite criſtato, corpore albo, ro-
ſtro nigro, loris pedibusque viſcentibus.

Bock, Naturgeſch. v. Preußen, IV. p. 353. *der kleine weiße Reiher.*

Naturf. XIII. p. 208. *der weiße Reyger?*

Lapeirouſe: neue ſchwed. Abh. III. p. 106. Ardea
Garzetta.

Bechſtein, Muſterung ſchäd. Thiere, p. 129. n. 6.
der kleine Silberreiher.

Kramer, Auſtr. p. 346. n. 3. Ardea tota alba, cri-
ſta dependente, roſtro ſuperius nigro, inferius
albido, pedibus nigris; *kleiner weißer Rager.*

Charleton, onom. zoic. p. 103. Garzetta.

Jonſton, av. p. 153. Garzetta.

32. LEUCOGASTER. *Der weißbäuchige Reiher.*

Latham, Syſt. ornitholog. II. p. 694. n. 62. Ardea
(Leucogaster) criſtata; caeruleo-nigricans, alis
ſubtus, abdomine femoribusque albis.

33. RUFESCENS. *Der röthliche Silberreiher.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 416. n. 265. *der röthliche Silberreiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 694. n. 61. Ardea (Rufescens) cinereo-nigricans, capite, collo dorsoque postico fulvo-rufis.

34. EGRETТА. *Der große Silberreiher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 41. n. 15. *der große Silberreiher.* p. 43. *der türkische, indische Reiher.* Tab. 4.

Pennant, arct. Zool. II. p. 415. n. 263. *der große Silberreiher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 694. n. 63. Ardea (Egretta) occipite cristato, corpore albo, penis scapularibus longissimis laceris, rostro pedibusque nigris.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 24. Ardea Egretta.

Jonston, av. p. 204. *Guiratinga?*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 294. n. 10. *der Silberreiher.*

35. AGAMI. *Der Agami.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 699. n. 79. Ardea (Agami) cristata caerulea, orbitis gulaque albis, collo supremo, corpore subtus femoribusque rufis.

14. COCOI. *Der Cocol.*

Müller, Naturyst. II. p. 381. n. 14. *der aschgraue Reiher.*

Briffon, ornith. II. p. 314. n. 3. Heron hupé de Cayenne.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 699. n. 80. Ardea (Cocol) occipite crista dependente, dorsoque
cine-

cinereis, collo subtus nigro maculato, capitis lateribus nigris.

Jonston, av. p. 203. Coci Brasiliensibus.

36. JOHANNÆ. *Der Reiher von der Insel Johanna.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 700. n. 82. Ardea (Johannæ) crista occipitis nigra, corpore supra griseo, subtus albo, collo antice maculis remigibusque nigris.

37. HOACTLI. *Der Hoactli.*

Briffon, ornith. II. p. 319. n. II. Heron hupé du Mexique.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 700. n. 84. Ardea (Hoactli) crista capitis nigra, corpore nigro-virescente, subtus albo, alis caudaque cinereis.

Jonston, av. p. 183. Hoactli sive Tobactli.

38. HOHU. *Der Hohu.*

Briffon, ornithol. II. p. 315. n. 5. Heron cendré du Mexique.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 701. n. 85. Ardea (Hohou) cristata cinerea, fronte albo nigro-que varia, alis albo cinereo et cyaneo variis, pedibus variegatis.

35. HERODIAS. *Der Riesenreiher.*

Müller, Naturfyst. II. p. 381. n. 15. *der Riese.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 195. n. 183. *der Riese.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 412. n. 258. *der große Reiher.*

Klein, av. p. 125. n. 14. Ardea cristata maxima americana.

Klein, Vorbereit. p. 231. n. 14. *höchster amerikanischer Reyger.*

Klein,

Klein, verb. Vögelhist. p. 131. n. 17. *höchster amerikanischer Reyger.*

Briffon, ornith. II. p. 318. n. 10. Heron hupé de Virginie.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 692. n. 56. Ardea (Herodias) occipite cristato, dorso fusco, femoribus rufis, pectore maculis oblongis nigris.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 108. *der größte amerikanische Reyger mit dem Federbusche.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 98. n. 118. Ardea Herodias.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 143. n. 11. Ardea (Herodias) occipite cristato, dorso cinereo, femoribus rufis, pectore maculis oblongis nigris.

39. LUDOVICIANA. *Der louisianische Reiher.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 417. n. 267. *der louisianische Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 690. n. 51. Ardea (Ludoviciana) cristata cinerea, collo abdomineque rufis, vertice, alis caudaque viridi-nigricantibus.

16. VIOLACEA. *Der gelbköpfige Reiher.* (10)

Müller, Natursystem, II. p. 382. n. 16. *Violet-Reiher.*

Halle, Vögel, p. 529. n. 623. *der blaue Reiher mit gelbem Federbusche.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 196. n. 184. *der Violetreiher.*

Pennant,

(10) Gewicht 1 1/2 Pfund. Brütet auf den Bahamainseln unter den Büschen auf den Felsen, und ist daselbst in so ungeheurer Menge, daß zwey Personen, die auf das Ausnehmen der Jungen ausgehen, in wenig Stunden ein kleines Boot damit anfüllen können. Sie werden auf den Büschen und Felsen sitzend gefangen, und suchen auch nicht zu entweichen, ob sie gleich ihre völlige Größe erreicht haben.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 417. n. 269. *der Gelbkopf.*

Klein, av. p. 124, n. 9. *Ardea stellaris cristata americana.*

Klein, Vorbereit. p. 229. n. 9. *blauer Reiher mit einer gelben Mütze.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 130. n. II. *blauer Reyger mit gelber Mütze.*

Briffon, ornitholog. II. p. 337. n. 41. *Crabier de Bahama.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 690. n. 50. *Ardea (Violacea) occipite luteo, crista alba, corpore albo nigroque striato, subtus caerulescente, pedibus luteis.*

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 58. *amerikanische Rohrdommel mit dem Federbusch.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 353. n. 108. *der violette Reyher??*

Naturf. XIII. p. 208. n. 108. *der Violett-Reyger??*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 143. n. 12. *Ardea (Violacea) crista flava, corpore nigro-caerulescente, fascia temporali alba.*

17. CAERULEA. *Der blaue Reiher.* (1)

Müller, Natur Syst. II. p. 383. n. 17. *der Krabbenfresser.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 417. n. 268. *der blaue Reiher.*

Klein, av. p. 124. n. 7. *Ardea cyanea.*

Klein, Vorbereit. p. 229. n. 7. *hochblauer karolinischer Reyger.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 130. n. 9. *hochblauer Caroliner.*

Halle,

(1) Gewicht 15 Unzen. Scheint in Jamaica zu überwintern.

Halle, Vögel, p. 529. n. 621. *der blaue Reiher mit dem Federbusche.*

Briffon, ornith. II. p. 338. n. 42. *Crabier bleu.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 689. n. 48. *Ardea* (Caerulea) occipite cristato, corpore caeruleo, crista colloque violaceis.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 51. *der blaue Reiher.*

Linné, auserl. Abhandl. II. p. 279. n. 7. *der blaue Reiher.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 143. n. 13. *Ardea* (Caerulea) occipite cristato, corpore caeruleo.

β. *Der blaue Reiher mit braunrothen Kopf und Hals.* (2)

Latham, Syn. III. 1. p. 79. n. 45. A. Blue Heron.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 690. n. 49. *Ardea* (Caerulefcens) cristata, corpore obscure caeruleo, capite colloque fusco-rufis, occipite pennis duabus elongatis.

γ. *Der grün-blaue Reiher mit weißen Kinn u. Kehle.*

Latham, Syn. III. 1. p. 79. n. 45. B. Blue Heron.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 689. n. 48. β. *Ardea* subcristata viridi-caerulea, gula iuguloque albis.

δ. *Der stahlfarbene Reiher.* (3)

Briffon, ornitholog. II. p. 337. n. 40. *Crabier du Brésil.*

Latham, Syn. III. 1. p. 80. n. 45. C. Blue Heron.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 689. n. 48. γ. A. fusco flavo cinereoque varia, supra nigro-chalybea subtus alba, remigibus rectricibusque virescentibus.

Forstön, av. p. 204. *Ardeola.*

(2) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

(3) Nach *Briffon* eine eigene Gattung.

40. RUBIGINOSA. *Der Reiher mit rostfarbigem Schnabel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 421. n. 275. *der Reiher mit dem rostfarbigen Schnabel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 693. n. 58. Ardea (Rubiginosa) subcristata ferruginea, gula alba, abdomine albo nigro striato, collo subtus lineis quatuor nigris.

38. HUDSONIAS. *Der hudsonische Reiher.*

Müller, Naturf. II. p. 384. n. 18. *der hudson. Reiher.*

Halle, Vögel, p. 520. n. 602. *der braunbunte Kranich.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 413. n. 259. *der Reiher mit rothen Schultern.*

Briffon, ornitholog. II. p. 316. n. 7. Heron de la Baye de Hudson.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 693. n. 57. Ardea (Hudsonias) vertice cristato nigro, corpore fuscescente, subtus albido, collo subtus nigro-rufescente maculato.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 27. *der große Kranich von der Hudsonsbay.*

41. COMATA. *Deo Squakko-Reiher. (4)*

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 46. *der Squakko-Reiher.*

Briffon, ornith. II. p. 335. n. 37. Crabier jaune.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 687. n. 39. Ardea (Comata) cristata luteo-rufescens, uropygio, corpore subtus, alis caudaque albis.

Pallas, Reif. Ausz. II. p. 240. *ein vortrefflich schönes gelbbraunes Reigerchen mit langen Haupt- und Nackenfedern.*

Q 99 2

Pallas,

(4) *Bechstein* hält ihn für das Männchen von *Ardea Castanea* p. 633. n. 46.

Pallas, Reif. Ausz. II. Anh. p. 17. n. 31. Ardea comata.

β. *Latham*, Syn. III. 1. p. 75. n. 39. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 687. n. 39. β.: A. alba, capite superiore, cervice, pectore dorsoque rufescentibus, capite laevi.

γ. A. fronte colloque albido testaceo nigroque striatis, alis testaceis, uropygio abdomine femoribusque albis. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 687. n. 39. γ.

42. ERYTHROCEPHALA. *Der rothköpfige Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 688. n. 43. Ardea (Erythrocephala) occipitis crista dependente rubra, corpore albo.

43. THULA. *Der Thula.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 688. n. 44. Ardea (Thula) occipitis crista, et toto corpore albis.

44. CYANOCEPHALA. *Der blauköpfige Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 688. n. 45. Ardea (Cyanoccephala) vertice cristato dorsoque caeruleis, alis nigris, margine albis.

45. CANDIDISSIMA. *Der schneeweiße gehäubte? Reiher.*

Ist nach *Latham* mit *Ardea Nivea*, p. 640. n. 59. einerley.

46. CASTANEA. *Der Rallenreiher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 45. n. 17. der Rallenreiher.

Latham, Syst. ornith. II. p. 687. n. 40. Ardea (Castanea) cristata alba, lateribus capitis colloque castaneo flavis, dorso castaneo, remigibus intus rectricibus apice albo maculatis.

Scopoli,

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 100. n. 121.
der kleine Reyher.

Decouv. Ruff. I. p. 164.

47. SQUAIOTTA. *Der schwarz und weiß gehäubte italienische Reiher.*

Briffon, ornith. II. p. 333. n. 33. Crabier.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 686. n. 36. Ardea (Squaiotta) cristata castanea, pennis scapularibus basi albis, crista medio alba, lateribus nigra.

Charleton, onomast. zoic. p. 103. n. 6. Squaiotta Italarum.

Jonston, av. p. 153. Squaiotta Italarum.

48. GALATEA. *Der milchweiße, karmoisinrothfüßige Reiher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 696. n. 68. Ardea (Galatea) occipite subcristato, corpore lacteolo, rostro luteo, pedibus coccineis.

49. FERRUGINEA. *Der rostfarbene Reiher.* (5)

Latham, Syst. ornith. II. p. 688. n. 41. Ardea (Ferruginea) subcristata nigricans rufo-maculata, subtus rufo albido cinereo fuscoque variegata.

88. ERYTHROPUS. *Der rothfüßige Reiher.*

Briffon, ornith. II. p. 334. n. 35. Crabier roux.

Latham, Syst. ornith. II. p. 686. n. 38. A. (Erythropus) cristata croceo-castanea, subtus saturatior, rostro caeruleo, pedibus rubris.

Lapeirouse: neue schwed. Abhandl. III. p. 106.

19. STRIATA. *Der guianische gestreifte Reiher.*

Müller, Natursyst. II. p. 384. n. 19. der gestreifte Reiher.

Q 9 9 3

Latham,

(5) Nach Bechstein a. a. O. III. p. 39. ein altes Weibchen von Ardea Nycticorax.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 691. n. 52. Ardea (Striata) occipite subcrifato, dorfo cano striato, collo fubtus ferrugineo, remigibus fecundariis apice albis.

Bankroft, Naturgefch. von Guiana, p. 103. *der guianifche Reiher*.

DeCouv. Ruff. II. p. 146.

20. VIRESCENS. *Der grüne Reiher*.

Müller, Naturf. II. p. 385. n. 20. *der grüne Reiher*.

Halle, Vögel, p. 528. n. 618. *der grüne Nachtreiher*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 416. n. 266. *der grüne Reiher*.

Klein, av. p. 123. n. 6. Ardea stellaris minima.

Klein, Vorbereit. p. 228. n. 6. *grüne Nachtrabe*.

Klein, verb. Vögelh. p. 130. n. 8. *grüne Nachtrabe*.

Briffon, ornith. II. p. 339. n. 43. Crabier verd.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 684. n. 31. Ardea (Virescens) occipite subcrifato, dorfo viriditente, pectore rufefcente, loris luteis, rectricibus viridi-aureis. (*Mas.*)

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 60. *die kleinste Rohrdommel*.

Linné, auserl. Abh. II. p. 279. n. 9. *der grünliche Reiher*.

Neueste Mannichf. I. p. 569. *der Krabbenfresser*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 144. n. 15. Ardea (Virescens) occipite subcrifato, dorfo viridi, pectore rufefcente.

b. *Briffon*, ornithol. II. p. 340. n. 44. Crabier verd tachteté. (6)

Latham, Syst. ornith. II. p. 684. n. 31. A. fusca viridi-aurea, corpore fubtus albido, collo rufefcente

(6) Nach *Briffon* eine eigene Gattung.

fescente albo striato, tectricibus alarum remigibusque albo maculatis. (*Femina.*)

β. *Latham*, Syn. III. I. p. 63. n. 30. Var. A.

Latham, Syft. ornithol. II. p. 684. n. 31. β. A. cristata cinerea, collo antice albo striis rufis, tectricibus alarum virescentibus, rufo marginatis, vertice caudaque nigris.

γ. *Klein*, av. p. 124. n. 8. Ardea fusca. (7)

Klein, Vorber. p. 229. n. 8. *brauner Reyger*.

Klein, verbeff. Vögelhist. p. 130. n. 10. *brauner Reyger*.

Halle, Vögel, p. 529. n. 622. *der braune Reiher*.

Briffon, ornithol. II. p. 332. n. 32. Butor tacheté d'Amérique.

Latham, Syn. III. I. p. 70.

Latham, Syft. ornith. II. p. 685. n. 31. γ. A. fusca, subtus dilutior, alis albo punctulatis, remigibus rectricibusque caerulescenti-cinereis.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 56. *amerikanische Rohrdommel*.

21. STELLARIS. Die Rohrdommel.

Müller, Natursystem, II. p. 385. n. 21. *die Rohrdommel*. Tab. 15. fig. 5.

Leske, Naturgesch. II. p. 280. n. 5. *die Rordommel*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 76. n. 5. *der Rohrdommel*.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 213. n. 5. Ardea (Stellaris) capite laeviusculo, supra testacea, maculis transversis, subtus pallidior, maculis oblongis fuscis; *die Rohrdommel, der Iprump*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 418. n. 4. *der Rohrdommel*.

Q 9 9 4

Bech-

(7) Nach *Briffon*, *Klein* u. a. eine eigene Gattung.

- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 24. n. 8.
der Rohrdommel. p. 30 *Rohrtrummel, Waf-*
serochs, Moosochse, Mooskrähe, Moosreier,
Rohrbrüller, Urrind, Meerrind, Rohrpompe,
Moosriegel, Erdbull, Hortyhel.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 245. *die Rohrdommel.*
- Ebert*, Naturl. II. p. 89. *die Rohrdommel.*
- Halle*, Vögel, p. 527. n. 616. *der Rohrdommel.*
 Fig. 45.
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
 II. p. 196. n. 186. *die Rohrdommel.*
- Beckmann*, Naturhist. p. 46. b. *der Rohrdommel.*
- Neuer Schaupl. der Natur, VII. p. 225. *Rohr-*
dommel.
- Onomat. hist. nat. I. p. 690. *Rohrdommel.*
- Handb. d. Naturgesch. II. p. 325. *der Rohrdommel.*
- Handb. d. deutsch. Thierg. p. 110. *Rohrdommel.*
- Klein*, av. p. 123. n. 4. *Ardea stellaris.*
- Klein*, Vorber. p. 227. n. 4. *Moosriegel, Rohr-*
drummel, Rohrtrumm.
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 129. n. 4. *Rohrdom-*
mel u. s. w.
- Klein*, stemm. av. p. 29. Tab. 32. a. b.
- Klein*, Vögeleyer, p. 34. Tab. 18. fig. 3.
- Gesner*, Vögelb. p. 439. *Moßriegel oder Urrind;*
 mit 1 Fig. p. 440. *Ocnus, Meerrind, Moß-*
kuh, Rortrumm, Rordrumb, Rorreigel, Lor-
rind.
- Briffon*, ornith. II. p. 327. n. 24. *Butor.*
- Ratsch*, Thiere, I. p. 390. *der Rohrdommel.*
- Latham*, Syn. Suppl. p. 234. *Bittern.*
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 680. n. 18. *Ardea*
 (*Stellaris*) capite laeviusculo, supra testacea,
 maculis transversis, subtus pallidior, maculis
 oblongis fuscis.

Beseke, Vögel Kurlands, p. 58. n. 114. *die Rohrdommel.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 163. n. 6. *die Rohrdommel, Ruhrdump.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 353. n. 109. *die Rohrdommel.*

Cetti, Sardinien, II. p. 282. *die Rohrdommel.*

Fischer, Naturgesch. v. Livl. p. 85. n. 103. *Rohrdommel.*

Taube, Slavon. u. Syrm. I. p. 23. *Rohrdommel.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 8. *der Reiger.* (Buik.)

Pontoppidan, Dännemark, p. 170. n. 5. *Rohrdommel.*

Döbel, Jägerpraktik, I. p. 70. *Rohrdommel.*

Naumann, Vogelsteller, p. 190. *Rohrdommel.*

Scopoli Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 103. n. 125. *die Rohrdommel, Moosochse.*

Naturf. XIII. p. 208. n. 109. *die Rohrdommel.*

Lichtenberg, Magazin f. d. Neuëste u. s. w. II. 4. p. 151. *Reiger.*

Bechstein, Musterung schädli. Thiere, p. 128. n. 3. *die Rohrdommel.*

Jablonsky, allgemein. Lex. p. 934. *Rohrdommel.*

Eberhard, Thiergesch. p. 101. *die Rohrdommel.*

Meidinger, Vorles. I. p. 136. n. 4. *die Rohrdommel.*

Hannöv. Magaz. 1780. p. 423. 424.

Valentini anat. Ardeae Stellaris. Eph. Nat. Cur. Vol. I. obs. 131. p. 283.

Bresl. Nat. u. Kunstgesch. 34 Verf. p. 650. (Anat.)

Muralto, de Ardea Stellari. Eph. Nat. Curios. Dec. II. an. 2. obs. 31. p. 60. c. f.

Linne, Syst. Nat. Edit. VI. p. 25. n. 4. Ardea Stellaris.

Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 144. n. 16. Ardea (Stellaris) capite laeviusculo, supra testacea,

Qq 5 maculis

maculis transversis, subtus pallidior, maculis oblongis fuscis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 22. n. 177. Ardea (Stellaris) capite laeviusculo, supra testacea, maculis transversis, subtus pallidior maculis oblongis fuscis.

Kramer, Austr. p. 347. n. 9. Ardea vertice nigro, collo pallido, maculis longitudinalibus ferrugineo nigris, pedibus viridibus; *Mooskuh, Rohrtrummel*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 225. Ardea stellaris; *Moos-Reigel, Rohr-Drummel*.

Mus. Worm. p. 307. Ardea Stellaris.

Charleton, onomast. zoic. p. 103. n. 5. Ardea stellaris, Asterias.

Fonston, av. p. 153. Ardea stellaris minor.

Zimman. Uov. p. 112. tab. 20. fig. 100. Garza bionda o di color d'oro.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 135. Ardea Stellaris.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 294. n. 11. die Rohrdommel.

β. Die Rohrdommel aus der Hudsonsbay. (8)

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 420. n. 274. der Rohrdommel.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 129. n. 5. Rohrdommel aus der Hudsonsbay.

Briffon, ornithol. p. 328. n. 25. Butor de la Baye de Hudson.

Latham, Syn. Suppl. p. 67.

Latham, Syst. ornith. II. p. 680. n. 18. β.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 31. der Reiger aus der Hudsonsbay.

(8) Nach *Briffon* eine eigene Gattung.

50. **BOTAURUS.** *Der schwarz gescheitelte italienische Reiher.*

Briffon, ornith. II. p. 330. n. 28. grand Butor.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 698. n. 74. Ardea (Botaurus) cristata, cinereo-fusca, subtus rufa, vertice nigro, gula iuguloque albo striis nigris.

Gesner, Vögelb. p. 441. Ardea stellaris maior; *große Korreigel.* Fig. p. 441.

Jonston, av. p. 154. Ardea stellaris maior.

51. **SOLONIENSIS.** *Der braunrothe italienische Reiher.*

Briffon, ornith. II. p. 330. n. 21. Butor roux.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 681. n. 19. Ardea (Solonienfis) nigricans, subtus rufescens, capite colloque ferrugineis, uropygio albo, rectricibus alarum albo ferrugineoque variegatis.

52. **MARSIGLI.** *Der schwäbische Reiher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 33. n. 10. *der schwäbische Reiher.*

Halle, Vögel, p. 531. n. 628. *der grüngelbe Reiher?*

Klein, av. p. 124. n. 13. Ardea viridi-flavescens?

Klein, Vorber. p. 230. n. 13. *grüngelber Reyger?*

Klein, verb. Vögelhist. p. 131. n. 15. *graugelblicher Reyger?*

Briffon, ornithol. II. p. 329. n. 26. petit Butor.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 681. n. 20. Ardea (Marsigli) rufescens, fusco-striata, rectricibus albicantibus, collo subtus albo.

Marsil. Danub. p. 22. Tab. 9. Ardea viridi-flavescens, nova species?

53. **DANUBIALIS.** *Der gestrichelte Reiher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 34. n. 11. *der gestrichelte Reiher.*

Briffon,

Briffon, ornithol. II. p. 329. n. 27. Butor rayé.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 681. n. 21. Ardea (Danubialis) lineolis fuscis nigris et rufescentibus striata, collo subtus pectoreque albicantibus, rostro fusco, subtus flavo.

54. UNDULATA. *Der gewässerte Reiher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 681. n. 22. Ardea (Undulata) rufo-grisea, pileo nigro, corpore supra strigis undulatis subtus angulatis nigris.

23. BRASILIENSIS. *Der brasilianische Reiher.*

Müller, Naturfyft. II. p. 387. n. 23. *der westindische Reiher.*

Halle, Vögel, p. 532. n. 630. *der Perlreiher.*

Briffon, ornith. II. p. 326. n. 23. Héron du Bresil.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 681. n. 23. Ardea (Brasilienfis) capite laevi, corpore nigricante flavo punctato, remigibus, rectricibus, rostro pedibusque nigricantibus.

Jonston, av. p. 195. Soco Brasiliensibus.

55. TIGRINA. *Der getiegerte Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 682. n. 24. Ardea (Tigrina) maculis nigris difformibus notata, supra rufa, subtus albida, vertice caudaque nigris, rectricibus fasciis quatuor albis.

Fermin, Beschreib. von Surinam, II. p. 131. *der getiegerte Reiger.*

56. LINEATA. *Der gestreifte cayennische Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 682. n. 25. Ardea (Lineata) flavo fusco rufoque transversim lineata, subtus albida, capite colloque rufis, fasciis fuscis, anterieus linea longitudinali alba.

57. FLAVA. *Der gelbe Reiher.*
Briffon, ornithol. II. p. 321. n. 3. Butor du Bresil.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 682. n. 26. Ardea
 (Flava) striata, supra fusca subtus alba, capite
 colloque rufescentibus, rectricibus striis trans-
 versis albis.
58. BONONIENSIS. *Der bononische Reiher.*
Briffon, ornitholog. II. p. 325. n. 22. Heron noir
 à collier.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 678. n. 12. Ardea
 (Bononiensis) nigricans, collo torque albo,
 rostro flavo, medio et apice macula nigra.
Charleton, onomast. zoic. p. 104. n. 8. Ardea
 nigra.
24. ALBA. *Der große weiße Reiher.*
Müller, Natursystem, II. p. 387. n. 24. *der weiße
 Gelbschnabel.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 23. n. 6.
der große weiße Reiher.
Pennant, arct. Zool. II. p. 414. n. 261. *der große
 weiße Reiher.*
*Onomatol. hist. nat. I. p. 687. der große weiße
 Reiher.*
Klein, av. p. 122. n. 2. Ardea alba maior.
Klein, Vorber. p. 227. n. 2. *weißer Reigel.*
Klein, verbesserte Vögelhist. p. 129. n. 2. *weißer
 Reyger.*
Hall, Vögel, p. 525. n. 612. *der große weiße
 Reiher ohne Federbusch.*
Briffon, ornith. II. p. 322. n. 15. Heron blanc.
Gesner, Vögelb. p. 437. *weißer Reigel.* Fig. p. 438.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 695. n. 65. Ardea
 (Alba) capite laevi, corpore albo, rostro ful-
 vo, pedibus nigris.

Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 284.
der weiße Reiher.

Forster, Reis. Ed. in 8. I. p. 185. der weiße Reiher.

Lepechin, Tageb. d. russ. R. I. p. 309. weiße Reyher.

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 24. Ardea alba.

Linné, auserl. Abhandl. II. p. 279. n. 8. der weiße
Reiger.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 104. n. 127.
der weiße Reyher mit rothem Schnabel.

Bechstein, Musterung schäd. Thiere, p. 130. n. 8.
der große weiße Reiher.

Linné, Syst. N. Ed. VI. p. 25. n. 2. Ardea alba.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 144. n. 17. Ardea (Al-
ba) capite laevi, corpore albo, rostro rubro.

Linné, fn. Succ. I. n. 132. Ardea tota alba, capi-
te laevi.

Kramer, Austr. p. 346. n. 2. Ardea tota alba, ca-
pitate laevi, rostro luteo; großer weißer Rager.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 224. Ardea candida;
weißer Reger.

β. Der gehaubte weiße brasilianische Reiher. (9)

Briffon, ornith. II. p. 323. n. 17. Ardea Brasiliensis
candida; Heron blanc du Bresil.

Latham, Syn. III. 1. p. 92. Black-crested white
Heron.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 695. n. 66. Ardea
(Pileata) occipite cristato, corpore albo, ven-
tre nigro.

59. NIVEA. Der schneeweiße, ungehaubte? Reiher. (10)

Latham, Syn. Suppl. p. 236. Snowy Heron.

Latham,

(9) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

(10) Ist, nach *Latham*, mit *Ardea candidissima* p. 633. n. 45.
einerley. *Bechstein* ist a. a. Ö. III. p. 44.) geneigt, ihn bloß
für

Latham, Syst. ornith. II. p. 696. n. 67. Ardea
(Nivea) cristata nivea, pennis occipitis, colli
dorsique longioribus fetosis, digitis croceis.

Decouv. Russ. I. p. 164.

60. HELIAS. *Der surinamische Sonnenreiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 725. n. 38. Scolopax
(Helias) corpore nigro fulvo alboque fasciato,
abdomine strigisque capitis albis, collo rufo,
lineis transversis nigris, cauda nebulosa,
fascia nigra.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 295. n. 12.
der surinamische Sonnenreiger.

61. SACRA. *Der heilige Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 696. n. 69. Ardea
(Sacra) alba capite laevi, rectricibus interioribus
alarum, rectricibusque nigro lineatis, pennis
dorsalibus laceris albis.

β. *Latham*, Syn. III. I. p. 93. n. 62. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 696. n. 69. β. Ardea
capite laevi, corpore albo, nigro variegato,
pennis dorsalibus laceris nigris.

62. ATRA. *Der schwarze Reiher.*(¹)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 24. n. 7.
der schwarze Reiher.

Halle, Vögel, p. 526. n. 615. *der schwarze Reiher?*

Klein, av. p. 123. n. 3. Ardea nigra.

Klein, Vorbereit. p. 227. n. 3. *schwarzer Reyger.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 129. n. 3. *schwarzer
Reyger.*

Briffon,

für einen alten Vogel von *Ardea Garzetta*, p. 628. n. 13. zu
halten; und die *Ardea Xantbedactylus* (System. Linn. p. 640.
n. 59. β.) als einen jungen anzusehen.

(1) *Bechstein* meynt, dies könne wohl gar der schwarze Storch
(*Ardea nigra*) seyn.

Briffon, ornithol. II. p. 325. n. 21. Heron noir.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 697. n. 71. Ardea
 (Atta) nigricans, tectricibus alarum cinereo-
 caerulescentibus, rectricibus nigricantibus, ro-
 stro pedibusque nigris.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 224. Ardea nigra; ein
 schwarzer Reger.

63. PURPURATA. *Der glattköpfige Purpur-
 reiher.* (2)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 21. n. 4.
 der glattköpfige Purpurreiher.

Halle, Vögel, p. 531. n. 637. der graugelbe Reiher?

Klein, av. p. 124. n. 12. Ardea cinerea flavescens?

Klein, Vorbereit. p. 230. n. 12. graugelblicher
 Reyger?

Klein, verbess. Vögelhist. p. 131. n. 15. graugelb-
 lichter Reyger?

Briffon, ornitholog. II. p. 320. n. 12. Heron
 pourpré.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 698. n. 75. Ardea
 (Purpurata) capite laevi colloque cinereo-
 nigricantibus, corpore supra castaneo-purpureo
 subtus cinereo.

Marsfl. Danub. p. 20. Tab. 8. Ardea cinerea fla-
 vescens, nova species?

64. SPADICEA. *Der mexikanische Purpurreiher.*

Briffon, ornith. II. p. 320. n. 13. Heron pourpré
 du Mexique.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 699. n. 76. Ardea
 (Spadicea) castaneo-purpurea, capite remigi-
 busque spadiceis, vertice nigro.

Moehring, av. gen. p. 72. n. 82. Crex.

25. AEQUI-

(2) *Buffon* hält ihn für das Weibchen von *Ardea Purpurea*,
 p. 626. n. 10. *Bechstein* aber für ein Junges von demselben.

25. **AEQUINOCTIALIS.** *Der kleine weiße Reiher.*
Müller, Naturf. II. p. 388. n. 25. der weiße Grün-
schnabel.
Klein, av. p. 124. n. 10. Ardea alba minor Caro-
linensis.
Klein, Vorber. p. 229. n. 10. weißer kleiner Karo-
liner, mit rothem Schnabel.
Klein, verb. Vögelhist. p. 130. n. 12. weißer klei-
ner Caroliner.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 414. n. 262. der
kleine weiße Reiher.
Briffon, ornith. II. p. 324. n. 18. Héron blanc de
la Caroline.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 696. n. 70. Ardea
(Aequinoctialis) capite laevi, corpore albo, re-
migibus duabus primis, margine exteriore
fulcis.
Seligmann, Vögel, IV. Tab. 54. der kleinere weiße
carolinische Reiger.
- β. *Briffon, ornithol. II. p. 325. n. 20. petit Heron*
blanc. (3)
Latham, Syn. III. 1. p. 94. n. 63. Var. A.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 697. n. 70. β.
A. capite laevi, corpore albo, vertice et pecto-
re croceis, loris pedibusque flavo-croceis.
- γ. *Briffon, ornith. II. p. 324. n. 19. Heron blanc*
du Mexique. (4)
Latham, Syn. III. 1. p. 94. n. 63. Var. B.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 697. n. 70. γ. Ar-
dea capite laevi, corpore albo, loris luteis, ro-
stro purpureo, pedibus pallide purpurascen-
tibus.

65. CRA-

(3) Nach *Briffon* eine eigene Gattung.(4) Nach *Briffon* eine eigene Gattung.

65. CRACRA. *Der Cracra.*

Briffon, ornith. II. p. 336. n. 39. Crabier d'Amérique.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 699. n. 77. Ardea (Cracra) rufescente-variegata, supra cinereo-caerulescens, subtus cinerea, collo subtus pectoreque albis.

66. LEUCOCEPHALA. *Der violetsfarbige Reiher.*

Latham, Syn. Suppl. p. 236. Violet Heron.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 699. n. 78. Ardea (Leucocephala) nigro-violacea, vertice nigro, capite, collo superiore, crisso tectricibusque subcaudalibus albis, rostro pedibusque fuscis-rubris.

67. RUF A. *Der braungraue Reiher.* (5)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 22. n. 5. *der braunrothe Reiher.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 692. n. 55. Ardea (Rufa) cinereo-fusca, subtus castaneo-ferruginea, crista dependente.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 99. n. 119. *der braunrothe Reiher.*

Kramer, Austr. p. 347. n. 6. Ardea cinereo-fusca, subtus castaneo-ferruginea, crista dependente; *brauner Rager.*

68. SINENSIS. *Der chinesische Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 700. n. 81. Ardea (Sinensis) fusca striis pallidioribus, subtus dilutior, remigibus rectricibusque nigris.

69. VIRGATA. *Der gestreifte nordamerikan. Reiher.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 418. n. 271. *der gestreifte Reiher.*

Latham,

(5) Nach *Bechstein* ein junges Männchen von *Ardea Purpurea*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 693. n. 60. Ardea (Virgata) fusco-nigricans, collo subtus albo, iugulo nigro striato, tectricibus alarum flavescente striatis.

70. CANA. *Der aschgraue Reiher.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 418. n. 270. *der aschgraue Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 693. n. 59 Ardea (Cana) cinerea, collo fusco-cinerascente, abdomine, genis gulaque albis.

71. CARUNCULATA. *Der gelappte Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 691. n. 53. Ardea (Carunculata) vertice, dorso tectricibusque alarum caeruleo-cinereis, abdomine nigro, capite, collo carunculisque sub gula geminis pennaceis albis.

72. MALACCENSIS. *Der malackische Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 689. n. 47. Ardea (Malaccensis) alba, dorso fusco, collo fusco alboque striato, rostro pedibusque flavis.

73. CINNAMOMEA. *Der zimmetfarbene Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 689. n. 46. Ardea (Cinnamomea) castaneo-cinnamomea, collo antice fusco striato, gula, macula maxillari, crissoque albis.

74. PUMILA. *Der kastanienbraune caspische Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 683. n. 28. Ardea (Pumila) castanea, tectricibus alarum mediis albo flavoque variis, collo antice stria longitudinali, abdomine caudaque albis.

75. BADIA. *Der kastanienbraune schlesische Reiher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 34. n. 12. *der kastanienbraune Reiher.*

Briffon, ornitholog. II. p. 334. n. 34. Crabier marron.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 687. n. 40. Ardea (Castanea) cristata alba, lateribus capitis colloque castaneo-flavis, dorso castaneo, remigibus intus, rectricibus apice albo maculatis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 225. Ardea rubra; ein rothter Reger, Sand-Reger.

77. PHILIPPENSIS. *Der philippinische Reiher.*

Briffon, ornith. II. p. 336. n. 38. Crabier des Philippines.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 686 n. 35. Ardea (Philippensis) castanea subtus albida, dorso striis transversis nigris, tectricibus alarum nigricantibus albo marginatis, remigibus caudaque nigris.

78. NOVAE GUINEAE. *Der neuquineische Reiher.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 685. n. 34. Ardea (Novae Guineae) corpore toto nigro, iridibus flavis, rostro pedibusque fuscis.

79. CYANOPUS. *Der blaufüßige Reiher.*

Briffon, ornithol. II. p. 316. n. 6. Heron cendré d'Amérique.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 685. n. 33. Falco (Cyanopus) cinerea, subtus alba, remigibus partim nigris partim candidis, rostro, loris pedibusque caeruleis.

80. MACULATA. *Der gefleckte Reiher.* (6)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 35. n. 13. it. p. 39. u. 708. *der gefleckte Reiher.*

Bech-

(6) Ist, nach *Latham*, mit dem folgenden einerley. *Bechstein* hält ihn für ein Junges von *Ardea Nycticorax*, oder vielmehr von *Ardea Grisea*, p. 625. b.

Bechstein, Musterung schädli. Thiere, p. 130. n. 4.
der gefleckte Reiher.

Briffon, ornithol. II. p. 332. n. 31. Butor tacheté
ou le Pouacre.

81. GARDENI. *Der gardenische Reiher.* (7)

Pennant, arct. Zool. II. p. 419. n. 272. *der gardenische Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 685. n. 32. Ardea
(Gardeni) nigricans albo maculata, subtus al-
bida fusco striata, remigibus margine apice-
que albis, cauda fusca.

82. SENEGALENSIS. *Der senegalische Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 684. n. 30. Ardea
(Senegalensis) fusca, abdomine, alis caudaque
albis, capite colloque nigro striatis, alarum
medio fascia longitudinali pallide rufa.

83. EXILIS. *Der kleinste Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 683. n. 29. Ardea
(Exilis) rufo castanea, collo rufo, antice ab-
domineque albo, lunula pectorali rectricibus-
que nigris.

86. MINUTA. *Die kleine Rohrdommel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 388. n. 26. *die kleine
Rohrdommel.* Tab. 15. fig. 4.

Borowsky, Thierreich, III. p. 77. n. 6. *die kleine
Rohrdommel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 30. n. 9.
die kleine Rohrdommel.

Ebert, Natürl. II. p. 90. *der kleine gestirnte Rei-
her aus der Barbarey.*

K r r 3

Halle,

(7) *Pennant* hält *Catesb. brown* Bittern I. Tab. 78. (Syst. Linn. p. 335. n. 20. γ.) wegen der weissen Linienstreifen auf den Flügeln mit diesem für einerley.

- Halle*, Vögel, p. 528. n. 619. *der kleine Rohrdommel.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 422. n. 276. *der kleine Rohrdommel.*
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 129. n. 6. *kleine Rohrdommel aus der Barbarey.*
- Briffon*, ornith. II. p. 341. n. 46. *Blongios.*
- Latnam*, Syn. Suppl. p. 235. *Little Bittern.*
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 683. n. 27. *Ardea (Minuta) capite laevi, vertice, dorso, remigibus rectricibusque nigro-virescentibus, collo, tectricibus alarum abdomineque pallide fulvis. (Mas.)*
- Shaw*, Reise, p. 161. *der Bu-onk.*
- Bechstein*, Musterung schädli. Thiere, p. 128. n. 4. *die kleine Rohrdommel.*
- Kramer*, Austr. p. 348. n. 10. *Ardea vertice dorsoque nigris, collo antice et alarum tectricibus lutescentibus; Stauden-Ragerl, kleine Mooskuh.*
- Gentl. Magaz. XIX. Tab. p. 497.*
- β. *Briffon*, ornithol. II. p. 342. n. 47. *Blongios tacheté.*⁽⁸⁾
- Latham*, Syst. ornith. II. p. 683. n. 27. *A. capite laevi, corpore fusco, marginibus pennarum rufescentibus, subtus rufescente, vertice, dorso, remigibus caudaque nigris. (Femina.)*
- Seligmann*, Vögel, VII. Tab. 65. *die kleine braune Rohrdommel.*

**** *Mit in der Mitte klaffendem Schnabel.*

84. PONDICERIANA. *Der Reiher von Pondichery.*
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 702. n. 90. *Ardea (Pondiceriana) cinereo-grisea, remigibus nigris, rostro lateribus glabro, apice mucronato.*

(8) Nach *Briffon* eine eigene Gattung.

86. COROMANDELIANA. *Der Reiher von Coromandel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 702. n. 91. Ardea (Coromandeliana) alba, facie, dorso supremo, remigibus caudaque nigris, rostro lateribus serrato, apice dentato.

87. SCOLOPACEA. *Der Schnepfenreiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 701. n. 89. Ardea (Scolopacea) cupreo-fusca, collo pectoreque striis albis, gula nigra.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.**Edit. XII.**Edit. XIII.*

p. 239. n. 22. Ardea Grisea.

p. 625. n. 9. b. Ardea Nycticorax. (Femina.)

p. 236. n. 11. Ardea Cinerea.

pag. 627. n. 12. Ardea maior b.

Die Anzahl der Gattungen in der XIIIten Edit. beläuft sich, der höchsten Nummer nach, auf 88. Es fehlen aber die Nummern 22, 76, und 85; mithin bleiben ihrer, nach Abgang dieser drey, nur 85; also 59 mehr als in der XIIten Edition. Ueberdem sind bey der 4ten Gattung zwey, bey der 6ten zwey, bey der 10ten zwey, bey der 12ten zwey, bey der 17ten vier, bey der 20ten drey, bey der 21ten zwey, bey der 24ten zwey, bey der 25ten drey Varietäten aus einander gesetzt. — Bey der 26ten ist *Brisson's Ardeola naevia* n. 47. als Varietät von dessen *Ardeola* n. 46. angenommen, da es in der XII. Ed. umgekehrt war.

B. Unbestimmtere Thiere.

1. Der Kranich mit abgestumpftem einer Ruderschau-
fel ähnlichen Schnabel.

Carver, Reif. d. Nordamer. p. 387.

2. Ein Reiher der nicht ganz *Ardea maior*, und
nicht ganz *Ardea cinerea* ist.

Sander: Naturf. XIII. p. 195. n. 6.

3. Der bunte Reiher.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 100. n. 120.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 692. n. 56. *Ardea*
(*Variiegata*) *ferruginea*, *fusco-maculata*, *sub-*
tus pallidior, *fronte nigra*, *gula alba*.

C. Neuere Gattungen.

1. Der slavonische Reiher.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 679. n. 16. *Ardea*
(*Obscura*) *occipite cristato*, *penna solitaria*,
corpore castaneo supra virescente-aureo, *sub-*
tus castaneo albo ferrugineoque longitudinaliter
litturato, *remigibus apice macula alba*.

2. Der braune cayennische Reiher.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 700. n. 83. *Ardea*
(*Fusca*) *crista capitis nigricante*, *corpore fusco-*
nigricante, *subtus albo*, *pectore maculis fuscis*
elongatis.

Büffon, ois. VII. p. 381. pl. enl. 858. *Heron brun.*

3. Der indianische Reiher.

Latham, Syn. Suppl. p. 238. *Lohaujung Heron.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 701. n. 86. *Ardea*
(*Indica*) *fusca viridi-varia*, *remigibus secun-*
dariis viridibus, *cauda nigra*, *teetricibus alarum*,
remigibus primoribus corporeque subtus albis.

4. Der gelbhälfige Reiher.

Latham, Syn. Suppl. p. 239. *Yellow-necked Heron.*

Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 701. n. 87. Ardea (Flavicollis) crista occipitis corporeque nigris, collo lateribus flavescente, antierius castaneo, pennis albo nigroque marginatis.

5. *Der neuholländische Reiher.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 701. n. 88. Ardea (Novae Hollandiae) subcristata plumbeo-cinerea, subtus rufo-ferruginea, facie ultra oculos gula iuguloque albis.

85. GESCHLECHT. TANTALUS. *Der Brachvogel.* (Sichelreiher.)

Müller, Naturfyst. II. p. 389. Gen. LXXXV.

Leske, Naturgesch. p. 275. Gen. LV.

Borowsky, Thierreich, III. p. 71. Gen. XLVII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 213. Gen. LVII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 415. Gen. XXXVII.

Bechstein, Naturg. Deutschl. II. p. 70. Gen. XXVII.

Halle, Vögel, p. 509. Gen. II.

Onomat. hist. nat. VII. p. 435.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 426.

Klein, av. p. 109. Trib. II. A. Numenius.

Briffon, ornitholog. II. p. 289. Gen. LXXVIII. Numenius.

Batsch, Thiere, I. p. 385. Gen. XCVI.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 702. Gen. LXX.

Hermann, tab. affinit. anim. p. 133. 141.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 295. Gen. XLVIII.

1. LOCULATOR. *Der Waldpelikan.*

Müller, Natursystem, II. p. 389. n. 1. *der Nimmerfatt.*

Leske, Naturgesch. p. 276. n. 1. *der Nimmerfatt.*

- Borowsky*, Thierreich, II. p. 71. n. 1. *der Nimmerfatt, Harpunreihcr.*
- Funke*, Naturgesch. I. p. 314. *Nimmerfatt.*
- Ebert*, Naturl. II. p. 90. *Nimmerfatt, amerikanischer Pelikan.*
- Halle*, Vögel, p. 511. n. 588. *der schwarze große Brachvogel.*
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 197. n. 187. *der Waldpelikan.*
- Pennant*, arct. Zoolog. II. p. 426. n. 277. *der Waldpelekan.*
- Onomat. hist. nat.* VII. p. 438. *der große schwarze Brachvogel.*
- Klein*, av. p. 109. n. 6. *Numenius niger, Curiaca.*
- Klein*, Vorber. p. 203. n. 6. *schwarzer Braacher.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 112. n. 6. *schwarzer Braacher.*
- Klein*, av. p. 127. C. *Tantalus, Loculator.*
- Klein*, Vorbereit. p. 235. C. *hochbeiniger Mauchler, Baumpelikan.*
- Klein*, verbesserte Vögelhist. p. 133. n. 3. *der Nimmerfatt, Sackträger.*
- Briffon*, ornithol. II. p. 295. n. 8. *grand Courly d' Amerique.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 389. *der Nimmerfatt, Harpunreihcr.*
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 702. n. 1. *Tantalus (Loculator) facie caerulescente, rostro rubescente, pedibus, remigibus rectricibusque nigris, corpore albo.*
- Seligmann*, Vögel, IV. Tab. 62. *der amerikanische Pelikan.*
- Taube*, Slavon. u. Syrm. I. p. 23. *Nimmerfatt.*
- Linné*, auserles. Abh. II. p. 279. n. 2. *der Kropf-Pelekan.*

Meidinger,

Meidinger, Vorles. I. p. 138. n. 1. *der Nimmerfatt.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 140. n. 1. Tantalus Loculator.

Fonston, av. p. 187. Curicaca.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 133. Tantalus Loculator.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 296. n. 1. *der Waldpelikan.*

β. T. capite et collo albis flavo variegatis, corpore nigro, dorso, capite ventrequé cinereis. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 703. n. 1. β.

Will. ornithol. p. 295. Tab. 54. — *Raj.* Syn. p. 103. n. 4. Curicaca.

γ. T. albus, alis fere totis caudaque nigris. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 703. n. 1. γ.

2. FALCINELLUS. *Der Sichelschnabel.*

Müller, Natursystem, II. p. 390. n. 2. *der Sichelschnabel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 72. n. 2. *der Sichelschnabel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 415. n. 1. *der Sichelschnabel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 70. n. 1. *der Sichelschnäbler.*

Halle, Vögel, p. 510. n. 586. *der dunkelbraune Brachvogel.*

Pennant, arch. Zoolog. II. p. 429. A. *der Sichelschnabel.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 436. *der braungrüne Brachvogel.*

Klein, av. p. 110. n. 8. *Numenius subaquilus.*

Klein, Vorbereit. p. 203. n. 8. *braunrother Bracher.*

Klein.

- Klein*, verb. Vögelhist. p. 112. n. 8. *braunrother Braacher*.
- Gesner*, Vögelb. p. 444. *ein welscher Vogel, Sichel oder Sägyser genannt*; mit 1 Fig.
- Briffon*, ornithol. II. p. 293. n. 4. Courly verd.
- Batsch*, Thiere, I. p. 389. *der Sichelschnabel*.
- Latham*, Syn. Suppl. p. 67. Bay Ibis.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 707. n. 14. Tantalus (Falcinellus) facie nigra, pedibus caeruleis, alis caudaque violaceis, corpore castaneo.
- Bock*, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 355. *der Sichelschnabel, kleiner Brachvogel*.
- Pontoppidan*, Dännemark, p. 170. n. 8. Scolopax Falcinellus; *Ryle, Domschnepfe*. Tab. 13.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 106. n. 131. *der rothbraune Brachvogel mit grünen Flügeln*.
- Meidinger*, Vorlesung. I. p. 134. n. 3. *der braungrüne Brachvogel*.
- Naturf XIII. p. 210. n. 111. *der Sichelschnabel*.
- Neue schwed. Abhandl. III. p. 106. Tantalus Falcinellus.
- Charlton*, onom. zoic. p. 103. n. 7. Falcinellus.
- Müller*, zool. dan. prodr. p. 22. n. 178. Tantalus (Falcinellus) facie nigra, pedibus caeruleis, alis caudaque violaceis, corpore castaneo.
- Kramer*, Austr. p. 350. n. 2. Numenius rostro arcuato, corpore castaneo; alis et cauda caeruleo viridi violaceoque splendentibus, pedibus obscure virentibus; *türkischer Goisser, türkischer Schnepf*.
- Brünniche*, ornith. bor. p. 49. n. 167. Scolopax (Falcinellus) rostro depresso, apicibus decurvatis, corpore fusco lituris luteis, rectricibus cinereis apice albis, intermediis nigris immaculatis.
- Jonston*, av. p. 154. Falcinellus seu Falcata.

β. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 72. *der kastanienbraune Sichelschnäbler.*

Halle, Vögel, p. 511. n. 589. *der rothe kleine Brachvogel mit grünen Flecken.*

Briffon, ornith. II. p. 294. n. 5. Courly marron.

Latham, Syn. III. I. p. 114. n. 12. Var. A. (9)

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 707. n. 14. β. T. splendide castaneus, pectore viridi.

Marfil. Dan. V. p. 40. Tab. 18. Arcuata minor, puniceo colore, pectore virescente.

8. VIRIDIS. *Der grüne Brachvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 707. n. 15. Tantalus (Viridis) viridis aureo splendens, capite, collo corporeque subtus nigricantibus, facie nuda colloque anterieus fasciis tribus nigris.

Lepchin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 309. *der grüne Tantalus.*

9. IGNEUS. *Der feuerglänzende Brachvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 708. n. 16. Tantalus (Igneus) corpore nigricante caeruleo-viridi - et vinaceo-variegato-nitente, capite colloque nigris, pennis albido fimbriatis.

19. LEUCOCEPHALUS. *Der weißköpfige Brachvogel (10)*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 706. n. 10. Tantalus (Leucocephalus) facie rostroque flavis, corpore albo, tectricibus alarum remigibusque nigris, uropygii pennis longissimis pedibusque roseis.

Latham, Syn. Suppl. p. 240. White-headed Ibis.

Naturf.

(9) Nach *Briffon* eine eigene Gattung.

(10) Im Naturf. a. a. O. heisst es: während der Regenzeit verlieren seine schönen rosenrothen Federn ihre Farbe.

Naturforsch. I. p. 274. n. 10. *der weißköpfige Ibis oder Nilreiher.*

Berlin. Samml. IX. p. 193. *der weißköpfige zeylonische Ibis.*

Neueste Mannichfalt. I. p. 189. p. 627. mit 1 Fig.

11. CALVUS. *Der kahlköpfige Brachvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 708. n. 17. Tantalus (Calvus) capite colloque supremo nudis, corpore nigro viridi splendente, pileo, rostro pedibusque rubris.

12. MANILLENSIS. *Der lüçonische Brachvogel.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 708. n. 18. Tantalus (Manillensis) rufo-fuscus, rostro lateribusque capitis nudis virescentibus, pedibus rubris.

Sonnerat, Reif. n. Neuguinea, p. 32. *der braunrothe Krummschnabel.*

3. MINUTUS. *Der kleine Brachvogel.*

Müller, Natursystem, II. p. 391. n. 3. *der kleine Kropfvogel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 439. *der kleinere Brachvogel.*

Ebert, Naturl. II. p. 91. *Courly, Matuicui.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 708. n. 19. Tantalus (Minutus) facie, rostro pedibusque virescentibus, corpore ferrugineo subtus albo.

13. CRISTATUS. *Der gehäubte Brachvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 709. n. 20. Tantalus (Cristatus) cristatus ferrugineus, capite, crisso caudaque nigris, alis albis.

14. NIGER. *Der schwarze Ibis.* (1)

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 214. ad
n. 1. *der schwarze etwas klemere Ibis.*

Halle, Vögel, p. 512. n. 590. *der schwarze
Brachvogel.*

Klein, av. p. 110. n. 9. *Numenius holosericus?*

Klein, Vorbereit. p. 203. n. 9. *Seidenbracher?*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 112. n. 9. *Sammeter
Braacher.*

Gesner, Vögelb. p. 340. *der schwarze Ibis.*

Briffon, ornithol. II. p. 299. n. 13. *Ibis.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 707. n. 13. *Tantalus
(Niger) niger, capite anteriore nudo rubro,
rectricibus nigris, rostro pedibusque rubris.*

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 316. *schwarze Sichel-
schneppen?? Tantalus niger??*

Mannichf. II. p. 620. *der schwarze ägypt. Storch.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 144. n. 18. *β.
Ibis nigra.*

Linné, Syst. Nat. Edit. XII. I. p. 241. n. 4. *Obf.
Ibis nigra.*

Charleton, onomast. zoic. p. 102. n. 2. *Ibis nigra.*

Jonston, av. p. 149. *Ibis nigra.*

Plin. hist. nat. L. 10. c. 30. *Ibis nigra.*

4. IBIS. *Der Ibis.* (2)

Müller, Naturfyst. II. p. 391. n. 4. *der ägyptische.
Leske,*

(1) Vorerst bleibt es allerdings noch völlig unentschieden, ob dies wirklich eine eigne Gattung sey oder nicht. Dies bey Seite gesetzt aber begreife ich nicht, wie *Latham* a. a. O. sagen kann: *Habitat copiose in Volgae paludosis.* Vielleicht gründet sich diese Behauptung auf eine Relation von *Pallas*, ob er ihn gleich nicht anführt. Aber sollte des *Pallas Tantalus niger* wirklich diese Gattung seyn?

(2) Das berühmte, ehemals in Aegypten auf den dasigen alten Denkmählern verewigte, göttlich verehrte, und so, wie die dama-

- Leske*, Naturgesch. p. 276. n. 2. *der Ibis*.
Borowsky, Thierreich, III. p. 72. n. 3. *der Ibis*,
ägyptische Brachvogel, Nilreiher.
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 213. n. 1.
 Tantalus (Ibis) facie rubra, rostro luteo, pe-
 dibus griseis, remigibus nigris, corpore rufe-
 scente-albido.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 415. n. 2. *der Ibis*.
Funke, Naturgesch. I. p. 314. *der Ibis*.
Ebert, Naturl. II. p. 91. *der Ibis*.
Halle, Vögel, p. 530. n. 626. *der Nilreiher*.
 Fig. 46.
Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere,
 p. 198. n. 188. *der Nilreiher*.
 Neuer Schaupl. d. Natur, IV. p. 289. *Ibis*.
 Onomat. histor. nat. IV. p. 490. *der Nilreiher*.
 Handb. d. Naturgesch. II. p. 333. *der Ibis*.
Klein, verbesserte Vögelhist. p. 131. n. 14. *ägypti-*
scher Ibis.
Gesner, Vögelb. p. 340. *der Ibis*.
Briffon, ornith. II. p. 299. n. 14. *Ibis blanc*.
Batsch, Thiere, I. p. 389. *der Ibis oder ägypti-*
sche Brachvogel.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 706. n. 11. Tantalus
 (Ibis) facie rubra, rostro luteo, pedibus griseis,
 remigibus nigris, corpore rufescente-albido.
Latham, Syst. ornith. II. p. 706. n. 12. Tantalus
 (Aethiopicus) albus, capite colloque superiore
 fuscis, dorso postico remigibusque nigris.

Bruce,

damaligen menschlichen Leichen zu Mumien kostbar einbal-
 samirte, und in besondern Gewölbern in größter Menge
 beygesetzte, allen Familien bekannte Thier, ist jetzt, wie
Shaw a. a. O. p. 352. sagt, daselbst so außerordentlich sel-
 ten geworden, daß er nicht einmal erfahren können, daß
 man es angetroffen habe.

Bruce, Reif. n. d. Quellen des Nils, V. p. 175.
Tab. 35. *Abou Hannes*.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 103. *der Schnabel vom ägyptischen Reyger, Ibis genannt.*

Shaw, Reif. p. 305. 352. 369. *der Ibis.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 105. n. 128.
Ardea Ibis.

Eberhard, Thiergesch. p. 98. *der Ibis.*

Perrault, *Charras* u. *Dodart*, Abhandl. aus der Naturgesch. II. p. 237. anatomische Beschreib. des weissen Ibis. Tab. 73. *der Ibis.* Tab. 74. die Zergliederung.

Berlin. Samml. VI. p. 269. *der Ibis.*

Gazet. lit. de Berlin. 1773. p. 355. *Ibis?*

Charleton, onomast. zoic. p. 102. n. 2. *Ibis candida.*

Jonston, av. p. 149. *Ibis candida.*

Cicero, de nat. Deor. L. I. c. 36. *Ibes.*

Plin. hist. nat. L. 8. c. 27. L. 10. c. 12. 28. 30. *Ibis.*

Aelian. de nat. anim. L. 2. c. 38. *Ibis.*

Aristot. histor. anim. L. 9. c. 37. *Ibes.*

Strabo, geogr. L. 17. p. 823. *Ibis.*

Plutarch, de solert. anim. p. 972. et de Isid. p. 381.

Gaudent. *Merul.* memorab. L. 3. c. 50.

Middleton's miscellan. works. Vol. IV. Tab. 10. p. 90 sqq.

Caylus, Recueil d'Antiquités Vol. VI. Tab. XI. fig. 1.

Hermann, tab. aff. anim. p. 133. *Tantalus Ibis.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 296. n. 2. *der Ibis.*

5. RUBER. *Der scharlachrothe Brachvogel.*

Müller, Naturfyß. II. p. 392. n. 5. *der rothe Brachvogel.*

- Halle*, Vögel, p. 510. n. 587. *der karminrothe Brachvogel.*
- Halle*, Vögel, p. 530. n. 625. *der Purpurreiker.*
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 198. *der rothe Brachvogel.*
- Onomat. hist. nat.* VII. p. 440. *der rothe Brachvogel.*
- Klein*, av. p. 124. n. 11. *Ardea porphyrio.*
- Klein*, Vorbereit. p. 230. n. 31. *rother Reyger.*
- Klein*, av. p. 109. n. 5. *Numenius ruber.*
- Klein*, Vorbereit. p. 202. n. 5. *rother Braacher.*
- Klein*, verb. Vögelh. p. 112. n. 5. *rother Braacher.*
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 427. n. 278. *der scharlachrothe Ibis.*
- Briffon*, ornithol. II. p. 298. n. 12. *Courly rouge du Brésil.*
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 703. n. 2. *Tantalus (Ruber) facie, rostro pedibusque rubris, corpore sanguineo, alarum apicibus nigris.*
- Seligmann*, Vögel, IV. Tab. 68. *der rothe Brachvogel.*
- Bankroft*, Naturgesch. von Guiana, p. 103. *der guianische Keilhaken, oder der indianische rothe Keilhaken.*
- Linne*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 145. n. 1. *Scolopax (Rubra) rostro arcuato, pedibus rubris, corpore sanguineo, alarum apicibus nigris.*
- Moehring*, av. gen. p. 71. n. 80. *Ibis.*
- Bellon*. av. L. 4. c. 3. *Ibis.*
- Charleton*, onomast. zoic. p. 116. n. 3. *Guara.*
- Jonston*, av. p. 198. *Guara.*
- Hermann*, tab. affinit. animal. p. 141. *Tantalus Ruber.*
- Donndorff*, Handb. der Thiergesch. p. 297. n. 3. *der Scharlachrothe Ibis.*

6. ALBUS. *Der weiße Brachvogel.*

Müller, Naturf. II. p. 392. n. 6. *der weiße Brachvogel.*

Halle, Vögel, p. 510. n. 585. *der weiße Brachvogel mit rothem Schnabel.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 535. *der weiße Brachvogel.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 428. n. 280. *der weiße Ibis.*

Klein, av. p. 109. n. 3. Numenius albus.

Klein, Vorber. p. 202. n. 3. *weißer Braacher.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 112. n. 3. *weißer Braacher.*

Briffon, ornithol. II. p. 296. n. 10. Courly blanc du Brésil.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 705. n. 9. Tantalus (Albus) facie, rostro pedibusque rubris, corpore albo, alarum apicibus viridibus.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 64. *der weiße Brachvogel.*

Linne', auserl. Abh. II. p. 279. n. 11. *die weiße Schnepfe.*

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 145. n. 2. Scolopax (Alba) rostro arcuato, pedibus rubris, corpore albo, alarum apicibus viridibus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 141. Tantalus Albus.

7. FUSCUS. *Der braune Brachvogel.*

Müller, Natursystem, II. p. 392. n. 7. *der braune Brachvogel.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 438. *der braune amerikanische Brachvogel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 428. n. 279. *der braune Ibis.*

Klein, av. p. 109. n. 4. Numenius fuscus.

Klein, Vorber. p. 202. n. 4. brauner Braacher.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 112. n. 7. dunkelbrauner Braacher.

Briffon, ornithol. II. p. 297. n. 11. Courly brun du Bresil.

Latham, Syst. ornith. II. p. 705. n. 8. Tantalus (Fuscus) rostro apice inflexo, corpore nigro albo nebuloso, uropygio alisque subtus albis.

Seligmann, Vögel, IV. Tab. 66. der braune Brachvogel.

Linneé, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 145. n. 3. Scolopax (Fusca) rostro arcuato, pedibus rubris, corpore fusco, cauda basi alba.

15. COCO. *Der Koko.* (3)

Latham, Syn. Suppl. p. 241. Coco Ibis.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 705. n. 9. β. T. facie rostroque flavo-carneis, pedibus ex carneo pallentibus, corpore albo, remigibus 3. extimis apice nigris.

16. PILLUS. *Der Pillu.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 709. n. 22. Tantalus (Pillus) facie, rostro pedibusque fuscis, corpore albo, remigibus rectricibusque nigris.

17. CAYENNENSIS. *Der cayennische Brachvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 704. n. 3. Tantalus (Cayanensis) viridi-nigricans, remigibus rectricibusque saturatoribus, rostro nigricante, pedibus flavescens.

18. MEXICANUS. *Der mexicanische Brachvogel.*

Briffon, ornitholog. II. p. 295. n. 7. Courly varié du Mexique.

Latham,

(3) Nach *Latham* eine Varietät von *Tantalus Albus* n. 6.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 704. n. 4. Tantalus (Mexicanus) purpureo viridi et nigricante varius, subtus fuscus rubro variegatus, tectricibus alarum viridibus, rostro caerulecente.

19. MELANOPIS. *Der Brachvogel mit schwarzem Gesicht.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 704. n. 5. Tantalus (Melanopis) dorso, alis fasciaque pectorali cineris, capite colloque fulvis, remigibus, rectricibus, femoribus crissoque nigris.

20. ALBICOLLIS. *Der weißhalsige Brachvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 704. n. 6. Tantalus (Albicollis) fuscus griseo undulatus, capite colloque rufo-albis, tectricibus alarum maioribus albis.

21. GRISEUS. *Der graue Brachvogel.*

Briffon, ornitholog. II. p. 296. n. 9. petit Courly d'Amerique.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 705. n. 7. Tantalus (Griseus) albidus, capite posteriore colloque griseis, uropygio, remigibus rectricibusque nigro-virescentibus.

Jonston, av. p. 211. Matuitui.

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 14 Gattungen vermehrt. Bey der 2ten Gattung ist die Varietät β hinzugekommen. Bey der 4ten ist *Tantalus Niger* als eine besondere Gattung von *T. Ibis* getrennt.

B. *Neuere Gattungen.*1. *Der schwarzköpfige indianische Brachvogel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 240. Black-headed Ibis.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 709. n. 21. Tantalus (Melanocephalus) albus, rostro, capite pedibusque nigris.

2. *Der Hagedash vom Vorgeb. der g. Hoffn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 709. n. 23. Tantalus (Hagedash) cinereus, dorso viridi flavoque vario, alis caeruleo-nigris, tectricibus minoribus violaceis.

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT.

CORRIRA. *Der Laufvogel.*

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 181.

Gen. XLIX.

Briffon, ornitholog. II. p. 505. Gen. CXV.

Latham, Syst. ornith. II. p. 787. Gen. LXXXVI.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 297.

Gen. XLIX.

1. ITALICA. *Der italienische Laufvogel. (*)*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 181. III.

p. 223. *der italienische Kurrier.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 582. *der Laufer.*

Handb. d. Naturgesch. II. p. 383. *der Courier.*

Eberhard, Thiergesch. p. 121. *der Courier.*

Briffon, ornith. II. p. 505. n. I. Coureur.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 787. n. I. Corrira

(Italica) supra ferruginea, subtus alba, rectricibus binis intermediis candidis, apice nigris.

Charleton, onomast. zoic. p. 97. n. 9. Trochilus,

Corrira, seu Tabellaria Aldrovandi.

Jonston, av. p. 196. Trochilus, Corrira.

86. GE.

(*) Soll, nach *Bechstein*, der *Charadrius Oedicnemus* seyn, dem man Füße von der *Avocette* angesetzt hatte.

36. GESCHLECHT. SCOLOPAX. *Die Schnepfe.*

Müller, Naturfyst. II, p. 393. Gen. LXXXVI.

Leske, Naturgesch. p. 274. Gen. LIV.

Borowsky, Thierreich, III. p. 86. Gen. LI.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 214.

Gen. LVIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 423. Gen. XLI.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 72.

Gen. XXVIII.

Halle, Vögel, p. 479. Gen. I.

Neuer Schauplatz der Natur, VII. p. 740.

Onomat. hist. nat. VII. p. 25.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 429. 430.

Klein, av. p. 99. Gen. XI. p. 109. Trib. II. A.

Briffon, ornith. II. p. 277. Gen. LXXVI. Limosa.

p. 284. Gen. LXXVII. Scolopax. p. 289.

Gen. LXXVIII. Numenius.

Batsch, Thiere, I. p. 386. Gen. CI.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 710. Gen. LXXI.

Numenius (*Curlew*). p. 713. Gen. LXXII.

Scolopax (*Snipe*.)

Hermann, tab. affinit. animal. p. 140.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 297. Gen. L.

I. GUARAUNA. *Die brasilianische Schnepfe.*

Müller, Naturfyst. II. p. 394. n. 1. *der brasilianische Schnepf.*

Onomat. hist. natur. IV. p. 98. *der dunkelbraune Brachvogel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 102. Guarauna.

Briffon, ornithol. II. p. 294. n. 6. Courly brun d' Amerique.

Latham, Syst. ornith. II. p. 712. n. 8. Numenius (Guarauna) rostro flavicante, corpore fusco albo striato, pedibus fuscis.

Jonston, av. p. 199. Guarauna Brasiliensibus; Rusticola aquatica.

17. BOREALIS. *Die Esquimauxschnepfe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 429. n. 281. *der Esquimauxbrachvogel.* Tab. 19. unt. Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 712. n. 9. Numenius (Borealis) rostro pedibusque nigris, corpore fusco griseo maculato, subtus ochroleuco.

19. AFRICANA. *Die afrikanische Schnepfe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 712. n. 10. Numenius (Africanus) cinereus, facie, collo subtus, abdomine, uropygio, rectricibus alarum mediis apice albis, pectore cinerascete ferrugineo maculato.

20. PYGMEA. *Die Lerchenschnepfe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 87. n. 4. *die Lerchenschnepfe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 291. not. o.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 713. n. 11. Numenius (Pygmeus) fusco ferrugineo alboque variegatus, corpore subtus uropygioque albo, remigibus rectricibusque exterioribus albo marginatis.

21. MADAGASCARIENSIS. *Die madagascarischnepfe.*

Müller, Natursystem, II. p. 394. n. 2. *der madagascarischnepf.* Tab. 16. fig. 1.

Onomat. histor. nat. VII. p. 41. *die Schnepfe aus Madagascar.*

Briffon, ornitholog. II. p. 292. n. 3. Courly de Madagascar.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 710. n. 11. Numenius (Madagascariensis) rostro pedibusque

que rufescentibus, maculis dorſi rhomboida-
libus.

3. ARQUATA. *Die Doppelschnepfe.* (4)

Müller, Naturſyſt. II. p. 394. n. 3. *der Krumm-
ſchnabel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 86. n. 1. *der Wet-
tervogel, Doppelschnepfe.* Tab. 51.

Bechstein, Naturgeſch. I. p. 424. n. 1. *die Dop-
pelschnepfe.*

Bechstein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 73. n. 1.
*die Doppelschnepfe, der große Brachvogel,
Keilhaken. p. 79. der Wettervogel, Brachvo-
gel, Brachhuhn, Giloch, Windvogel, Gewit-
tervogel, (Güthvogel, Geisvogel, Himmelgeis,
Goifar, Brachſchnepfe, Kronſchnepfe, Regen-
worp, Regenwulp.) braunſchnäblige Schnepfe,
Krummſchnabel, Faſtenſchlier.* Tab. 5.

Sss 5

Halle,

(4) Flügelweite $3\frac{1}{3}$ Fuß nach *Briffon*. Gewicht 22 bis 37 Un-
zen, nach *Pennant*. Erſterer vergleicht die Stärke (*Crassities*)
mit den Kapaunen, welches aber übertrieben iſt. Dieſe Vö-
gel fliegen nicht ſo ſchnell wie andere Schnepfen, ſind auch,
ob ſie gleich ſcheu ſind, doch in Vergleichung mit andern
dieſes Geſchlechts noch am leichtesten zu berücken. In
Deutschland ſieht man ſie mehrentheils als Zugvögel am En-
de des Septembers oder Anfang des Octobers in groſen und
kleinen Heerden auf Sümpfen und Rieden, oder Brach- und
Saarfeldern ſchnell herumlaufen. Im Frühjahr und Herbst
ziehen ſie ſich immer nach den Ufern des Meers, der Land-
ſeen, Teiche, Flüſſe, und nach den Sümpfen. Sie brüten im
April, und die Brützeit über lebt jedes Paar für ſich allein.
Das Neſt beſteht nur aus einigen Grashalmen, und iſt in
Sümpfen auf einem trocknen Rafenhügel angebracht. Die
Eyer werden drey Wochen bebrütet. Man kann dieſe Thiere
mehrere Jahre lebendig unterhalten, wenn man ihnen grüne
Kräuter unter Gerſtenſchrot und Brodt mengt. Die Jungen
erhalten erſt im zweyten Jahre ihre eigentlichen Farben.

- Halle*, Vögel, p. 509. n. 583. *der Gewittervogel*.
Fig. 40.
- Gatterer*, vom Nutzen und Schaden der Thiere,
II. p. 210. n. 191. *die Doppelschnepfe*.
- Onomat. histor. nat.* I. p. 776. *der Brachvogel*,
Wettervogel.
- Pennant*, arct. Zoolog. II. p. 430. A. *der Wet-*
tervogel, die Doppelschnepfe.
- Handbuch der deutschen Thiergesch.* p. 110. *der*
große Brachvogel.
- Klein*, av. p. 109. n. 1. *Numenius, Arquata Gesn.*
- Klein*, *Vorbereit* p. 201. n. 1. *deutscher Braacher*,
Brachvogel, Regen-, Wind-, Wettervogel.
- Klein*, *verbess. Vögelhist.* p. 112. n. 1. *teutscher*
Bracher, großer Feldmäher.
- Klein*, *stemm. av.* p. 24. Tab. 24. fig. 3.
- Klein*, *Vögeleyer*, p. 31. Tab. II. fig. 5.
- Gesner*, *Vögelb.* p. 47. *Brachvogel; m. 1 Fig.*
- Briffon*, *ornith.* II. p. 289. n. 1. *Courly*.
- Batsch*, *Thiere*, I. p. 200. *der Wettervogel*.
- Latham*, *Syn. Suppl.* p. 242. *Common Curlew*.
- Latham*, *Syst. ornithol.* II. p. 710. n. 1. *Nume-*
nius (Arquata) cinerascens nigroque varius,
pedibus caeruleis, alis nigris, maculis
niveis.
- Beseke*, *Naturgesch. der Vögel Kurl.* p. 59. n. 115.
der Krummschnabel, die Kronschnepfe.
- Siemssen*, *meklenburg. Vögel*, p. 171. n. 7. *die*
krummschnablichte Schnepfe, Regenwölp.
- Graumann*, *diätet. Wochenbl.* II. p. 104. *Keil-*
haken.
- Bock*, *Naturgesch. v. Preussen*, IV. p. 355. *der*
Krummschnabel, Bracher, Jütvogel.
- Fischer*, *Naturgesch. v. Livl.* p. 86. n. 104. *Bra-*
cher, Wettervogel.

- Leem*, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 133. *Gusgastak*.
- Pontoppidan*, Dännemark, p. 107. n. 2. *Heel-spove*.
- Pennant*, Reif. d. Schottl. I. p. 271. *Krummschnabel*.
- Olaffen*, Reif. d. Isl. I. p. 308. a. *Spoe, Spov*.
- Pallas*, nord. Beytr. IV. p. 14. *Brach-oder Kornschneepfe*.
- Naturf. XIII. p. 210. n. 112. *der Krummschnabel*.
- Linné*, auserl. Abhandl. II. p. 283. n. 34. *der Gewittervogel*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. VI. p. 26. n. 1. *Arquata*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 145. n. 5. *Scolopax* (*Arquata*) rostro arcuato, pedibus caerulefcentibus, alis nigris, maculis niveis.
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 22. n. 179. *Scolopax* (*Arquata*) rostro arcuato, pedibus caerulefcentibus, alis nigris, maculis niveis.
- Kramer*, Austr. p. 350. n. 1. *Numenius* rostro arcuato, alis nigris, maculis niveis, pedibus caerulefcentibus; *Goiffer*, *Brachschneepf*.
- Moehring*, av. gen. p. 74. n. 87. *Numenius*.
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 315. *Pardalus primus*; *ein Geißvogel, Brachhun, Giloch, Himmel-Geiß, großer Brachvogel*.
- Charleton*, onomast. zoic. p. 106. n. 2. *Arquata, Arcuata, Numenius veterum, Curlinus*.
- Muf. Worm. p. 307. *Arquata* feu *Numenius*.
- Jonston*, av. p. 158. *Arquata*.
- Hermann*, tab. affinit. animal. p. 141. *Scolopax Arquata*.
- Schäfer*, element. ornith. tab. 50.
- Sepp*, Voy. tab. p. 109. — *Collin. anat. II. tab. 21.*

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 298.
die Doppelschnepfe.

β. Latham, Syst. ornitholog. II. p. 710. n. 1. β.
Numenius rufo-nigroque varius, corpore sub-
tus pallide-rufescente, pedibus nigris, alis ni-
gris maculis rufescentibus.

γ. Die rosenrothpunktirte Doppelschnepfe. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 79. n. 1.

δ. Die weiße Doppelschnepfe, mit grauem Schna-
bel und gelblichweißen Füßen. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 79. n. 2.

21. LUZONIENSIS. Die gefleckte luçonische
Schnepfe.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 711. n. 3. Nume-
nius (Luzoniensis) albus, capite colloque striis,
abdomine caudaque fasciis nigris, dorso fusco
maculis albis, vertice nigro.

Sonnerat, Reis. n. Neuguin. p. 32. der gefleckte
Krummschnabel.

22. TAHITIENSIS. Die tahitische Schnepfe.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 711. n. 4. Nume-
nius (Tahitiensis) albo-rufescens, collo striis
nigris, dorso tectricibusque alarum nigricante
et albido undulatis, cauda basi maculis, ad api-
cem fasciis nigris.

23. LEUCOCEPHALA. Die weißköpfige Schnepfe.

Latham, Syn. Supplem. p. 242. White-headed
Curlew.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 711. n. 5. Nume-
nius (Leucocephalus) cyaneus, capite et col-
lo supremo griseo-albis, remigibus nigris,
rostro rubro.

4. PHAEOPUS. *Der Regenvogel.* (5)

Müller, Naturf. II. p. 395. n. 4. *der Regenvogel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 87. n. 2. *der Regenvogel.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 424. n. 2. *der Regenvogel.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 80. n. 2. *der Regenvogel.* p. 83. *Saatvogel, mittlerer Brachvogel, Gùsvogel, Regenworp, Regenwulp, Gùthvogel, Weid- u. Wettervogel, türkischer Goiser, türkische Schnepf, Blaubeerschnepfe, Blaufuß.*

Halle, Vögel, p. 509. n. 584. *der kleinere Gewittervogel.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 430. B. *der Regenvogel.*

Onomat. hist. nat. I. p. 777. *der kleine Brachvogel.*

Klein, av. p. 109. n. 2. *Numenius minor.*

Klein, Vorbereit. p. 202. n. 2. *kleinere Braacher.*

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 112. n. 2. *kleiner Braacher.*

Klein, stemmat. av. p. 24. Tab. 24. fig. 4.

Briffon, ornith. II. p. 291. n. 2. *petit Courly ou le Corlieu.*

Batsch, Thiere, I. p. 398. *der Regenvogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 711. n. 6. *Numenius (Phaeopus) rostro nigro, pedibus caeruleo-lescentibus, maculis dorsalibus fuscis rhomboidalibus, uropygio albo.*

Frisch,

- (5) Flügelweite 2 1/2 Fufs. *Briffon.* Gewicht 12 Unzen. *Penn.* Im Syst. ist *Kramer* El. p. 350. angeführt, aber ohne Nummer; so auch bey *Latham* n. 2. kann es nicht seyn; denn diese ist schon bey *Tantalus Falcinellus* p. 648. n. 2. umständlicher citirt; gleichwohl führt *Bechstein* bey *dem Regenvogel* die Synonymen *türkischer Goiser, türkische Schnepf* mit an, und dies wäre dann *Kram.* n. 2. — Wer hat Recht?

- Frisch*, Vögel, Tab. 225. die krummschnäblige Schnepfe oder Keilhake, der Brach- oder Regenvogel, die kleinere Art.
- Seligmann*, Vögel, VIII. Tab. 97. der Wimbrell oder kleine Bracher.
- Befcke*, Vögel Kurl. p. 59. n. 116. der Regenvogel, Blaubeerschnepfe.
- Siemssen*, mekleub. Vögel, p. 171. n. 8. die Moos-schnepfe.
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 86. n. 110. Blaubeerschnepfe.
- Bock*, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 356. der Regenvogel.
- Pennant*, Reif. n. Schottl. I. p. 19. Regenvögel.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 107. n. 132. der Brachvogel mit blaugrauen Füßen.
- Naturforsch. XIII. p. 210. n. 113. der Regenvogel.
- Pontoppidan*, Dännemark, p. 170. n. 3. Mellemspove.
- Pontoppidan*, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 184. Spove.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 2. Nume-nius minor.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 146. n. 6. Scolopax (Phaeopus) rostro arcuato, pedibus caeruleiscentibus, maculis dorsalibus fuscis rhomboidalibus.
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 22. n. 180. Scolopax (Phaeopus) rostro arcuato, pedibus caeruleiscentibus, maculis dorsalibus fuscis rhomboidalibus.
- Hermann*, tab. affinit. animal. p. 141. Scolopax Phaeopus.

5. FUSCA. *Die dunkelbraune Schnepfe.*

Müller, Natursystem, II. p. 395. n. 5. *der gewölk-
te Schnepf.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 438. n. C. *die dun-
kelbraune Schnepfe.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 32. *die braune Schnepfe.*

Briffon, ornithol. II. p. 280. n. 4. *Barge brune.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 724. n. 35. Scolopax
(Fusca) rostro apice inflexo, corpore nigro al-
bo nebuloso, uropygio alisque subtus albis.

Fischer, Livland, p. 86. n. 105. *gewölkter Schnepf.*

Tengmalm: neue schwed. Abhandl. IV. p. 47.
Scolopax Fusca.

24. CINEREA. *Der Terek.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 466. A. *die aschgraue
Avolette. der Terek.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 724. n. 36. Scolopax
(Terek) cinereo fusco maculata subtus alba,
collo subtus pectoreque cinereo nebulosis, fascia
alarum remigibusque secundariis apice albis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 141. Scolopax
cinerea.

25. SUBARQUATA. *Die rothbäuchige Schnepfe. (6)*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 425. n. 3. *die roth-
bäuchige Schnepfe.*

Bechstein.

- (6) Hält sich an grossen Mooren, sumpfigen Wiesen, und sol-
chen Orten auf, wo Teiche und Flüsse oft austreten. Kömmt
in Thüringen in der Mitte des März in kleinen Heerden
an, und zieht in der letzten Hälfte des Octobers weg.
Nährt sich von Insekten, Würmern, Graspitzen, Graswut-
zeln, auch grüner Saat. Legt im April auf einen Maul-
wurfs- oder Grashügel, in eine kleine Aushöhlung, ohne al-
le Zubereitung vier bis fünf gelbliche mit dunkelbraunen
Flecken gezeichnete Eyer. Brütet 16 Tage. Die Jungen
laufen

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 84. n. 3.
die rothbäuchige Schnepfe. Tab. 6.

Hermann, tab. affin. anim. p. 141. Scolopax Sub-
arquata.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 737. n. 39. (Mit
Tringa Islandica einerley.)

26. INCANA. *Die graue Schnepfe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 724. n. 34. Scolo-
pax (Incana) cinerea, iugulo, abdomine medio
maculaque ante oculos albis.

27. GRISEA. *Die braune Schnepfe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 432. n. 286. die brau-
ne Schnepfe.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 724. n. 34. Scolo-
pax (Grisea) cinereo-fusca, nigro nebulosa,
alis fuscis, dorso abdomine caudaque albis, uro-
pygio rectricibusque nigro fasciatis.

28. NOVEBORACENSIS. *Die Schnepfe v. Newyork.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 432. n. 285. die
Rothbrust.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 723. n. 32. Scolo-
pax (Noveboracensis) nigro cinereo rubroque
varia, dorso, abdomineque albis, alis cinereis,
cauda albo nigroque fasciata.

29. NIGRA. *Die schwarze Schnepfe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 437. n. 298. die
schwarze Schnepfe.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 723. n. 31. Scolo-
pax (Nigra) corpore toto aterrimo, rostro pe-
dibusque rubris.

30. Nu-

laufen sogleich ins Gras, und nehmen ihre von der Mutter
vergezeigte Nahrungsmittel auf. *Bechstein.*

30. NUTANS. *Die Nickschnepfe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 433. n. 287. *die Nickschnepfe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 723. n. 30. Scolopax (Nutans) cinerea ferrugineo varia, abdomine, uropygio caudaque albis, collo subtus, pectore, femoribus uropygioque maculis, cauda fasciis nigris.

31. FLAVIPES. *Die gelbbeinige Schnepfe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 436. n. 295. *das Gelbbein.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 723. n. 29. Scolopax (Flavipes) albida nigro maculata, alis fuscis, collo subtus pectoreque albo nigroque maculatis, abdomine rectricibusque caudae albis, rectricibus albis fasciis fuscis.

32. MELANOLEUCA. *Die Steinschnepfe.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 435. n. 293. *die Steinschnepfe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 723. n. 38. Scolopax (Melanoleuca) corpore maculis, uropygio caudaque fasciis albis nigrisque, remigibus primoribus nigricantibus, pedibus flavis.

33. SEMIPALMATA. *Die Schwimmschnepfe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 437. n. 297. *die Schwimmschnepfe.* Tab. 20. *Größ. Fig.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 722. n. 27. Scolopax (Semipalmata) nigro maculata, supra cinerea, subtus alba, remigibus primoribus fascia, secundariis rectricibusque extimis toto albis.

6. RUSTICOLA. *Die Waldschnepfe.* (7)

Müller, Naturfyſtem, II. p. 396. n. 6. *die Waldschnepfe.*

Leske, Naturgeſch. p. 275. n. 1. *die Waldschnepfe.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 88. n. 3. *die Waldschnepfe.*

Blumenbach, Handb. der Naturgeſch. p. 214. n. 1.
Scolopax (Rusticola) rostro basi rufescente,
pedibus cinereis, femoribus tectis, fascia capi-
tis nigra.

Bechstein, Naturgeſch. I. p. 425. n. 4. *die Waldschnepfe.*

Bechstein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 90. n. 6.
die Waldschnepfe. p. 107. *gemeine Schnepfe,*
Schneppe, Holzſchnepfe, Buſchſchnepfe, Waſ-
ſerrebhuhn, Bergſchneppe, Schnepphuhn. it.
p. 718. 719.

Funke, Naturgeſch. I. p. 249. *die Waldschnepfe.*

Ebert, Naturl. II. p. 92. *die gewöhnliche Wald-*
schnepfe.

Halle, Vögel, p. 479. n. 519. *die Waldschnepfe.*
Fig. 35.

Meyer, Thiere, II. Tab. 90.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere
II. p. 211. n. 193. *die Waldschnepfe.*

Onomat. hiſt. nat. VII. p. 43. *die gemeine Schnepfe,*
Waldschnepfe.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 437. A. *die europäi-*
ſche Waldschnepfe.

Handb. d. Naturgeſch. II. p. 315. *die Schnepfe.*

Handb. d. deutſch. Thiergeſch. p. 110. *die Wald-*
schnepfe.

Klein,

(7) Länge etwas über 13 Zoll; nach *Briffon*. Flügelweite
1 1/2 Fuſs, nach *Bechstein*. Gewicht 12 Unzen, nach *Pen-*
nant und *Gerner*.

- Klein*, av. p. 99. n. 1. Scolopax.
- Klein*, Vorber. p. 184. n. 1. *Waldschnepfe, Busch-, Holz-, Bergschnepfe.*
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 100. n. 1. *Waldschnepfe.*
- Klein*, Stemat. av. p. 20. Tab. 20. fig. 1. a-c.
- Klein*, Vögeleyer, p. 30. Tab. II. fig. 1. 2.
- Gesner*, Vögelb. p. 235. *Ruthschnepffe, oder größserer Schnepff.*
- Gesner*, Vögelb. p. 417. Scolopax.
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 164. n. 1. *die Waldschnepfe.*
- Briffon*, ornitholog. II. p. 284. n. 1. Becasse.
- Batsch*, Thiere, I. p. 398. *die Waldschnepfe.*
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 713. n. 1. Scolopax (Rusticola) castaneo nigro griseoque varia, subtus rufescens fasciis nigris, fascia capitis nigra, femoribus tectis.
- Beseke*, Vögel Kurlands, p. 59. n. 117. *die Waldschnepfe.*
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 356. *die Waldschnepfe.*
- Fischer*, Naturgesch. v. Livl. p. 186. n. 106. *Busch- oder Bergschnepfe.*
- Cetti*, Sardinien, II. p. 250. *die Schnepfe.*
- White*, Naturgesch. von England, p. 61. n. 5. *die Schnepfe.*
- Boswell*, Corfica, p. 45. *Schnepfen.*
- Wolf*, Ceyl. p. 136. *Waldschnepfen.*
- Pallas*, Reif. Ausz. III. p. 474. *Waldschnepfe.*
- Taube*, Slavon. u. Syrmien, I. p. 22. *Schnepfen?*
- Pontoppidan*, Naturgesch. v. Dänemark, p. 170. n. 4. *Blomrokke.*
- Döbel*, Jägerpraktik, I. p. 49. *Waldschnepffen.*
- Naumann*, Vogelsteller, p. 159. *Waldschnepfe oder Becasse.*

- Naturf. XIII. p. 211. n. 114. *der Waldschnepf.*
 Linné, auserles. Abhandl. II. p. 297. n. 102. *die Waldschnepfe.*
- Oekon. Zool. p. 78. n. 20. *die Waldschnepfe.*
 Meidinger, Vorles. I. p. 133. n. 1. *die Waldschnepfe.*
 Jablonsky, allgemein. Lex. p. 1014. *Holz- oder Waldschnepfen.*
- Zorn, Petinoth. II. p. 287. *die Waldschnepfe.*
 Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 96.
 Scopoli Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 108. n. 134. *die Waldschnepfe.*
- Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 4. *Rusticola.*
 Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 146. n. 7. *Scolopax (Rusticola) rostro recto laevi, pedibus cinereis, femoribus tectis, fascia frontis nigra.*
- Müller, zoolog. dan. prodr. p. 23. n. 181. *Scolopax (Rusticola) rostro recto basi rufescente, pedibus cinereis, femoribus tectis, fascia capitis niger.*
- Kramer, Austr. p. 351. n. 5. *Numenius rostri apice laevi, capite linea utrinque nigra, rectricibus nigris, apice albis; Wald-Schnepff.*
- Mochring, av. gen. p. 77. n. 97. *Rusticola.*
 Schwenkfeld, av. Siles. p. 329. *Perdix rustica maior; Schnepffe, Schnep-Hun.*
- Charleton, onomast. zoic. p. 108. n. 7. *Scolopax, Rusticola maior.*
- Schäfer, element. ornith. Tab. 61.
 Junston, av. p. 160. *Scolopax seu Perdix rustica.*
 Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 298. n. 2. *die Waldschnepfe.*
- β. *Die weiße Waldschnepfe.*
 Brisson, ornithol. II. p. 285. A. *Becasse blanche.*
 Klein, av. p. 100. n. 6. *Scolopax alba. (Mit Scol. Guaranna verwechselt.)*

Klein, Vorbereit. p. 186. n. 6. *weiße Waldschnepfe*.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 102. *weiße Waldschnepfe*.

Latham, Syn. III. 1. p. 131.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 714. n. 1. β.

Frisch, Vögel, Tab. 230. *der weiße Schnepf*.

Albin. av. III. 85. white Wood-Cock.

γ. *Die strohgelbe Schnepfe*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 714. n. 1. δ.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 165. β. *die Wachholder Schnepfe*, *Machollerschnepf*.

δ. *Die Schnepfe mit röthlichem Kopfe, weißem Leibe und braunen Flügeln*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 714. n. 1. δ.

ε. *Die geschäckte Schnepfe*. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 107. Var. 4.

ζ. *Die weißflügelige Schnepfe*. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 107.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 714. n. 1. ε. Scolopax corpore usitato, alis totis niveis.

34. MINOR. *Die kleine Waldschnepfe*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 430. n. 282. *die kleine Waldschnepfe*. Tab. 19. obere Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 714. n. 2. Scolopax (Minor) castaneo nigro rufoque varia, subtus flavescens, occipite nigro, fasciis quatuor transversis flavescens, cauda nigra.

35. PALUDOSA. *Die Sumpfschnepfe*.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 714. n. 3. Scolopax (Paludosa) rufo nigroque varia, subtus albida nigro undulata, loris superciliisque nigris.

36. MAIOR. *Die große sibirische Schnepfe.* (8)
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 108. 719.
die Mittelschnepfe.
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 438. B. *die große Schnepfe.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 714. n. 4. Scolopax (Maior) nigro maculata, supra testacea, subtus albida, linea verticis testacea, altera utrinque nigra.
Frisch, Vögel, Tab. 228. *die Doppelschnepfe?*
37. CAYENNENSIS. *Die cayennische Schnepfe.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 715. n. 5. Scolopax (Cayanensis) cinereo fusca testaceo varia, corpore subtus uropygioque albo, tectricibus alarum maioribus remigibusque primoribus basi albidis.
7. GALLINAGO. *Die Heerschnepfe.* (9)
Müller, Natursystem, II. p. 397. n. 7. *der Heerschnepf.*
Leske, Naturgesch. p. 275. n. 2. *die Heerschnepfe.*
Borowsky, Thierreich, II. p. 89. n. 4. *die Heerschnepfe.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 214. n. 2. Scolopax (Gallinago) rostro recto tuberculato, pedibus fuscis, frontis lineis fuscis quaternis;
Heerschnepfe, *Himmelsziege*, *Haberbock*.
Bechstein,
- (8) Gewicht 8 Unzen. *Penn.* — *Frischens* Doppelschnepfe scheint der Gestalt nach eine noch ungebraute junge *Waldschnepfe*, der Beschreibung nach aber eine *Heerschnepfe* zu seyn.
- (9) Frisst auch Getraide, zumal Hafer, und weiche Sumpfgewürze. Das Weibchen brütet seine Eyer allein in drey Wochen aus. Die Streifen am Kopfe sind vor dem ersten Mausern noch nicht deutlich, auch oft in der Anzahl verschieden.

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 426. n. 5. die Heerschnepfe.
- Bechstein*, Naturg. Deutschl. III. p. 110. n. 8. p. 720. die Heerschnepfe. p. 115. die Becassine, Heerschnepfe, Wasserschnepfe, Sumpfschnepfe, Riedschnepfe, Dobbelschnepfe, Grasschnepfe, Moosschnepfe, Wasserhühnchen, Bruchschnepfe, Himmelgeis, Schnibbe, Haarekenblatt, Haberbock, Haberlämmchen, Schnepfchen, kleine Pfulschnepfe.
- Funke*, Naturgesch. I. p. 249. die Heerschnepfe, Becassine.
- Ebert*, Naturl. II. p. 93. die Wasserschnepfe.
- Halle*, Vögel, p. 482. n. 521. die Himmelsziege.
- Meyer*, Thiere, II. Tab. 11.
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 211. n. 194. die Heerschnepfe.
- Pennant*, arct. Zoolog. II. p. 431. n. 283. die gemeine Schnepfe.
- Onomat. hist. nat.* VII. p. 34. die Sumpfschnepfe, Moosschnepfe, Heerschnepfe.
- Handb. d. deut. Thiergesch.* p. III. die Becassine.
- Klein*, av. p. 99. n. 2. Scolopax media.
- Klein*, Vorber. p. 185. n. 2. Duppelschnepfe.
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 101. n. 2. Duppelschnepfe.
- Klein*, av. p. 100. n. 3. Scolopax quae Capella celestis autorum.
- Klein*, Vorber. p. 185. n. 3. Himmelsziege, Schnepfe, Herren- und Fürstenschnepfe, Becasse.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 101. n. 3. Heerschnepfe.
- Klein*, stemmat. av. p. 20. Tab. 20. fig. 2. a-c.
- Gesner*, Vögelb. p. 239. Gallinago, rusticola minor; Herrschnepff, Harschnepff, Grasschnepff, Schnepfflein.

- Briffon*, ornith. II. p. 285. n. 2. Becassine.
- Batsch*, Thire, I. p. 397. die Heer- oder Sumpfschnepfe.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 715. n. 6. Scolopax (Gallinago) rostro tuberculato, corpore nigricante et fulvo vario, subtus albo, frontis lineis fulcis quaternis.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 59. n. 118. die Heerschnepfe.
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 166. n. 2. die Heerschnepfe, Haberzüge, Bekkassine.
- Bock*, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 357. n. 115. die Doppelschnepfe. p. 358. n. 116. die Heerschnepfe.
- Fischer*, Livland, p. 86. n. 107. Doppelschnepfe, Heer-, Moosschnepfe.
- Cetti*, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 252. die Heerschnepfe.
- White*, Naturgesch. von Engl. p. 61. n. 6. Moosschnepfe.
- Nau*, Entdeck. aus der Naturgesch. I. p. 248. Scolopax Gallinago.
- Leem*, Finnm. p. 133. Myrebuk.
- Olassen*, Reise d. Isl. I. p. 308. b) Hrossa Gökr, Myre-Skitr.
- Ström*, Lappl. p. 247. Myre-Snipe.
- Pontoppidan*, Naturgesch. v. Dännemark, p. 170. n. 5. Myrsneppe, Harsegiäg.
- Pontoppidan*, Naturhist. von Norwegen, p. 183. Myr-Sneppe.
- Naturforsch. XII. p. 211. n. 115. Doppelschnepfe. p. 212. n. 116. Heerschnepfe.
- Naturf. XVIII. p. 68. Moosschneppe.
- Wigand*, Abh. vom Guckguck u. s. w. p. 19-21. Heerschnepfe.
- Zern*, Petinoth. II. p. 422. Wasser- od. Moosschnepf.
Naumann,

- Naumann*, Vogelsteller, p. 195. *Wasserschneepfe*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 73. *Himmelsziege*.
 Anweisung Vögel zu fangen, u. f. w. p. 394.
der Moosschneepf.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. p. III. n. 138.
die Moosschneepfe.
Goetze, nützl. Allerl. II. p. 219. n. 26. *die Becassine*.
Meidinger, Vorlesung. I. p. 133. n. 2. *die Moos-*
schnepfe.
 Hannöv. Magaz. 1780. p. 415.
Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 96.
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 6. Galli-
 nago.
Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 147. n. 1. Scolo-
 pax (Gallinago) rostro recto, apice tubercula-
 to, pedibus fuscis, lineis frontis fuscis quaternis.
Müller, zool. dan. prodr. p. 23. n. 182. Scolopax
 (Gallinago) rostro recto tuberculato, pedibus
 fuscis, frontis lineis fuscis quaternis,
Kramer, Austr. p. 352, n. 6. Numenius capite li-
 neis quatuor fuscis longitudinalibus, rostri api-
 ce tuberculoso, femoribus seminudis; *Moos-*
schnepf.
Brünniche, ornith. bor. p. 48. n. 161. Scolopax
 (Gallinago) lineis frontis fuscis ternis, rectri-
 cibus lateralibus albis.
Schwenkfeld, av. Siles. p. 330. Perdix rustica mi-
 nor; *Wasserschneepf*.
Charleton, onomast. zoic. p. 108. n. 8. Gallinago,
 Scolopax minor, Molliceps Aristotelis.
Fabric, fn. groenl. p. 106. n. 71. Scolopax (Galli-
 nago) rostro recto tuberculato, pedibus fuscis,
 frontis lineis fuscis quaternis.
Jonston, av. p. 161. Scolopax, seu Gallinago
 minor.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 299. n. 3.
die Heerschnepfe.

β. Sc. remige prima a latere anteriori non alba, sed nigra. *

Brünniche, ornith. bor. p. 49. n. 162.

38. GALLINARIA. *Die finnmarkische Schnepfe.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 438. D. die finnmarkische Schnepfe.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 715. n. 7. Scolopax (Gallinaria) rostro tuberculato, corpore variegato, capite griseo, pedibus flavis.

8. GALLINULA. *Die Haarschnepfe.*⁽¹⁰⁾

Müller, Natursystem, II. p. 398. n. 8. das Wasserhühnchen.

Borowsky, Thierreich, III. p. 90. n. 5. das Wasserhühnchen, Rohrschnepfe.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 427. n. 6. die Haarschnepfe.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 120. n. 10. die Haarschnepfe. p. 123. Wasserhühnchen, Rohrschnepfe, Wasserschnepfe, Halbschnepfe.

Halle, Vögel, p. 482. n. 522. die Haarschnepfe.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 212. n. 195. die Haarschnepfe.

Pennant, arct. Zool. II. p. 432. n. 284. das Wasserhühnchen.

Onomat. hist. nat. VII. p. 36. Haarschnepfe, kleinste Schnepfe, Halbschnepfe.

Klein, av. p. 100. n. 4. Scolopax minima.

Klein, Vorbereit. p. 185. n. 4. kleinste Schnepfe.

Klein,

(10) Gewicht, nach *Pennant*, unter 2 Unzen. Legt 4 bis 5 grügelbe dunkelbraun gefleckte Eyer. Von den feinen, gleichsam haarigen Federn hat sie den Namen erhalten.

Klein, verb. Vögelhist. p. 101. n. 4. *Haarschnepfe*,
Pudelschnepfe.

Klein, stemm. av. p. 20. Tab. 20. fig. 4. a. b.

Briffon, ornith. II. p. 287. n. 3. petite Becassine.

Batsch, Thiere, I. p. 397. *das Wasserhühnchen*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 715. n. 8. Scolopax (Gallinula) rostro tuberculato, corpore variegato, uropygio violaceo vario, pedibus virescentibus, loris fuscis.

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 59. n. 119.
das Wasserhühnchen, *Haarschnepfe*.

Siemssen, meklenburg. Vögel, p. 167. n. 3. *die Haarschnepfe*, *Haarbull*.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 358. *das Wasserhühnchen*.

Fischer, Naturgesch. v. Livl. p. 86. n. 109. *kleinster Schnepfe*.

White, Naturg. v. Engl. p. 61. n. 7. *Halbschnepfe*.

Naturf. XIII. p. 213. n. 117. *das Wasserhühnchen*.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 112. n. 139.
die kleinste Schnepfe.

Döbel, Jägerprakt. I. p. 73. *Mittel - oder Haarschnepfe*.

Graumann, diätet. Wochenbl. II. p. 104.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 23. n. 184. Scolopax (Gallinula) rostro recto tuberculato, pedibus virescentibus, loris fuscis, uropygio violaceo vario.

Charleton, onomast. zoic. p. 108. n. II. Cinclus.

Jonston, av. p. 163. Cinclus quartus, Gallinago minima Bellonii.

39. BELGICA. *Die niederländische Schnepfe*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 716. n. 9. Scolopax (Belgica) rostro rectissimo apice nigro, capite

pite, collo et pectore ferrugineis, abdomine albo, dorso, alis, cauda pedibusque nigris.

40. PUSILLA. *Der Dunlin.* (1)

Pennant, arct. Zool. II. p. 443. n. 308. *der Dunlin.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 22. ad n. 8. *der Dunlin.*
Briffon, ornitholog. II. p. 288. n. 5. Becassine
 d' Angleterre.

41. OBSCURA. *Die purpurschnäblige Schnepfe.*

Pallas, nord. Beyträge, IV. p. 10. Scolopax obscura *Gmelin.*

9. FEDOA. *Die große Pfulschnepfe.*

Müller, Naturfyst. II. p. 398. n. 9. *der rothe Pfulschnepf.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 433. n. 288. *die große Pfulschnepfe.*

Onomat. histor. nat. III. p. 883. *das rothe amerikanische Berghuhn.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 104. n. 13. *langschnäblicht Wasserhuhn.*

Briffon, ornitholog. II. p. 283. n. 7. *Barge rouge d' Amerique.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 718. n. 14. Scolopax (Fedoa) rostro flavicante, corpore rufo nigroque, subtus albido, pedibus fuscis, remigibus secundariis rufis nigro punctatis.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 32. *das größere amerikanische Haselhuhn.*

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII. p. 461. n. 8. *die rothe Pfulschnepfe.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 146. n. 8. Scolopax (Fedoa) rostro recto longo, pedibus fuscis,

(1) Ist, nach *Latham*, mit *Tringa Alpina* p. 676. n. 11. einerley; daher auch beyder Synonymen von ihm zusammen gezogen werden.

fuscis, remigibus secundariis rufis nigro punctatis.

10. **GLOTTIS.** *Die Regenschneepfe.* (2)

Müller, Naturst. II. p. 399. n. 10. *der Regenschneepf.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 90. n. 6. *die Regenschneepfe.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 130. n. 13. *die Regenschneepfe.* p. 132. *große Pfulschneepfe, Grünbein, Meerhuhn.*

Pennant, arch. Zoolog. II. p. 436. n. 296. *das Grünbein.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 37. *die große graue Pfulschneepfe, Meerhuhn.*

Gesner, Vögelb. p. 240. *Glutt; m. i Fig.*

Gesner, Vögelb. p. 252. *Limosa.*

Briffon, ornithol. II. p. 279. n. 3. *grande Barge grise.*

Latham, Syn. Suppl. p. 249. *Greenshank.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 720. n. 21. *Scolopax (Glottis) griseo-fusca, maculis nigricantibus varia, superciliis, dorso infimo corporeque subtus albis, rectricibus albis, fasciis fuscis.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 359. *die Regenschneepfe.*

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 168. n. 4. *die Regenschneepfe.*

Graumann, diätet. Wochenbl. II. p. 104.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 110. n. 137. *Scolopax Glottis.*

Natur-

- (2) Gewicht, nach *Pennant*, 5 Unzen. Legt 6 schmutzig strohgelbe, mit leberfarbenen und purpurblauen, einzelnen großen und kleinen Flecken besprenge Eier, von der Größe der Rebhühnereyer. Wird oft mit der folgenden Gattung verwechselt.

- Naturforsch. XIII. p. 213. n. 118. *Regenschneepfe.*
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 26. n. 5. Glottis.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 146. n. 9. Scolopax
 (Glottis) rostro recto, basi inferiori rubro, pedibus virescentibus.
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 23. n. 185. Scolopax (Glottis) rostro recto, basi inferiore rubro, corpore subtus niveo, pedibus virescentibus.
Charleton, onomast. zoic. p. 104. n. 9. Limosa.
Charleton, onomast. zoic. p. 109. n. 3. Pluvialis maior.
Fonston, av. p. 156. Limosa. p. 165. Pluvialis maior Aldrov.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 299. n. 4. *die Regenschneepfe.*

II. CALIDRIS. *Die rothfüßige Schneepfe.*

- Müller*, Naturf. II. p. 400. n. II. *der Rothfuß.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 127. n. 12. *die rothfüßige Schneepfe.* p. 130. *Rothfuß, Rothbein, der kleine Rothschenkel.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 436. n. 294. *das Rothbein, Strand-schneepfe.*
 Onomat. hist. nat. VII. p. 29. *das Rothbein.*
Halle, Vögel, p. 484. n. 525. *das Wasserhuhn mit rothen Füßen und Schnabel.*
Klein, av. p. 101. n. 1. Glareola I.
Klein, Vorber. p. 187. n. 1. *Rothbeinlein, Rothfüßel, Wasserhünlein mit rothen Beinen.*
Klein, verbesserte Vögelhist. p. 102. n. 1. *Rothbeinlein.*
Klein, stemmat. av. p. 21. Tab. 21. fig. 11. a. b.
Brisson, ornitholog. II. p. 261. n. 3. Chevalier.
Gesner, Vögelb. p. 239. *Rothbein.*

Latham,

Latham, Syn. Suppl. p. 225. Redshank.

Latham, Syst. ornith. II. p. 722. n. 25. Scolopax (Calidris) rostro rubro, pedibus coccineis, corpore cinereo, remigibus secundariis albis.

Beseke, Vögel Kurlands, p. 62. n. 2. (das zweyte Exemplar.)?

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 138. *Laxe-Titing*.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 359. *der Rothfuß*.

Pennant, Reif. d. Schottl. I. p. 19. *Rothschenkel*. Naturf. XIII. p. 213. n. 119. *der Rothfuß*.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 23. n. 186. Scolopax (Calidris) rostro recto rubro, pedibus coccineis, remigibus secundariis albis.

Kramer, Austr. p. 353. n. 5. Tringa rostro nigro, basi rubra, pedibus coccineis; *Rothfüßler*.

Charleton, onomast. zoic. p. 107. n. 2. Gallinula Erythropus.

Charleton, onomast. zoic. p. 106. n. 5. Calidris Bellonii, Fedoa.

Charleton, onomast. zoic. p. 106. n. 4. Totanus.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 281. Glareola I. *Rottbein*, *Rotfüßel*.

Jonston, av. p. 159. Calidris Bellonii.

β. *Latham*, Syn. III. 1. p. 151. n. 1. Var. A. Chinese Redshank.

Latham, Syst. ornith. II. p. 722. n. 25. β. Sc. corpore supra griseo, subtus candido, collo subtus et pectore lateribus nigricante maculatis, uropygio et cauda albo nigroque fasciatis.

12. TOTANUS. *Die Strandschnepfe*.

Müller, Naturyst. II. p. 400. n. 12. *der Strandschnepf*.

Borowsky,

- Borowsky*, Thierreich, III. p. 91. n. 7. *die Strandschnepfe.*
- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 123. n. 11. *die Strandschnepfe.* p. 125. *der große Rothschenkel, die gefleckte Pfulschnepfe, das Meerhuhn.*
- Onomat. histor. natur.* VII. p. 45. *das Meerhuhn, Strandschnepfe.*
- Klein*, av. p. 102. n. 12. *Glareola, Barker Albin.*
- Klein*, Vorbereit. p. 189. n. 12. *der Barker.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 104. n. 12. *Barker.*
- Briffon*, ornith. II. p. 279. n. 2. *Barge grise.*
- Gesner*, Vögelb. p. 251. *Totanus.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 397. *die Strandschnepfe.*
- Latham*, Syst. ornith. II. p. 721. n. 24. *Scolopax (Totanus) nigricans maculis albis, subtus alba, pectore lineolis, rectricibus lateralibus fasciis nigricantibus, pedibus rubris.*
- Siemssen*, meklenburg. Vögel, p. 169. n. 5. *die Strandschnepfe.*
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 86. n. 108. *Pfulschnepfe.*
- Leem*, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 134. *Skrugg-Kjeld.*
- Pallas*, nord. Beytr. III. p. 13. *die Strandschnepfe.* IV. p. 10. *Scol. Totanus.*
- Pontoppidan*, Dänemark, p. 170. n. 1. *Röd-beener.*
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 23. n. 187. *Scolopax (Totanus) rostro subrecto, pedibus fuscis, superciliis, pectore, abdomine uropygioque albis.*
- Charleton*, onomast. zoic. p. 106. n. 3. *Crex?*
- β. *Pennant*, arch. Zool. II. p. 434. n. 291. *die gefleckte Pfulschnepfe.*

Latham,

Latham, Syn. III. I p. 149. n. 19. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 721. n. 24. β.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 125. die gefleckte Strandschnepfe.

13. LIMOSA. Die gemeine Pfulschnepfe. (3)

Müller, Natursystem, II. p. 401. n. 13. die gemeine Pfulschnepfe.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 428. n. 8. die kleine Pfulschnepfe.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 116. n. 9. die Pfulschnepfe. p. 120. die gemeine kleine Pfulschnepfe, *Becassine*, *Stickup*.

Halle, Vögel, p. 483. n. 523. die Uferschnepfe?

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 213. n. 197. die Pfulschnepfe.

Pennant, arch. Zoolog. II. p. 435. n. 292. die kleine Pfulschnepfe, *Jadreka*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 40. die gemeine Pfulschnepfe.

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. III. Pfulschnepfe, *Wasserschnepfe*.

Klein,

(3) Gewicht, nach *Pennant*, 9 Unzen. Ist der *Becassine* sehr ähnlich, nur daß bey jener der Schnabel etwas länger, die Farben des Oberkörpers dunkler, und der Unterleib weißer ist. Ob *Olassens*, *Fabrizens*, und *Müllers Jadreka* ebenderselbe Vogel sey, scheint noch nicht ganz ausgemacht zu seyn. In unserm System ist sie mit hierher gerechnet, und *Pennant* zieht gleichfalls die Synonymen zusammen. *Olassen* sagt von seiner *Jadreka*, daß sie zwar in vielen Stücken mit der Pfulschnepfe übereinkomme, aber es fehlten dieser doch wichtige Merkinale, die jene habe. Sie lege 4 Eyer. *Fabric*. sagt: er habe nur ein einziges Exemplar von diesem Vogel gesehen, er gehöre unter die seltensten Vögel Grönlands, und seine Oekonomie sey gar nicht bekannt. *Müller* will ihn fast zur *Walschnepfe* (Sc. Rusticola) rechnen.

- Klein*, av. p. 100. n. 5. Scolopax, Rusticola Aldr.?
- Klein*, Vorbereit. p. 186. n. 5. *Riedschneepfe?*
- Klein*, verbesserte Vögelhist. p. 102. ad n. 5.
- Briffon*, ornithol. II. p. 277. n. 1. Barge.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 719. n. 18. Scolopax (Limosa) rostro subrecurvato basi rubro, corpore griseo-fusco rufo variegato subtus albo, remigibus basi albis, quatuor primis immaculatis, cauda basi alba.
- Beseke*, Vögel Kurlands, p. 60. n. 120. *die Pfulschneepfe, Doppelschneepfe.*
- Bock*, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 359. *die kleine Pfulschneepfe, Pudelschneepfe, Moorschneepfe.* (Mit der Haarschneepfe verwechselt.)
- Pennant*, Reise d. Schottl. I. p. 19. *Pfulschneepfer mit rother Brust.*
- Lepetchin*, Tageb. d. russ. Reif. I. p. 194. *langbeinigte Schneepfen.*
- Olassen*, Reif. d. Isl. II. p. 201. G. *Jadreka.*
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 172. n. 2. *die Pfulschneepfe.*
- Pallas*, nord. Beyträge, III. p. 113. *die große Schneepfe.*
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 73. *Ried - Pfuhl - oder Puhlschneepfe.*
- Naumann*, Vogelsteller, p. 196. *Pfulschneepfe.*
- Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Fr. VII. p. 461. n. 41. *gemeine Pfulschneepfe.*
- Naturf. XIII. p. 214. n. 120. *die gemeine Pfulschneepfe.*
- Linné*, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. Limosa.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 3. Numenius medius.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 147. n. 10. Scolopax (Limosa) rostro recto laevi, pedibus fuscis,

cis, remigibus macula alba, quatuor primis immaculatis.

Müller, zool. dan. prodr. p. 23. n. 190. Scolopax (Jadreka) rostro recto laevi, pedibus plumbeis, remigibus linea obliqua uropygioque albo, rectricibus macula nigra.

Fabric. in groenl. p. 107. n. 72. Scolopax (Jadreka) rostro recto laevi, remigibus linea obliqua, uropygio albo, rectricibus macula nigra.

Moehring, av. gen. p. 74. n. 88. Totanus.

Charleton, onomast. zoic. p. 104. n. 10. Barge Gallorum.

Jonston, av. p. 156. Barge Gallorum.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 300. n. 5. die gemeine Pfulschneepfe.

14. CAPENSIS. Die capsche Schneepfe.

Müller, Naturfyst. II. p. 402. n. 14. der capsche Schneepf.

ONOMAT. hist. nat. VII. p. 51. die Schneepfe vom Vorgeb. d. g. Hoffnung.

Latham, Syn. Suppl. p. 244. Cape Snipe.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 716. n. 10. Scolopax (Capensis) rostro lineaque verticis rufescentibus, fascia pectorali nigra, linea utrinque dorsali alba.

Briffon, ornitholog. II. p. 288. n. 6. Becassine du Cap de bonne Esperance.

Sparrmann, Reise n. d. Vorgeb. der g. Hoffn. p. 148. Kieviten. (Kiebitze.)

β. *Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 716. n. 10. β. Sc. olivaceo-viridis, collo nigro, vertice iuguloque ferrugineis, orbitis scapularibus abdomineque albis, remigibus caudaque maculis fulvis.

- γ. *Latham*, Syn. III. 1. p. 139. n. 9. Var. B.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 717. n. 11. Scolopax (Sinensis) caerulescente fusco rufo nigroque variegata, superciliis, linea verticis, gula abdomineque albis. (4)
- δ. *Latham*, Syn. III. 1. p. 139. n. 9. Var. C.
Latham, Syst. ornith. II. p. 717. n. 10. γ. Scolopax cinereo griseo nigroque undulata, capite colloque rufis, orbitis, gula, scapularibus abdomineque albis, fascia pectoris superciliisque nigris, remigibus caudaque maculis ovatis nigris.
42. MADERASPATANA. *Die Rebhuhnschnepfe.*
Briffon, ornithol. II. p. 287. n. 4. Becassine de Madras.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 717. n. 12. Scolopax (Maderaspatana) nigricante fulvoque varia, subtus alba, capite fasciis tribus dorso duabus fusco-nigricantibus, pectoris unica nigra.
43. INDICA. *Die indianische Schnepfe.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 718. n. 13. Scolopax (Indica) grisea fusco-undulata, subtus alba, capite albido, collo subtus striis, vitta per oculos alteraque subtus griseis, rostro pedibusque nigris.
15. LAPPONICA. *Die lappländische Schnepfe.* (5)
Müller, Natursyst. II. p. 402. n. 15. *der lappländische Schnepf.* Tab. 16. fig. 1.
 Onomat. hist. nat. VII. p. 39. *die lappländische Schnepfe.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 433. n. 289. *die rothe Pfulschnepfe.*

Klein,

(4) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

(5) Flügelweite 2 Fuß 4 Zoll, Gewicht 12 Unzen. *Penn.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 104. n. 14. rothbrüstiges Wasserhuhn.

Brisson, ornithol. II. p. 281. n. 5. Barge rouge.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 718. n. 15. Scolopax (Lapponica) rostro flavescente, pedibus nigris, subtus tota rufo-ferruginea.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 33. das rothgebrüstete Hasel-Huhn.

Pallas, Reif. Ausz. II. p. 240. Scolopax lapponica.

Linne', Syst. Natur. Edit. X. I. p. 147. n. 12. Scolopax (Lapponica) rostro subrecurvato, pedibusque nigris, pectore ferrugineo.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 147. n. 14. Scolopax (Haemastica) rostro recto flavescente, pedibus fuscis, corpore subtus fulvo fusco-undulato.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 23. n. 188. Scolopax (Lapponica) rostro subrecurvato flavescente, pedibusque nigris, subtus tota rufo-ferruginea.

β. *Latham*, Syn. III. I. p. 143. n. 13. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 719. n. 15. β. Sc. fusca, capite colloque cinereis, gula, superciliis abdomineque albis, pectore ferrugineo nebuloso.

16. AEGOCEPHALA. Die Geiskopfschnepfe. (6)

Müller, Naturyst. II. p. 402. n. 16. der Geißkopf.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 427. n. 7. der Geiskopf.

V v v 3

Bechstein,

(6) Hier findet sich in Ansehung der Synonymen bey den Ornithologen eine ganz verschiedene Ordnung, die ich nicht unbemerkt lassen kann. In unserm System ist *Pennants Common Godwit Britt. zool. II. n. 179. Arct. zool. n. 373.* hieher gerechnet. *Latham* trennt diese ganz von der *Scol. Aegocephalo*,

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 132. n. 14.
die *Geiskopfschnepfe*.

Halle, Vögel, p. 483 n. 523. die *Uferschnepfe*.

Pennant, arct. Zool. II. p. 434. n. 290. gemei-
ne *Pfufschnepfe*, *Geiskopf*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 27. die *Uferschnepfe*.

Klein, av. p. 102. n. II. Glareola, Aegocephalus.

Klein, Vorber. p. 189. n. II. *Gelbnase*, *Rothhals*.

Klein, verbeff. Vögelhist. p. 104. n. II. *Grbnase*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 719. n. 16. Scolopax
(Aegocephala) rostro flavo-rubente, pedibus
virescentibus, capite colloque rufescentibus, remi-
gibus tribus nigris basi albis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 147. n. 13. Scolo-
pax (Aegocephala) rostro recto, pedibus vire-
scentibus, capite colloque rufescentibus, remi-
gibus tribus nigris, basi albis.

β. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 134. der
rothe Geiskopf.

Briffon, ornith. II. p. 282. n. 6. grande Barge rousse.

Shaw, Reis. p. 163. das *Rebhuhn in der Bar-
barey*.

44. CANESCENS. Die *grau- und weißbunte Schnepfe*.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 721. n. 22. Scolo-
lopax (Canescens) cinereo alboque varia, gula
pectore-

cephala, nimmt *Briffons Limosa evisea maior* (Gmel. System.
p. 664. n. 10. Scol. Glottis) dazu, und macht daraus p. 719.
n. 17. eine eigne Gattung: *Scolopax (Lencophaea) fusca, albi-
do marginata, collo albedo, maculis parvis fuscis, gula abdomi-
neque albis, rectricibus albis, nigro fasciatis*. Dagegen sieht er
zu *Scolopax Glottis, Briffons Limosa Grisea* n. 2. (Gmel.
p. 665. n. 12. Scol. Totanus) und bey *Scol. Totanus* findet
sich bey ihm gar kein *Briffonsches* Synonym. — In *Penn.
arct. zoolog.* hingegen ist *Briff. grande Barge grise* mit unter
den Synonymen von *Common Godwit* aufgeführt.

pectoreque albis, cauda fasciis pectoreque maculis cinereis.

45. CANTABRIGIENSIS. *Die engländische Schnepfe.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 721. n. 23. Scolopax (Cantabrigiensis) cinereo-fusca, subtus alba, rectricibus alarum rectricibusque nigro-fasciatis, rostro rubro.

18. CANDIDA. *Die weiße Schnepfe.*
Müller, Naturfyst. II. p. 403. n. 18. *der hudsonische Schnepf.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 30. die weiße Schnepfe mit gelben Füßen.

Klein, verbeff. Vögelhist. p. 104. n. 16. *weißes Wasserhuhn.*

Brisson, ornith. II. p. 266. n. 8. Chevalier blanc.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 722. n. 26. Scolopax (Candida) rostro recto pedibusque aurantiis, corpore albicante, rectricibus candidis, griseo-fasciatis.

Seligmann, Vögel, V. Tab. 34. *der weiße Wasser Schnepf.*

36. CURONICA. *Die kurländische Schnepfe.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 724. n. 37. Scolopax (Curonica) griseo-maculata, alis nigricantibus, rostro nigricante, mandibula inferiore subtus a basi ad medium coccinea, pedibus lateritiis.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 247. n. 17. Scolopax alba. p. 694. n. 3. Recurvirostra alba.

Das Geschlecht ist mit 28 Gattungen der Zahl nach, sonst aber mit 29 neuen Schnepfenarten vermehrt, denn die 17te Gattung der XIIten Edition ist in ein anderes Geschlecht versetzt, und deren Stelle mit einer neuen besetzt. Bey der 3ten Gattung ist die Var. β , bey der 6ten die Var. β , γ , δ ; bey der 11ten die Var. β , bey der 12ten die Var. β , bey der 14ten die Var. β , γ , δ , bey der 15ten die Var. β hinzugekommen, und bey der 16. ist *Briff.* n. 6. als Spielart von der Hauptgattung angenommen.

B. Unbestimmtere Thiere.

1. Eine dem *Scol. Lapponica* und *Scol. Alba* Linn. (*Recurvirostr. alba* Gmel.) ähnliche Schnepfe.

Beseke, Vögel Kurland, p. 63. n. 3.

2. Die punktirte Schnepfe.

Nau: Naturf. XXV. p. 27. *Scolopax* (*Punctata*) rostro arcuato, gula rufescente, dorso fusco, punctis albis, pedibus nigris.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 88. n. 5. die punktirte Schnepfe.

3. Die rothfärbige Schnepfe auf den Pyrenäen und im südlichen Frankreich.

Thunberg: neue schwed. Abhandl. III. p. 107.

Scolopax (*Rufipes*) rostro subrecurvato, basi cinnabarino, pedibus cinnabarinis, tectricibus caudae crissisque albo fuscoque striatis.

4. Die kleine Strandschnepfe.

Simmson, meklenb. Vögel, p. 169. n. 6. *Scolopax* (*Dethardingii*) rostro subrecto, dorso pedibusque fuscis, collo pectoreque griseis, cauda cinerea, gula, abdomine, crisso et uropygio candidis.

C. Neus-

B. *Neuere Gattungen.*1. *Die marmorirte Schnepfe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 245. Marbled Godwit.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 730. n. 19. Scolopax (Marmorata) nigricante pallideque rufo, maculatum varia, abdomine medio, superciliis gulaque albidis, pectore fusco-undulato, remigibus rufescentibus, quatuor primis extus apiceque nigris.

2. *Die hudsonische Schnepfe.*

Latham, Syn. Suppl. p. 246. Hudsonian Godwit.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 720. n. 20. Scolopax (Hudsonica) fusca maculis albis, subtus castaneo-ferruginea, fasciis fuscis, superciliis, gula, uropygio rectricibusque basi albis.

87. GESCHLECHT. TRINGA. *Der Strandläufer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 404. Gen. LXXXVII.

Leske, Naturgesch. p. 273. Gen. LIII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 91. Gen. LII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 215. Gen. LIX.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 428. Gen. XLII.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 135. Gen. XXIX.

Halle, Vögel, p. 99. Gen. IV.

Onomat. hist. nat. VII. p. 556.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 439.

Briffon, ornith. II. p. 259. Gen. LXXV. p. 361. Gen. LXXXIX. Phalaropus.

Batsch, Thiere, I. p. 386. Gen. CII.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 725. Gen. LXXIII. p. 775. Gen. LXXXII. Phalaropus.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 141.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 300. Gen. LI.

I. PUGNAX. *Der Kampfhahn.* (7)

Müller, Naturfyst. II. p. 404. n. 1. *der Kampfhahn.* Tab. 23. fig. 7.

Leske, Naturgesch. p. 273. n. 1. *der kämpfende Strandläufer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 92. n. 1. *der Kampfhahn.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 215. n. 1. Tringa (Pugnax) rostro pedibusque rubris, rectricibus tribus lateralibus immaculatis, facie papillis granulatis carnis; *der Kampfhahn.*

Bechstein, Naturg. I. p. 431. n. 1. *der Kampfhahn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 155. n. 7. *der Kampfhahn.* p. 161. *Streithuhn, Heidehuhn, Hausteufel, Renomist, Brausehahn, Mönnik, Streitvogel, Strußhahn, Seepfau.* (*Beginen, die Weibchen.*)

Funke, Naturgesch. I. p. 250. *der Kampfhahn.*

Ebert, Naturl. II. p. 95. *der Kampfhahn.*

Halle, Vögel, p. 488. n. 532. *das Hausteufelchen.* Fig. 36.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 215. n. 189. *das Streithuhn.*

Neuer

(7) Ist fast der einzige wilde Vogel, der in Rücksicht der Farbe so sehr wie das Hausgeflügel abändert. Verläßt Deutschland im September, und kömmt im April oder May zurück. Hält sich besonders an der Seeküste oder in grossen Sümpfen und Morästen auf. Nährt sich von Insekten und Gewürmen, vorzüglich Regenwürmern, auch einigen Wasserkräutern und deren Wurzeln. Läst jung gefangen sich zähmen, und an den in der Stube auferzogenen bemerkt man gar nichts von der ihnen sonst eignen Streitsucht. Im ersten Jahre sind Männchen u. Weibchen nicht von einander zu unterscheiden.

Neuer Schaupl. der Natur, I. p. 959. *Braushahn.*
 Onomat. hist. nat. VII. p. 574. *der Hausteufel.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 446. A. *der Kampf-*
hahn.

Handb. der Naturgesch. II. p. 312. *das Kampf-*
hähnchen.

Klein, av. p. 102. n. 10. *Glareola Pugnax.*

Klein, Vorber. p. 188. n. 10. *Hausteufel.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 103. n. 10. *Kampf-*
hähnchen, Braushahn.

Klein, Stemmat. av. p. 21. Tab. 21. fig. 1. a. b.

Briffon, ornith. II. p. 273. *Combattant, ou Paon-*
de-ner.

Batsch, Thiere, I. p. 399. *die Kampfähne.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 725. n. 1. *Tringa*
 (Pugnax) rostro pedibusque rufis, rectricibus
 tribus lateralibus immaculatis, facie papillis
 granulatis carnis.

Beseke, Vögel Kurl. p. 64. n. 124. *der Kampfahn.*

Siemssen, meklenburg. Vögel, p. 173. n. 1. *der*
Kampfahn, Bruhshahn.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 360. n. 121.
der Kampfahn.

Fischer, Livland, p. 87. n. III. *Streit-od. Brau-*
sehahn.

Leem, Finn. p. 132. *Bruuns-Kopper.*

Lepechin, Tagebuch der russ. Reise, III. p. 14.
Kampfähne.

Pennant, Reif. d. Schottl. I. p. 16. *Kampfähne.*

Naturf. XIII. p. 214. n. 121. *der Kampfahn.*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 170.
 n. 1. *Brushane. (Brauskopfschnepfe.)*

Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 130.
Bruushane.

Meidinger, Vorles. I. p. 132. n. 1. *der Kämpfer.*

Scopoli,

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 113. n. 140.
der Streitvogel.

Goeze, nützl. Allerl. I. p. 158. der Kampfahn.

Mannichf. II. p. 602. der Streithahn; mit 1 F.

Hannöv. Magaz. 1780. p. 418 ff.

Frisch, Tabb. citt. die Streitschnepfe.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. Pugnax.

Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 26. n. 1. Avis
Pugnax.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 148. n. 1. Tringa
(Pugnax) pedibus rubris, rectricibus tribus
lateralibus immaculatis, facie papillis granula-
tis carneis.

Müller zoolog. dan. prodr. p. 24. n. 191. Tringa
(Pugnax) rostro pedibusque rubris, rectricibus
lateralibus immaculatis, facie papillis granula-
tis carneis.

Kramer, Austr. p. 352. n. 1. Tringa capite rufo,
collo antice pennis longissimis atris obsito,
pedibus luteis; *Krößler*.

Kramer, Austr. p. 352. n. 2. Tringa vertice et col-
lo postice nigro, antice collo pennis longis te-
staceis lituris, maculisque nigris obsito, pedi-
bus fuscis; *Krößler*.

Mohring, av. gen. p. 76. n. 93. Philomachus.

Charleton, onomast. zoic. p. 104. n. 5. Avis pugnax.

Jonston, av. p. 154. Avis pugnax.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 300. n. 1.
der Kampfahn.

a. VANELLUS. Der Kybitz. (8)

Müller, Natursystem, II. p. 406. n. 2. der Ky-
bitz. Tab. 24. fig. 1.

Leske,

(8) Flügelweite $2\frac{1}{2}$ Fufs. Gewicht 8 Unzen. Das Weibchen
legt jährlich zwey - auch wohl drey - bis viermal Eyer, wenn
sie

- Leske*, Naturgesch. p. 274. n. 2. *der Kibitz.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 93. n. 2. *der Kiebitz.*
Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 215. n. 2.
 Tringa (Vanellus) pedibus rubris, crista dependente, pectore nigro; *der Kybitz.*
Bechstein, Naturgesch. I. p. 429. n. 1. *der gemeine Kiebitz.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 136. *der gemeine Kiebitz.* p. 143. *Kibitz, Kievitz, Kybitz, Kübitz, Kifitz, Gibitz, Gyfitz, Zifitz, die Zifitzen, Kiebith, Geisvogel, Feldpfau.*
Funke, Naturgesch. I. p. 251. *der Kiebitz.*
Ebert, Naturl. II. p. 96. *der Kiebitz.*
Halle, Vögel, p. 99. n. 8. *der gemeine Kueiz.*
Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere, II. p. 216. n. 200. *der Kiebitz.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 447. D. *der Kiebitz.*
 Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 871. *Kybitz.*
 Onomat. hist. nat. II. p. 583. *der Kübitz, Gyfitz.*
 Handb. d. Naturg. II. p. 302. *der Kybitz, Pardel.*
 Handb. d. deutsch. Thiergesch. p. III. *der Kibitz.*
Klein, av. p. 19. n. 1. *Gavia vulgaris.*
Klein, Vorbereit. p. 39. n. 1. *Kybitz, Feldpfau.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 20. n. 1. *gemeiner Kybitz.*
Klein, stemmat. av. p. 3. Tab. 3. fig. 5. a. b.
Klein, Vögeleyer, p. 16. Tab. 6. fig. 2. 3.
Gesner, , Vögelb. p. 150. *Gyfitz.* Fig. p. 151. *mittelmäfsig.*
Briffon, ornithol. II. p. 236. n. 1. *Vanneau.*
Batsch, Thiere, I. p. 399. *der gemeine Kibitz.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 726. n. 2. *Tringa (Vanellus) pedibus rubris, crista dependente, pectore nigro.*

Befcke,

sie ihm öfters entwendet werden. Zuweilen, aber sehr selten findet man auch weisse Kybitze.

- Beske*, Vögel Kurl. p. 64. n. 125. *der Kiebitz.*
Siemssen, meklenburg. Vögel, p. 174. n. 2. *der Kybitz.*
Bock, Naturg. v. Preussen, IV. p. 361. n. 122. *der gemeine Kiebitz.*
Cetti, Sardin. II. p. 259. *der Kiebitz.*
Fischer, Livland, p. 87. n. 112. *Kyfiz.*
Taube, Slavon. u. Syrm. I. p. 23. *Kiwitze.*
Pennant, R. d. Schottl. I. p. 19. *Kiebitze.*
Pallas, Reise, Ausz. III. p. 475. *Kyweit.*
Pallas, nord. Beyträge, III. p. 13. *der Kybitz.*
Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 170. n. 2. *Vibe.*
Linné, auserl. Abhandl. II. p. 283. n. 33. p. 284. n. 41. 43. p. 285. n. 47. p. 296. n. 94. *der gemeine Kiwitz.*
 Naturf. XIII. p. 215. n. 122. *der Kiebitz.*
Naumann, Vogelfteller, p. 181. *Kiebitz.*
Döbel, Jägerprakt. I. p. 53. *Kibitz.*
Zorn, Petinotheol. II. p. 94. 423. 145. *Kybitz.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 113. n. 141. *der Kybitz.*
 Anweisung Vögel zu fangen u. f. w. p. 235. *der Gibitz.*
Jablonsky, allgem. Lex. p. 527. *Kibitz.*
Eberhard, Thiergesch. p. 95. *der Kiwitz.*
Maidinger, Vorles. I. p. 132. n. 2. *der Kibiz.*
Geoffroy, mat. med. VII. p. 749. *Kiwitz.*
Kraft, Ausrott. grauf. Thiere, I. p. 281. *Kybitz.*
Beckmann, Naturhist. p. 47. *der gemeine Kybitz.*
Goeze, nützl. All. I. p. 158. *der Kiebitz.*
Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 98.
 Hannöv. Magazin, 1780. p. 420.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. *Vanellus.*
Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 4. *Vanellus.*
Linné,

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 148. n. 2. Tringa (Vanellus) pedibus rubris, crista dependente, pectore nigro.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 24. n. 192. Tringa (Vanellus) pedibus rubris, crista dependente, pectore nigro.

Kramer, Austr. p. 353. n. 4. Tringa crista dependente, pectore nigro; *Kiwitz*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 361. Vanellus; *Gybitz*, *Gyfitz*, *Gywitt*.

Charleton, onomast. zoic. p. 108. n. 13. Vanellus.

Moehring, av. gen. p. 76. n. 92. Vanellus.

Jonston, av. p. 164. Vanellus.

Schäfer, element. ornith. Tab. 69.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 139. Tringa Vanellus.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 301. n. 2. der *Kybitz*.

6. BONONIENSIS. *Der bononische Kybitz.*

Briffon, ornithol. II. p. 239. n. 5. grand Vanneau de Bologne.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 726. n. 3. Tringa (Bononiensis) nigra subtus albida, capite et collo superiore castaneis, iugulo et pectore maculis ferrugineis vario, rectricibus nigris.

10. ERYTHROPUS. *Der rothbeinige Kybitz.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 154. n. 6. der rothbeinige Kiebitz.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 727. n. 4. Tringa (Erythropus) fusco-cinerea, abdomine fuliginoso, fronte rufa, rectricibus albo-rufescentibus, fascia ad apicem nigra.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 118. n. 146. das Rothbeinlein.

3. GAMBETTA. *Die Gambette.*

Müller, Natursystem, II. p. 407. n. 3. *der rothe Reuter.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 430. n. 2. *die Gambette.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 143. n. 2. *die Gambette.* p. 145. *Stelkr.* p. 146 *Deutschen, kleine Brachvögel, Gambettstrandvögel.*

Halle, Vögel, p. 485. n. 526. *das graue Wasserhuhn, mit schwarzem Schnabel, gelben Füßen.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 444. n. 311. *die Gambette.*

Onomat. hist. nat. VII. *der rothe Reuter.*

Klein, av. p. 101. ad n. 1. *Gambetta.*

Klein, Vorber. p. 187. ad n. 1. *Gambetta.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 102. ad n. 1. *Gambetta.*

Briffon, ornitholog. II. p. 262. n. 4. *Chevalier rouge.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 728. n. 9. *Tringa (Gambetta) rostro pedibusque rubris, corpore luteo cinereoque variegato, subtus albo.*

Scopoli, Bemerk. 2. d. Naturgesch. I. p. 115. n. 142. *Tringa Gambetta.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 9. *Gallinula pedibus nigris.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 148. n. 3. *Tringa (Gambetta) rostro pedibusque rubris, corpore luteo cinereoque variegato, subtus albo.*

Müller, zool. dan. prodr. p. 25. n. 204. *Tringa (Variegata) supra fusca, luteo maculata, subtus cinerascens, abdomine albo, rectricibus nigricantibus, apice lituraque luteis.*

Jonston, av. p. 159. *Gambetta Italis dicta.*

4. INTERPRES. *Der Steindreher.* (9)

Müller, Naturfyst. II. p. 407. *der Dolmetscher.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 430. n. 3. *der Steindreher.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 146. n. 3. *die Steindreher.* p. 149. *Mornelsstrandläufer, dollmetschende Strandvögel, Schwarzschnäbel.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 439. n. 299. *der hebridische Strandläufer.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 568. *der Dollmetscher.*

Klein, av. p. 21. n. 9. *Gavia, quae Pluvialis Arenaria nostra.*

Klein, Vorbereit. p. 40. n. 9. } Mit mehrern

Klein, verb. Vögelhist. p. 22. ad n. 8. } verwechselt.

Briffon, ornith. II. p. 246. n. 1. *Coulon chaud.*

Latham, Syn. Suppl. p. 249. *Turnstone or Sea Dotterel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 738. n. 45. *Tringa (Interpres) pedibus rubris, corpore nigro albo ferrugineoque vario, pectore abdomineque albo.*

Seligmann, Vögel, V. Tab. 36. *der Steindreher aus der Hudsonsbay.*

Beseke, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 64. n. 126. *der Dolmetscher.*

Lepeschin, Tageb. d. ruff. R. I. p. 324. *eine roth gefiederte Schnepfe.*

Linne, auserles. Abh. II. p. 296. n. 95. *der graue Kwitz.*

Pontoppidan, Dännemark, p. 170. n. 3. *Veydetite.*

Schriften der berlin. Gesellsch. naturf. Fr. VII. p. 462. n. 43. *der Dolmetscher.*

Linne,

(9) Flügelweite, nach *Briffon*, 15 1/2 Zoll. Gewicht, nach *Pennant*, 3 1/2 Unzen.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 16. *Tringa* maritima.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 148. n. 4. *Tringa* (Interpres) pedibus rubris, corpore nigro albo ferrugineoque vario, pectore abdomineque albo.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 24. n. 193. *Tringa* (Interpres) pedibus rubris, corpore nigro albo ferrugineoque vario, pectore abdomineque albo.

Moehring, av. gen. p. 77. n. 95. *Cinclus*?

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 301. n. 3. *der Steindreher*.

β. *MORINELLA*. *Die Morinelle*.⁽¹⁰⁾

Müller, Naturfyft. II. p. 408. n. 6. *der Schwarzschnabel*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 149. *die Morinelle*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 572. *der Seemornel*.

Briffon, ornitholog. II. p. 247. n. 2. *Coulonchaud cendré*.

Latham, Syst. ornith. II. p. 739. n. 45. β. Tr. pedibus rubris, rectricibus nigricantibus basi albis, corpore griseo, pectore nigro.

Seligmann, Vögel, III. Tab. 44. *die Seelerche*.

γ. *Latham*, Syst. ornithol. II. p. 739. n. 45. γ. Tr. fusco alboque varia, gula, iugulo, abdomine fasciaque alarum gemina albis, remigibus caudaque obscuris.

δ. *Latham*, Syst. ornithol. II. p. 739. n. 45. δ. Tr. fusco alboque varia, subtus alba, pectore maculis fuscis, remigibus caudaque fuscis, rectricibus exterioribus margine, omnibus apice albis.

5. STRIA-

(10) Nach *Briffon*, u. a. eine eigene Gattung.

5. STRIATA. Der gestreifte Strandläufer. (1)

Müller, Natursystem, II. p. 407. n. 5. der gestreifte Kibitz.

Borowsky, Thierreich, III. p. 94. n. 3. der gestreifte Kibitz.

Onomat. histor. natur. VII. p. 578. der gestreifte Reuter.

Pennant, arct. Zool. II. p. 439. n. 300. der gestreifte Strandläufer.

Briffon, ornith. II. p. 263. n. 5. Chevalier rayé.

Batsch, Thiere, I. p. 399. der gestreifte Kibitz.

Xxx 2

Latham,

(1) Bey dieser und der 36ten Gattung p. 678. (*Tringa Maritima*) bemerke ich auffallende Verwechslungen der Synonymen. *Fabrizens Tringa Striata* ist ohne Zweifel der unfrige, wie auch *Latham* bemerkt hat. Aber *Fabric.* rechnet auch die Synonymen aus *Brünniche* und *Leem* (*Gmel. Syst.* p. 678. n. 36.) dazu, und sagt, p. 108. das bey *erstem*, und in *Akt. nidros.* (*Gmel. Syst.* p. 672. n. 5.) der Vogel ganz genau beschrieben wäre. Er nimmt also ganz deutlich beyde Synonymen für ein und eben dasselbe Thier an. *Fabric.* verweist ferner auf *Müll. zool. dan. prodr.* n. 194. aber auch *Müller* vereinigt eben dieselben Citata, und ausländischen Synonymen. In *Penn. arct. Zool.* II. p. 447. ist zwar bey *Tringa Maritima Müller* n. 206. angeführt. Aber *Müller* zieht *Olassens Selningus* mit dahin, und auch diesen rechnet *Fabric.* zu *Tringa Striata*. — Nimmt man nun zu diesen offenbaren Zweydeutigkeiten noch folgende Umstände worin die *Tringa Striata*, mit der *Tringa Maritima* übereinkommt: 1) Das Vaterland; denn beyde finden sich in Norwegen und Island. — 2) Den Aufenthalt; an den Seeküsten. — 3) Die Größe; die *Pennant* bey beyden mit der eines Staars vergleicht. — 4) Die gelben Füße. — 5) Die Aehnlichkeit der Stimme; wozu noch 6) kommt, das *Fabric.* von der *Tringa Striata* ausdrücklich sagt: das das äußere Ansehen nach der Jahreszeit und dem Alter sehr verschieden sey — so möchte, vielleicht nicht ungegründet, die Frage entstehen: ob nicht die *Tringa Striata* mit der *Tringa Maritima* ein und eben derselbe Vogel sey?

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 733. n. 24. *Tringa* (Striata) rostri basi pedibusque flavis, rectricibus albis fusco fasciatis, remigibus plurimis albis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 24. n. 194. *Tringa* (Striata) rostri basi pedibusque flavis, rectricibus albis fusco fasciatis, remigibus plurimis albis.

Fabric. fn. groenl. p. 107. n. 73. *Tringa* (Striata) rostri basi pedibusque flavis, rectricibus albis, fusco fasciatis, remigibus plurimis albis.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 301. n. 4. *der gestreifte Strandläufer.*

β. *Briffon*, ornithol. II. p. 264. n. 6. Chevalier ta-
cheté. (2)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 733. n. 24. β. *Tr.*
nigricans, rufo-griseo marginata, pectore, ab-
domine uropygioque albis, rectricibus albo ni-
groque fasciatis.

Latham, Syn. III. I. p. 127. n. 21. Var. A.

7. MACULARIA. *Der gefleckte Strandläufer.*

Müller, Naturyst. II. p. 408. n. 7. *der gefleckte*
Kiebitz.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 150. n. 4.
der gefleckte Kiebitz.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 440. n. 302. *der*
gefleckte Strandläufer.

Onomat. histor. natur. VII. p. 571. *der gefleckte*
Strandläufer.

Briffon, ornitholog. II. p. 275. n. 20. Grive
d'eau.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 734. n. 29. *Tringa*
(Macularia) rostro basi pedibusque incarnatis,
corpore

(2) Nach *Briffon* eine eigene Gattung.

corpore undique maculato, superciliis fascia-
que gemina alarum albis.

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 67. *die gefleckte
Wasserdrossel.*

42. KEPTUSCHKA. *Der Keptuschka.* (3)

Latham, Syst. ornithol. II. p. 738. n. 42. *Tringa*
(Keptuschka) corpore cinereo, vertice nigro,
abdomine nigricante, ad exitum rufescente.

Lepechin l. c. I. p. 229. *der Vogel Keptuschka.*

25. CINEREA. *Der aschgraue Strandläufer.* (4)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 186. n. 14.
der aschgraue Strandläufer.

Pennant, arct. Zool. II. p. 441. n. 303. *der asch-
graue Strandläufer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 733. n. 25. *Trin-
ga* (Cinerea) nigro cinereo alboque lunato-va-
ria, pectore et abdomine albis, rectricibus cau-
dae albo nigroque fasciatis, rectricibus margi-
ne albo.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 85. n. 202. *Trin-
ga* (Cinerea) dorso alisque cinereis, lituris ni-
gris alisque undulatis, rectricibus cinereis, mar-
ginibus albis.

26. ATRA. *Der schwarze Strandläufer.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 188. n. 15.
der schwarze Strandläufer.

Latham, Syst. ornith. II. p. 738. n. 43. *Tringa*
(Atra) capite colloque nigris, dorso alisque
fuscescentibus nigro mixtis, pectore et abdo-

Xxx 3 mine

(3) Größe des gemeinen Kybitz. Hält sich um die niedrigen
Wiesengründe auf; fliegt heerdenweise, und prophezeyhet mit
seinem Geschrey Regenwetter. *Lepechin.*

(4) Gewicht 5 Unzen nach *Pennant*. Wegen *Frisch* Tab. 237.

S. Bechstein a. a. O. p. 187. u. 723.

mine cinereis, uropygio cinereo albo nigroque undulato.

27. **NOVEBORACENSIS.** *Der Strandläufer von Newyork.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 441. n. 304. *der Strandläufer von Newyork.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 735. n. 30. Tringa (Noveboracensis) nigricans, pennis margine albidis, subtus alba, tectricibus caudae albo nigroque fasciatis, cauda cinerea.
28. **VIRGATA.** *Der gestrichelte Strandläufer.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 735 n. 31. Tringa (Virgata) fusca albo marginata, subtus alba, scapularibus maculis ferrugineis, capite colloque albis fusco longitudinaliter striatis.
29. **BOREALIS.** *Der nördliche Strandläufer.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 735. n. 32. Tringa (Borealis) cinerea, collo lateribus, pectoreque pallidiore undulatis, superciliis, gula, tectricibus caudae corporeque subtus albis.
30. **NOVAE TERRAE.** *Der neufundländische Strandläufer.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 735. n. 33. Tringa (Novae terrae) nigricans fusco marginata, subtus cinereo-alba, rostro, pedibus, alula, remigibus caudaque nigris.
31. **VARIEGATA.** *Der bunte Strandläufer.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 735. n. 34. Tringa (Variegata) rostro pedibusque nigris, corpore supra fusco nigro et rufo variegato subtus albo, pectore nigro maculato, cauda fusca.

8. LOBATA. *Der Sturmsflegler.* (5)

Müller, Naturfyst. II. p. 408. n. 8. *der Sturmsflegler.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 94. n. 4. *der Sturmsflegler.*

Leske, Naturgesch. p. 274. n. 3. *der Sturmsflegler.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 459. n. 329. *das graue Bastardwasserhuhn.*

Briffon, ornithol. II. p. 361. n. 1. Phalarope.

Batsch, Thiere, I. p. 399. *der Sturmsflegler.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 428. *das englische Wasserhuhn.* VII. p. 570. *Tringa lobata.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 776. n. 2. Phalaropus (Lobatus) cinereo - caeruleus subtus albus, tectricibus alarum, remigibus rectricibusque nigricantibus, margine cinerascens. albis.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 162. n. 4. *buntes Wasserhuhn.*

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 98. *die eisengraue Wasserdrossel mit Wasserhühnerpfoten, eine Art von Becassinen.*

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 151. *Smälle - Bot, Nordwestvogel.*

Pontoppidan, Dänemark, p. 170. n. 4. *Tringa Lobata.*

Pallas, Reif. Ausz. II. p. 240. *Tringa lobata.*

Linné, auserles. Abh. II. p. 297. n. 96. *Wasserhuhn - Kiwitz.*

Eberhard, Thiergesch. p. 122. *das englische Wasserhuhn.*

XXX 4

Müller,

(5) Nach Fabric. (fn. groenl. p. 109.) soll die *Tringa Hyperborea* L. n. 9. und Müller prodr. n. 196. *das Männchen*; — *Tringa Lobata* L. n. 8. und Müll. prodr. n. 195. *das Weibchen*; — und Brännicks Tr. *Lobata* n. 171. *ein junger Vogel* seyn.

Müller, zool. dan. prodr. p. 24. n. 195. Tringa (Lobata) rostro subulato apice inflexo, pedibus pinnatis, pectore albo undulato.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 302. n. 5. der *Sturmsiegler*.

32. GLACIALIS. *Der Eisstrandläufer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 461. n. 332. das einfarbige *Bastardwasserhuhn*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 776. n. 3. Phalaropus (Glacialis) supra nigricans, pennis margine flavescens, subtus albus, genis colloque subtus flavicantibus, alis caudaque cinereis.

33. FUSCA. *Der braune Strandläufer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 460. n. 331. das braune *Bastardwasserhuhn*.

Klein, av. p. 151. n. 3. Fulica fusca, rostro tenui.

Klein, Vorber. p. 278. n. 3. braunes dünn schnäbliches *Wasserhuhn*.

Klein, verbesserte Vögelhist. p. 161. n. 3. braun dünn schnäblich *Wasserhuhn*.

Briffon, ornith. II. p. 363 n. 3. Phalarope brun.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 776. n. 4. Phalaropus (Fuscus) fuscus marginibus pennarum dilutioribus, subtus albus, capite supra nigro, collo cinereo, fascia alarum alba.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 91. die *Wasserdrossel*.

Linne', Syst. Nat. Edit. X, I. p. 148. n. 5. Tringa (Lobata) rostro subulato, apice inflexo, pedibus virescentibus lobatis, abdomine albido.

34. CANCELLATA. *Der gegitterte Strandläufer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 777. n. 5. Phalaropus (Cancellatus) fuscus, marginibus pennarum

narum albis, subtus albus, fasciis obscuris, rectricibus utrinque maculis albis.

9. HYPERBOREA. *Der Eiskybitz.* (6)

Müller, *Natursystem*, II. p. 409. n. 9. *der Eiskiebitz.*

Halle, *Vögel*, p. 606. n. 761. *das braune Rohr-
huhn.*

Pennant, *arct. Zool.* II. p. 460. n. 330. *das rothe
Rastardwasserhuhn.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 566. *der nordische
Strandläufer.*

Brisson, *ornitholog.* II. p. 362. n. 2. *Phalarope
cendré.*

Latham, *Syst. ornithol.* II. p. 775. n. 1. *Phalaro-
pus (Hyperboreus) cinereus, subtus uropygio
fasciaque alarum albis, pectore cinereo, colli
lateribus ferrugineis. (Mas.)*

Seligmann, *Vögel*, V. Tab. 38. *die Wasserdros-
sel, der Er.*

Müller, *zoolog. dan. prodr.* p. 24. n. 196. *Trin-
ga (Hyperborea) rostro subulato, apice infle-
xo, pedibus pennatis, pectore cinereo, colli
lateribus ferrugineis.*

Brünniche, *ornitholog. bor.* p. 51. n. 172. *Tringa
Fulicaria.*

Xxx 5

β. *Trin-*

- (6) *Fabric.* *fn. groenl.* n. 75. ist im System hier und bey der 8ten Gattung p. 674. angeführt. Was in unserm System von der Naturgesch. des Vogels bemerkt wird, sagt *Fabric.* von der *Tringa Lobata*, und fügt noch hinzu: daß der Vogel eine Schwalbenstimme habe, die er auch bey dem schnellen Flug hören lasse; daß er sehr unvorsichtig sey; daß sein Fleisch gegessen, und sein Fell in Grönland, wegen der Weichheit von alten Weibern zur Abwischung der Augen gebraucht werde. Die Eyer hat *Fabric.* nicht gesehen, sagt auch nichts von ihrer Anzahl.

β. *Tringa Fulicaria.* (7)

Müller, Naturfyft. II. p. 408. n. 10. *der graue Kiewitz.*

Briffon, ornitholog. II. p. 363. n. 4. Phalarope rouffâtre.

Latham, Syft. ornithol. II. p. 775. n. 1. β. Ph. corpore grifeo, subtus rufo, uropygio fasciaque alarum alba, supercilijs reatricibusque basi rufescentibus. (*Femina.*)

Seligmann, Vögel, V. Tab. 37. *die rothe Wasserdrossel.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 562. *der Wasserhuhn-ähnliche Strandläufer.*

Linné, Syft. Nat. Edit. X. I. p. 148. n. 6. *Tringa (Fulicaria) rostro recto, pedibus lobatis subfufcis, abdomine ferrugineo.*

γ. *Latham*, Syft. ornithol. II. p. 776. n. 1. β. Ph. fusco-nebulosus, gula, abdomine fasciaque alarum albis, lateribus colli macula difformi rufa.

II. ALPINA. *Der Alpenstrandläufer.* (8)

Müller, Naturfyft. II. p. 410. n. 11. *der lappländische Kiebitz.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 190. n. 16. *der Alpenstrandläufer.*

Briffon,

(7) Das Weibchen von *Tringa Hyperborea*. Bis dahin hatte man es als eine eigene Gattung betrachtet, welches wahrscheinlich zu der großen Verwechslung der Synonymen Gelegenheit gegeben hat, die man in den angeführten Stellen findet. *Fabric.* sagt, a. a. O. er habe den Vogel nicht gesehen, und bezieht sich bloß auf *Brünniche* n. 172. p. 51. tadelt aber den *Müller*, daß er *Brünn.* n. 172. bey der *Tringa Hyperborea* anführt, weil Er diese mit zu der *Lobata* gezogen hat.

(8) Soll, nach *Latham*, mit *Scolopax Pusilla*, p. 663. n. 40. *einerley seyn.*

Briffon, ornith. II. p. 268. n. II. Alouette-de-mer à collier.

Onomat. hist. nat. VII. p. 555. *der lappländische Strandläufer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 736. n. 37. *Tringa* (*Alpina*) testaceo-fusca, pectore nigricante, rectricibus cinereo-albidis, pedibus fuscescentibus.

Linne', Syst. Nat. Ed. X. I. p. 149. n. 7. *Tringa* (*Alpina*) testaceo-fusca, pectore nigricante, rectricibus cinereo-albidis, pedibus fuscescentibus.

Brünniche, ornitholog. bor. n. 167. *Tringa Falci-nellus?*

Müller zoolog. dan. prodr. p. 25. n. 197. *Tringa* (*Alpina*) testaceo-fusca, pectore nigricante, rectricibus cinereo-albidis, pedibus fuscescentibus.

Frisch, Vögel, Tab. 241. *der kleinste Schnepfen-sandläufer.*

12. HELVETICA. *Der schweitzerische Strandläufer.*

Müller, Naturyst. II. p. 410. n. 12. *der schweitzerische Kiebitz.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 565. *der Schweizer-Kiwiz.*

Pennant, arch. Zoolog. II. p. 445. n. 313. *der Schweitzerkiebitz.*

Briffon, ornitholog. II. p. 239. n. 4. Vanneau de Suisse.

Latham, Syn. Suppl. p. 248. Suisse Sandpiper.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 728. n. 10. *Tringa* (*Helvetica*) rostro pedibusque nigris, subtus nigra abdomine albo, rectricibus albis nigro fasciatis.

Pallas, Reif. Ausz. III. p. 10. n. 28. *Charadrius hypomelas.*

13. OROPHUS. *Der grüne Strandläufer.* (9)
 Müller, *Natursystem*, II. p. 410. n. 13. *der punk-*
tirte Strandläufer.
 Borowsky, *Thierreich*, III. p. 95. n. 5. *der punk-*
tirte Strandläufer.
 Bechstein, *Naturgesch.* I. p. 432. n. 5. *der punk-*
tirte Strandläufer.
 Bechstein, *Naturgesch. Deutschl.* III. p. 162. *der*
punktirte Strandläufer. p. 166. *der grüne*
Strandläufer, Weißarsch, Steingället, der größ-
te Sandläufer.
 Halle, *Vögel*, p. 486. n. 528. *das braune Was-*
serhuhn, mit schwarzem Schnabel und grünen
Füßen.
 Gatterer, *vom Nutzen und Schaden der Thiere*,
 II. p. 217. *das rothe Wasserhuhn.*
 Onomat. *hist. nat.* VII. p. 573. *der Steingället.*
 Pennant, *arct. Zool.* II. p. 442. n. 306. *der grüne*
Strandläufer.
 Klein, *av.* p. 101. n. 4. *Glareola quarta.*
 Klein, *Vorber.* p. 188. n. 4. *Grünbeinlein, Grün-*
füssel, Matkuillis.
 Klein, *verb. Vögelhist.* p. 103. n. 3. *Grünbeinlein,*
Matkuillis.
 Klein, *av.* p. 101. n. 7. *Glareola octava.*
 Klein, *Vorbereit.* p. 188. n. 7. *bunt Motthünlein,*
gescheckt Mothünlein.
 Klein, *verb. Vögelhist.* p. 103. n. 7. *buntes Mott-*
hünlein.
 Gesner, *Vögelb.* p. 243. *Steingälletl; mit 1 F.*
 Gesner,

(9) Flügelweite 18 Zoll. Gewicht 6 Unzen. *Bechstein.* Nistet da wo es viel Schilfgras giebt. Legt 5 bis 6 grünlich weisse, braungeflechte Eyer, auf das bloße Gras, oder in den Sand, und brüetet 3 Wochen. — Wird oft mit *Scolopax Totanus* verwechselt.

- Gesner*, Vögelb. p. 246. *Mattnillis*; mit 1 Fig.
- Briffon*, ornithol. II. p. 259. n. 1. Becasseau, appellé vulgairement Cul-blanc.
- Batsch*, Thiere, I. p. 399. *der punktirte Strandläufer*.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 729. n. 12. Tringa (Ocropus) rostri apice punctato, pedibus virescentibus, dorso fusco-viridi, abdomine re-ctricibusque extimis albis.
- Beseke*, Vögel Kurlands, p. 64. n. 27. *der punktirte Strandläufer*.
- Bock*, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 362. *der punktirte Strandläufer*.
- Cetti*, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 258. *der Sandpfeiffer*.
- Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Fr. VII. p. 463. n. 44. *der punktirte Strandläufer*.
- Pontoppidan*, Dännemark, p. 170. n. 5. *Horsegiög*. Naturforsch. XIII. p. 216. n. 123. *der punktirte Strandläufer*.
- Frisch*, Vögel, Tab. 239. *der kastanienbraune, weißpunktirte Strandläufer*.
- Linné*, Syst. Nat. Ed. II. p. 53. Ocropus.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 2. Cinclus.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 149. n. 8. Tringa (Ocropus) rostri apice punctato, pedibus virescentibus, dorso fusco-viridi nitido.
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 25. n. 198. Tringa (Ocropus) rostri apice punctato, pedibus virescentibus, dorso fusco-viridi, abdomine re-ctricibusque externis albis.
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 282. Glareola IV. *Grünfüßel, Mattnillis*.
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 283. Glareola VIII. *bundt Wasser-Himlin*.

Charleton, onomast. zoic. p. 107. n. 3. Ochra.
Jonston, av. p. 163. *Tringa tertia*. p. 164. *Cincli*
 congener altera. p. 160. *Gallinula Rhodopus*.
Schäfer, element. ornith. Tab. 67.
Doundorff, Handb. der Thiergesch. p. 302. n. 6.
der grüne Strandläufer.

β. LITTOREA. *Der Küstenjäger*. (1°)

Müller, Natursystem, II. p. 413. n. 17. *der braune Reuter*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 167. n. 2.
der Uferstrandläufer.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 448. F. *der Küstenjäger*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 569. *der braune Reuter*.

Briffon, ornith. II. p. 265. n. 7. Chevalier cendré.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 731. n. 15. *Tringa*
 (*Littorea*) *rostro laevi pedibusque cinereis, remigibus fuscis, rachi primae nivea*.

Cetti, Sardinien, II. p. 255. *die kleinste Schnepfe?*

Fischer, Naturgesch. v. Livl. p. 88. n. 114. *Strandhühnlein*.

Pontoppidan, Dännemark, p. 171. n. 10. *Strandbekkassin*.

Linné, auserles. Abhandl. II. p. 297. n. 97. *der Uferläufer - Kiewitz*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 7. *Gallinula pedibus nigricantibus*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 149. n. 12. *Tringa*
 (*Littorea*) *rostro laevi, pedibus fuscis, remigibus fuscis, rachi primae nivea*.

Müller, zool. dan. prodr. p. 25. n. 200. *Tringa*
 (*Littorea*) *rostro laevi pedibusque cinereis, remigibusque fuscis, rachi primae nivea*.

Charle

(10) Nach *Briffon*, *Latham*, *Pennant* eine eigene Gattung.

Charleton, onomast. zoic. p. 107. n. 2. *Calidris nigra*.

Jonston, av. p. 159. *Calidris Bellonii nigra*.

7. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 167. n. 3. *einzelne gefleckte Strandläufer*.

Latham, Syn. III. 1. p. 171. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 730. n. 12. β . *Tr. cinerea*, supra maculis albidis varia, subtus albidia, fronte superciliisque albis, pectore nebulofo, rectricibus lateralibus extus nigro-fasciatis.

21. *GLAREOLA. Der Waldjäger.*

Müller, Naturfyft. II. p. 411. Var. B. Tab. XVI. fig. 4.

Pennant, arct. Zool. II. p. 488. *G. der Waldjäger*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 730. n. 13. *Tringa (Glareola) rostro laevi, pedibus virescentibus, corpore fusco albo punctato, pectore albido.*

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 8. *Gallinula pedibus viridibus.*

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 149. n. 11. *Tringa (Glareola) rostro laevi, pedibus virescentibus, corpore albo punctato, pectore subalbido.*

Linné, Syst. Nat. Edit. XII. I. p. 250. n. 13. β . *Tringa Glareola rostro laevi, pedibus virescentibus, corpore fusco albo punctato, pectore albido.*

Linné, fn. Succ. I. n. 152. *Tringa nigra albo punctata, pectore maculato, abdomine subalbido, pedibus virescentibus.*

35. *LEUCOPTERA. Der weißflügelige Strandläufer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 731. n. 17. *Tringa (Leucoptera) fusca, corpore subtus superciliis*

ciliis uropygioque rufis, cauda rufo maculata, humeris albis.

36. MARITIMA. *Der Pfeiffer.* (1)

Pennant, arct. Zool. II. p. 447. C. *der Pfeiffer.*

Leem, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 135. *Fjäreplit*, *Gaddevierusch.*

Olassen, Reise d. Isl. I. p. 309. *Selningur.*

Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 138.

Fierre Muns.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 731. n. 18. Tringa (Maritima) griseo nigroque varia, subtus alba, iugulo caudaque obscuris, rectricibus laterali- bus quatuor albo-marginatis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 25. n. 206. Tringa rostro laevi, subtus alba, supra cinereo-et nigro-variegata, tinctura in medio dorso violacea.

Brünniche, ornithol. bor. p. 54. n. 182. Tringa (Maritima) fusca cinereo undata, rectricibus lateralibus 4. utrinque brevioribus, basi rostri pedibusque flavis.

37. UNDATA. *Der wellenförmig gezeichnete Strandläufer.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 448. E. *der brünnichsche Strandläufer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 732. n. 19. Tringa (Undata) obscura, luteo alboque undulata, tectricibus alarum et remigibus secundariis apice uropygioque albis, cauda cinerea, apice nigro marginata.

Beseke, Vögel Kurlands, p. 65. n. 130.

38. UNIFORMIS. *Der einfarbige Strandläufer.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 449. H. *der einfarbige Strandläufer.*

Latham,

(1) S. die Anmerk. bey *Tringa striata.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 732. n. 20. *Tringa* (Uniformis) rostro brevi nigro, tota dilute cinerea.

14. **HYPOLEUCOS.** *Der Sandpfeiffer.* (2)

Müller, Natursystem, II. p. 451. n. 14. *der Sandpfeiffer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 95. n. 6. *der Sandpfeiffer.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 432. n. 6. *der gemeine Strandläufer.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 168. *der gemeine Strandläufer.* p. 173. *Strandläuferlein, Pfisterlein, Haarschnepfe, gemeine Sandläufer.* Tab. 8.

Pennant, arct. Zool. II. p. 441. n. 305. *der gemeine Strandläufer.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 567. *das Pfisterlein.*

Gesner, Vögelb. p. 244. *Fisterlein*; mit 1 Fig.

Halle, Vögel, p. 489. n. 534. *das graue Wasserhuhn.*

Briffon, ornitholog. II. p. 260. *Guignette.*

Batsch, Thiere, I. p. 399. *der Sandpfeiffer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 734. n. 28. *Tringa* (Hypoleucos) rostro laevi, pedibus cinereis, corpore cinereo, subtus albo.

Fischer, Naturgesch. v. Livl. p. 88. n. 113. *Wasserschnepf.*

White,

(2) Gewicht, nach *Pennant*, 2 Unzen. — Ein geselliger Vogel der in Herden zu zwanzig und mehrern auf seinen Reisen angetroffen wird. Verläßt uns im September, und kommt im May wieder. Zieht des Nachts. Nährt sich besonders von kleinen Wasserschnellen, und ans Ufer geschwemmten Wasserinsekten. Brütet vierzehn Tage. Das Fleisch ist sehr schmackhaft.

- White*, Naturgesch. v. Engl. p. 37. *Sandpfeifer*.
Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *Tringa Hypoleucos*.
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 116. n. 143.
das Strandläuferlein.
Pontoppidan, Dännemark, p. 170. n. 6. *Bekka-*
fin, Virlén, kleine Myrstikkel, Strandschnepfe.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 74. *Sandläuffer*.
Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 26. n. 3. *Hypoleucos*.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 149. n. 9. *Tringa*
 (*Hypoleucos*) *rostro laevi, pedibus lividis, cor-*
pore cinereo, lituris nigris, subtus albo.
Müller, zool. dan. prodr. p. 25. n. 199. *Tringa*
 (*Hypoleucos*) *rostro laevi, pedibus lividis, cor-*
pore cinereo, lituris nigris, subtus albo.
Kramer, Austr. p. 353. n. 3. *Tringa rostro laevi,*
corpore cinereo, lituris nigris, subtus albo;
Sandläufferl.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 303. n. 7.
der Sandpfeifer.

15. CANUTUS. *Der Canutsvogel.* (3)

- Müller*, Naturyst. II. p. 412. n. 15. *der Canuts-*
vogel.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 183. n. 13.
der Kanutsvogel. p. 185. *graues Wasserhuhn,*
Kanutstrandvogel.
Halle, Vögel, p. 489. n. 533. *das graue Wasser-*
huhn mit acht Zähnen an der Zunge.
Pennant, arch. Zool. II. p. 340. n. 301. *der Ca-*
nutsvogel.
Onomat. hist. nat. VII p. 560. *der Kanutvogel*.
Briffon, ornitholog. II. p. 276. n. 21. *Canut*.

Latham,

- (3) Flügelweite 19 Zoll. Gewicht $4\frac{1}{2}$ Unze. *Bechstein*. Der Name soll vom König *Kanut* kommen, der ihn für einen grossen Leckerbissen hielt. Wird zuweilen mit *Tringa Cinclus* verwechselt.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 738. n. 44. Tringa (Canutus) rostro laevi, pedibus cinerascensibus, remigibus primoribus ferratis, rectrice extima alba immaculata.

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 66. *der Canutvogel*.

Pennant, R. d. Schottl. I. p. 19. *Konutsvögel*.

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 171. n. 7. Tr. Canutus.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 26. n. 6. Canuti avis.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 149. n. 10. Tringa (Canutus) rostro laevi, pedibus cinerascensibus, remigibus primoribus ferratis.

Charleton, onomast. zoic. p. 107. n. 1. Calidris cinerea.

39. AUSTRALIS. *Der cayennische Strandläufer*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 737. n. 40. Tringa (Australis) rostro pedibusque nigris, corpore cinereo fusco luteoque vario, subtus pallide rufescente, abdomine uropygioque albo.

16. ARENARIA. *Der Sandläufer*. (4)

Müller, Naturf. II. p. 412. n. 16. *der Sandläufer*.

Borowsky, Thierreich, III. p. 96. n. 7. *der Sandläufer*.

Bechstein, Naturg. I. p. 434. n. 9. *der Sandläufer*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 194. n. 17. *der Sandläufer*.

Onomat. hist. nat. VII. p. 557. *der Sandläufer*.

Briffon, ornithol. II. p. 272. n. 17. petite Maubèche grise.

Batsch, Thiere, I. p. 399. *der Strandläufer*.

Yyy 2

Befekte,

- (4) Länge über 7 Zoll. Flügelweite 13½ Z. Gewicht ohngefähr 2 Unzen. *Bechst.* — Man darf ihn nicht mit *Charadrius Hiaticula* verwechseln, dessen Jungen er ähnlich sieht. *Latham* hält ihn mit *Char. Calidris* für einerley.

Beseke, Vögel Kurlands, p. 64. n. 128. *der Strandläufer.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 362. n. 124. *der Sandläufer, Sandregerlein.*

Pallas, nord. Beytr. IV. p. 10. *Tringa arenaria.*
Naturf. XIII. p. 216. n. 124. *der Sandläufer.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 303. n. 8. *der Sandläufer.*

18. CINCLUS. *Die Meerlerche.*⁽⁵⁾

Müller, Naturf. II. p. 413. n. 18. *die Meerlerche.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 96. n. 8. *die Meerlerche, der Steinpicker.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 433. *die Meerlerche.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 173. n. 10. *die Meerlerche.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 442. n. 307. *die Meerlerche.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 561. *die Meerlerche.*

Briffon, ornitholog. II. p. 267. n. 10. *Alouette-de-mer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 735. n. 35. *Tringa*
(*Cinclus*) *rostro pedibusque nigris, loris albis,*
corpore uropygioque griseis fuscisque.

Gesner, Vögelb. p. 544. *Lyßklicker, Steinpicker.*

Moehring, av. gen. p. 77. n. 94. *Schoeniclus?*

Jonston, av. p. 163. *Cinclus.*

β. *Cinclus pedibus fuscis.*

Wird von *Latham* zu *Tringa Alpina*, p. 676.
n. 11. gerechnet.

22. Ru-

(5) Flügelweite, nach *Briffon*, 13 1/3 Zoll. Gewicht, nach *Pennant*, 1 1/2 Unze. Legt 4 bis 5 gelblich weiße, blaß und dunkelbraun gefleckte Eyer in die Löcher der Ufer auf die bloße Erde, und brütet 3 Wochen.

32. RUFICOLLIS. *Der rothhäufige Strandläufer.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 736. n. 36. Tringa
 (Ruficollis) cinerea, subtus ferruginea, capite
 colloque ferrugineo nigroque striatis.
Pallas, Reif. Ausz. III. Anh. p. II. n. 31. Tringa
ruficollis.
19. CALIDRIS. *Der olivenfarbene Strandläufer.*
Müller, Natursystem, II. p. 413. n. 19. *der grüne*
Strandläufer.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 181. n. 12.
der grüne Strandläufer.
Onomat. hist. nat. VII. p. 559. *die Waldschnepfe.*
Briffon, ornith. II. p. 270. n. 14. Maubéche.
Gesner, Vögelb. p. 237. *Waldschnepff, Holtz-*
schnepff; mit 1 Fig.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 732. n. 21. Tringa
 (Calidris) rostro pedibusque nigricantibus, cor-
 pore subtus olivaceo, uropygio variegato.
Jonston, av. p. 161. *Rusticola sylvatica.*
40. NAEVIA. *Der getüpfelte Strandläufer.*
Pennant, arct. Zool. II. p. 446. B. *der getüpfelte*
Strandläufer.
Briffon, ornitholog. II. p. 271. n. 15. Maubéche
 tachetée.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 732. n. 22. Trin-
 ga (Naevia) cinereo rufo violaceoque nigro va-
 ria, subtus castaneo-albida, rectricibus latera-
 libus fuscis, extima latere exteriori linea lon-
 gitudinali alba.
Klein, av. p. 101. n. 5. *Glareola castanea?*
Klein, Vorbereit. p. 188. n. 5. *Braunhünlein?*
41. GRISEA. *Der graue schwarzfüßige Strandläufer.*
Briffon, ornith. II. p. 272. n. 16. Maubéche grise.
Latham,

Latham, Syst. ornithol. II. p. 733. n. 23. *Tringa* (*Grisea*) *grisea* *subtus* *alba*, *collo* *subtus* *uro-*
pygio *et* *pectore* *fusco* *undatis*, *rectricibus* *mar-*
gine *albis*.

20. PUSILLA. *Der kleine Strandläufer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 414. n. 20. *der Zwerg-*
reuter,

Bechstein, Naturgesch. I. p. 433. n. 8. *der kleine*
Strandläufer.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 178. n. 11.
der kleine Strandläufer. Tab. 10.

Pennant, arct. Zool. II. p. 446. n. 314. *der kleine*
Strandläufer.

Briffon, ornithol. II. p. 269. n. 12. *Alouette-de-*
mer *de* *St. Domingue.*

Onomat. histor. nat. VII. p. 576. *die kleine Meer-*
lerche *von* *St. Domingo.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 737. n. 38. *Tringa*
(*Pusilla*) *rostro* *pedibusque* *fuscis*, *corpore*
subtus *rufescente*, *rectricibus* *extimis* *scapo*
albo, *uro-pygio* *variegato*,

23. SQUATAROLA. *Der graue grünfüßige Strand-*
läufer.

Müller, Naturfyst. II. p. 414. n. 23. *der Parder.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 151. n. 5.
der graue Kiebitz. p. 153. *Brachamsel*, *grauer*
Strandläufer, *Parder*, *braungefleckter Strand-*
vogel.

Halle, Vögel, p. 102. n. 110. *der graue Regen-*
pfeifer.

Onomat. hist. nat. VII. p. 577. *der graue Regen-*
pfeifer; *graue Pulroß.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 444. n. 310. *der*
graue Strandläufer.

Klein,

- Klein*, av. p. 20. n. 3. *Gavia* f. *Pluvialis cinerea*.
- Klein*, Vorber. p. 38. n. 3. *grauer Gyfitz, Pardel*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 21. n. 4. *grauer Kybitz, grauer Pardel*.
- Klein*, stemmat. av. p. 3. Tab. 3. fig. 2. a - c.
- Briffon*, ornith. II. p. 237. n. 2. Vanneau gris.
- Latham*, Syn. Suppl. p. 248. Grey Sandpiper.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 729. n. 11. *Tringa* (*Squatarola*) rostro nigro, pedibus virescentibus, corpore griseo subtus albido.
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 362. *der Parder*.
- Pontoppidan*, Dännemark, p. 171. n. 8. *Fløy-tetyten, Dolken*.
- Naturf. XIII. p. 216. n. 125. *der Parder*.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 117. n. 145. *grauer Pulroß*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 11. *Tringa Augusti mensis*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 149. n. 13. *Tringa* (*Squatarola*) rostro nigro, pedibus virescentibus, corpore griseo, subtus albido.
- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 25. n. 201. *Tringa* (*Squatarola*) rostro nigro, pedibus virescentibus, corpore griseo, subtus albido.
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 316. *Pardalus* II. *Brach-Amsel, großer Brachvogel, grauer Gyfitz*.
- Charleton*, onomast. zoic. p. 109. n. 14. *Pluvialis cinerea*.
- Jonston*, av. p. 165. *Pluvialis cinerea*.
- β. VARIA. *Der braun und weiß gefleckte Strandläufer.* (6)
- Müller*, Naturfyst. II. p. 414. n. 21. *der Scheck*.

(6) Nach *Briffon* eine eigene Gattung.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 153. *der gefleckte Kiebitz.*

Onomat. hist. nat. VII. p. 580. *der bunte Kiwiz.*

B. Bon, ornitholog. II. p. 238. n. 3. *Vanneau varié.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 729. n. II. β . Tr. rostro pedibusque nigris, corpore fusco albo variegato, abdomine albo, rectricibus fusco-fasciatis.

Latham, Syn. III. I. p. 169. n. II. Var. A.

Fischer, Naturgesch. von Livland, p. 88. n. 115. *bunte Schnepfe.*

24. ISLANDICA. *Der rothe Strandläufer.* (7)

Müller, Naturfyst. Supplem. p. 113. n. 24. *der Isländer.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 443. n. 309. *der rothe Strandläufer.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 337. n. 39. Tringa (Islandica) rostro pedibusque fuscis, corpore subtus ferrugineo, remigibus secundariis margine albis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 25. n. 203. Tringa (Ferruginea) subtus tota ferruginea, dorso e nigro ferrugineo alboque vario, rectricibus intermediis apice subcaudato.

Olaassen, Reise d. Isl. II. p. 202. *Raudbristingv.*

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 249. n. 6. Tringa Mori-nellus.

p. 671. n. 4. β Var. von Tr. Interpres.

Edit.

(7) *Pennant*, und mit ihm *Latham*, halten ihn mit *Scolopax Subarguata* p. 658. n. 25. für einerley.

Edit. XII.

p. 249. n. 10. Tr. Fulicaria.

p. 250. n. 13. β . Var. Tr. Ochroph.

p. 251. n. 17. Tr. Littorea.

p. 252. n. 21. Tr. Variaria.

pag. 252. n. 22. Tringa Fusca.

Edit. XIII.

p. 676. n. 9. *b* als das Weibchen von Tr. Hyperborea.

p. 677. n. 21. Tr. Glareola.

p. 677. n. 13. β . Var. von Tr. Ochropus.

p. 682. n. 23. β . Var. von Tr. Squatarola.

p. 696. n. 2. Glareola Senegalensis.

Das Geschlecht ist um 18 Gattungen vermehrt. Bey der 4ten Gattung sind vier, bey der 5ten zwey, bey der 8ten zwey, bey der 9ten zwey, bey der 13ten drey, bey der 18ten zwey, bey der 23ten zwey Spielarten aus einander gesetzt.

B. Unbestimmtere Thiere.

1. Der cassubische Mornell.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 23. n. 12.

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 363. n. 128.

Naturf. XIII. p. 217. n. 128.

2. Eine Tringa, die sich mit keiner von den beschriebenen Arten vereinigen läßt.

Sander: Naturf. XIII. p. 193.

3. Eine Tringa, die man nicht zu einer der bekanntesten Arten rechnen kann.

Beseke, Vögel Kurl. p. 65. n. 129.

4. Der braun und gelbbunte Strandläufer mit gelben Füßen.

Frisch, Vögel, Tab. 238.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 723.

5. Der hochbeinige, grau und weiß marmorirte Sandläufer mit rothem Unterkiefer und braungehenen Füßen.

Frisch, Vögel, Tab. 236.

Beseke, Vögel Kurlands, p. 60. n. 1.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 88. et 722.

6. *Tringa nigro lutescens variegata*, pectore macula nigra, rectricibus intermediis longioribus.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 26. n. 208.

Olaffen, Isl. II. Tab. 41. *Loar-Thraell*. p. 309. g.

Fabric. fn. groenl. p. 112. (oben.)

C. Neuere Gattungen.

1. *Tringa* (*Equestris*) pedibus virescentibus, dorso fusco vario, abdomine uropygioque albis.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 730. n. 14.

Buffon, ois. VII. p. 511. Pl. enl. 844. Chevalier commun.

2. *Tringa* (*Grenovicensis*) corpore supra vario, collo subtus cinereo, abdomine, cristo uropygioque lateribus albis.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 731. n. 16.

Latham, Syn. Suppl. p. 249. Greenwich Sandpiper.

3. *Tringa* (*Fusca*) pallide fusca nigro maculata, subtus alba, collo antice nigro striato, cauda cinerea, tectricibus alarum albido marginatis.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 733. n. 26.

Br. Zool. II. n. 195. — *Latham*, Syn. Supplem. p. 250. Brown Sandpiper.

4. *Tr.* (*Lincolniensis*) alba, supra maculis griseis fuscisque varia, subtus maculis oblongis fuscis et nigris, rectricibus duabus intermediis toto nigris.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 734. n. 27.

Br. Zool. II. n. 197. — *Lath.* Syn. Suppl. p. 251.

88. GESCHLECHT. CHARADRIUS. *Der Regenpfeifer.*

Müller, Naturyst. II. p. 415. Gen. LXXXVIII.

Leske, Naturgesch. p. 272. Gen. LII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 108. Gen. LVIII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 215.
Gen. LX.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 435. Gen. XLIV.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 197.
Gen. XXX.

Halle, Vögel, p. 99. Gen. IV.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 449.

Onomat. hist. nat. II. p. 817.

Briffon, ornithol. II. p. 220. Gen. LXVII. Himantopus. p. 222. Gen. LXIX. Pluvialis.

Batsch, Thiere, I. p. 387. Gen. CIII.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 740. Gen. LXXIV.
p. 751. Gen. LXXV. Curforius.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 138.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 303.
Gen. LII.

1. HIATICULA. *Die Seelerche.*⁽⁸⁾

Müller, Naturyst. II. p. 415. n. 1. *der Strandpfeifer.*

Leske, Naturgesch. p. 273. n. 1. *der Strandpfeifer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 109. n. 2. *der Strandpfeiffer, Uferlerche.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 215. n. 1.
Charadrius (Hiaticula) pectore nigro, fronte nigricante, fasciola alba, vertice fusco, pedibus luteis; *die Seelerche.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 437. n. 4. *der Strandpfeifer.*

Bechstein,

(8) Gewicht an 2 Unzen. *Pennant.*

- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 214. *der Strandpfeifer*. p. 219. *Uferlerche, Seelerche, sprenglichter Grillvogel, Koppenriegerlein, Kobelregerlein, Sandvogel, Sandregerlein, Tullfiß, Griesshennl.*
- Ebert*, Naturl. II. p. 97. *Seelerche.*
- Halle*, Vögel, p. 105. n. 13. *der Strandpfeifer.*
Fig. 4.
- Pennant*, arch. Zoolog. II. p. 451. n. 318. *der Strandpfeifer.*
- Neuer Schaupl. der Natur, VIII. p. 120. *Seelerche.*
Onomat. histor. nat. II. p. 817. *der gesprengte Grillvogel.*
- Klein*, av. p. 21. n. 6. *Gavia littoralis.*
- Klein*, Vorber. p. 39. n. 6. *Seemornel, Seelerche.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 22. n. 7. *Seelerche.*
- Briffon*, ornithol. II. p. 227. n. 8. *petit Pluvier à collier.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 400. *die Uferlerche.*
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 743. n. 8. *Charadrius (Hiaticula) griseo-fuscus, subtus albus, pectore nigro, fronte nigricante, fasciola alba, ventre fusco, pedibus luteis.*
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 65. n. 131. *der Strandpfeifer.*
- Simmssen*, meklenb. Vögel, p. 183. n. 1. *die Seelerche, Oostvogel.*
- Seligmann*, Vögel, III. Tab. 44. *die Seelerche.*
- Bock*, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 362. n. 126. *Strandpfeifer.*
- Cetti*, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 266. *der Strandpfeifer.*
- Leem*, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 135. *Sandmuling.*
- Pallas*, Reis. I. p. 370. *Brachvogel.*

Pallas,

Pallas, nord. Beyträge, IV. p. 10. Charadrius
Hiaticula. p. 14. *das Brachhuhn*. III. p. 13.
der kleine Strandläufer.

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 171.
Prästekraue, Sandvrifter.

Scopoli, Betmerk. a. d. Naturgesch. I. p. 118. n. 147.
die Uferlerche.

Naturf. XIII. p. 217. n. 126. *Strandpfeifer*.

Olaassen, Reif. d. Isl. I. p. 309. *Sandlo*.

Linné, auserl. Abhandl. II. p. 284. n. 41. p. 297.
n. 100. *Seelerche*.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. Hiaticula.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 4. Hiaticula.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 150. n. 2. Chara-
drius (Hiaticula) pectore nigro, fronte nigri-
cante fasciola alba, vertice fusco, pedibus
luteis.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 26. n. 209. Chara-
drius (Hiaticula) pectore nigro, fronte ni-
gricante fasciola alba, vertice fusco, pedibus
luteis.

Kramer, Austr. p. 354. n. 2. Charadrius pectore
nigro, fronte nigricante lineola alba, vertice
fusco, *Griesshennl*.

Charleton, onomast. zoic. p. 109. n. 15. Chara-
drius.

Jonston, av. p. 166. Charadrius. p. 211. Matuitui.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 303. n. 1.
die Seelerche.

β. Ch. griseus collari abdomineque albis. *

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 744. n. 8. β.

γ. Ch. griseo-cinereus, fronte collarique albis, cau-
dae ultima medietate nigra, apice ferrugineo. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 744. n. 8. γ.

2. ALEXANDRINUS. *Der alexandrinische Regenpfeifer.* (9)

Müller, Naturfystem, II. p. 416. n. 2. *der Alexandrinische.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 254. B. *der alexandrinische Regenpfeifer.*

Latham, Syn. III. I. p. 203. n. 9. Alexandrine Plover.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 744. n. 9. Charadrius (Alexandrinus) fuscus, fronte collarique dorsali abdomineque albis, rectricibus lateralibus utrinque candidis, pedibus nigris.

Hasselquist, Reise n. Paläst. (Ed. germ.) p. 310. n. 30. Charadrius Alexandrinus.

Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 150. n. 3. Charadrius (Alexandrinus) fuscus, fronte collarique dorsali, abdomineque albis, rectricibus lateralibus utrinque candidis, pedibus nigris.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 26. n. 210. Charadrius (Alexandrinus) fuscus fronte collarique dorsali abdomineque albis, rectricibus lateralibus utrinque candidis, pedibus nigris.

β. AEGYPTIUS. *Der ägyptische Regenpfeifer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 416. n. 4. *der ägyptische.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 744. n. 9. β. Ch. fascia pectorali nigra, superciliis albis, rectricibus apice albis fascia nigra, pedibus caeruleis.

Hasselquist, Paläst. (Ed. germ.) p. 311. n. 31. Charadrius Aegyptius.

γ. ERYTHROPUS. *Der rothfüßige Regenpfeifer.*

Latham, Syn. III. I. p. 204. n. 9. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 745. n. 9. γ.

δ. *Der*

(9) Soll, nach *Bechstein*, a. a. O. III. p. 216. das Weibchen von *Tringa Hirculica* seyn.

3. *Der philippinische Regenpfeifer* (10)

Latham, Syn. III. I. p. 205. n. 9. Var. C.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 745. n. 11. Charadrius (Philippinus) fuscus, regione oculorum torque colli caudaque nigris, fronte, corpore subtus rectricibusque apice albis.

Sommerat, Reif. n. Neuguinea, p. 31. *der kleine Regenpfeifer der Insel Luçon.*

4. NOVAE SEELANDIAE. *Der neuseeländische Regenpfeifer.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 745. n. 12. Charadrius (novae Zealandiae) cinereo-viridis, facie et torque colli nigris, vitta annulari capitis, fascia alarum corporeque subtus albis.

8. GREGARIUS. *Der gesellige Regenpfeifer.*

Müller, Naturfyft. Suppl. p. 115. n. 13. *der Gesellige.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 745. n. 13. Charadrius (Gregarius) cinereus, subtus albus, pectore lunula nigra, postice rufa, rectricibus albis fascia nigra.

Pallas, Reif. Ausz. I. p. 186. *eine Art Brachvögel die an der Wolga der wilde Kybits, Dikaja Pikaliza oder Pischik genannt werden.*

13. ASIATICUS. *Der asiatische Regenpfeifer.*

Müller, Naturfyft. Supplem. p. 115. n. 14. *der Afer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 746. n. 14. Charadrius (Asiaticus) griseo fuscus, fronte, superciliis, gula abdomineque albis.

Pallas, Reise, Ausz. II. p. 240. Anhang p. 17. n. 32. Charadrius asiaticus.

14. MON-

(10) Nach *Latham* eine eigne Gattung.

14. **MONGOLUS.** *Der mongolische Regenpfeifer.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 746. n. 16. Charadrius (Mongolus) cinereo fuscus, fronte subtusque albus, iugulo pectoreque ferrugineis, gula lunula nigra.
Pallas, Reif. Ausz. III. Anh. p. 10. n. 29. Charadrius Mongolus.
3. **VOCIFERUS.** *Der Kildir.*
Müller, Naturfyst. II. p. 416. n. 3. *der Schreyer.*
Borowsky, Thierreich, III. p. 113. n. 8. *der Schreyer.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 220. n. 7. *der schreyende Regenpfeifer.*
Halle, Vögel, p. 107. n. 17. *der Schwanzkiwitz.*
Pennant, arct. Zoolog. II. p. 450. n. 317. *der Killdir.*
Klein, av. p. 21. n. 8. *Gavia brachyptera, vocifera.*
Klein, Vorber. p. 40. n. 8. *langgeschwänzter Mor-nell, Gijbitz.*
Klein, verbesserte Vögelhist. p. 23. n. 10. *langgeschwänzter Kybitz.*
Briffon, ornithol. II. p. 228. n. 9. *Pluvier à collier de Virginie.*
Batsch, Thiere, I. p. 400. *der Schreyer.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 742. n. 6. Charadrius (Vociferus) fasciis pectoris, colli, frontis genarumque nigris, cauda lutea fascia nigra, pedibus flavis.
Seligmann, Vögel, III. Tab. 42. *der Schreykibiz.*
Nau, Entdeck. aus der Naturgesch. I. p. 247. Charadrius vociferus.
Linne, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 150. n. 4. Charadrius (Vociferus) fasciis pectoris, colli, frontis genarumque nigris, cauda lutea fascia nigra, pedibus pallidis.

β. TORQUATUS. *Der Regenpfeifer mit dem Halskragen.*⁽¹⁾

Müller, Naturfyst. II. p. 419. n. 8. *der Schwarzkragen.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 221. *Regenpfeifer mit dem Halskragen.*

Briffon, ornitholog. II. p. 229. n. 10. *Pluvier à collier de St. Domingue.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 743. n. 6. β. Charadrius pectore griseo-variegato, fronte alba, vertice collarique nigro, rostro pedibusque caeruleiscentibus.

Pontoppidan, Dännemark, p. 171. n. 5. Charadrius Torquatus.

35. JAMAICENSIS. *Der jamaicische Regenpfeifer.*
Müller, Naturfyst. Suppl. p. 117. n. 18. *der Jamaiker.*

Briffon, ornithol. II. p. 230. n. 11. *Pluvier à collier de la Jamaïque.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 743. n. 7. Charadrius (Jamaicensis) obscure fuscus, subtus albus, pectore nigris maculis vario. torque albo, rectricibus albidis, rufo et nigricante variegatis.

Latham, Syn. III. I. p. 201. n. 7. *Collared Plover.*

5. MORINELLUS. *Der Morinell.*⁽²⁾

Müller, Naturfystem, II. p. 417. n. 5. *der Poffenreißer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 110. n. 3. *das Morinellenchen, der Morinell.*

Leske, Naturgesch. p. 273. n. 2. *der Morinell.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 436. n. 3. *der Mornell.*

Bechstein,

(1) Nach Briffon eine eigene Gattung.

(2) Gewicht 4 Unzen. Pennant.

- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. I. p. 211. n. 5. *der Mornell*.
- Ebert*, Naturl. II. p. 97. *der Mornell*.
- Halle*, Vögel, p. 104. n. 12. *das Mornellchen*.
- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 223. n. 217. *das Mornellchen*.
- Onomat. histor. nat.* V. p. 249. *das Mornellchen, der lappländische Regenpfeifer*.
- Pennant*, arct. Zool. II. p. 453. A. *der Mornell*.
- Klein*, av. p. 21. n. 5. *Gavia Morinellus simpliciter*.
- Klein*, Vorbereit. p. 39. n. 5. *Mornelgybitz, Morinelle, Hauptdummer Gybitz*.
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 21. n. 6. *Mornell*.
- Klein*, Stemmat. av. p. 3. Tab. 3. fig. 3. a. b.
- Briffon*, ornithol. II. p. 225. n. 5. *petit Pluvier ou le Guignard*.
- Batsch*, Thiere, I. p. 400. *der Morinell*.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 746. n. 17. *Charadrius (Morinellus) pectore ferrugineo, fascia superciliarum pectorisque lineari alba*.
- Beseke*, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 66. n. 132. *der Possenreißer*.
- Pontoppidan*, Dännemark, p. 271. n. 2. *Pomeranzvogel, Citronvogel, Mornellchen*.
- Pallas*, Reif. Ausz. III. p. 474. *der Brachvogel*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 3. *Morinellus*.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 150. n. 6. *Charadrius (Morinellus) pectore ferrugineo, fascia superciliarum pectorisque lineari alba, pedibus nigris*.
- Müller*, zool. dan. prodr. p. 26. n. 211. *Charadrius (Morinellus) pectore ferrugineo, fascia superciliarum pectorisque lineari alba, pedibus nigris*.

Charleton, onomast. zoic. p. 106. n. 1. *Morinellus*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 304. n. 2. *der Morinell*.

b. *Linné*, Syst. Nat. Ed. VI. p. 26. n. 5. *Charadrius lapponicus*.

Briffon, ornitholog. II. p. 226. *Femina*.

Halle, Vögel, p. 107. n. 16. *der lappländische Regenpfeifer*.

β. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 214. *der englische Mornell*.

Klein, av. p. 21. n. 7. *Gavia Morinella altera*.

Klein, Vorbereit. p. 40. n. 7. *grauer Mornell*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 22. n. 9. *graue Mornell*.

Briffon, ornitholog. II. p. 226. n. 6. *Guignard d'Angleterre*.

Latham, Syn. III. 1. p. 209. n. 14. *Var. A*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 747. n. 17. β.

γ. *Müller*, Naturfyst. Supplem. p. 116. n. 15. *der Tartar.*⁽³⁾

Latham, Syn. III. 1. p. 210. n. 14. *Var. B*.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 746. n. 14. *Charadrius (Tataricus) collo cinereo, pectore ferrugineo, fascia gulae pectorisque nigra, abdomine albo, alis caudaque fuscis*.

Pallas, Reise, Ausz. II. Anh. p. 17. n. 32. *Charadrius tataricus*.

16. **ATRICAPILLUS.** *Der schwarzköpfige Regenpfeifer*.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 452. n. 319. *der Schwarzkopf*.

• Zzz 2

Latham,

(3) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 745. n. 10. Charadrius (Atricapillus) cinereo - fuscus, pileo nigro, superciliis, gula abdomineque albis, cauda alba, fascia ad basin nigra.

17. OBSCURUS. *Der schwärzliche Regenpfeifer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 747. n. 20. Charadrius (Obscurus) nigricans, subtus ochraceus, fronte gulaque albidis, collo obscuriore striis pallidis.

18. FULVUS. *Der gelbe Regenpfeifer.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 747. n. 21. Charadrius (Fulvus) niger, fulvo-marginatus, subtus albidus, pectore fulvo, unaculis nigris, fascia alarum alba.

β. *Latham*, Syn. III. I. p. 211. n. 17. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 748. n. 21. β. Char. fuscus fulvo marginatus, subtus albus, pectore obscuro, cauda fusca, rectricibus utrinque maculis pallidis.

19. LEUCOGASTER. *Der weißbäuchige Regenpfeifer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 748. n. 22. Charadrius (Leucogaster) fuscus, corpore subtus, fronte vitta supra et infra oculos, remigibus primoribus basi rectricibusque tribus exterioribus albis.

20. RUBRICOLLIS. *Der rothhälsige Regenpfeifer.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 748. n. 23. Charadrius (Rubricollis) cinereus, corpore subtus albo, capite colloque nigris, lateribus colli utrinque macula quadrata castaneo - rufa.

6. APRICARIUS. *Der Haidenpfeifer.*

Müller, Naturfyst. II. p. 418. n. 6. *der goldgrüne Regenpfeifer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 109. n. 1. *der goldgrüne Regenpfeifer.* Tab. 58.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 203. n. 3. *der Haidenpfeifer.* p. 205. *Grillvogel, Feldläufer, schwarzgelber Ackervogel.*

Halle, Vögel, p. 106. n. 15. *der schwarzgelbe Ackervogel.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 449. n. 315. *der Haidenpfeifer, Grillvogel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 23. n. II. *ABC Kybitz.*

Briffon, ornitholog. II. p. 224. n. 4. *Pluvier doré de la Baye de Hudson.*

Batsch, Thiere, I. p. 400. *der Ackervogel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 742. n. 5. *Charadrius (Apricarius) pectore abdomineque nigro, corpore fusco, albo luteoque punctato, pedibus cinereis.*

Seligmann, Vögel, V. Tab. 35. *das fleckigte Wasfer-Huhn.*

Martini, Naturlex. I. p. 257. *Ackervogel.*

Beseke, Vögel Kurlands, p. 66. n. 133. *der goldgrüne Regenpfeifer.*

Siemssen, meklenburg. Vögel, p. 184. n. 2. *der Strandpfeifer, Braakvogel.*

Leem, Nachricht von den Lappl. in Finnmarken, p. 132. *die Amfeln.* p. 133. *Heiloner.*

Olassen, Isl. I. p. 309. f. *Heylo.*

Linne, Reis. d. Oel. u. Gothl. p. 83. *Alwargrim.*

Pontoppidan, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 147. *Heiloe oder Myreloe.*

Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Fr. VII. p. 463. n. 47. *der goldgrüne Regenpfeifer.*

Linné, auserles. Abh. II. p. 297. n. 98. *der Regenpfeifer*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 26. n. 1. *Pluvialis nigro flavus*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 150. n. 7. *Charadrius (Apricarius) pectore nigro, rostro basi gibbo, pedibus cinereis*.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 26. n. 212. *Charadrius (Apricarius) abdomine nigro, corpore fusco albo luteoque punctato, pedibus cinereis*.

7. PLUVIALIS. *Der Goldregenpfeifer*.

Müller, Naturf. II. p. 419. n. 7. *der Grillvogel*.

Borowsky, Thierreich, III. p. III. n. 4. *der Grillvogel*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 436. n. 2. *der Goldregenpfeifer*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 206. n. 4. *der Goldregenpfeifer*. p. 211. *grüne Regenpfeifer, Pardel, Pardelvogel, Grillvogel, Fastenschleyer, Dittchen, Düte, mittlere, große Brachvogel, Keylhaken, Brachhennl.*

Halle, Vögel, p. 101. n. 9. *der grüne Regenpfeifer*.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, p. 224. n. 209. *das Dittchen*.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 450. n. 316. *der Goldregenpfeifer*.

Handb. d. deutschen Thiergesch. p. 112. *der kleine Brachvogel*.

Siemssen, meklenb. Vögel, p. 185. n. 3. *der gemeine Regenpfeifer, Thutvogel*.

Klein, av. p. 19. n. 2. *Gavia viridis*.

Klein, Vorbereit. p. 37. n. 2. *grüner Gybitz, Pardel, Pulvier, Pulvos*.

Klein,

- Klein*, verb. Vögelhist. p. 20. n. 3. *grüner Kybitz*.
Klein, stemm. av. p. 3. Tab. 3. fig. 1. a-c.
Gesner, Vögelb. p. 405. *Pulvier*, *Pulros*. Fig. p. 406.
Briffon, ornithol. II. p. 222. n. 1. *Pluvier doré*.
Batsch, Thiere, I. p. 401. *der Grillvogel*.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 740. n. 1. Charadrius (Pluvialis) corpore nigro viridique maculato, subtus albido, pedibus cinereis.
Latham, Syn. Suppl. p. 252. Golden Plover.
Fischer, Zf. z. Naturgesch. v. Livl. p. 46. n. 496. *gemeiner Regenpfeifer*.
Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 263. *der Brachvogel*.
Boek, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 363. *Grillvogel*, *großer Brachvogel*.
Pennant, Reise durch Schottland, I. p. 271. *grüne Taucher*.
Wirsing, Vögel, Tab. 34. *kleiner Brachvogel?*
Linné, auserles. Abhandl. II. p. 284. n. 41. 46. p. 297. n. 99. *gemeine Regenpfeifer*.
Döbel, Jägerprakt. I. p. 51. *Keulhaken*.
Naumann, Vogelsteller, p. 182. *Keulhaken*.
Naturf. XIII. p. 218. n. 129. *Grillvogel*. XXV. p. 23. *Keulhaken*.
Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 171. n. 3. *Brokfugle*, *Hyeiler*.
Eberhard, Thiergesch. p. 110. *der Regenpfeifer*, *Grillvogel*.
Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. Pluvialis.
Linné, Syst. Natur. Edit. VI. p. 26. n. 2. Pluvialis viridis.
Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 151. n. 8. Charadrius (Pluvialis) pedibus cinereis, corpore nigro viridique maculato, subtus albido.

- Müller*, zoolog. dan. prodr. p. 26 n. 213. Charadrius (Pluvialis) corpore nigro viridique maculato, subtus albido, pedibus cinereis.
- Brünniche*, ornithol. bor. p. 57. n. 187. Charadrius Pluvialis.
- Kramer*, Austr. p. 354. n. 1. Charadrius nigro lutescenteque variegatus, pectore concolore;
Brachhennl.
- Charleton*, onomast. zoic. p. 109. n. 2. Pluvialis flavo-virescens.
- Moehring*, av. gen. p. 75. n. 90. Charadrius.
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 317. Pardalus III. *Brachvogel, Seetaube, Pulros.*
- Jonston*, av. p. 165. Pluvialis flavescens.
- Donndorff*, Handb. d. Thiergesch. p. 304. n. 3. *der Goldregenpfeifer.*
- β. *Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. III. p. 211. n. 2. *der kleine Goldregenpfeifer.*
- Briffon*, ornitholog. II. p. 223. n. 2. petit pluvier doré.
- Schwenkfeld*, av. Siles. p. 318. Pardalus IV. *kleiner Brachvogel.*
- γ. *Briffon*, ornitholog. II. p. 224. n. 3. Pluvier doré de S. Domingue.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 740. n. 1. β. Ch. corpore nigricante flavescenteque vario, subtus albo, collo inferiore et pectore dilute griseis.
21. RUBIDUS. *Der rothe Regenpfeifer.*
- Pennant*, arct. Zoolog. II. p. 452. n. 321. *der rothe Regenpfeifer.*
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 740. n. 2. Charadrius (Rubidus) rutilus pulveratim albo varius, maculis nigris, rectricibus duabus intermediis fuscis margine ferrugineis, lateralibus albis.

9. CALIDRIS. *Der graue Regenpfeifer.* (4)
 Müller, Naturfyſtem, II. p. 419. n. 9. *der graue Regenpfeifer.*
 Borowsky, Thierreich, III. p. 112. n. 5. *der graue Regenpfeifer.*
 Pennant, arct. Zoolog. II. p. 452. n. 320. *der Sonderling.*
 Brisson, ornitholog. II. p. 272. n. 17. *petite Mau-béche grise.*
 Batsch, Thiere, I. p. 401. *der graue Regenpfeifer.*
 Latham, Syn. Suppl. p. 253. *Curwillet.*
 Latham, Syst. ornithol. II. p. 741. n. 4. Charadrius (Calidris) rostro pedibusque nigris, loris uropygioque subgriseis, corpore subtus albo immaculato.
 β. Latham, Syn. III. I. p. 197. n. 4. *Var. A.*
 Latham, Syst. ornithol. II. p. 742. n. 4. β. *Ch. fronte et corpore subtus ex cinereo albis.*
10. OEDICNEMUS. *Der große Regenpfeifer.*
 Müller, Naturfyſt. II. p. 420. n. 10. *der Dickfuß.*
 Tab. 16. fig. 6.
 Borowsky, Thierreich, III. p. 112. n. 6. *der Steinwälzer.*
 Bechstein, Naturgeſch. I. p. 435. n. 1. *der Steinwälzer.*
 Bechstein, Naturgeſch. Deutschl. III. p. 197. *der Steinwälzer.* p. 201. *Steinpardel, Grünschnäbler, Trick, Griel, großer Brachvogel, Gluth.*
 Halle, Vögel, p. 103. n. 11. *der Steinwälzer.*
 Onomat. hiſt. nat. V. p. 668. *der Steinwälzer.*
 Klein, av. p. 20. n. 4. *Gavia rostro virescente, conico, acuto.*

Zzz 5

Klein,

(4) Gewicht gegen 13/4 Unzen. Pennant.

- Klein*, Vorber. p. 38. n. 4. *grünschnäblichter Pardel, Steinwälzer.*
- Klein*, verbesserte Vögelhist. p. 21. n. 5. *Steinpardel, Steinwälzer, Grünschnäbler.*
- Gesner*, Vögelb. p. 505. *Triel, Griel*; mit 1 F.
- Frisch*, Vögel, Tab. 215. *der große Brachvogel oder Gluth.* (ein Weibchen.)
- Briffon*, ornithol. II p. 230. n. 12. grand Pluvier, appellé vulgairement Courly de terre.
- Batsch*, Thiere, I. p. 401. *der Steinwälzer.*
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 661. n. 11. Otis (Oedicnemus) grisea, remigibus primoribus duabus nigris, medio albis, rostro acuto, pedibus cinereis.
- Cetti*, Naturgesch. v. Sardinien, II. p. 267. *Steinpardel.*
- White*, Naturgesch. von England, p. 31. 59. n. 12. *der große Regenpfeifer.*
- Lepechin*, Tageb. d. russ. Reif. I. p. 309. Oedicnemus.
- Neue schwed. Abhandl. III. p. 107. Charadrius Oedicnemus.
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 151. n. 9. Charadrius (Oedicnemus) griseus, remigibus primoribus duabus nigris, medio albis, rostro acuto, pedibus cinereis.
- Charleton*, onomast. zoic. p. 74. n. 11. Oedicnemus *Bellonii.*
- Jonston*, av. p. 65. Oedicnemus *Bellonii.*
- Schäfer*, element. ornith. Tab. 58.
- Hermann*, tab. affinit. animal. p. 138. Charadrius Oedicnemus.
- Donndorff*, Handb. der Thiergesch. p. 304. n. 4. *der große Regenpfeifer.*

22. SIBIRICUS. *Der sibirische Regenpfeifer.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 747. n. 9. Charadrius (Sibiricus) fronte ex albo et nigro varia, vertice nigricante fasciato, pectore fusco, fascia alba terminato, abdomine ferrugineo.

Lepechin, Tagebuch der russ. Reise, II. p. 185. ein sibirischer Hahn. (russ. *Sibirskoi Petuschok*.)

II. HIMANTOPUS. *Der Strandreuter.*

Müller, Naturfyst. II. p. 420. n. II. der Langfuß. Tab. 16. fig. 1.

Borowsky, Thierreich, III. p. 123. n. 7. das Riemenbein.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 438. n. 5. der Strandreuter.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 201. der Strandreuter. p. 203. Riemenfuß, Riemenbein, Stelzenläufer, Langfuß, Langbein, Dünnebein, fremder Vogel.

Ebert, Naturl. II. p. 98. das Riemenbein.

Halle, Vögel, p. 109. n. 20. der Strandreuter.

Onomat. hist. nat. IV. p. 178. der Strandreuter.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 453. n. 322. das Langbein.

Klein, av. p. 22. Gen. V. Himantopus.

Klein, Vorber. p. 42. Dünnebein, Riemenbein.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 23. Riemenbein.

Klein, stemmat. av. p. 3.

Briffon, ornitholog. II. p. 220. n. 1. Echasse.

Latham, Syn. Suppl. p. 252. Long-legged Plover.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 741. n. 3. Charadrius (Himantopus) albus dorso nigro, rostro nigro capite longiore, pedibus longissimis.

Lepechin, Tageb. d. russ. R. I. p. 309. der Grillvogel Himantopus.

Pallas,

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 370. die hochbeinige Schnepfe.

Pallas, nord. Beyträge, IV. p. 22. Charadrius Himantopus.

Stopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 120. n. 148. das Diinnbein.

Hasselquist, Reise n. Paläst. (Ed. germ.) p. 308. Charadrius autumnalis.

Eberhard, Thiergesch. p. 110. der Strandreuter.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 151 n. 10. Charadrius (Himantopus) supra niger, subtus albus, rostro nigro capite longiore, pedibus rubris longissimis.

Charleton, onomast. zoic. p. 107. n. 3. Himantopus.

Fousteron, av. p. 159. Himantopus.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 47. Himantopodi.

12. SPINOSUS. Der Dornflügel.

Müller, Naturyst. II. p. 421. n. 12. der Dornflügel. Tab. 16. fig. 7.

Borowsky, Thierreich, III. p. 114. n. 9. der Dornflügel.

Brisson, ornithol. II. p. 233. n. 15. Pluvier armé du Sénégal.

Batsch, Thiere, I. p. 401. der Dornflügel.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 748. n. 24. Charadrius (Spinofus) remigibus, pectore pedibusque atris, occipite cristato, rectricibus dimidiato-albis, alulis spinosis.

Hasselquist, Paläst. (Ed. germ.) p. 314. n. 33. Charadrius spinofus.

Russ. Alep. p. 72. Tab. II.

Linné, Syst. Nat. Ed. X. I. p. 151. n. 11. Charadrius (Spinofus) remigibus, pectore, abdomine pedibus-

pedibusque atris, rectricibus dimidiato - albis, humeris spinosis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 136. Charadrius spinosus.

β. *Der gehäubte persische Regenpfeifer.* (5)

Halle, Vögel, p. 108. n. 19. *der persische Kiwiz.*

Klein, av. p. 22. n. 10. Gavia f. Vanellus Indicus.

Klein, Vorbereit. p. 42. n. 10. *schwarzbrüstiger Kybitz.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 20. n. 2. *schwarzbrüstiger Kybitz.*

Briffon, ornithol. II. p. 232. n. 14. Pluvier hupé de Perse.

Latham, Syn. III. 1. p. 214. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 748. n. 24. β. Ch. corpore supra castaneo, collo abdomineque imo albis, collo antice, pectore, capite supra remigibus caudaque apicé nigris, alulis spinosis.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 93. *der indianische Kybitz mit schwarzer Brust.* (das Männchen.)

Seligmann, Vögel, VIII. Tab. 69. *das Wasserhuhn mit gespornten Flügeln.* (das Weibch.)

Linne, Syst. Nat. Edit. X. 1. p. 150. n. 1. Charadrius (Cristatus) gula, pileo pectoreque nigris, occipite cristato, dorso testaceo, pedibus nigris.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 139. Charadrius Cristatus.

γ. *Der cayennische Dornflügel.* (6)

Latham, Syn. III. 1. p. 215. n. 20. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 749. n. 25. Charadrius (Cyanus) capite, collo postico, fasciaque pectoris nigris, fascia occipitis annulari collo

(5) Nach *Briffon* eine eigene Gattung; wofür ihn auch *Hermann* hält.

(6) Nach *Latham* eine eigene Gattung.

collo antice, abdomine basique caudae albis, alulis spinosis.

23. **PILEATUS.** *Der senegalische Regenpfeifer.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 749. n. 26. Charadrius (Pileatus) cristatus fronte carunculata, corpore supra rufo-griseo, subtus albo, vertice, gula, remigibus caudaque apice nigris.
24. **CORONATUS.** *Der gekrönte Regenpfeifer.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 749. n. 27. Charadrius (Coronatus) fuscus, capite superiore nigro, occipitis annulo, abdomine, fascia alarum caudaque albis, remigibus fasciaque rectricum ad apicem nigris.
25. **BILOBUS.** *Der malabarische Regenpfeifer.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 750. n. 28. Charadrius (Bilobus) rufo-griseus, superciliis, abdomine fasciaque alarum albis, pileo, remigibus fasciaque rectricum nigris, caruncula frontis dependente.
26. **MELANOCEPHALUS.** *Der schwarzköpfige Regenpfeifer. (7)*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 750. n. 29. Charadrius (Melanocephalus) caeruleo-griseus, capite, collo postico et dorso nigris, superciliis, collo antice pectoreque pallide rufis.
27. **GALLICUS.** *Der französische Regenpfeifer. (8)*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 751. n. 1. Cursorius (Europaeus) fuscescens, striga per oculos pallida,

(7) Das Vaterland ist Senegal.

(8) Ist in Frankreich nur ein einziges Mal angetroffen, und soll überhaupt in Europa äußerst selten seyn. Wegen des spitzigen, nach der Spitze zu gekrümmten Schnabels, des
 weiten

pallida, remigibus macula pone oculos et ad apicem rectricum lateralium nigris.

Gerin. ornithol. Tab. 474. Pluvialis morinellus flavescens.

β. Ch. flavo-rufescens, lateribus capitis, gula abdomineque pallidioribus, pone oculos macula obscura, remigibus rectricibusque lateralibus ad apicem nigris. *

Latham, Syn. Suppl. p. 254. Tab. 116.

Latham, Syst. ornith. II. p. 751. n. 1. β.

28. COROMANDELICUS. *Der Regenpfeifer von Coromandel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 751. n. 2. Cursorius (Asiaticus) fuscus subtus rufus, superciliis, gula, abdomine imo, uropygio caudaque apice albis, remigibus fasciaque oculari nigris.

29. CURONICUS. *Der kurländische Regenpfeifer.*

Beseke, Vögel Kurlands, p. 66. n. 134.

Latham, Syst. ornith. II. p. 750. n. 31. Charadrius (Curonicus) albus, rostro nigricante, cervicis fascia et lunula frontis nigra, verticis pileo cinereo, fascia oculari nigricante undulata, dorso, alis caudaque cinereis, pedibus rubescentibus.

30. NAEVIUS. *Der schwarz und weißbunte Regenpfeifer.*

Beseke, Vögel Kurl. p. 67. n. 135.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 750. n. 32. Charadrius (Naevius) supra ex cinereo nigro alboque varius, subtus albus, fascia infraoculari nigro punctata, rostro pedibusque nigricantibus.

A. Ver-

weiten Rachens, der eiförmigen Nasenlöcher und der spitzi- gen Zunge, hat *Latham* aus dieser und der folgenden Gat- tung ein eignes Geschlecht gemacht.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Edit. XII.

Edit. XIII.

p. 254. n. 4. Charadr. Aegyptius.

p. 684. n. 2. β. Ch. Alexandrinus. *Var.*

p. 255. n. 8. Charadr. Torquatus.

p. 685. n. 3. β. Ch. Vociferus. *Var.*

Das Geschlecht ist der Anzahl nach um *achtzehn*, da aber zwey der XIIten Edition jetzt als Varietäten von andern angenommen, und an deren Stelle andere eingeschaltet worden, mit *zwanzig* neuen Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung ist überdem die *Var. β*, bey der 2ten die *Var. γ* und *δ*, bey der 5ten die *Var. β* und *γ*, bey der 7ten die *Var. β* und *γ*, bey der 9ten die *Var. β*, bey der 10ten die *Var. β* und *γ*, und bey der 12ten die *Var. γ* hinzugekommen.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

1. *Der Schreyer.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 363. n. 127. Naturf. XIII. p. 217. n. 127. Kulycek, (poln.)

C. *Neuere Gattungen.*

1. *Der Regenpfeifer von den Falklandsinseln.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 747. n. 18. Charadrius (Falklandicus) fusco-nebulosus, fronte, collo subtus abdomineque albis, vitta annulari capitis ferruginea, fascia verticis pectoreque nigris.

2. *Der kleine indianische Regenpfeifer.*

Briffon, ornith. II. p. 234. n. 16. petit Pluvier des Indes. (Pluvialis minima Indica.)

Latham, Syn. Suppl. p. 254. Indian Plover.

Latham, Syst. ornith. II. p. 750. n. 30. Ch. (Indicus) fuscus, subtus albus, pectore fasciis duabus fuscis, rectricibus basi albis.

89. GESCHLECHT. RECURVIROSTRA. *Der Säbelschnäbler.* (Wassersäbler.)

Müller, Naturyst. II. p. 89. Gen. LXXXIX.

Leske, Naturgesch. p. 281. Gen. LXV.

Borowsky, Thierreich, III. p. 85. Gen. L.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 216.

Gen. LXI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 434. Gen. XLIII.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 222.

Gen. XXXI.

Briffon, ornithol. II. p. 504. Gen. CXIV.

Batsch, Thiere, I. p. 385. Gen. XCV.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 786. Gen. LXXXV.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 141.

Domdorff, Handbuch der Thiergesch. p. 305.

Gen. LIII.

1. AVOCETTA. *Die Avocette.*⁽⁹⁾

Müller, Naturyst. II. p. 422. *der Säbelschnäbler.*

Tab. 17. fig. 1.

Leske, Naturgesch. p. 281. *die Avocette.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 85. *der Wassersäbler.* Tab. 50.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 216. n. 1.

Recurvirostra (Avocetta) albo nigroque varia.

Bechstein,

(9) Länge 18 Zoll. Flügelweite 30 Zoll. Gewicht 13 Unzen.

Penn. — *Cetti* sagt: sie sey ziemlich so groß als eine Taube — Der oberwärts gekrümmte Schnabel, der an diesem Vogel das unterscheidendste ist ist in einigen Abbildungen, selbst bey *Aldrovand* und *Jonston* so krumm gezeichnet, daß er beynahe den Bogen eines Halbzirkels ausmacht. Nach *Cetti* beträgt der Bogen in seiner Krümmung 3 Zoll, und der Chorde von der Spitze bis an das Ende des Schnabels drey Zoll weniger eine Linie.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 434. *der gemeine Wasserfäbler.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 223. n. 1. *der gemeine Wasserfäbler.* p. 226. *Wasserfäbel, Säbelschnabel, Säbelschnäbler, Avozette, Kremer.*

Ebert, Naturl. II. p. 99. *der Säbelschnäbler.*

Halle, Vögel, p. 585. n. 730. *der Wasserfäbel.* Fig. 52.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 466. B. *der Säbelschnabel.*

Neuer Schaupl. der Natur, VII. p. 401. *Säbelschnäbler.*

Onomat. histor. nat. II. p. 74. *der weißschwarze Krummschnabel.*

Handbuch d. Naturgesch. II. p. 383. *der Schabbelschnabel, Säbelschnäbler.*

Klein, av. p. 142. n. 1. *Plotus recurviroster.*

Klein, Vorber. p. 262. n. 1. *Schabbelschnabel.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 150. n. 1. *Schabbelschnabel, Säbelschnäbler.*

Gesner, Vögelb. p. 40. *Vberschnabel; Fig.* p. 41.

Briffon, ornith. II. p. 504. n. 1. *Avocette.*

Batsch, Thiere, I. p. 388. *Avosette.*

Latham, Syn. Suppl. p. 263. *Scooping Avosetta.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 786. n. 1. *Recurvirostra (Avocetta) albo nigroque varia.*

Cetti, Sardin. II. p. 296. *die Avosette oder der Verkehrt schnabel.* Tab. 4.

Lepechin, Tageb. d. russ. Reis. I. p. 302. *die Stachelschnäbel.*

Pallas, Reise, Ausz. I. p. 370. *die Avosettschnepfe.*

Pallas, nord. Beyträge, III. p. 14. IV. p. 22. *die Avosettschnepfe.*

Pontoppidan, Dännem. p. 171. n. 1. *Klyde, Laufugl.*

Linné,

Linné, auserl. Abhandl. II. p. 297. n. 101. der gemeine Säbelschnäbler.

Siemssen, meklenburg. Vögel, p. 182. n. 1. das Avosettchen.

Midinger, Vorles. I. p. 136. die Avozette.

Eberhard, Thiergesch. p. 120. der Wasserfübel.

Jablonsky, allgem. Lex. p. 90. Avosetta.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 105. n. 129. die Schnepfe mit über sich krumm gebogenem Schnabel.

Linné, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. Recurvirostra.

Linné, Syst. Nat. Ed. VI. p. 25. n. 1. Avosetta.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 151. n. 1. Recurvirostra (Avosetta) albo nigroque varia.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 27. n. 214. Recurvirostra (Avosetta) albo nigroque varia.

Charleton, onomast. zoic. p. 96. n. 8. Avosetta.

Moehring, av. gen. p. 74 n. 86. Trochilus.

Jonston, av. p. 135. Avosetta.

Salerne, ornithol. p. 359.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 141. Recurvirostra Avocetta.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 305. die Avocette.

2. AMERICANA. Die amerikanische Avocette.

Pennant, arct. Zool. II. p. 465. n. 338. die Pennants-Avosette. Tab. 21.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 787. n. 2. Recurvirostra (Americana) rostro nigro, corpore albo nigroque vario, capite, collo pectoreque rufescentibus.

3. ALBA. Die weiße Avocette.

Müller, Naturfyst. II. p. 403. n. 17. der canadische Schnepf.

Onomat. hist. nat. VII. p. 28. *die weiße Schnepfe aus Canada.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 104. n. 15. *weißer Strandläufer.*

Briffon, ornithol. II. p. 283. *Barge blanche.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 787. n. 3. *Recurvirostra (Alba) rostro aurantio, corpore albo, remigibus rectricibusque flavicantibus, pedibus fuscis.*

Seligmann, Vögel, V. Tab. 34. *das weiße Haselhuhn aus der Hudsonsbay.*

Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit zwey Gattungen vermehrt; wovon die 3te aus dem 86ten Geschlecht hierher versetzt worden.

90. GESCHLECHT. HAEMATOPUS. *Der Austernfischer.*

Müller, Naturyst. II. p. 224. Gen. XC.

Leske, Naturgesch. p. 276. Gen. LVI.

Borowsky, Thierreich, III. p. 106. Gen. LVII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 216. Gen. LXII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 443. Gen. L.

Bachstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 226. Gen. XXXII.

Briffon, ornitholog. II. p. 221. Gen. LXVIII. *Ostralega.*

Batsch, Thiere, I. p. 386. Gen. XCIX.

Latham, Syst. ornith. II. p. 752. Gen. LXXVI.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 305. Gen. LIII.

I. OSTRALEGUS. *Der Austerndieb.* (10)

Müller, Naturfyst. II. p. 424. *der Austerfischer.*

Tab. 17. fig. 2.

Leske, Naturgesch. p. 276. *der Austernfresser.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 106. *die Meerelster.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 216. n. 1.

Haemat. (Ostralegus) rostro pedibusque rubris.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 443. *der Austernfischer.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 226. n. 1.

die Meerelster. p. 230. *Austerfischer, Auster-*

sammler, Austermann, Austerfresser, Schwarz

und weiße Schnepfe. Tab. 12.

Ebert, Naturl. II. p. 99. *der Austerndieb.*

Halle, Vögel, p. 109. n. 21. *der Austernsammler.*

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere,

II. p. 218. n. 204. *die Meerelster.*

Pennant, arch. Zool. II. p. 454. n. 323. *die Meer-*

elster.

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 460. *Austermann.*

Onomat. hist. nat. IV. p. 123. *der Austernsammler,*

Augstermann.

Handb. der Naturgesch. II. p. 379. *der Auster-*

mann.

Klein, av. p. 23. *Ostralega.*

Klein, Vorber. p. 44. *Augstermann.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 24. *Austermann.*

Briffon, ornitholog. II. p. 321. n. 1. Huitrier, ap-

pellé vulgairement Pie de Mer.

Batsch, Thiere, I. p. 394. *Austernfresser.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 752. n. 1. Haema-

topus (Ostralegus) niger, corpore subtus fas-

cia gulari et alarum, uropygio caudaque basi

albis.

Aaaa 3

Bock,

(10) Flügelweite 27½ Fufs 6 Lin. Briffon. — Gewicht 16 Unzen. Pennant.

- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 365. *der Austernfischer, Strandelster.*
- Fischer*, Zof. z. Naturgesch. v. Livl. p. 46. n. 497. *Seeelster.*
- Lepechin*, Tageb. d. ruff. R. I. p. 194. *Wasserelstern.*
- Pennant*, R. d. Schottl. I. p. 285. 293. *Austernfischer.*
- Olaassen*, Reif. d. Isl. I. p. 257. *Tjälderen.*
- Leem*, Nachr. von den Lappen in Finnmarken, p. 134. *die Meerelster. (Kield od. Rone Kalv.)*
- Pallas*, Reif. Ausz. I. p. 7. *Heisterschnepfen.*
- Pallas*, Naturgesch. merkwl. Th. VI. p. 15. *Austerschnepfe.*
- Pallas*, nord. Beytr. IV. p. 22. *der Austerndieb.*
- Pontoppidan*, Naturgesch. v. Dännemark, p. 171. n. 1. *Strandskade.*
- Pontoppidan*, Naturhist. v. Norwegen, II. p. 179. *die Strandelster.*
- Seligmann*, Vögel, IV. Tab. 70. *der Austerndieb.*
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 186. n. 1. *der gemeine Strandheister, Strandhäster.*
- Linné*, auserles. Abh. II. p. 298. n. 103. *der Austerndieb.*
- Naturf. XIII. p. 219. n. 133. *der Austernfischer.*
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 109. n. 135. *die schwarz und weiße Schnepfe.*
- Wirsing*, Vögel, Tab. 36. *Austermann.*
- Eberhard*, Thiergesch. p. 110. *der Austernsammler.*
- Meidinger*, Vorles. I. p. 134. *der Austernfresser.*
- Linné*, Syst. Nat. Ed. II. p. 55. *Pica marina.*
- Linné*, Syst. Natur. Edit. VI. p. 25. n. 1. *Pica marina.*
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 152. n. 1. *Haematopus Ostralegus.*

Müller, zool. dan. prodr. p. 27. n. 215. Haematopus Ostralegus.

Charleton, onomast. zoic. p. 105. n. II. Haematopus. p. 68. n. 4. Pica marina.

Moehring, av. gen. p. 75. n. 89. Haematopus.

Jonston, av. p. 156. Haematopus Bellonii.

Nov. comment. Petropol. IV. p. 425. Pica marina.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 305. der *Austerdieb*.

β. H. corpore toto nigro. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 753. n. 1. β.

γ. H. gula alba. *

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 230. n. 2.

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT.

GLAREOLA. *Das Seerebhuhn*. (Sandhuhn, Sandstrandläufer.)

Bechstein, Naturgesch. I. p. 446. Gen. LII.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 231. Gen. XXXIII.

Klein, av. p. 100. Gen. XII.

Briffon, ornithol. II. p. 248. Gen. LXXIII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 753. Gen. LXXV.

Kramer, Austr. p. 381. Pratincola.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 129. Trachelia.

Donndorff, Handb. der Thiergeschichte, p. 306. Gen. LV.

I. AUSTRIACA. *Die Wiesenschwalbe*. (1)

Müller, Naturfyst. II. p. 635. n. 12. die *Wiesenschwalbe*.

Aaaa 4

Borowsky,

(1) Größe, nach *Kramer*, eines Ziemers (*Turd. viscivorus*) nach *Schwenkfeld*, einer Wachtel; nach *Scopoli* und *Briffon* einer Amsel. (*Turd. Merula*.)

Borowsky, Thierreich, III, p. 158. n. 6. die *Wiesenschwalbe*.

Bechstein, Naturgesch. I, p. 446. das *österreichische Sandhuhn*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl, III, p. 231. n. 1. das *österreichische Sandhuhn*. p. 233. *Koppriegerle*, *Kobelregerlein*, *Wiesenschwalbe*. Tabula 13.

Ebert, Naturl. II, p. 151. die *Wiesenschwalbe*.

Onomat. histor. nat. IV, p. 242. das *Kobel-Regerlein*.

Briffon, ornith. II, p. 248. n. 1. *Perdrix-de-mer*.

Batsch, Thiere, I, p. 364. die *Wiesenschwalbe*.

Gesner, Vögelb. p. 249. *Koppriegerlein*; mit 1 F.

Latham, Syst. ornithol. II, p. 753. n. 1. *Glareola* (*Austriaca*) *griseo-fusca*, subtus *rufo-alba* linea gulari incurvata *nigra*, rectricibus quatuor exterioribus basi *albis*.

Pallas, Reif. Ausz. II, p. 318. die *schwalbenschwänzige Steppenralle*.

Pallas, nord. Beytr. IV, p. 24. die *Pratincola*.

S. G. Gmelin, Reif. d. Russl. I, p. 77. Tab. 16.

Scopoli Bemerk. a. d. Naturgesch. I, p. 129. n. 161. die *Wiesen-Trachelia*.

Eberhard, Thiergesch. p. 96. die *Seeschwalbe*.

Kramer, Austr. I, c. *Brachvogel*.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 281. *Glareola* II. *Koppriegerle*, *Sandvogel*.

Charleton, onomast. zoic. p. 90. n. 5. *Hirundo marina*.

Jonston, av. p. 160 *Gallinula erythropus minor*.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 137. *Hirundo Pratincola*.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 306. die *Wiesenschwalbe*.

β. *Die Wiesenschwalbe mit dem Halsbände.*(²)

Klein, av. p. 101. n. 6. *Glareola V. Schwenkf.*

Klein, Vorber. p. 188. n. 6. *Sandregerlein, Riegerlein.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 105. n. 5. *Sandregerlein.*

Briffon, ornitholog. II. p. 249. n. 2. *Perdrix de mer à collier.*

Gesner, Vögelb. p. 250. *Riegerlein*; mit 1 Fig.

Bechstein, -Naturgesch. Deutschl. II. p. 233. n. 2. *das Sandhuhn mit dem Halsbände.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 753. n. 1. β. *Gl. griseo-fusca, subtus albida, fronte nigra, utrinque macula alba, linea gulari incurvata fusca.*

Latham, Syn. III. 1. p. 223. *Collared Pratincole.*

Schwenkfeld, av. Siles. p. 282. *Glareola V. Riegerlein, Sand-Regerlin, Tullfiß.*

γ. *Das Seerebhuhn von den maldivischen Inseln.*

Latham, Syn. III. 1. p. 224. *Maldivian Pratincole.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 754. n. 1. γ. *Gl. griseo-fusca, subtus uropygioque albo, gula striis nigris lineaque incurvata nigro cincta.*

Sonnerat, Reif. nach Ostindien, (ed. germ.) III. p. 169. *das Seerebhuhn.*

δ. *Das Seerebhuhn von Coromandel.*

Latham, Syn. III. 1. p. 224. *Coromandel Pratincole.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 754. n. 1. δ. *Gl. fusca, corpore subtus, uropygio basique caudae albis, linea gulari incurvata nigra.*

Sonnerat, Reif. n. Ostind. p. 169.

Aaaa 5

e. La-

(2) Nach *Briffon*, u. a. eine eigene Gattung. *Bechstein* ist geneigt, diesen Vogel für ein Junges, oder für das Weibchen von *Charadrius Hiaticula* zu halten, wenn ich anders die Stelle p. 234. a. a. O. recht verstehe.

- ε. *Latham*, Syn. III. r. p. 224. Madras Pratincole.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 754. n. 1. ε. Gl.
 rufo-grisea, femoribus, crisso, uropygio, cauda
 basi, rectricibus lateralibus ad apicem lunula albis.
Sommerat, Reif. nach Ostind. p. 170.
2. **SENEGALENSIS.** *Das senegallische Seerebhuhn.*
Müller, Natursystem, II. p. 414. n. 22. *der se-
 negalische Strandläufer.*
Onomat. hist. nat. VII. p. 563. *der braune Strand-
 läufer.*
Briffon, ornithol. II. p. 250. n. 4. Perdrix de mer
 du Senegal.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 754. n. 2. Gla-
 reola (Senegalensis) rostro pedibusque fuscis,
 corpore fusco immaculato.
Linné, auserl. Abh. II. p. 280. n. 12. *der braune
 Kneitz.*
3. **NAEVIA.** *Das gefleckte Seerebhuhn.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 235. n. 3.
das gefleckte Sandhuhn, Rothknuffel, Rothknillis.
Halle, Vögel., p. 487. n. 530. *das rothe Wasser-
 huhn mit schwarzen Füßen.*
Klein, av. p. 101. n. 9. Glareola, Gallinula Me-
 lampus.
Klein, Vorbereit. p. 188. n. 9. *Rothknuffel.*
Klein, verb. Vögelhist. p. 105. n. 9. *Rothknuffel.*
Gesner, Vögelb. p. 245. Melampus; *Rotknillis*;
 mit 1 Fig.
Briffon, ornith. II. p. 250. n. 3. Perdrix de Mer
 tachetée.
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 754. n. 3. Glareo-
 la (Naevia) maculis fuscis et albicantibus varia,
 supra fusca subtus rufa, abdomine imo basique
 caudae candicantibus.

Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das ganze Geschlecht ist hier neu. Die erste und zweyte Gattung sind aus andern Geschlechtern hierher versetzt, die dritte ist neu hinzugekommen. Bey der 1sten Gattung sind fünf Varietäten aus einander gesetzt.

91. GESCHLECHT. FULICA. *Das Wasserhuhn.*

Müller, Natursystem, II. p. 426. Gen. XCI.

Leske, Naturgesch. p. 277. Gen. LVII.

Borowsky, Thierreich, III. p. 96. Gen. XXIII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 216.

Gen. LXIII.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 438. Gen. XLV.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 236.

Gen. XXXIV.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 461.

Neuer Schaupl. d. Natur, IX. p. 563. II. p. 794.

Onomat. hist. nat. III. p. 990.

Briffon, ornitholog. II. p. 350. Gen. LXXXVII.

Porphyrio. p. 364. Gen. XC. Fulica.

Batsch, Thiere, I. p. 386. Gen. C.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 766. Gen. LXXX.

Gallinula. p. 777. Gen. LXXXIII. Fulica.

Hermann, tab. affin. anim. p. 163.

Donndorff, Handb. d. Thierng. p. 306. Gen. LVI.

* *Mit gespaltene Füßen: Meerhühner.*

1. FUSCA. *Das braune Meerhuhn.* (3)

Müller, Naturyst. II. p. 426. n. 1. *das braune Wasserhuhn.*

Bechstein,

(3) Soll, nach *Bechstein*, das Weibchen von *Fulica Chloropus*, und das Weibchen desselben ein Junges davon seyn.

Schrank's

Bechstein, Naturgesch. I. p. 440. n. 2. *das braune Meerhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 245. n. 2. *das braune Meerhuhn.* p. 247. *welches Wasserhuhn.*

Onomat. histor. natur. IV. p. 8. *das dunkelbraune Wasser-Huhn.*

Briffon, ornitholog. II. p. 359. n. 2. *petite Poulé d'eau.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 771. n. 15. *Gallinula (Fulca) fronte flavescens, armillis coloribus, corpore fuscescente.*

Besike, Vögel Kurlands, p. 67. n. 136. *das braune Wasserhuhn.*

Siemssen, meklenburg. Vögel, p. 178. n. 1. *das braune Wasserhuhn.*

Frieh, Vögel, Tab. 210. *das Oliven-Wasserhuhn.*
Schriften der berlin. Gesellschaft naturf. Fr. VII. p. 464. n. 5. *das braune Wasserhuhn.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 122. *das weißoachigte Wasserhuhn.*

Charleton, onomast. zoic. p. 101. n. 2. *Rallus Italarum.*

Fonston, av. p. 147. *Rallus Italarum.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 307. n. 1. *das braune Wasserhuhn.*

β. *Das große braune Meerhuhn.* (4)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 248.

Briffon,

Schrank's Wasserhübchen (Naturf. XVIII. p. 70.) nimme *Bechstein* für eine *Fulica Chloropus* kurz vor dem ersten Mausern, oder kurz nach demselben an, und rechnet auch *Frieh's Oliven Wasserhuhn* dahin.

(4) Nach *Briffon* eine eigene Gattung. Nach *Bechstein* vielleicht ein junges Männchen von *Fulica Chloropus*; wenn nicht die Größe im Wege stünde.

Briffon, ornitholog. II. p. 360. n. 3. grande Poule d'eau.

Latham, Syn. III. 1. p. 261. n. 14. Var. A.

Latham, Syst. ornith. II. p. 771. n. 15. β . Gallinula fronte flavicante, corpore supra castaneo subtus cinereo, marginibus pennarum albis, capite et collo nigricantibus, imo ventre albo.

4. CHLOROPUS. *Das grünfüßige Meerhuhn.* (5)

Müller, Naturfyſtem, II. p. 428. n. 4. *der Grünfuß.* Tab. 17. fig. 3.

Bechstein, Naturgeſch. I. p. 439. n. 1. *das grünfüßige Meerhuhn.*

Bechstein, Naturgeſch. Deutſchl. III. p. 237. n. 1. *das grünfüßige Meerhuhn.* p. 244. *gemeines Meerhuhn, Waſſerhenne, Rothbläſſchen, Grünfuß, rothes Blaßhuhn, Rohrhühnlein.*

Halle, Vögel, p. 490. n. 535. *das dunkelbraune große Waſſerhuhn, mit nackter rother Stirn und Knie.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 221. n. 208. *die Waſſerhenne.*

Onomat. hiſt. nat. III. p. 993. *das ſchwarze Waſſerhuhn mit grünen Beinen.*

Klein, av. p. 103. n. 2. *Rallus aquaticus?*

Klein, Vorbereit. p. 191. n. 2. *ſchwarzer Waſſertreter, Waſſerläufer.*

Klein, verb. Vögelhiſt. p. 105. n. 2. *ſchwarze Ralle, Thauſchnarre.*

Briffon, ornithol. II. p. 358. n. 1. *Poule d'eau.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 770. n. 13. *Fulica (Chloropus) fronte fulva, armillis rubris, corpore nigricante, criffo albo.*

Befeke,

(5) Gewicht des Männchens 14 Unzen. Ein zänkischer und scheuer Vogel, der aber doch sehr zahm und kirre gemacht werden kann.

- Beseke*, Vögel Kurl. p. 68. n. 139. *der Grünfuß.*
Siemssen, meklenb. Vögel, p. 179. n. 3. *das Wasserhuhn mit den grünen Füßen.*
Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 364. *der Grünfuß.*
Cetti, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 289. *grünfüßiges Wasserhuhn.*
Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 171. n. 2. *Vandhöne.*
Pallas, nord. Beyträge, IV. p. 10. *das kleine Wasserhuhn.*
Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 123. n. 153. *das grünfüßige Wasserhuhn.*
 Naturf. XIII. p. 218. n. 131. *der Grünfuß.* XV. p. 159. *der Grünfuß.* XVIII. p. 234. (Anat.)
Linne', Syst. Nat. Edit. X. I. p. 152. n. 2. *Fulica (Chloropus) fronte alba, corpore nigro, digitis simplicibus.*
Müller, zoolog. dan. prodr. p. 27. n. 217. *Fulica (Chloropus) fronte fulva, armillis rubris, pedibus simplicibus, corpore nigricante.*
Charleton, onomast. zoic. p. 107. n. 1. *Gallinula, Chloropus.*
Kramer, Austr. l. c. *Rohrhennl mit rothem Blasz, kleines Rohrhennl, Wasserhennl.*
Jonston, av. p. 161. *Gallinula Chloropus.*
Zinnar. Uov. p. 109. Tab. 29. fig. 98. *Gallinella aquatica, Porzanone.*
Schäfer, element. ornith. Tab. 36.
Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 307. n. 2. *das Rothbläschen.*

8. VIRIDIS. *Das grüne Meerhuhn.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 638. *das grüne Sultanshuhn.*

Briffon,

Briffon, ornitholog. II. p. 352. n. 3. Poule - Sultane verte.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 769. n. 12. Gallinula (Viridis) corpore supra obscure viridi subtus albo, fronte, rostro pedibusque viridiflavescens.

9. MELANOCEPHALA. *Das schwarzköpfige Meerhuhn.* (6)

Briffon, ornitholog. II. p. 352. n. 1. Var. A. Poule - Sultane à tête noire.

Latham, Syn. III. I. p. 257. n. 10. Black-headed Gallinule.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 768. n. 7. Gallinula (Melanocephala) fronte fulva, corpore caeruleo, capite colloque nigris.

Feuillée Journ. p. 288. (edit. 1725.) Gallinula palustris.

11. PURPUREA. *Das purpurfarbene Meerhuhn.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 769. n. 11. Gallinula (Purpurea) fronte rostroque rubente, corpore faturate purpureo albo vario.

Jonston, av. p. 182. *Quachilton, Jacacynthli.*

12. FLAVIROSTRIS. *Das gelbschnäblige Meerhuhn.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 769. n. 10. Gallinula (Flavirostris) fronte rubra, corpore supra caeruleo, subtus uropygioque albo, remigibus caudaque fuscis.

5. PORPHYRIO. *Das Sultanshuhn.*

Müller, Naturfyst. II. p. 428. n. 5. *der Sultan.*

Halle, Vögel, p. 427. n. 448. *das Sultanshuhn, Purpurhuhn.*

Gatte-

(6) Nach *Briffon* eine Varietät von *Fulica Porphyria* n. 5.

- Gatterer*, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 221. n. 209. *der Sultan*.
- Borowsky*, Thierreich, III. p. 97. n. 1. *das purpurfarbene Wasserhuhn*. Tab. 53.
- Onomat. hist. nat. VI. p. 634. *das Sultanshuhn, der Purpurvogel*.
- Klein*, av. p. 104. n. 6. *Rallus aquaticus, rostro, fronte pedibusque rubris, reliquo corpore cyaneo, sub cauda plumis albis*.
- Klein*, Vorbereit. p. 192. n. 6. *der purpurne Rall*.
- Klein*, verb. Vögelhist. p. 106. n. 7. *Purpurralle*.
- Briffon*, ornithol. II. p. 351. n. 1. *Poule-Sultane*.
- Gesner*, Vögelb. p. 403. *Purpurvogel*. Fig. p. 404.
- Batsch*, Thiere, I. p. 395. *das purpurfarbene Wasserhuhn*.
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 768. n. 6. *Gallinula (Porphyrio) fronte rubra, armillis rubris, corpore viridi, subtus violaceo*.
- Pallas*, nord. Beytr. I. p. 8. *das persische blaue Huhn*.
- Seligmann*, Vögel, IV. Tab. 9. *das purpurfarbene Wasserhuhn*.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 122. n. 152. *das violette Wasserhuhn*.
- Eberhard*, Thiergesch. p. 102. *der Purpurvogel*.
- Perrault, Charras u. Dodart*, Abhandl. aus der Naturgesch. I. p. 227. anatomische Beschreib. einer Sultanshenne. Tab. 71. *die Sultanshenne*. Tab. 72. *die Zergliederung*.
- Linne'*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 152. n. 3. *Fulica (Porphyrio) fronte calva, corpore violaceo, digitis simplicibus*.
- Philos.* Transact. xxiii. p. 1395. 19. *Chloropus, Acbac*.
- Charleton*, onom. zoic. p. 104. n. 6. *Porphyriion*.
Jonston,

Jonston, av. p. 155. Porphyrio.

Aelian. histor. animal. L. 3. c. 41. L. 5. c. 28.

Πορφυριων.

Athen. Deipnos. L. 9. c. 10. Πορφυριων.

Aristot. histor. anim. L. 7. c. 6. Πορφυριων.

Martial. Epigr. L. 13. Ep. 78. Porphyrio.

Plin. hist. nat. L. 10. c. 40. 46. 47. Porphyrio.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 307. das
Sultanshuhn.

β. F. nigro-violacea, collo subtus cyaneo, fronte
pedibusque rubris. *

Latham, Syst. ornithol. II. p. 768. n. 1. β.

Aldrov. III. p. 438. Tab. 440. Porphyrio alter.

6. CARTHAGENA. Das carthagensische Meerhuhn.

Müller, Naturfyst. II. p. 429. n. 6. das cartha-
genische Wasserhuhn.

Latham, Syst. ornith. II. p. 767. n. 2. Gallinu-
la (Carthagenensis) fronte caerulea, corpore rufo.

12. CAYENNENSIS. Das cayennische Meerhuhn.

Müller, Naturfyst. Supplem. p. 119. n. 1. das
cayennische Wasserhuhn.

Latham, Syst. ornith. II. p. 767. n. 3. Gallinula
(Cayanensis) griseo-fusca, pectore abdomine-
que superiore rufis, dorso alisque olivaceis,
gula albida.

13. RUFICOLLIS. Das rothhälsige Meerhuhn.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 767. n. 4. Galli-
nula (Ruficollis) corpore subtus nigro, dorso
fusco-viridi, collo subtus pectoreque rufis.

14. MADERASPATANA. Das malabarische Meer-
huhn.

Briffon, ornithol. II. p. 357. n. 10. Poule-Sultane
de Madras.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 767. n. 5. Gallinula (Maderaspatana) cinerea, subtus alba, collo subtus et pectore maculis lunatis nigris.

7. **MARTINICENSIS.** *Das martinikische Meerhuhn.*

Müller, Naturfyst. II. p. 409. n. 7. die Langzähe.

Briffon, ornitholog. II. p. 352. n. 2. petite Poule-Sultane.

Latham, Syst. ornith. II. p. 769. n. 9. Gallinula (Martinica) fronte caerulea, armillis coloribus, corpore fusco-caerulescente.

Latham, Syn. Suppl. p. 258. Martinico Gallinule.

15. **NOVEBORACENSIS.** *Das gelbbrüstige Meerhuhn.*

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 457. n. 327. die Gelbbrust.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 771. n. 16. Gallinula (Noveboracensis) fusca, scapularibus marginibus flavescens, pectore flavo, abdomine albo.

16. **NAEVIA.** *Das bunte Meerhuhn.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 22. ad n. 8. *Albins Poliopus.*

Gesner, Vögelbuch, p. 341. Poliopus; *Deffyt*; mit 1 Fig.

Onomat. histor. nat. VI. p. 636. *das kleine Wasferhuhn.*

Briffon, ornithol. II. p. 355. n. 8. Poule-Sultane tachetée.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 772. n. 18. Gallinula (Naevia) fronte crocea, corpore rufescente, nigro-maculato, collo subtus cinereo-caerulescente, maculis nigris, superciliis albidis.

17. MACULATA. *Das gefleckte Meerhuhn.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 248. n. 3.
das gefleckte Meerhuhn. p. 249. *Rheinvogel,*
Matkneltzel, Matkern.

Halle, Vögel, p. 487. n. 53. *das rothe Wasserhuhn.*
Klein, av. p. 101 n. 8. Glareola IX. *Schwenkf.*
Cenchramus; Matkneltzell Bellon.

Klein, Vorbereit. p. 188. n. 8. *Matkern, klein*
Brachvogel.

Klein, verb. Vögelhist. p. 103. n. 8. *kleiner Brach-*
vogel, Matkern.

Onomat. hist. nat. VI. p. 637. der Rhein-Vogel.

Briffon, ornitholog. II. p. 354. n. 7. *Poule-Sul-*
tane mouchetée.

Gesner, Vögelb. p. 247. *Erythra; Matkern;*
 mit 1 Fig.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 772. n. 20. *Gallin-*
nula (Maculata) fronte flava, corpore fusco-
rufescente supra maculis nigris candidisque ad-
sperso, genis, gula colloque subtus albis.

Schwenkfeld, av. Sil. p. 284. Glareola IX. *Matkern.*

Jonston, av. p. 160. *Gallinula Erythra.*

18. FLAVIPES. *Das gelbfüßige Meerhuhn. (7)*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 249. n. 4.
das gelbfüßige Meerhuhn. p. 250. *Schmirr-*
ling, Gelbbeinlein.

Halle, Vögel, p. 485. n. 527. *das rothe Wasserhuhn,*
mit schwefelgelben Beinen und Angerledern.

Klein, av. p. 101. n. 2. Glareola III. *Schwenkf.*

Klein, Vorbereit. p. 187. n. 2. *Geel-Gelbbeinlein,*
Schmiering, Geelfüßel.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 103. n. 2. *Gelb-*
beinlein, Schmirring.

bbbb 2

Briffon,

(7) Nach *Bechstein* ein Junges von *Fulica Chloropus.*

Briffon, ornith. II. p. 354. n. 6. Poule-Sultane rousse.

Gesner, Vögelbuch, p. 242. Ochropus magnus;
Schmirring; mit 1 F.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 773. n. 21. Gallinula (Flavipes) fronte calva, corpore supra rufo, maculis nigricantibus vario, subtus albo, capistro genisque candidis.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 281. Glareola III. *Schmirring*, *Geelfüßel*.

19. FISTULANS. *Das Glutthuhn.* (8)

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 250. n. 5. *das Glutthuhn*.

Briffon, ornith. II. p. 353. n. 4. Poule-Sultane brune.

Gesner, Vögelb. p. 240. Glottis; *Glutt*; m. 1 F.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 773. n. 22. Gallinula (Fistulans) fronte viridi-flavicante, corpore fusco, subtus albo, genis candidis.

Jonston, av. p. 160. Chloropus tertia; *Glutt*.

20. CINEREA. *Das aschgraue Meerhuhn.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 773. n. 23. Gallinula (Cristata) fronte cristata rubra, corpore supra cinereo-virescente, subtus apice colloque cinereis, abdomine medio albo.

** *Mit gefiederten, d. i. in kleine auswärts gebogene Lappen, getheilten Füßen. Eigentliche Wasserhühner.*

2. ATRA. *Das gemeine schwarze Wasserhuhn.* (9)

Müller, Naturfyst. II. p. 427. n. 2. *das rufffarbige Wasserhuhn.*

Leske,

(8) Nach *Bechstein* ein Junges, oder das Weibchen von *Fulica Chloropus*.

(9) Gewicht 24 bis 28 Unzen. *Penn.* Der Reymame rufffarbig kommt ihm wohl nicht zu, da es in der That rabenschwarz ist.

Leske, Naturgesch. p. 277. n. 1. das schwarze Wasserhuhn. Tab. 5. fig. II. (der Fuß.)

Borowsky, Thierreich, III. p. 97. n. 2. das schwarze Wasserhuhn.

Blumenbach, Handb. der Naturgesch. p. 216. n. 1. Fulica (Atra) fronte incarnata, armillis luteis, corpore nigricante; das schwarze Bläßhuhn.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 440. n. 3. das gemeine Wasserhuhn.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 251. n. 1. das gemeine Wasserhuhn. p. 258. Bläßhuhn, Bläßhuhn, Bläßchen, Bläßling, Bläßgieker, Pfaffe, Horbel, Bläßente, Rohrhenne, Weißbläße, rußfarbiges Wasserhuhn, glänzender Rabe.

Funke, Naturgesch. I. p. 253. das schwarze Wasserhuhn.

Halle, Vögel, p. 604. n. 759. das schwarze Rohrhuhn.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 220. n. 206. das gemeine Wasserhuhn.

Pennant, erst. Zoolog. II. p. 461. n. 333. das gemeine Wasserhuhn.

Onomat. hist. nat. IV. p. 991. das schwarze Wasserhuhn mit breiten Zehenlappen.

Handbuch d. deutschen Thiergesch. p. 112. das Bläßlein.

Klein, av. p. 150. n. 1. Fulica recentiorum.

Klein, Vorber. p. 277. n. 1. Rohrhuhn, Wasserhuhn, Pfaffe.

Bbbb 3

Klein,

ist. Bloß die untern Deckfedern des Schwanzes sind wie bey der *Ful. Fusca*. Die Indianer um Niagara beizen die Häute dieser Thiere und gebrauchen sie als Beutel. Nach *Latham* gehört auch *Scopolis Fulica albiventris* (*Gmelin*, S. Item p. 697. n. 1.) als Spielart hierher.

- Klein*, verbeff. Vögelhist. p. 161. n. 1. *schwarz Blashuhn, Rohrhahn.*
- Klein*, stemm av. p. 40. Tab. 40. fig. 1. a. b.
- Klein*, Vögeleyer, p. 36. Tab. 12.
- Gesner*, Vögelb. p. 44. *Bölchinen, Belchinen, Belch, Florn, Pfaff, Blesß, Blessing, Hagelganß, Schwarztaucher, Zapp.* Fig. p. 45.
- Brisson*, ornitholog. II. p. 365. n. 1. *Foulique ou Morelle.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 395. *das schwarze Wasserhuhn.*
- Latham*, Syn. Suppl. p. 259. Common Coot.
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 777. n. 1. *Fulica (Atra) fronte incarnata, armillis luteis, corpore nigricante.*
- Beseke*, Naturgesch. der Vögel Kurl. p. 67. n. 137. *das rußfarbige Wasserhuhn.*
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 180. n. 3. *das gemeine Wasserhuhn, Zapp.*
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 364. *das rußfarbige Wasserhuhn.*
- Cetti*, Naturgesch. von Sardinien, II. p. 291. *das rußfarbige Wasserhuhn, oder der Bläßling mit der rothen Blässe.*
- Pontoppidan*, Dännemark, p. 171. n. 1. *Blisköne.*
- Hasselquist*, Paläst. p. 316. n. 34. *Fulica atra.*
- Pallas*, nord. Beytr. I. p. 8. *das gemeine Wasserhuhn.*
- Linné*, auserles. Abhandl. II. p. 298. n. 104. *das schwarze Wasserhuhn.*
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 121. n. 149. *das Blashuhn, Weißblässe.*
- Naturf. XIII. p. 218. n. 130. *das rußfarbige Wasserhuhn.*

Döbel, Jägerprakt. I. p. 72. *Horbel*, Bläß - Ente
oder Bläßgen.

Naumann, Vogelsteller, p. 193. *Hurbel*.

Zorn, Petinotheol. II. p. 418. *der Bläßling*.

Schneider, zoolog. Abhandl. p. 139. 141. *das
schwarze Wasserhuhn*. p. 149. *Kritschäne,
Kritschele*.

Meidinger, Vorles. I. p. 135. n. 1. *das schwarze
Wasserhuhn*.

Eberhard, Thiergesch. p. 123. *das schwarze Rohr-
huhn*.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 28. n. 1. *Fulica
nigricans*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. f. p. 152. n. 1. *Fulica
(Atra) fronte calva, corpore nigro, digitis
lobatis*.

Linné, fn. Suec. I. n. 130. *Fulica fronte calva
aequali*.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 27. n. 216. *Fulica
(Atra) fronte incarnata, armillis luteis, pedi-
bus pinnatis, corpore nigricante*.

Kramer, Austr. p. 357. n. 1. *Fulica nigricans,
fronte et rostro incarnatis; Rohrhennl, Bläßl.*

Schwenkfeldt, av. Siles. p. 263. *Fulica; Wasserhuhn,
Rohr - Henne*.

Charleton, onomast. zoic. p. 101. n. 16. *Fulica*.

Moehring, av. gen. p. 70. n. 78. *Fulica*.

Jonston, av. p. 146. *Fulica*. p. 135. *Phalaris*.

Zinnan. Uov. p. 108. Tab. 19. fig. 96. *Falaga o
Polon*.

Schäfer, element. ornith. Tab. 34.

Plin. hist. nat. L. 18. c. 35. *Fulicae*.

Varro, de re rust. L. 3. c. 11. *Phalarides*.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 308. n. 4.
das schwarze Wasserhuhn.

3. ATERRIMA. Das große schwärzlich aschgraue Wasserhuhn ⁽¹⁰⁾
Müller, Naturfyst. II. p. 427. n. 3. das schwarze Wasserhuhn.
Borowsky, Thierreich, III. p. 98. n. 3. der Meerteufel, das schwärzeste Wasserhuhn.
Halle, Vögel, p. 605. n. 760. das schwarze Flußteufelchen. Fig. 55.
Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere. II. p. 220. n. 207. das Blashuhn.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 440. n. 4. das schwärzeste Wasserhuhn.
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 259. n. 2. das schwarze Wasserhuhn. p. 260. das rußfarbige Blashuhn; große Blashuhn, Meer-teufel, Timphahn.
Klein, av. p. 151. n. 2. Fulica maior.
Klein, Vorbereit. p. 277. n. 2. Meer-, Wasser-teufel.
Klein, verbess. Vögelhist. p. 161. n. 2. Meerteufel.
Klein, Vögeleyer, p. 36. Tab. 12. fig 3?
Briffon, ornithol. II. p. 366. n. 2. grande Foul-que, ou Macroule.
Batsch, Thiere, I. p. 395. der Meerteufel.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 778. n. 2. Fulica (Aterrima) fronte alba, armillis rubris, corpore nigricante.
Beseke, Vögel Kurl. p. 68. n. 138. das schwarze Wasserhuhn.
Siemssen, meklenburg. Vögel, p. 181. n. 4. der Wasser-teufel, Bläsenörk.

Scopoli,

(10) Diese Benennung kommt ihm wirklich zu, denn es ist dunkel schwärzlich aschgrau. Nach *Beseke* soll es fast noch einmal so groß als das vorige, nach andern nur um 1/2 Zoll größer seyn. *Bechstein* hält es mit demselben für einetley.

Scopoli Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 121. n. 150.

Fulica fuliginosa; das rußfarbene Blafshuhn.

Eberhard, Thiergesch. p. 123. das Flußteufelgen.

Meidinger, Vorlef. I. p. 135. n. 2. das kohlschwarze Wasserhuhn.

Linne', Syst. Nat. Edit. VI. p. 28. n. 2. *Fulica aterrima*.

Charleton, onom. zoic. p. 101. n. 1. *Cotta maior*.

Barrere, ornitholog. 23. *Fulica crasso corpore aterrima*.

Jonston, av. p. 147. *Fulica*, quam Parisienses *Dia-bolum marinum* vocant.

21. LEUCORYX. Das weißflüglige Wasserhuhn. (1)

Latham, Syn. Suppl. p. 259.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 778. n. 1. β. *Fulica nigra alis albis*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 258. n. 2.

22. AETHIOPS. Das Mohrenwasserhuhn. (2)

Latham, Syn. Suppl. p. 259.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 778. n. 1. γ. *Fulica tota nigra*.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 258. n. 3.

23. AMERICANA. Das amerikanische Wasserhuhn.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 779. n. 5. *Fulica* (Americana) fronte albida, corpore cinereo, gula abdomineque medio albis.

24. MEXICANA. Das mexikanische Wasserhuhn.

Briffon, ornitholog. II. p. 367. n. 3. Foulque du Mexique.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 779. n. 4. *Fulica* (Mexicana) fronte coccinea, corpore pallide

Bbbb 5 virefcente

(1) Nach *Latham* u. *Bechstein* eine Varietät von *Fulica Atra*.

(2) Nach *Latham* u. *Bechstein* eine Varietät von *F. Atra*.

virescente cyaneo et fulvo variegato, subtus, capite et collo coccineis.

Eberhard, Thiergesch. p. 123. Yohoalcoochillin.

35. CRISTATA. Das madagascarisches Wasserhuhn.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 779. n. 3. Fulica (Cristata) caruncula rubra bifida erecta, armillis tricoloribus, corpore caeruleo-nigricante.

A. Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.

Das Geschlecht ist mit 18 Gattungen vermehrt. Bey der 1sten Gattung sind zwey Varietäten aus einander gesetzt. Uebrigens sind die sogenannten Meerhühner von den eigentlichen Wasserhühnern getrennt, und beyde in besondere Unterabtheilungen gebracht.

B. Unbestimmtere Thiere.

1. Das kleine gesprenkelte Wasserhuhn des *Frisch*. Tab. 211.

Beseke, Vögel Kurlands, p. 68. n. 140.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 711. 735.

(An *Rallus Porzana* Linn. S. N. p. 712. n. 3?)

Es ist wohl ein Schreib- oder Druckfehler, wenn *Frisch*, Tab. 211. in unserm System p. 711. bey *Rallus Crex* citirt worden. Offenbar muß es 212 heißen.

2. Das grünschnablige Wasserhuhn.

Beseke, Vögel Kurl. p. 68. n. 141.

3. Fulica fronte, rostri basi coccinea, armillis nullis, pedibus pinnatis, corpore nigro.

Sander: Naturforsch. XIII. p. 191.

B. *Neuere Gattungen.*

1. *Das weiße Wasserhuhn von der Insel Norfolk.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 768. n. 8. Gallinula (Alba) fronte, rostro pedibusque rubris, corpore toto albo.
White, Reif. n. Neufüdwaales; — in dem Magazin merkwl. Reisebeschreib. V. p. 120. Fulica candida; *das weiße Bläshuhn.*

* EINGESCHOBENES GESCHLECHT.
 VAGINALIS. *Der Scheidenvogel.*

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 441. Gen. XLVII.
Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. II. p. 182. Gen. LVI.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 774. Gen. LXXXI.
Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 308. Gen. LVII.

3. ALBA. *Der weiße Hornschnabel.*

- Bechstein*, Naturgesch. I. p. 442. *der weiße Scheidenschnabel.*
Bechstein, Naturgesch. Deutschl. II. p. 182. *der weiße Hornschnabel.*
Latham, Syst. ornith. II. p. 774. n. 1. Vaginalis Chionis.
Donndorff, Handb. der Thiergeschichte, p. 308. *der weiße Hornschnabel.*

92. GESCHLECHT. PARRA. *Der Spornflügel.*

- Müller*, Naturfyft. II. p. 430. Gen. XCII.
Leske, Naturgesch. p. 277. Gen. LVIII.
Borowsky, Thierreich, III. p. 98. Gen. LIV.
Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 217. Gen. LXIV.
Bechstein, Naturgesch. I. p. 440. Gen. XLVI.

Onomat. hist. nat. VI. p. 171.

Briffon, ornithol. II. p. 242. Gen. LXXI. Jacana.

Batsch, Thiere, I. p. 396. n. 2.

Latham, Syst. ornith. II. p. 762. Gen. LXXIX.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 134. 142.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 309.
Gen. LVIII.

I. DOMINICA. *Der Spornflügel von St. Domingo.*⁽³⁾

Müller, Naturfyst. II. p. 431. n. 1. *der domingische Kiebitz.*

Ebert, Naturl. II. p. 101. *der domingische Spornflügel.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 174. Parra dominica.

Briffon, ornitholog. II. p. 241. n. 8. Vanneau armé de St. Domingue.

Latham, Syn. III. I. p. 165. n. 6. Var. A. Louisiane Sandpiper.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 727. n. 6. β . *Tringa carunculata alis armatis, corpore fulvo, subtus rosea, rectricibus fulvis, rostro pedibusque flavis.*

6. LUDOVICIANA. *Der louisianische Spornflügel.*

Briffon, ornithol. II. p. 241. n. 7. Vanneau armé de la Louisiane.

Pennant, arct. Zool. II. p. 445. n. 312. *der Waffenträger.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 727. n. 6. *Tringa (Ludoviciana) carunculata, alis armatis, corpore griseo-fusco, subtus basique caudae alborufescente, pileo, remigibus fasciaque rectricum nigris.*

7. CAYEN-

(3) Nach *Latham* eine Spielart von der folgenden Gattung.

7. CAYENNENSIS. *Der cayennische Spornflügel.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 727. n. 5. *Tringa*
 (Cayanensis) cristata alis armatis, dorso viridi-
 purpureo, collo rufescente, fronte, gula fascia-
 que pectoris caudaeque nigris, margine alarum
 extus, abdomine basique caudae albis.
Fermin, Besch. v. Surinam, II. p. 175. *Kiebitz*.
8. GOENSIS. *Der Spornflügel von Goa.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 727. n. 7. *Tringa*
 (Goensis) carunculata armata fusca, apice collo
 remigibus fasciaque caudae nigris, linea longi-
 tudinali colli, pectore, abdomine, fascia alarum
 basique caudae albis.
2. SENEGALLA. *Der senegallische Spornflügel.*
Müller, Natursystem, II. p. 431. n. 2. *der senegal-*
ische Kiebitz.
Ebert, Naturl. II. p. 101. *der senegalische bewaff-*
nete Kiebitz.
Onomat. histor. nat. VI. p. 175. Parra Senegalla.
Briffon, ornithol. II. p. 240. n. 6. *Vanneau armé*
du Senegal.
Latham, Syst. ornithol. II. p. 728. n. 8. *Tringa*
 (Senegalla) carunculata armata fusca, gula, re-
 migibus fasciaque caudae nigris, fascia alarum
 longitudinali, abdomine, basi apiceque caudae
 albis.
Adanson, R. n. Senegal, p. 64. *Uet-uet.*
9. CHILENSIS. *Der Theghel.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 765. n. 5. *Parra*
 (Chilensis) unguibus modicis, pedibus fuscis,
 occipite subcristato.
Vidaure, Chile, p. 73. *der Threguel oder Kel-*
tren.

Goeze, nützl. All. III. p. 124. n. 10. *der Lanzettenvogel.*

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 309. n. 1. *der Theghel.*

9. JACANA. *Die Jacane.*

Müller, Naturfyst. II. p. 431. n. 3. *der Nachtkopf.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 99. n. 2. *der braune Spornflügel.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 217. n. 1. Parra (Jacana) unguibus posticis longissimis, pedibus viridescentibus.

Onomat. hist. nat. VI. p. 174. Parra Jacana.

Ebert, Naturl. II. p. 101. *die sogenannte amerikanische Gans mit dem Dornflügel.*

Briffon, ornitholog. II. p. 244. n. 4. Chirurgien brun.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 762. n. 1. Parra (Jacana) castaneo-purpurea, capite, collo subtusque ex nigro violacea, remigibus olivaceo-viridibus, apice fusco marginatis, rectricibus apice nigro-violaceis.

Fermin, Besch. v. Surinam, II. p. 174. *Reuter.*

Eberhard, Thiergesch. p. 95. *der Jacan.*

Charleton, onomast. zoic. p. 115. n. 1. Anser chilensis, seu caput nocturnum.

Fonston, av. p. 187. Jacanae quarta species.

Fonston, av. p. 181. Jochualcuachili. (Yohualcuachili.)

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 309. n. 2. *die Jacane.*

10. NIGRA. *Der schwarze Spornflügel.*

Halle, Vögel, p. 491. n. 537. *das schwarze Wasserhuhn.*

Briffon, ornith. II. p. 243. n. 3. Chirurgien noir.

Latham,

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 762. n. 2. Parra
(Nigra) nigra, subtus fusca, remigibus viridi-
bus, apice fuscis, rectricibus nigris.

Jonston, av. p. 181. Jacanae tertia species.

11. BRASILIENSIS. *Der brasilianische Spornflügel.*

Halle, Vögel, p. 490. n. 536. *das brasilische Was-
serhuhn.*

Briffon, ornitholog. II. p. 243. n. 2. Jacane armé,
ou le Chirurgien.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 763. n. 3. Parra
(Brasilienfis) nigro-viridans, alis ad fuscum
vergentibus, rectricibus nigro-viridantibus.

Jonston, av. p. 181. Jacanae alia species, Bra-
siliensibus *Aquapecaca* dicta.

12. VIRIDIS. *Der grüne Spornflügel.*

Briffon, ornith. II. p. 242. n. 1. Jacana.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 763. n. 4. Parra
(Viridis) nigro-viridans, capite collo pectore-
que violaceo-variantibus, rectricibus nigro-vi-
ridantibus, testricibus subtus albis.

Jonston, av. p. 180. Jacana Brasilienfis.

4. VARIABILIS. *Der bunte Spornflügel.*

Müller, Natursystem, II. p. 332. n. 4. *der mexica-
nische Kiebitz.*

Borowsky, Thierreich, II. p. 98. n. 1. *der me-
xitanische Spornflügel.* Tab. 54.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 441. *der mexikanische
Spornflügel.*

Neuer Schaupl. der Nat. VII. p. 11. n. 7. *Karthu-
ginenser.*

Halle, Vögel, p. 496. n. 547. *der gehörnte Spo-
renvogel.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 175. Parra variabilis.

Klein,

Klein, av. p. 104. n. 7. Rallus digitis triuncialibus, calcaneo biunciali, aculeiformi, anomalo. Follata excelsa.

Klein, Vorber. p. 193. n. 7. *Karthaginerfer*.

Klein, verbess. Vögelhist. p. 106. n. 7. *Carthaginerfer Ralle*, mit sonderlicher Hinterzähe.

Brisson, ornith. II. p. 245. n. 5. Chirurgien varié.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 763. n. 5. Parra (Variabilis) castaneo-purpurea, subtus superciliisque albis, remigibus viridibus, fascia per oculos nigra.

Seligmann, Vögel, II. Tab. 95. *das Wasserhuhn mit Flügelspornen*.

Bankroft, Naturgesch. von Guiana, p. 104. *das Wasserhuhn mit Spornen an den Flügeln*.

Mannichf. IV. p. 216. *das bunte Wasserhuhn mit Flügelsporn*.

Linné, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 152. n. 4. Fulica (Spinosa) fronte carunculata, corpore variegato, humeris spinosis.

13. LUZONIENSIS. *Der Spornflügel von der Insel Luçon.*

Latham, Syn. Suppl. p. 256. Luzonian Jacana.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 764. n. 6. Parra (Luzoniensis) fusca, subtus, superciliis, tectricibus alarum minoribus remigibusque secundariis albis, lateribus colli fascia cinerea, remigibus primoribus tribus elongatis denudatis, apice rhombeis.

Sommerat, Reif. n. Neuguin. p. 31. *der Wundarzt von der Insel Luçon*; mit 1 Fig.

14. AFRICANA. *Der afrikanische Spornflügel.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 764. n. 8. Parra (Africana) cinnamomea, collo subtus albo, pectore

pectore flavescente nigro vario, vitta per oculos, collo postice remigibusque nigris.

15. **SINENSIS.** *Der chinesische Spornflügel.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 764. n. 7. Parra (Sinensis) castaneo vinacea, capite, collo anteriore rectricibusque alarum albidis, collo postico lutescente, remigibus duabus rectricibusque intermediis elongatis.

3. **CHAVARIA.** *Der neuspanische Spornflügel.*

Müller, Naturfyst. II. p. 333. n. 5. *der Krüppel.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 99. n. 3. *der neuspanische Spornflügel.*

Ebert, Naturl. II. p. 102. *der bewaffnete Kiebitz aus Neuspanien.*

Batsch, Thiere, I. p. 396. *der neuspanische Spornflügel.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 171. Parra Chavaria.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 764. n. 9. Parra (Chavaria) crista occipitis dependente, corpore supra fusco, collo abdomineque nigris, temporibus gula albis, alulis spinosis.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 134. 142. Parra Chavaria.

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 310. n. 3. *der neuspanische Spornflügel.*

A. *Veränderungen gegen die XII. Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit zehn Gattungen vermehrt.

B. *Neuere Gattungen.*

I. *Der indianische Spornflügel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 257. Indian Jacana.

II. Band I. Th.

Cees

Latham

Latham, Syst. ornithol. II. p. 765. n. 10. Parra (Indica) caeruleo-nigricans, dorso alisque fuscis, superciliis albis, ad rictum oris macula rubra.

93. GESCHLECHT. RALLUS. *Die Ralle.*

Müller, Naturfystem, II. p. 435. Gen. XCIII.

Leske, Naturgesch. p. 271. Gen. LI.

Borowsky, Thierreich, III. p. 100. Gen. LV.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 217. Gen. LXV.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 444. Gen. LI.

Bechstein, Naturgeschichte Deutschl. III. p. 261. Gen. XXXV.

Halle, Vögel, p. 491. Gen. III.

Neuer Schaupl. d. Natur, VII. p. 10.

Onomat. hist. nat. VI. p. 765.

Pennant, arct. Zoolog. II. p. 455.

Klein, av. p. 102. Gen. XIII.

Briffon, ornitholog. II. p. 251. Gen. LXXIV.

Batsch, Thiere, I. p. 386. Gen. XCVIII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 755. Gen. LXXVIII.

Hermann, tab. affin. anim. p. 142.

Donndorff, Handb. d. Thierg. p. 310. Gen. LIX.

1. CREX. *Der Wachtelkönig* (4)

Müller, Naturfyst. II. p. 435. n. 1. *der Wachtelkönig.*

Leske, Naturgesch. p. 272. n. 1. *der Wachtelkönig.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 100. n. 1. *der Wachtelkönig.* Tab. 55.

Blumen-

- (4) Flügelweite 16 Zoll. *Bechstein.* — Gewicht 6 bis 8 Unzen, nachdem er mager oder fett ist. *Pennant.* Schon beym *Plinius* finde ich die Sage, daß dieser Vogel der Wachteln Heerführer im Strich sey, und davon ist vielleicht die deutsche Benennung entstanden. Brüet drey Wochen.

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 217. n. 1.
Rallus (Crex) alis rufo-ferrugineis; *Wachtel-*
könig, *Schneerz*.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 444. n. 1. *der Wachtel-*
telkönig.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 263. n. 1.
der Wachteikönig p. 267. *Ralle*, *Schnarr-*
wachtel, *Wiesenkarrer*, *Wiesenschnarcker*,
Arpschnarp, *Feldwächter*, *Gras- und Wiesen-*
läufer, *Schnarrichen*, *Schnarker*, *Schars*, *Schre-*
cke, *der alte Knecht*, *Egenschär*, *Grasrät-*
scher, *Schnarf*, *Kressler*, *Heckschnarr*, *Gröf-*
sel, *Schnärz*.

Ebert, Naturl. II. p. 103. *der Wachtelkönig*.

Halle, Vögel, p. 492. n. 539. *der Wiesenkarr-*
rer. Fig. 37.

Gatterer, vom Nutzen und Schaden der Thiere,
II. p. 222. n. 211. *die Ralle*.

Neuer Schaupl. der Natur, IX. p. 408. *Wachtel-*
telkönig.

Onomat. hist. nat. V. p. 768. *der gemeine Wachtel-*
telkönig.

Pennant, arct. Zool. II. p. 458. A. *der Wachtel-*
telkönig.

Handb. d. Naturgesch. II. p. 308. n. 3. *der Wachtel-*
telkönig.

Handbuch der deutschen Thiergesch. p. 112. *der*
Wachtelkönig.

Klein, av. p. 102. n. 1. Rallus terrestris, vulgo
Rex Coturnicum.

Klein, Vorber. p. 190. n. 1. *Gras- Wiesenläufer*,
alte Knecht, *Schryck*.

Klein, verb. Vögelhist. p. 105. n. 1. *Wachtelkönig*.

Klein, stemmat. av. p. 22. Tab. 23. fig. 2. a. b.

Klein, Vögeleyer, p. 31. Tab. 12. fig. 1.

- Gesner*, Vögelb. p. 52. *Crex*. p. 542. *Wachtelkönig*; mit 1 Fig.
- Briffon*, ornithol. II. p. 253. n. 3. *Rale de genet ou Roi de Cailles*.
- Batsch*, Thiere, I. p. 394. *der Wachtelkönig*.
- Latham*, Syst. ornithol. II. p. 766. n. 1. *Gallinula (Crex) grisea pennis medio nigricantibus, alis rufo-ferrugineis, corpore subtus albo rufescente*.
- Beseke*, Vögel Kurl. p. 68. n. 142. *der Wachtelkönig*.
- Siemssen*, meklenb. Vögel, p. 176. n. 1. *der Wachtelkönig, Wachtelkönning*.
- Fischer*, Naturgesch. von Livland, p. 88. n. 116. *Wachtelkönig, der schwarze Casper*.
- Cetti*, Naturgeschichte von Sardinien, II. p. 286. *der Wachtelkönig*.
- White*, Naturgesch. von England, p. 34. n. 15. p. 59. n. 17. *Wachtelkönig*.
- Bock*, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 366. *der Wachtelkönig*.
- Linné*, auserl. Abh. II. p. 282. n. 31. p. 297. n. 90. *der Wachtelkönig*.
- Pontoppidan*, Dännem. p. 171. n. 1. *Skovsnarre, Akerrixze*.
- Pontoppidan*, Norwegen, II. p. 123. *Aker-Rixe, Ager-Hön*.
- Döbel*, Jägerprakt. I. p. 58. *Schnertz*.
- Naumann*, Vogelsteller, p. 177. *Wachtelkönig*.
- Hervieux*, Canarienvögel, p. 181. *Wachtelkönig*.
- Scopoli*, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 124. n. 154. *die Schnarre*.
- Schwed. Abh. XXXVIII. p. 294. *Wiesenkarrer*.
- Naturf. XIII. p. 220. n. 134. *der Wachtelkönig*.
- Meidinger*, Vorles. I. p. 131. n. 1. *der Wachtelkönig*.
- Zorn,

Zorn, Petinoth. I. p. 549. II. p. 284. Schnarre.
Schriften der dronth. Gesellschaft, II. p. 308. 311.

Ager - Rixe.

Eberhard, Thiergesch. p. 97. *der Wachtelkönig.*

Jablonsky, allgem. Lex. p. 1350. *Wachtelkönig.*

Hannöv. Magazin, 1780. p. 416.

Zückert, Speis. a. d. Thierreich, p. 105.

Linné, Syst. Nat. Edit. VI. p. 25. n. 1. *Crex.*

Linné, Syst. Natur. Edit. X. I. p. 153. n. 1. *Rallus*

(*Crex*) *alis rufo - ferrugineis.*

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 27. n. 218. *Rallus*

(*Crex*) *alis rufo - ferrugineis.*

Charleton, onomast. zoic. p. 106. n. 3. *Crex.*

p. 75. n. 14. *Ortygometra.*

Schwenkfeld, av. Sil. p. 313. *Ortygometra*; *Schnecker, Wachtel - König.*

Moehring, av. gen. p. 73. n. 85. *Ortygometra.*

Hermann, tab. affinit. animal. p. 142. *Rallus*

Crex.

Schäfer, element. ornith. Tab. 60.

Zinnar. Uov. p. 36. Tab. 5. fig. 18. *Re delle*

Quaglia.

Decouv. Russ. I. p. 470.

Plin. hist. nat. L. p. c. 23. *Ortygometra.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 310. n. 1.

der Wachtelkönig.

β. *Briffon*, ornitholog. II. p. 253. n. 5. *Poule-Sultane rouffâtre.* (5)

γ. *Latham*, Syn. III. I. p. 251. n. 1. *Var. A.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 767. n. 1. β. *Gal-*

linula corpore rufo - fusco, subtus pallidior,

remigibus caudaque saturatoribus, gula crisso-

que albidis.

♂. *Latham*, Syn. III. I. p. 252. n. 1. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 767. n. 1. γ. Galinula corpore supra rufo griseo, subtus tectricibusque alarum ferrugineo-fuscis, pedibus obscuris.

3. AQUATICUS. *Die große Wasserralle.* (6)

Müller, Naturfyst. II. p. 436. n. 2. *die große Wasserralle.*

Leske, Naturgesch. p. 272. n. 2. *die große Wasserralle.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 102. n. 2. *der große Wasserralle.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 445. n. 2. *der große Wasserralle.*

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 267. *die große Wasserralle.* p. 271. *die schwarze Wasserstelze, das Samthuhn, Miethuhn, schwarze Wassertreter, kleine Wasserhühnchen, Thauschnarre, schwarze Caspar.* Tab. 14.

Ebert, Naturl. II. p. 103. *die größere Wasserralle.*

Halle, Vögel, p. 413. n. 540. *der graue Wisenknaurer.*

Halle, Vögel, p. 493 n. 541. *die schwarze Wasserstelze.*

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 222. *die große Wasserralle.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 766. *die große Wasserralle.*

Klein, av. p. 103. n. 2. *Rallus aquaticus.*

Klein,

- (6) Kömmt als Zugvogel in der Mitte des Aprils zu uns, und verläßt uns zu Ende des Septembers wieder. Nistet auf trocknen Hügeln in Sümpfen und an feuchten Teich- und Seeufern. Legt 8 bis 12 Eyer. Das Fleisch ist sehr schmackhaft.

Klein, Vorbereit. p. 191. n. 2. *schwarzer Wasser-
treter, Wasserläufer.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 105. n. 2. *schwarze Rat-
le, Thauschnarre.*

Klein, Stemmat. av. p. 22. Tab. 23. fig. 1. a. b.

Gesner, Vögelb. p. 251. *Sammethünlein; m. 1 F.*

Briffon, ornitholog. II. p. 251. n. 1. *Râle d'eau.*

Batsch, Thiere, I. p. 394. *die große Wasser-
ralle, das Sammethuhn.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 755. n. 1. *Ral-
lus (Aquaticus) alis griseis, fusco-maculatis,
hypochondriis albo maculatis, rostro subtus
fulvo.*

Siemss n., meklenb. Vögel, p. 176. n. 2. *die Was-
serralle.*

Bock, Naturgesch. von Preussen, IV. p. 367. *die
große schwarze Wasserralle.*

Cetti, Sardin. II. p. 287. *Rallus aquaticus.*

Pennant, R. d. Schottl. I. p. 18. *Afchhühner.*

Linne, auserles. Abh. II. p. 296. n. 91. *die Was-
serralle.*

Pontoppidan, Naturgesch. v. Dännemark, p. 171.
n. 2. *Vagtelkonge, Vandrixe.*

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 125. n. 155.
der Wasserrall.

Naturf. XIII. p. 221. n. 135. *die große Wasserralle.*

Zorn, Petinotheol. II. p. 421. *das Sammet-Hünlein.*

Meidinger, Vorles. I. p. 131. n. 2. *die große Was-
serralle.*

Eberhard, Thiergesch. p. 97. *der Wiesenknarrer,
Sammthuhn.*

Schriften der dronth. Gefellsch. II. p. 308. *Vand-
höne oder Wasserhuhn. Tab. 12.*

Linne, Syst. Natur. Edit. VI. p. 25. n. 1. *Ortygo-
metra alis fuscis.*

Linne', Syst. Natur. Edit. X. I. p. 153. n. 2. Rallus (Aquaticus) alis griseis, fusco maculatis, hypochondriis albo maculatis, rostro luteo.

Müller, zoolog. dan. prodr. p. 27. n. 219. Rallus (Aquaticus) alis griseis fusco maculatis, hypochondriis albo maculatis, rostro subtus fulvo.

Charleton, onomast. zoic. p. 107. n. 4. Gallinula serica.

Schwenkfeld, av. Siles. p. 283. Glareola VII. Aesch-Hünlein?

Jonston, av. p. 160. Gallinula serica.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 142. Rallus aquaticus.

Schaefer, element. ornithol. Tab. 60. (caput.)

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 311. n. 2. die große Wasserralle.

3. PORZANA. Die kleine Wasserralle.

Müller, - Natursystem, II. p. 437. n. 3. die kleine Wasserralle.

Borowsky, Thierreich, III. p. 102. n. 3. die kleine Wasserralle.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 445. n. 3. der mittlere Wasserralle.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 271. der mittlere Wasserralle. p. 273. kleine europäische Wasserralle, *Winkernell*, *Grasshuhn*, *Makosch*. Tab. 15.

Gatterer, vom Nutzen u. Schaden der Thiere, II. p. 222. n. 213. die kleine Wasserralle.

Onomat. hist. nat. VI. p. 771. die kleine europäische Wasserralle, *Winkernell*.

Klein, Vögeleyer, p. 31. Tab. 12. fig. 2. (Rallus alter, *Casparus*.)?

Gesner, Vögelb. p. 248. Ochra; *Winkernell*.

Briffon,

Brisson, ornitholog. II. p. 252. n. 2. petite Râle d'eau ou la Marouette.

Batsch, Thiere, I. p. 394. die kleine Wasserralle.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 772. n. 19. Gallinula (Porzana) fusco-olivacea, nigro albidoque variegata et maculata, subtus cinerea, albedo varia, rectricibus duabus intermediis albo-marginatis.

Siemssen, meklenburg. Vögel, p. 177. n. 3. die Wiesenschnarre.

Frisch, Vögel, Tab. cit. das kleine gesprenkelte Wasserhuhn.

Scopoli, Bemerk. a. d. Naturgesch. I. p. 117. n. 144. Tringa Porzana.

Meidinger, Vorles. I. p. 131. n. 3. die kleine Wasserralle.

Charleton, onomast. zoic. p. 108. n. 5. Porzana Italarum.

Jonsson, av. p. 160. Gallinula Ochra.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 311. die kleine Wasserralle.

12. CREPITANS. Die Klapperralle.

Pennant, arct. Zool II. p. 455. n. 324. die Klapperralle, Tab. 20. kleinere Fig.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 756. n. 2. Rallus (Crepitans) olivaceo-fuscus, gula alba, collo subtus pectoreque fusco-flavescentibus, hypochondriis cinereo alboque transversim lineatis.

13. TROGLODYTES. Die neuseeländische Ralle.

Ist, nach *Latham*, mit *R. Australis* p. 717. n. 18. einerley.

4. FUSCUS. Die braune Ralle.

Müller, Natursyst. II. p. 437. n. 4. die braune Ralle.

Onomat. hist. nat. VI. p. 769. *die braune Ralle.*

Briffon, ornithol. II. p. 256. n. 7. Râle brun des Philippines.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 757. n. 6. Rallus (Fuscus) fuscus, crisso albo undulato, pedibus flavis.

Naturf. XII. p. 221. n. 13. *die braune Ralle.*

Bock, Naturgesch. v. Preussen, IV. p. 367. *die braune Ralle.*

5. STRIATUS. *Die gestreifte Ralle* (?)

Müller, Natursyst. II. p. 537. n. 5. *die gestreifte Ralle.* Tab. 17 fig. 5.

Onomat. hist. nat. VI. p. 772. *der gestreifte Ralle.*

Briffon, ornithol. II. p. 255. n. 5. Râle rayé des Philippines.

Latham, Syn. III. r. p. 232. n. 4. Var. C.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 756. n. 4 γ. R. nigricans albo-undulatus, pedibus flavis.

6. TORQUATUS. *Die Ringelralle.*

Müller, Natursystem, II. p. 438. n. 6. *die Ringelralle.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 102. n. 4 *die Ringelralle.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 772. *die Ringelralle.*

Briffon, ornith. II. p. 255. n. 6. Râle à collier des Philippines.

Batsch, Thiere, I. p. 394. *die Ringelralle.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 757. n. 5. Rallus (Torquatus) fuscus, fubtus albo-undulatus, linea infra oculos alba.

7. PHILIPPENSIS. *Die philippinische Ralle.*

Müller, Naturf. II. p. 438. n. 7. *die bandirte Ralle.*

Onomat.

(7) Nach Latham eine Varietät von *Rallus Philippensis* n. 7.

Onomat. histor. nat. VI. p. 770. *die größere philippinische Ralle.*

Briffon, ornithol. II. p. 254. n. 4. *Râle des Philippines.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 756. n. 4. Rallus (Philippensis) fuscus subtus griseo-fasciatus, superciliis albis, collo subtus rufescente.

β. Latham, Syst. ornithol. II. p. 756. n. 4. β. R. rubro-fuscus, nigro alboque maculatus et striatus, capite castaneo, corpore subtus superciliisque cinereis.

γ. Latham, Syn. III. I. p. 332. n. 4. Var. B.

Latham, Syst. ornith. II. p. 757. n. 4. δ. R. fuscus albo-maculatus et striatus, subtus albus, superciliis griseis, cauda fusco alboque fasciata.

δ. R. supra fuscus, subtus cinerascens, dorso alisque albo maculatis lineatis, abdomine imo albo fasciis nigricantibus. *

Latham, Syn. Suppl. p. 225. n. 4. Var. D.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 757. n. 4. ε.

3. BENGALENSIS. *Die bengalische Ralle.* (8)

Müller, Natur Syst. II. p. 438. n. 8. *die bengalische Ralle.*

Halle, Vögel, p. 494. n. 542. *die braungrüne Wasserstelze.*

Onomat. histor. natur. VI. p. 768. *die Ralle aus Bengala.*

Klein, av. p. 104. n. 5. Rallus aquaticus bengalensis.

Klein, Vorbereit. p. 192. n. 5. *bengalische Ralle.*

Klein, verbess. Vögelhist. p. 106. n. 5. *bengalische Wasserralle.*

Briffon,

(8) Nach Latham eine Varietät von *Scolopax Capensis*.

Briffon, ornitholog. II. p. 266. n. 9. Chevalier de Bengale.

Latham, Syn. III. i. p. 140. Var. D. Bengal Water-Rail.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 717. n. 10. *d.* Scolopax albus capite colloque nigro, alis dorsoque viridibus, remigibus primariis rubro maculatis.

9. CAROLINUS. *Das Lerchenhuhn.*

Müller, Naturfyft. II. p. 439. n. 9. *die carolinische Ralle.*

Pennant arct. Zool. II. p. 456. n. 326. *das Lerchenhuhn.*

Onomat. histor. nat. VI. p. 768. *die carolinische Wasserralle.*

Klein, av. p. 103. n. 4. *Rallus terrestris americanus.*

Klein, Vorbereit. p. 192. n. 4. *braune Ralle aus Amerika.*

Klein, verb. Vögelhist. p. 106. n. 4. *braune Erdralle.* n. 8. *Ralle aus der Husonsbay.*

Briffon, ornitholog. II. p. 356. n. 9. *Poule-Sultane de la Baye de Hudson.*

Latham, Syst. ornith. II. p. 771. n. 17. *Gallinula (Carolina) grisea, capistro nigro, pectore plumbeo, rostro flavo, pedibus virescentibus.*

Seligmann, Vögel, III. Tab. 40. *braune Ralle.*

Seligmann, Vögel, V. Tab. 39. *das kleine amerikanische Wasserhuhn.*

Donndorff, Handb. der Thiergesch. p. 311. n. 4. *das Lerchenhuhn.*

14. PHOENICURUS. *Die rothgeschwänzte Ralle.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 770. n. 14. *Gallinula (Phoenicura) fronte incarnata, corpore nigro*

nigro, vertice subtus genisque albis, crisso caudaque ferrugineo-rubris.

Naturforsch. I. p. 273. n. 9. *das rothgeschwänzte Wasserhuhn.*

β. Latham, Syst. ornithol. II. p. 770. n. 14. β. Galinula fronte rubra, corpore cinereo-nigricante subtus albo, abdomine imo crissoque rufis.

γ. Latham, Syn. III. I. p. 260. n. 13. Var. B.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 771. n. 14. γ. Galinula fronte alba, corpore supra nigro-nitente, subtus albo, crisso rubro.

10. VIRGINIANUS. *Die virginische Ralle.* (9)

Müller, Natursystem, II. p. 439. n. 10. *die virginische Ralle.*

Onomat. hist. nat. VI. p. 773. *die amerikanische Landralle.*

Pennant, arct. Zool. II. p. 455. n. 325. *die virginische Ralle.*

Briffon, ornithol. II. p. 257. n. 8. Rallus Virginianus; *Râle de Virginie.*

Briffon, ornithol. II. p. 257. n. 9. *Rale de Pensylvanie.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 755. n. 1. β. R. superne fuscus, infra fusco-rufescens, rectricibus fuscis, superciliis gulaque albis.

Latham, Syn. III. I. p. 228. *Virginian Rail.*

Seligmann, Vögel, VIII. Tab 69. *der amerikanische Wasserschneppf oder Wachtelkönig.*

15. FERRUGINEUS. *Die rothbrüstige Ralle.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 758. n. 7. Rallus (Ferrugineus) nigricans, subtus cinereus, collo pectore-

(9) Nach Pennant und Latham eine Varietät von Rallus Aquaticus n. 2.

pectoreque ferrugineis, hypochondriis albo transversim lineatis, superciliis pallidis.

11. **CAPENSIS.** *Die capsche Ralle.*

Müller, Naturfyst. Supplem. p. 120. n. 11. *die capsche Ralle.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 758. n. 8. *Rallus* (Capensis) ferrugineus subtus albo nigroque fasciatus.

16. **CAERULESCENS.** *Die bläuliche Ralle.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 758. n. 9. *Rallus* (Caerulescens) fusco-ruber, corpore subtus albo, collo antice pectoreque pallide caeruleis, hypochondriis albo nigroque transversim lineatis.

17. **ZEYLANICUS.** *Die zeylanische Ralle.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 758. n. 10. *Rallus* (Zeylanicus) ferrugineus, subtus pallide ruber fusco-nebulosus, capite nigricante, rostro pedibusque rubris.

18. **AUSTRALIS.** *Die neuseeländische Ralle.* (10)

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 756. n. 3. *Rallus* (Australis) cinereo-ferrugineus, alis caudaque saturate brunneis, pennis nigro-fasciatis.

19. **PACIFICUS.** *Die Ralle von den Inseln des stillen Oceans.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 758. n. 11. *Rallus* (Pacificus) niger, albo punctatus, alis fasciatis. corpore subtus albido, capite fusco, pectore cinereo-caerulescente.

20. TA-

(10) Ich behalte die deutsche Benennung von n. 12. p. 713 hier bey, weil *Latham* selbst seinen *Troglodyte Rail* mit *Rallus Australis* *Sparrm.* für einerley ausgiebt.

20. **TABUENSIS.** *Die Ralle von Tonga tabu.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 759. n. 12. Rallus
 (Tabuensis) corpore toto nigro, subtus palli-
 diore, palpebris iridibusque rubris.
- β. *Latham*, Syst. ornithol. II. p. 759. n. 12. β. R.
 fusco-nigricans, crisso albo nigroque, fasciis
 nigris, pedibusque rubris.
21. **NIGER.** *Die schwarze Ralle.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 759. n. 13. Rallus
 (Niger) corpore toto fusco-nigricante, rostro
 flavo, pedibus rubris.
22. **SANDWICHENSIS.** *Die Ralle von den Sand-
 wichinseln.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 759. n. 14. Rallus
 (Sandvicensis) pallide ferrugineus, supra ma-
 culis obscuris, rostro pedibusque cinereis.
23. **TAHITIENSIS.** *Die otaheitische Ralle.*
Latham, Syst. ornithol. II. p. 759. n. 15. Rallus
 (Taitiensis) cinereus, corpore supra rubro-
 fusco, gula remigibusque latere exteriori al-
 bis, cauda nigra.
24. **OBSCURUS.** *Die dunkelbraune Ralle.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 759. n. 16. Rallus
 (Obscurus) fusco-ferrugineus, striis nigris,
 subtus ferrugineo-fuscescens, pedibus rubro-
 fuscis.
25. **LONGIROSTRIS.** *Die langschnäblige Ralle.*
Latham, Syst. ornitholog. II. p. 759. n. 17. Ral-
 lus (Longirostris) corpore supra cinereo fus-
 co maculato, subtus ferrugineo-albo, hypo-
 chondriis albo transversim undatis, rostro
 elongato ferrugineo.

26. **VARIEGATUS.** *Die schwarz und weißbunte Ralle.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 760. n. 20. Rallus (Variegatus) nigro alboque maculatim variegatus, remigibus caudae fuscis, tectricibus alarum fuscis albo striatis.

27. **CAYENNENSIS.** *Der Kiolo.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 760. n. 21. Rallus (Cayannensis) olivaceo-fuscus, vertice subtusque rufus, genis nigricantibus, remigibus nigris.

Donndorff, Handb. d. Thiergesch. p. 312. n. 5. *der Kiolo.*

β. *Latham*, Syn. III. 1. p. 238.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 761. n. 1. β. R. fuscus, corpore subtus et vertice castaneo, genis cinereis, gula crissoque albidis.

28. **JAMAICENSIS.** *Die jamaicaische Ralle.*

Briffon, ornitholog. II. p. 258. n. 10. Râle de la Jamaïque.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 761. n. 22. Rallus (Jamaicensis) fusco-rufescens, taeniis nigricantibus, collo subtus pectoreque caerulefcente, capite nigro, abdomine, femoribus hypochondriisque fusco alboque undatis.

Seligmann, Vögel, VII. Tab. 68. *das kleine Wasserhuhn.*

29. **MINUTUS.** *Die kleine cayennische Ralle.*

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 761. n. 23. Rallus (Minutus) fuscus, subtus flavescens, dorso alisque maculis striisque pallidis, superciliis fasciisque hypochondriorum et caudae albis.

β. *Latham*,

β. *Latham*, Syn. III. 1. p. 240. n. 21. Var. A.

Latham, Syst. ornithol. II. p. 761. n. 23. β. Rallus fuscus dorso fasciis albis, corpore subtus albido, abdomine et hypochondriis albo nigroque undulatis.

30. PUSILLUS. *Die taurische Ralle.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 446. n. 4. die kleine Wasserralle.

Bechstein, Naturgesch. Deutschl. III. p. 274. n. 4. die kleine Wasserralle. p. 276. das kleine Wasserhühnchen, Sumpfschmerze. Tab. 16.

Latham, Syst. ornith. II. p. 761. n. 24. Rallus (Pusillus) ferrugineo nigroque lituratus, corpore subtus nigro fasciis albis, iugulo pectoreque caeruleiscentibus.

Pallas, Reise, Ausz. III. A.h. p. 11. n. 30 Rallus pusillus.

31. BARBARICUS. *Die Ralle aus der Barbarey.*

Latham, Syst. ornithol. II. p. 760. n. 18. Rallus (Barbaricus) fuscus, alis albo-maculatis, uropygio albo nigroque vario, crisso albo.

A. *Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Vermehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit 21 Gattungen vermehrt, Bey der 1sten Gattung sind vier, bey der 7ten drey Varietäten aus einander gesetzt.

B. *Unbestimmtere Thiere.*

I. *Die unbestimmte Ralle.*

Latham, Syll. ornitholog. II. p. 760. n. 19. Rallus (Dubius) fusco ferrugineoque lituratus,

abdomine albo, hypochondriis fuscis ferrugineo-cinerascente fasciatis, remige prima extus longitudinaliter alba.

94. GESCHLECHT. PSOPHIA. *Der Trompetenvogel.* (Knarrhuhn.)

Müller, Naturfyft. II. p. 440. Gen. XCIV.

Leske, Naturgesch. p. 278. Gen. LXII.

Blumenbach, Handbuch der Naturgesch. p. 217. Gen. LXVI.

Bechstein, Naturgesch. I. p. 442. Gen. XLVIII.

Latham, Syst. ornith. II. p. 657. Gen. LVIII.

Downdorff, Handbuch der Thiergesch. p. 312. Gen. LX.

I. CREPITANS. *Der Agami.* (1)

Müller, Naturfyft. II. p. 440. *der Farzer.*

Borowsky, Thierreich, III. p. 81. n. 1. Grus Psophia, *der Trompetenvogel, das Knarrhuhn.*

Blumenbach, Handb. d. Naturgesch. p. 218. n. 1. Psophia (Crepitans) nigra, pectore columbino; *der Agami, Mackukawa.*

Bechstein, Naturgesch. I. p. 442. *der Trompetenvogel.*

Bechstein,

(1) Hier findet sich in mancher Rücksicht eine große Verwechslung der Synonymen bey den Ornithologen; besonders zwischen dieser Gattung und *Tetrao Maior* Gmel. p. 767. n. 63. In der XIIten Edition rechnete Linné die *Macucaqua* des Raj. *Marcgr. Psf.* und *Will.* mit hieher, die auch *Brisson* bey seinem *Perdix maior Brasiliensis* anführt. In der XIII. Edition sind diese Synonymen zu *Perdix Maior* gezählet — Von dem *Caracara* sagt *Büffon* selbst, daß es der *Agami* nicht sey, und auch *Latham* hat den *Caracara* des *Büffon* und *du Tertre* bey dem *Agami* nur zweifelhaft aufgeführt.

- Bechstein*, Naturgesch. Deutschl. II. p. 183. *der Trompetenvogel.*
- Neuer Schauplatz der Natur, IX. p. 149. *Trompetenvogel.*
- Onomat. histor. nat. VI. p. 697. *das Knarrhuhn.*
p. 699. *Blähungshuhn.*
- Klein*, verbess. Vögelhist. p. 104. n. 17. *blühender Strandläufer.*
- Briffon*, ornithol. I. p. 64. n. 5. *große Perdrix du Bresil.*
- Briffon*, ornitholog. I. p. 75. n. 2. *Faisan des Antilles.*
- Batsch*, Thiere, I. p. 393. *das Knarrhuhn.*
- Büffon*, Vögel, V. p. 309. *der Karakara.*
- Büffon*, Vögel, XIII. p. 203. *der Agami*; mit 1 Figur.
- Latham*, Syst. ornitholog. II. p. 657. n. 1. *Psophia (Crepitans) nigra, dorso griseo, pectore caeruleo-viridi splendente, orbitis nudis rubris.*
- Pallas*, Naturgesch. merkwürd. Th. IV. p. 5. *Grus Psophia.* p. 8 *der Trompetenvogel oder der Trompeter, Mucutaqua, die knarrende Psophia.* Tab. 1.
- Fermin*, Beschreib. von Surinam, II. p. 141. *der Trompetenvogel.*
- Reis. der Missionar. (von Murr) p. 232. *Trompetero.*
- Samml. zur Phys. und Naturgesch. III. p. 104. *der Agami.*
- Condamin* Reis. p. 261. *der Trompeter.*
- Linné*, Syst. Nat. Edit. X. I. p. 154. n. 1. *Psophia (Crepitans).*
- Vosmaer*, monogr. Amst. 1768. *Trompette Americain*; mit Abbild.

Hermann, tab. affinit. animal. p. 133. Psophia
Crepitans.

Donndorff, Handbuch der Thiergesch. p. 312.
der Agami.

2. **UNDULATA.** *Der afrikanische Trompeten-
vogel.*

Latham, Syn. Suppl. p. 225. Undulated Trum-
peter.

Latham, Syst. ornitholog. II. p. 657. n. 2. Pso-
phia (Undulata) cristata undulata, subtus alba,
pennis pectoralibus dependentibus.

*Veränderungen gegen die XIIte Edition, und Ver-
mehrung der Gattungen dieses Geschlechts.*

Das Geschlecht ist mit *einer* Gattung vermehrt.







SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01038 3982

L